




+QK314  
.G55  
t.4



Bequest of  
Kenneth K. Mackenzie  
October 1934









FLORA  
BADENSIS  
ALSATICA

ET  
CONFINIUM REGIONUM

CIS ET TRANSRHENANA

PLANTAS PHANEROGAMAS

A LACU BODAMICO USQUE AD CONFLUENTEM MO-  
SELLAE ET RHENI SPONTE NASCENTES  
EXHIBENS

SECUNDUM SYSTEMA SEXUALE

CUM

ICONIBUS AD NATURAM DELINEATIS

Auctore

CAROLO CHRISTIANO GMELIN

MED. DOCT.

Magni Ducis Badens. Consiliar. Aul. intim. Botan. et Hist.  
Nat. Prof. Publ. Ord. Directore Musei Natur. Colleg. Med.  
Bad. Membr. Ord. Acad. Imp. Nat. Cur. Nat. Scrut. Berol.  
Freiburg. Halens. Heidelb. Helvet. Marburg. Suevic. Wet-  
terav. Phytogr. Gorenkensis. Botan. Ratisbonens. Soc. Phys.  
Medic. Erlang. Agricult. Scient. et Art. Rheni infer.  
Agricult. Bad. Ettling. et Württemberg. Forestr. et Venat.  
in Dreysigaker. Pharmacev. Badens. Sodal. Mineralog.  
Jenens. Assesor.

*Tom. IV.*

*Supplementa cum Indicibus.*

---

CARLSRUHAE  
IN OFFICINA AUL. MÜLLERIANA

1 8 2 6.





FLORA  
BADENSIS  
ALSATICA

ET

CONFINIUM REGIONUM

CIS ET TRANSRHENANA

PLANTAS PHANEROGAMAS

A LACU BODAMICO USQUE AD CONFLUENTEM MO-  
SELLAE ET RHENI SPONTE NASCENTES  
EXHIBENS

SECUNDUM SYSTEMA SEXUALE

CUM

ICONIBUS AD NATURAM DELINEATIS

Auctore

CAROLO CHRISTIANO GMELIN

MED. DOCT.

Magni Ducis Badens. Consiliar. Aul. intim. Botan. et Hist.  
Nat. Prof. Publ. Ord. Directore Musei Natur. Colleg. Med.  
Bad. Membr. Ord. Acad. Imp. Nat. Cur. Nat. Scrut. Berol.  
Freiburg. Halens. Heidelb. Helvet. Marburg. Suevic. Wet-  
terav. Phytogr. Gorenkensis. Botan. Ratisbonens. Soc. Phys.  
Medic. Erlang. Agricult. Scient. et Art. Rheni infer.  
Agricult. Bad. Ettling. et Würtemberg. Forestr. et Venat.  
in Dreysigaker. Pharmacev. Badens. Sodal. Mineralog.  
Jenens. Assesor.

*Tom. IV.*

*Supplementa cum Indicibus.*

---

CARLSRUHAE

IN OFFICINA AUL. MÜLLERIANA

1 8 2 6.

+Q1314

655

t. 4

Ut ut sit, nostra tamen enumeratio hactenus terminum aliquem figit, ultra quem, cum voluptate posteri excurrent, nostracque penui, suas addere divitias gaudebant. Et ego desidero superari satisque puto, mihi decoris fore, si fundamentum aedificio straverim. Hall. praef. ad Hist. Stirp. Helvet. p. XXII.

5634





---

## PRAEFATIO.

---

Succedit jam FLORÆ BADENSIS et ALSATIÆ, tertio Tomo SUPPLEMENTORUM ad omnes plantas phanerogamas multum et diu impedita editio, ad quam pauca habeo quæ præmittam.

Singularem curam adhibendam mihi duxi in repetendis plantis saltem rarioribus COMITATUS WERTHEMIENSIS, quæ ne in prioribus voluminibus suo loco interponi possent, impedivit soli istius ad Floræ nostræ provinciam accessio, insituto jam opere. In quo negotio multum me quidem adiuvit non solum instructissimi quondam et in me amicissimi *Wibelii* liber: *primitias Floræ Werthemiensis* continens sed et ejusdem et post eum acutissimi *Mertini*, pharmaceutæ liberalitas, permultas plantas ex collectionibus suis, mihi impertientium.

Ipse vero repetitis itineribus, quo studio ejus ditionis nascentia rariora aut dubia investigaverim, investigata definierim, spero fore ut benevoli lectores lubenter agnoscant.

Ex opposita fere plaga, concesso tempore non intermisi, regiones ad Lacum Bodamicum sitas plantis intentus iterato revisere, quin al-

pibus adjacentibus ut, *Gamor*, *Kasten et Sentis* dictis vallibusque interjectis me immitere, in quibus plantas non paucas in hisque rariores, ut *Rhododendron ferrugineum Saxifragam bifloram et rotundifoliam* aliasque in natali solo observavi, quæ inde ad loca demissiora ad Lacum et in vallem Rheinthal delatæ sunt, pro supplementis non aspernandæ.

Quæ vero in aliis regionibus plantæ, nisi casu aliquo allatæ vel diligentissimi scrutatoris oculos forte subterfugerant, potissimum per juvenem *Alexandrum Braun*, in arte instructissimum, in detegendis plantis minutioribus atque rarioribus felicissimum, in lucem protractæ, suo quæquæ loco interpositæ observabuntur.

Superest ut omnibus bonis doctissimisque viris et amicis, qui suas observationes acceptissimas benevolenter mecum communicaverunt, gratissimum meum animum publice profitear.

Quæ restat adhuc plantarum Cryptogamicarum recensio, duobus voluminibus comprehensa, sine mora sequetur, atque ita volente Deo totum opus conficietur.

Scripsi Carlsruhæ Mense Aprili 1825.

Carolus Christianus GMELIN.



---

# SUPPLEMENTUM

A D

## FLORAM BADENSEM

ALSATICAM ET CONFINIUM REGIONUM

CIS ET TRANSRHENANAM.

Tom. I.

---

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

---

pag. 2. I. HIPPURIS.

*Nux* unilecularis, monosperma.

**HIPPURIS** *vulgaris*.

*var.* β. foliis submersis latioribus longioribus.

*Hab.* passim in regionibus rhenanis. In ditone  
Basileensi Michelfeldæ et prope patibulum.  
t. *C. Bauhino*. In Principatu superiore ad  
lacum Bodamicum vidi.

Suppl. ad Flor. Bad. Tom I.

A

# CLASSIS II.

## D I A N D R I A.

---

### M O N O G Y N I A.

pag. 11. post LYCOPUM,

XIV \* MONARDA. *Cor.* ringens, galea lineari  
obvolvante genitalia.

XIV \*\* ROSMARINUS. *Cor.* ringens, galea fal-  
cata. *Stamina* curva.

pag. 11. post CIRCEAM.

\*\*\*\*\* *Flores glumacei (Schænus Mariscus.)*

pag. 16. post CIRCEAM *lutetianam.*

10. \* CIRCEA *intermedia* caule erecto  
glabro, racemo simplici terminali, foliis  
subcordatis glabris, sinuato-serratis, peti-  
olis membranaceo-angulatis.

*C. intermedia.* Ehrh. *Beitr.* 4. p. 42. Koch  
et Ziz. *Cat. pl. palat.*

*C. alpina.* *Fl. Dan.*

*C. alpina*  $\beta$ . *major.* caule majori erecto,  
foliis obscure viridibus. Schrad. *Fl. Germ.*  
1. p. 14. Smith. *Fl. Brit.* 1. p. 14. Willd.  
*Linn. Sp. pl.* 1. p. 54.

*Icon. Fl. Dan. tab.* 256. (*mediocris.*)

*Germ. Mittleres Hexenkraut.*

*Gal. la Circée intermédiaire.*

*Hab.* in montosis aquosis roridis nec non ad scaturigines sylvæ nigrae passim. *Auf dem Kallenbrunn*, prope *Forbach*, in monte *Gniebis* prope *Griesbach* et *Rippolsau* frequens, ubi eam legi 1805.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. 2.

Differt ab affini *C. lutetiana*: *Caule* simpliciusculo, pallide viridi, glabro, *Foliis* subcordato-acuminatis sinuato-serratis, tenuioribus, glabris, pallide viridibus. *Racemo* unico. *Corollis* majusculis albidis. a *C. alpina*: *Caule* semper multo longiori, erecto, nunquam ad terram decumbente, *Foliis* majoribus. *Racemo* multo majori. *Corollis* duplo triplove majoribus.

*Nota.* Planta ex seminibus in horto Carlsruhensi culta, constans, minime pro varietate *C. alpinae* habenda.

pag. 16. *CIRCEA alpina*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Botany*. tab. 1057.  
*Flor. Dan.* tab. 1321.

*Hab.* in monte *Gniebis*, et in montosis prope *Donaueschingen* frequens.

pag. 19. *VERONICA spicata*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot.* tab. 2.

pag. 20. post *VERONICAM spicatam*.

14.\* *VERONICA hybrida* foliis oppositis crenatis cauleque pubescentibus; radicalibus petiolatis ovatis, caulinis subsessilibus oblongis. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 17.

*V. hybrida*, spicis terminalibus, foliis oppositis elliptico-obtusis, inæqualiter cre-



nato-serratis, caule erectiusculo. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 16. *Linn. Mantiss.* p. 316. *Willd. in Schrad. Diar. Bot.* 1799. 1. p. 388. tab. 3.

*Veronica spicata* Cambrobritannica Bugulæ subhirsuto folio. *Ray. Syn.* p. 278. tab. 11.

*Veronica mas erecta latifolia spica cœrulea. Barrel. Icon.* tab. 682.

*Icon. Sowerby Engl. Bot.* tab. 673. (optima).

*Germ. Bastard-Ehrenpreis.*

*Gall. Veronique batarde.*

*Hab.* In Ditione Basileensi in montosis calcareis asperis. In Principatu sub superiori retro *Möskirch am Donauthal* prope *Werrenwag* rarius, in agro Abbatiscellensi prope *Weisbad* in subalpinis alpinisque calcareis ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 4.

Maxime affinis *V. spicatae*, a qua differt. Foliis inferioribus petiolatis, ovatis, nec ut in *spicata* oblongo-obovatis, in petiolum decurrentibus.

*Caules, Folia, Spicæ, Corollæque* majores.

*Variat.* Spica simplici, spicisque tribus, media majori.

pag. 23. post *VERONICUM saxatilem*.

16.\* *VERONICA fruticulosa* corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis, subdenticulatis, calycinis foliolis acutis, caulibus fruticulosus. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 61.

V. *fruticosa* caulibus fruticosis basi procumbentibus, racemo terminali multifloro, foliis oppositis elliptico-lanceolatis subdenticulatis, calycibus acutis. *Wulffen apud Jacqu. Collect. IV. p. 229.*

V. foliis ovatis crenatis, fructu ovali, floribus in summo caule purpurascens. *Hall. Hist. 1. tab. 16.*

*Icon. Wulffen l. c. tab. 5. Sowerby Engl. Bot. tab. 1028.*

*Germ. Stauden-Ehrenpreis.*

*Gall. Veronique fruticulé.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen* prope *dem Weisbad am Wildkirchlein, dem Gamor et Kasten, ubi vidi 1814.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2.

*Fruticulus* basi decumbens, dein erectus, foliosus, subpubescens, spithamæus. *Folia* opposita, lanceolato-elliptica, rariter serrulata, interdum integriuscula, pallide viridia, margine subvillosa. *Flores* corymbosi. *Corymbi* terminales erecti, 3-5-9 flori. *Calyx* tetrapartitus: laciniis acutiusculis, villosis. *Corolla* roseo-incarnata, lineis purpureis picta. *Capsula* obovato-subcordata, obtusa, hirsuta.

16.\*\* *VERONICA alpina* corymbo terminali subspicato, foliis ovatis glabris subserratis, calyce ciliato, caule adscendente simplici. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 18.*

V. *alpina* corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispidis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 15.*

V. caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis. *Linn. Fl. Lapp. 7. tab. 9. fig. 4.*

V. caule simplici, foliis ovatis glabris subserratis, spica pauciflora. *Hall. hist. n. 544. tab. 15. fig. 2.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 484. Oed. Fl. Dan. tab. 16.*

*Germ. Alpen-Ehrenpreis.*

*Gall. Veronique des alpes,*

*Hab. in vicinia Principatus superioris retro St Gallen in pascuis subalpinis alpinisque lapidosis prope dem Weisbad, dem Gammor, Kasten et Sentis frequens, ubi vidi 1818.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 24.*

*Caulis* adscendens, 2-3-5 uncias longus, simplex, foliosus, basi plus minusve radicans, subhirsutus. *Folia* opposita, ovali-elliptica, sæpe integerrima, interdum rariter et obsolete crenulata, subhirsuta, tenuia, obscure viridia. *Flores* terminales, corymbosi. *Corymbus* brevis 7-12 florus. *Calyx* obtusiusculus, hirsutus, *Corollæ* parvæ, albido-cœruleæ, venis saturatioribus pictæ, quandoque albidæ. *Capsula* elliptica, emarginata, pubescens. *Foliorum* pili per lentem articulati.

*Obs.* In variis Pyrenæorum, et in Helvetiæ subalpinis alpinisque, sæpe in uno eodem loco, individua vidi, foliis plus minusve approximatis, acutiusculis obturisque, rariter dentato-crenulatis, integerrimisque. Hinc V. integrifolia Willd. Sp. pl. 1. p. 63. et Schrankii Fl. Salisb. vix ac ne vix, specie diversa est.



**16.\*\*\*** *VERONICA aphylla* corymbo terminali, scapo nudo. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 14. *Wulf. in Jacqu Coll.* 3. p. 28.

*Veronica* caule nudo, foliis ovatis serratis, racemo paucifloro. *Hall. helv. n.* 541.

*Veronica* parva saxatilis, cauliculis nudis. *Seguier. pl. veron.* 1. p. 241. *Pluck. Phyt.*

*Veronica alpina pumila* caule aphylo. *Bocc. Mus.*

*Icon.* *Seguier l. c. tab.* 3. *fig.* 2. — *Pluck. l. c. tab.* 114. *fig.* 3. — *Bocc. l. c. tab.* 1 et 9.

*Ger m.* *Blätterloser - Ehrenpreis.*

*Gall.* *Veronique à phylle.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia in calcareis alpium *Sentis, Gamor et Kasten* ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2.

*Radix* multiceps, ramoso - fibrosa. *Scapi* adscendentes, unciales, subbiunciales, teretes, villosi. *Folia* radicalia in rosulam digesta, subpetiolata, obovata, subcrenulata, utrinque villosa. *Corymbus* terminalis, 2 - 3 - 4 - 5 florus. *Corollæ* mediocres, cœrulescentes. *Capsulæ* majusculæ, obovatæ, emarginatæ, villosiusculæ.

**16.\*\*\*\*** *VERONICA bellidioides* corymbo terminali, caule adscendente diphylo. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 15. *Wulf. in Jacqu. Coll.* 3. p. 23.

*Veronica* caule simplici paucifloro, foliis scabris ovatis serratis, spica pauciflora. *Hall. helv. n.* 543.

*Veronica alpina bellidisfolia.* *Bauh. Pin.*  
247. *Prodr.* 115.

*Icon.* *Hall. l. c. tab.* 15. *fig.* 1.

*Germ.* *Mafsliebenblättriger-Ehrenpreis.*

*Gall.* *Veronique à séville de Bellis.*

*Hab.* In iisdem cum præcedente alpinis passim non infrequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2.

*Radix* ramoso-fibrosa, dura. *Caulis* adscendens, demum erectus, digitalis, palmaris et altiores, simplicissimus, durus. *Folia* radicalia in rosulam digesta, ad terram expansa, sessilia, cuneiformi-elliptica, obtusa, firma, hirsuta, margine obsolete crenulata. *Caulina* opposita, duorum rarius trium parium, radicalibus similia sed minora, basin versus angustiora, erecta. *Flores* terminales, racemosi, 5-7 congesti. *Calyx* tetrapartitus, laciniis ellipticis, duris, hirsutis. *Corolla* medioeris, pallide cærulea, venis saturatioribus picta. *Capsula* magna, elliptica, acutiuscula, apice subemarginata, hirsuta, nigricans.

pag. 27. *VERONICA scutellata. L.*

*var. B. villosa* foliis villosis.

*Icon.* *Flor. Dan. tab.* 1561.

*Hab.* promiscue circa *Carlsruhe* et alibi ad fossas.

*Folia* villosa, subincana.

pag. 35. *VERONICA urticæfolia.*

*Hab.* in Principatu superiore retro *Möskirch*

*im Donauthal* in rupibus calcareis humidiusculis, nec non eam in vicina helvetia prope *Alstædten* im *Rheinthal* vidi.

pag. 39. *VERONICA Tournesortii.*

*Icon. Hagenb. Fl. Basil.*

*Hab.* nunc circa *Carlsruhe* in agris passim frequens, nec non circa *Rintheim*, *Mühlburg*, *Dachslad* et alibi a brevi tempore quasi spontanea.

pag. 45. post *VERONICAM vernam.*

32.\* *VERONICA præcox* floribus pedunculatis solitariis, foliis inferioribus subpetiolatis oppositis cordatis serrato-crenatis ciliato-setulosis, caule erecto ramoso setuloso, capsulis ventricosis, obcordatis longitudine calycis.

*V. præcox* floribus solitariis, foliis inferioribus oppositis cordatis profunde dentatis, superioribus alternis incisissimis, capsulis oblongis ventricosis. *Loise. Fl. Gall.* 1. p. 11. — *Allion. Auct.* 5. tab. 1. fig. 1.

*V. acinifolia.* *Poll. Fl. Palat.* p. 19. (excl. *Linnæi* *Synon.*)

*Icon. Hagenb. Fl. Basil.*

*Germ. Früher-Ehrenpreis.*

*Gall. Veronique præcoce.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* retro *Durlach* in agris colliculosis calcareo-argillaceis, apricis, in arenosis prope *Schwetzingen*, in Brisgovia monte *Kaiserstuhl* ad vineas frequens. In Palatinatu circa *Alzey*, *Frankenthal*, *Oba*, *Edekum* t. *Pollichio.* Prope *Wertheim* in



agris calcareo-lutosis prope *Kümmelhof* et *Dertingen* frequens t. *Mertino* pharmacopœo.

*Flor.* Martio, Aprili, Majo. *Semina* Majo, Junio matura. ☉

Differt a *V. acinifolia* Linn. Statura in omnibus partibus majori. *Caulibus* magis ramosis, crassioribus, hispidioribus. *Foliis* inferioribus breviter petiolatis, cordatis, profunde 7-9 serrato-crenatis hispidioribus, duplo triplove majoribus (non sessilibus ovatis obsoletissime 2-3 dentatis, glabriusculis.) *Capsulis* majoribus, magis inflatis. *Corollis* intense cœruleis majoribus.

*Nota.* Pollichii planta omnino huc, nec ad *V. acinifoliam* pertinet, ut ex ejus adumbratione patet.

pag. 45. *GRATIOLA officinalis.*

*Hab.* in Principatu superiore prope *Radolfzell* ad lacum Bodamicum abunde. Inter *Höcklingen* et *Kennzingen* in pratis humidis. Obvia et varietas major flore albo, foliis latioribus et longioribus: inter *Mühlburg* et *Dachsland*.

Varietas hæc memorabilis, in horto ultra decem jam annos culta, auctaque, constantissima.

pag. 48. *PINGUICULA vulgaris*

*Hab.* in pratis paludosis prope *Waghäufsel* frequens.

pag. 49. post *PINGUICULAM vulgarem.*

35.\* *PINGUICULA alpina* nectario conico petalo brevior. Linn. *Sp. pl.* 1. p. 25.

— *Flor. Lapp. tab. 12. fig. 3.* — *Roth. Fl. Germ. 2. p. 27.* *Hoffm. Fl. Germ. p. 8.*

*P. calcare brevissimo. Hall. hist. n. 293. Icon. Oed. Fl. Dan. t. 453. — Gunner. Fl. Norweg. t. 4. fig. 4.*

*Germ. Alpen-Fettkraut.*

*Gall. Grassette des alpes.*

*Hab. in Principatus superioris vicinia retro St. Gallen prope dem Weisbad, dem Gamor et Kasten vidi 1818.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto maturata. 4.*

Differt a *P. vulgari*; *Corolla* alba, *Palati* maculis duabus luteis picto. *Nectario* conico, *corolla* brevior, *apice* flavo aut rubello.

pag. 50. post *UTRICULARIAM vulgarem.*

**36.\*** *UTRICULARIA intermedia* nectario conico, labio superiore integro palato duplo longiore, foliis tripartitis, laciniis capillaribus dichotomis. *Hayne in Schrad. Journ. für die Botan. I. ann. 1800. p. 18. tab. 5.*

*Utricularia intermedia* nectario conico, labio superiore plano palato duplo longiore. *Vahl. enum. plant. 1. p. 198.*

*Utricularia vulgaris minor. Linn. Sp. pl. 1. p. 26.*

*Icon. Sowerby Engl. Botany 35. tab. 2429.*

*Germ. Mittlerer Wasserschlauch.*

*Gall. Utriculaire intermediaire.*

*Hab.* promiscue in iisdem cum præcedenti regionibus.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 24.

Differt ab affini *U. vulgari*. *Scapo* tenuiori 2-3 floro. *Labio* corollæ superiori, palato duplo longiore, nec æquali. *Nectario* labio inferiori adpresso, nec a labio inferiore reclinato.

pag. 54, post *LYCOPUM europæum*.

#### XIV.\* MONARDA.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 48.*

*Calyx* monophyllus, tubulatus, cylindricus, striatus, ore quinquedentato æquali. *Corolla* inæqualis. *Tubus* cylindricus calyce longior. *Limbus* ringens. *Labium superius* rectum, angustum, lineare, integrum, *Labium inferius* reflexum, latius, trifidum, lacinia media longiore angustiore, emarginata; lateralibus obtusis. *Stamina Filamenta* duo setacea longitudine labii superioris a quo involuta. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis cum staminibus involutus. *Stigma* bifidum, acutum. *Semina* in fundo calycis quatuor subrotunda.

*Obs.* *M. didyma*: stamina 4 profert, quorum duo castrata.

39.\* *MONARDA didyma* floribus capitatis subdidynamis, caule acutangulo. *Linn. Sp. pl. 1. p. 32.*



*M. didyma* foliis ovatis glabris capitulis verticillatis, floribus subdidynamis, caule acutangulo. *Linn. ed. Willd. 1. p. 125.*

*Icon. Mill. Dict. tab. 122. fig. 1. Trew. Ehret. tab. 66.*

*Germ. Scharlachrothe Monarde, wohlriechende oder Balsam-Monarde.*

*Hab.* In Pennsylvania. Colitur passim in hortis rusticorum, nec non in vineis.

*Flor.* Julio. *Semina* Augusto Septembri maturantur.

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caulis* erectus, 2-3 pedalis et altior, acute angulatus. *Folia* opposita petiolata, ovata, glabra. *Flores* speciosi, terminales, verticillato-capitati, coccinei.

Mire rusticorum hortos in montosis et convallibus passim condecorat.

Folia suaviter odorata, ab anglis et passim a nostratibus Theæ loco adhibentur. Medicatas omnino vires possidet. Magis propaganda, ad balnea aromatica omnino suadenda. Ex floribus apes mel colligunt.

#### XIV.\*\* ROSMARINUS.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 49.*

*Calyx* monophyllus, tubulatus, superne compressus; ore erecto bilabiato: superiore integro, inferiore bifido. *Corolla* inæqualis. *Tubus* calyce longior. *Limbus* ringens. *Labium superius* bipartitum erectum brevius, acutum, marginibus reflexis; *L. inferius* reflexum, trifidum, *lacinia media* maxima, concava, basi angusta; *lateralibus* angustis acutis. *Fila-*

*menta* duo subulata cum dente. *Germen* quadrifidum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* simplex acutum. *Calyx* semina in fundo continens, quatuor, ovata.

39.\*\* *ROSMARINUS officinalis* foliis subsessilibus linearibus marginibus reflexis.

*R. officinalis* foliis sessilibus. *Linn. ed. Willd.* 1. p. 126.

*Rosmarinus hortensis* angustiore folio. *Bauh. pin.* 217.

*Rosmarinus hortensis coronarius.* *Tabernæmont l. c. p. 311. Icon.*

*Rosmarinum coronarium.* *Lob. Icon. p. 429. Camerar. Epit. Icon.*

*Icon. Blackw. herb. tab. 159. Bulliard. herb. tab. 20. Plenk. Icon med. tab. 18.*

*Germ. Rosmarin.*

*Gall. Rosmarin.*

*Hab.* In Gallia australi, Italia, Hispania. Colitur in rusticorum hortis et passim in vineis.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Julio matura. *Fruticulus.*

*Frutex* in hortis sæpe 2-3-5 pedalis et altior. *Rami* oppositi copiosi erecti, *Folia* opposita subsessilia linearia patentia, firma, margine revoluta, supra atroviridia, subluca subtus albide tomentosa, sempervirentia. *Flores* verticillato-racemosi. *Corollæ* cœrulescentes. *Filamenta* postice denticulo recurvo notata.

Variat foliis latioribus et angustioribus.

*Pharm. ROSMARINI Herba. ROSMARINI s. ANTHOS Flores.*

Herba fragrans, aromatica, irritantes, resolventes, nervinas vires possidet. Oleum æthereum continet. Spiritus Rosmarini, sub Aqua Reginae Hungaricæ notus.

Oves Monspelienses ab esu Rosmarini sapidas carnes sortiuntur. Gabr. P. Sallé, mat. med. in regn. veget. Monsp. 1768. 4<sup>to</sup> p. 14.

Rosmarinus hispanis Romero audit et ibi hinc inde præsertim in regno Valentino et in Catalonia maxima in abundantia vidi. Planta peregrinatori et botanico omnium odiosissima: odor fragrans, acutus, nares et palatum lædit, oculos irritat et caput obnubilat. Vera ovium pestis, a quibus non tangitur, odore nimis excitante, illis vertiginem mortemque non raro caussat; hinc ovium pastores omni præcautione Romerale s. i. e. loca Rosmarino plena, evitant.

In fasciculos collectus, ad usum foci adhibent, nec non ex virgis dentiscalpia in hispania parant.

Flores apibus multum et optimum mel concedunt.

Planta in hortis culta, tritissima est rusticis puellis, diebus festivis acceptissima. Hyemes fortiores apud nos ægre fert.

pag. 55. ante *SALVIAM pratensem*.

40.\* *SALVIA officinalis* foliis lanceolato-ovatis crenulatis floribus spicatis, calycibus acutis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 34,

*S. officinalis.* foliis lanceolato-ovatis crenulatis, verticillis paucifloris, calycibus mucronatis. *Ettlinger. Salv. p.* 16.

α. *Salvia major.* *Dodon. Pempt.* 290. *Tabernæmont. p.* 760. *Icon. Lobel. Icon.* 554.

β. *Salvia minor.* *Dodon. Pempt.* 290. *Tabernæmont- p.* 761. *Icon. Lobel. Icon.* 555.

*Icon. Blackw. herb. tab.* 71.

*Ger m. Garten-Salbey.*



*Gall. Sauge.*

*Hab.* In Europa australi. Colitur in hortis et passim in vinctis.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. *Suffrutex.*

*Radix* lignosa, simpliciuscula, fibrosa. *Caulēs* ex radice plurimi, suffruticosi, pedales sesquipediales altiores, erecti et ramosi, tomentoso-villosi. *Rami* axillares, oppositi. *Folia* opposita, petiolata, ovali-oblonga, obtusa, quandoque acutiuscula, utrinque minutim villosa, supra rugosa, margine crenulata. *Flores* verticillati. *Verticilli* sub sexflori. *Bracteæ* calyce breviores, ovatae, integrae, concavae, acutae, nervosae, deciduae. *Calycis* dentes mucronati. *Corolla* dilute cœrulæa.

*Variat.* Foliis majoribus et minoribus, viridibus, plus minusque variegatis aureis argenteisque.

*Pharm. SALVIÆ FOLIA.*

Amaricantia, fragrantia, aromatica, nervina, resolventia, roborantia. Quotidiana medicina domestica in aphthis oris, in laxitate gingivarum dentium vacillatione. In atonia vasorum et viscerum, in cachexia, chlorosi, fluore albo, malo hysterico — et optimos producit effectus in sudoribus symptomatice post morbos acutos sæpe remanentibus. Ettling. l. c. p. 56.. Flores apibus mel concedunt.

*Nota.* Non planta integra, sed folia perfecta, selecta, bene mundata et siccata, in vitris obturatis servanda sunt. Persaepe in officinis pharmaceuticis foliorum loco, herbam integram conspurcatam, corruptam, inveteratam et inertem pro dolor vidi, et removi.

*Obs.* *Salvia sylvestris* foliis cordato-lanceolatis undatis biserratis maculatis acutis, bracteis

teis coloratis flore brevioribus. Linn. Sp. pl. 1. p. 34. Frustra hucusque in magno Ducatu Badensi et in confiniis, a me quaesita est.

40.\*\* *SALVIA verticillata* foliis cordatis, crenato-dentatis, stylo labio inferiori corollae incumbente. Linn. Sp. pl. 1. p. 37. Roth. Flor. Germ. 1. p. 12.

*Salvia* foliis cordatis serratis, verticillis densissimis in spicam continuatis. Hall. hist. n. 251.

*Horminum silvestre*, latifolium verticillatum. Bauh. pin. 238. Moris. hist. 3. p. 395. sect. 11. tab. 14. fig. 29.

*Horminum spurium*. Rivin. pl. monop. irr. tab. 60.

Germ. Quirlförmige Salbey.

Gall. Sauge verticillé.

Hab. ad viarum marginalia circa *Carlsruhe* inter *Rippur* et *Ettlingen* ad dextram viæ publicæ; prope *Bauschlott*. In Principatu superiori, ad viarum marginalia inter *Engen* et *Stockach* in terra calcareo-argillacea, ubi eam vidi. Ann. 1814.

Flor. Junio, Julio. Semina Augusto maturâ. 2.

*Caulis* sesquipedalis, bipedalis, erectus, tetragulus, villosus, subramosus; ramis oppositis. *Folia* petiolata, cordato-subagittata, crenato-dentata, acutiuscula, rugosa, villosa, læte viridia, petiolis foliorum præsertim infimorum pinnarum parvarum subrotundarum pari auctis. *Flores* verticillati breviter pedunculati. *Verticilli* remoti, densi, multiflori. *Bractææ* cordato-lanceolatae, villosae, mox marcescentes. *Corollæ* violaceo-cæruleae, externe pubescentes. *Tubus*

calyce longior. *Labium* superius breve, fornicatum, basi coarctatum. *Stylus* e medio tubi prominens, labio inferiori incumbens.

40.\*\*\* **SALVIA** *Sclarea* foliis rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis floralibus calyce longioribus coloratis concavis acuminatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 38. Horminum sylvestre primum. *Clus. hist.* p. XXVIII.

Orvala *Dodon. Pempt.* p. 292.

*Sclarea officinarum* Gallitrichum. *Lobel. Icon.* 556.

*Sclarea. Tabernæmont. p.* 764. *Icon.*

*Icon. Blackw. tab.* 122. *Regnault. Bot.*

*Germ. Garten-Scharlach. Muscateller-Salbey. Muttersalbey.*

*Gall. La Sclarée. Orvale. Toute bonne.*

*Hab.* In Gallia meridionali, Austria, Italia, Hispania. Ad muros nonnullorum hortorum et passim in vineis Brisgoviae t. generoso *Yttnero*. Colitur passim in hortis rusticorum.

*Flor.* Julio. *Semina* Augusto matura. ♂

*Radix* fusiformi-cylindrica, crassiuscula, fibrosa, fusco-lutescens. *Caulis* erectus, crassus, 3-4-5 pedalis, ramosus, villosus-viscidulus. *Folia* inferiora longe petiolata, maxima, cordata, acutiuscula, oblonga, crenato-serrata, rugosa villosula, summa minora, sessilia. *Panicula* speciosa, brachiata. *Verticilli* triflori. *Bractæ* cordatæ, speciosæ, concavæ, acuminatæ, calycibus longiores, albido-rubellæ, margine ciliatæ. *Calyces* compressi, sulcati, piloso-glutinosi, mucronati. *Corollæ* majusculæ, albidæ seu albide-cærulescentes. *Semina* subrotunda, e luteo-rufescentia.

**Nota.** Planta speciosa vix in Germania spontanea, sed perraro in vineis, hortiis, ad muros culta.

**Pharm. SCLAREÆ s. HORMINISATIVÆ s. GALLITHRICHI Folia.**

Planta amaricans. Folia recentia et siccata maxime aromatica. Omnino in medicina maxime efficax, quanquam hodiernis medicis nostratibus superflua, multis plane incognita. Qualitates spirantes! Vis: fortior Salvia officinali, stimulans, exhilarans, sternutatoria, resolvens. Usus: Leucorrhœa, Hysteria, Colica. Linn. Mat. med. ed. Schreb. p. 43.

Herba recens et siccata hispanis praesertim Castilianis sub Matrisalvia. Herba Tota Buena tritissima, efficacissima in fluore albo, Chlorosi, remissione menstruorum, ataxia mensium et in Colica saepe dirissima a refrigerio orta, nec non contra sudores nocturnos. Hinc in horto regio pharmaceutico Madritensi in abundantia colitur, ut ipse vidi.

Summum facile medicamentum in relaxationibus, corrosionibus, cumprimis in fluore albo. Infunditur herba in aqua calida, qua refrigerata, saepe lavantur partes affectae. Copiose in Castiliis, balneis aromaticis tepidis et frigidis ex hac herba paratis utuntur. Haec balnea omnino ad stimulantia et exhilarantia pertinent.

Cerevisia et vinum herba imprægnatum inebriant insigniter, capitis dolores excitant. Herm. Cynos. Mat. med. 1. p. 460. Lobel. Advers. p. 240. Vino saporem moschatellinum imbuit.

**Obs.** In pharmaciis nostratibus et confiniis sub Herba Sclareae semper herbam integram Salviae pratensis inveteratam, corruptam et inertem omnino vidi.

**Nota.** Folia Sclareae bene siccanda, et in vasis vitreis obturatis, in pharmaciis servanda sunt, talia vidi in officinis Madritensibus.

Planta in hortis, muris et vineis magis et praesertim in regionibus rhenanis ad Thermas et Acidulas colenda est. Flores apium culturae maxime idonei.



# CLASSIS III.

## TRIANDRIA.

---

### MONOGYNIA.

post FEDIAM:

\* *Flores superi.*

XVIII.\* CROCUS. *Cor.* monopetala, sexpartita, erecto-patula. *Stigmata* convoluta colorata.

## TRIANDRIA

### TRIGYNIA.

pag. 63. post HOLOSTEUM:

LII.\* POLYCARPON. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* trivalvis polysperma.

### TRIANDRIA MONOGYNIA.

pag. 67. VALERIANA *officinalis*.

Quinque hujus varietates memorabiles, in terris Badensibus obveniunt:

*Var.* 1. Caule stricto simplici, tenui glabro striato, foliis omnibus pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis, angustis, omnibus integerrimis glabriusculis læte viridibus.

*Var.* 2. Caule stricto, simplici, tenui, glabro striato, foliis omnibus pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis, angustis integris, non-

nullis denticulo uno alterove obsoleto instructis, glabriusculis, læte viridibus.

Synonyma et Icones pro 1 et 2 vix apud veteres et hodiernos prostant.

*Nostratibus. Edel-Baldrian. Feiner Baldrian. Bergbaldrian mit sehr schmalen ganzen Blättchen.*

*Hab. var. 1. et 2.* In collibus, montosisque asperis dumetosis apricis siccioribus arvisque calcareo-argillaceis et gypsaceis Principatus *Fürstenbergensis*, prope *Donau-eschingen, Unadingen, Fürstenberg, Geisingen, Möhringen, Engen, Stockach, Zizenhausen, Möskirch*, inter *Möskirch et dem Donauthale*, retro *Stetten am Kalten-Markte* et passim alibi non infrequens, ubi eam vidi 1805 et sq.

In var. 1 et 2. *Radix* minor quam in sequentibus varietatibus, magis firma, pallide flavida, aut flavercente albido-fusca. *Caulis* 3-4-7 pedalis, strictus, teres, striatus, glaber, raro subvillosus, simplex, crassitie pennæ anserinæ. *Folia* opposita, omnia pinnata, inferiora petiolata; superiora sessilia. *Foliola* subsessilia, alterna oppositaque, lineari-lanceolata, in var. 1. omnia integerrima, (in var. 2. obsolete dente unico-alterove instructa,) glabra, lineam ad binas lineas lata, sesquiunicam ad 2-2½ uncias longa, læte viridia. *Flores* corymbosi, terminales, triandri. *Corollæ* subminores quam in reliquis varietatibus, maxime suaveolentes, albidæ, albido-rubellæ.

Obs. Var. 1 et 2. in hortum Carlsruhensem Anno 1805. a me transplantatae, hucusque ibi constantissimæ.

*Pharm. VALERIANÆ NOBILIS Radix.*

Radices ex var. 1 et 2. omnes reliquas Valerianae officinalis varietates, odore gravi, et sapore fragrante amaricante longe antecellunt et plus olei aetherii continent. Hinc jure meritoque in medicina et in officinis pharmaceuticis nostris et aliis sub Valeriana nobili introducenda est.

**Nota.** Vidi radices varietatum 1 et 2 in pharmacologia egregia aulica, Serenissimi Principis Fürstenbergensis ad fontes Danubii (Donau-eschingen) et quidem selectissimas, tempore vernali lectas, optime siccatas, in vitris obturatis servatas. Degustavi ibidem oleum ex his radicibus, longe majori in quantitate elicited aethereum, limpidissimum, flavescent, ex flavescente-rubellum, fragrantissimum et omnino maxime antispasmodicum.

**Var. 3.** Caule erecto glabro aut subvillosa, striato-sulcato, subsimplici, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, angustioribus et latioribus remote serratis, glabriusculis subvillosisque, extremo subtrilobo.

Valeriana sylvestris major montana, *Casp. Bauh. Pin. p. 164.*

Valeriana media et montana. *Tabernæmont. l. c. p. 456.*

Valeriana foliis angustioribus. *Rivin. Monop.*

Valeriana sylvestris angustifolia. *Hill. Valerian.*

Valeriana sylvestris. *Blackw. herb. tab. 271.*

Valeriana officinalis. *Plenk. Icon. med. tab. 27.*

Phu minus. *Camerar. Epitome p. 22. Icon. (foliolis angustioribus.)*

Phu germanicum. *Fuchs. hist. 857. Icon. (foliolis latioribus.)*

Phu vulgare. *Tabernæmont. l. c. p. 555.*

*Icon.* repæsentat omnino Valerianam ejus mediam et montanam. (Foliola medium tenent inter angustifolia et latiora.)

*Germ.* *Großer schmalblättricher Bergbaldrian. Aechter officineller Baldrian.*

*Hab.* Utrunque in collibus asperis dumetosis apricis siccioribus, sylvisque montosis, ad muros et rudera arcium præsertim antiqua, passim frequens.

*Nota.* Hanc varietatem in Flora sub V. officinali descripsi.

Ex hac varietate sumenda est *Radix Valerianæ sylvestris* medicorum, quæ omnino in locis colliculosis, montosisque siccis apricis, nec non ad rudera arcium antiqua, elevata lecta, magis graveolens, et fragrans est, quam sequens in humidis, demissioribus aut sylvis udis aquosis lecta.

*Var. 4.* Caule erecto sulcato, glabriusculo aut villosulo, ramoso, foliis omnibus pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, sublanceolatisque grosse dentato-serratis, aut dentatis, latioribus, villosulis aut glabriusculis, supremo trilobo.

*Valeriana palustris major* profunde laciniata.

*Casp. Bauh. Prodr. p. 86.*

*Valeriana sylvestris major. Casp. Bauh. Pin. 164.*

*Valeriana latifolia palustris. Hill. l. c.*

Phu vulgare. *Tabernæmont. p. 455. (excepta Icone.)*

*Germ.* *Großer Wasserbaldrian. Großer Sumpfbaldrian.*



*Hab.* Utrinque in sylvis humidis, udis, aquis præsertim Alneis, Populinis, Salicetis. Copiose circa Carlsruhe in sylva uda *Auacker*, in sylva Durlacensi, ad fossarum marginalia, nec non ad rivos, rivulosque, ad Rhenum, Mœnum, Nicarum, Tuberim et alibi.

*Radix* major quam in tertia varietate, minus firma, magis aquosa, albida, longe minus fragrans. *Caulis* 4-5-9 pedalis, sæpe crassior, profundius sulcatus, plus minusve superne ramosus. *Folia* majora. *Foliola* sæpe ovato-lanceolata, latiora, grosse dentata, seu dentato-serrata.

*Nota.* Radices hujus ex pharmacis omni cura tanquam fere inertes, removendae sunt. Confer. Hill. *Valerian*.

*Obs.* Dum munus visitatoris Pharmacopoeiarum Badensium per plures annos habui Radices ibi sæpe non rite collectas, conspurcatas, et asservatas ex sola hac varietate majori latifolia palustri, cum rudimento sæpe ultraunciali crasso caulis, pro dolor vidi, et reiteratim tanquam inertes removi, et demonstravi medicis et pharmaceutis loca aprica montosa, collina, sicca, ubi Radices *Valerianae sylvestris* tempore vernali antequam caulem edunt, colligendae sunt.

In excursionibus botanicis persaepe mensibus Junii et Julii in sylvis rhenanis aquosis, mulierculas rhizotomas vidi, quae ex hac varietate palustri, Radices pro Pharmacis, magna in abundantia colligebant!

*Var. 5.* Caule erecto, crasso, sulcato, villoso, ramoso, foliis omnibus pinnatis seu radicalibus nonnullis subternatis, foliolis in foliis inferioribus subcordatis, ovatisque latioribus grosse inciso-dentatis, in superioribus late ovato-lanceolatis dentatis.

*Valeriana sambucifolia. Mikan. Willd. Enum. pl. Suppl. p. 3. (omnino.)*

*Valeriana palustris inodora, parum lacinata. Casp. Bauh. Prodr. p. 86.*

*Germ. Großer Wasserbaldrian mit Hollunder-Blättern.*

*Hab.* In sylvis demissioribus aquosis udis ad fossarum marginalia. Circa *Carlsruhe* in sylva *Auaker* et in sylva *Durlacensi* passim cum varietate 4. In ditione *Basileensi* in palustribus *Michelfeldensibus* t. *C. Bauhino*.

Nimis in omnibus fere partibus affinis præcedenti varietati, a qua mere differt: *Foliis* inferioribus sæpe majoribus. *Foliolis* in foliis infimis sæpe manifeste cordatis, ovali-subrotundis, ovatisque latioribus, profundius incisodentatis. *Radix* ut in præcedenti, minus odorata.

*Nota.* Amicissimus *Willdenow* hanc varietatem *An. 1810* in horto *Carlsruhensi* vidit et pro planta *perrara*: *Valeriana sambucifolia* declaravit.

*Obs.* Varietates 3 4 et 5 in horto nostro facile quidem dignoscendae, sed minus constantes sunt. Sic omnino *Valeriana* nostra tertia, ex siccioribus, in palustrem locum transplantata, abit in varietatem quartam, et forsā vice versa. Exstant omnino varietates intermediae, inter tertiam et quartam varietatem.

pag. 74. *FEDIA dentata.*

var.  $\beta$ . fructibus pubescentibus.

*Fedia dasycarpa. M. v. Bieberst. Fl. Taur. Caucas. III.*

*Valerianella pubescens. Merat.*

*Hab.* In agris sabulosis apricis prope *Schwezingen am Grenzhof* ubi eam vidi 1813.

49.\* **FEDIA** *eriocarpa* caule erecto dichotomo, foliis oblongis integriusculis, floribus corymbosis subfastigiatis, bracteis lanceolatis glabris, fructibus hispidis subsexdentatis.

*Valerianella eriocarpa.* *Loisel. Suppl. ad Fl. Gall. p. 149. Desv. Journ. Bot. 2. p. 311. Decand. Suppl. Flor. Franc. p. 493.*

*Icon.* *Loisel. l. c. tab. 3. fig. 2.*

*Germ.* *Wollhaarige Fedie.*

*Gall.* *Mache à fruit velu.*

*Hab.* in Palatinatu prope *Zweybrücken t. Bruchio.*

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Junio matura. ☉

*Caules* pedales. *Folia* radicalia spathulata, integra, caulina superiora oblonga, basi subdentata. *Fructus* hispidi, subsexdentati.

49.\*\* **FEDIA** *carinata* caule dichotomo divaricato, foliis oblongis integriusculis, floribus corymbosis congestis, bracteis lanceolatis glabris, fructibus oblongis nudis unibilicatis, dorso carinatis. *Loisel. l. c. p. 149. (sub Valerianella.)*

*Valerianella carinata.* *Decand. Fl. Franc. Suppl. p. 492. Dufresne. Diss. p. 58.*

*Icon.* *Dufresne. l. c. tab. 2.*

*Germ.* *Gekielte Fedie.*

*Gall.* *Mache carenée.*

*Hab.* In vineis cis et trans rhenum passim frequens, nec non in agris dumetosis saxosis supra et infra vineas.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Junio, Julio matura. ☉

Primo intuitu affinis *F. olitoria*, a qua facile dignoscitur: *Foliis* succulentioribus. *Corymbis* majoribus, floribus magis congestis. *Fructibus* longioribus, oblongis, non rotundis compressis.

Folia juniora in acetariis, ut *F. olitoria* adhibentur.

49.\*\*\* *FEDIA Auricula* caule dichotomo, foliis oblongis integriusculis, superioribus basi utrinque 2-3 dentatis, bracteis margine ciliatis basi membranaceis appendiculatis, fructibus ovatis, coronatis.

*Valerianella Auricula.* *Decand. Fl. Franc. Suppl. p.* 492.

*Germ.* *Ohrrandige Fedie.*

*Gall.* *Mâche oreillete.*

*Hab.* In agris apricis sabulosis passim. Prope *Schwetzingen*, nec non in Palatinatu transrheno.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Julio matura. ☉

*Caulis* digitalis, palmaris, pedalis, dichotomus, erectus, setuloso-hispidus. *Folia* inferiora longe petiolata, spathulata integra; superiora oblonga, obtusa, *ramea* lineari-lanceolata, acuminata, basi dentibus 2-3 incisa, *floralia* subulata, basi membranacea, appendiculata. *Fructus* ovatus subinflatus, glaber, coronatus corona subtridentata auriculæformi.

*Obs.* Monstrosa facile evadit, flosculis abortientibus inque folia erispata degenerantibus.



pag. 75. *POLYCNEMUM arvense*.

*var.* major pedalis, sesquipedalis, multocrassior, prostrata et adscendens.

*Hab.* in collibus calcareo - argillosis retro dem Thurnberg, et prope Grötzingen.

### XVIII.\* C R O C U S.

*Linn. Gen. pl. ed Schreb. n. 75.*

*Spatha* monophylla. *Corollæ* Tubus simplex, longus. *Limbus* sexpartitus, erectus: *laciniis* ovato-oblongis, æqualibus. *Antheræ* sagittatæ. *Stigmata* convoluta, serrata. *Capsula* subrotunda triloba, trilocularis, trivalvis. *Semina* plura, subrotunda.

50.\* *CROCUS vernus* stigmate trifido corolla brevior erecto, foliis linearibus planis. *Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 195.*

*C. sativus* β. *vernus*. foliis latioribus margine patulo. *Linn. Syst. veg. p. 83.*

*C. tuba* brevissime trifida. *Hall. helv. n. 1257.*

*C. vernus* latifolius. *Bauh. pin. 65. 66.*

*Icon, Jacqu. Fl. Austr. 5. app. 36. Blackw. tab. 144. fig. 2. Sow. Engl. Bot. tab. 344.*

*Germ. Frühlings - Safran.*

*Gall. Safran printanniere.*

*Hab.* In ditione Basileensi inter *Bruntrutum* et *Bellelai*, ubi passim tota prata replet. *Lachenalio*. Colitur in hortis rusticorum et aliorum.

*Flor.* Primo vere. 4.

*Flores* lutei, albi, cœrulescentes — — in hortis mire variantes, oculos delectantes.

Nota. Croci autumnalis sativi Stigmata, Crocum pharmaciis exhibent.

pag. 78. inseratur,

52.\* *IRIS pumila* corollis barbatis, caule foliis brevioris unifloro. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 56. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 42. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 13.

*Iris* violacea parva. *Lob. Jc.* 1. p. 63.

*Chamæiris* minor flore purpureo - purpureo - cœruleo - rubello - pallido et albo, et flore variegato. *Bauh. pin.* 33. 34.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 1.

*Germ.* *Niedere Schwerd-Lilie.*

*Gall.* *Iris nain.*

*Hab.* In Brisgovia am. *Kaiserstuhl* prope *Burgheim* in vinearum collibus, forsan ex hortis emigrata, ubi passim colitur.

*Flo r.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 4

Planta pumila, digitalis, elegantissima. *Flores* purpurei, cœruleo - purpurascens, rubelli, albide - rubelli, albidum et variegati.

Hortorum areas mire condecorat.

52.\*\* *IRIS squalens* barbata, foliis ensiformibus glabris erectis brevioribus, scapo multifloro, laciniis corollæ deflexis replicatis; erectis emarginatis. *Thunb. Diss. n.* 11. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 228. (exclus. *Jacquini J. variegata* synonym.)

**I.** *squalens* corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, petalis deflexis replicatis; erectis emarginatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 56.

**I.** folio lato rugoso, petalis repandis ex purpureo sordido pallido et luteo variis, erectis vero squalide lutescentibus. *Bærh. Lugdunb.* 2. p. 125.

*Germ.* Gelbbunte Schwerd-Lilie.

*Gall.* Iris jaune-violette.

*Hab.* Circa *Wertheim* ad mœnum in arcis muris ubi eam cum amicissimo *Wibelio* vidi 1813. forsan ex hortis emigrata.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 4.

Distinguitur ab affini *Iride variegata*: *Caule* foliis altiore. *Corollis* minoribus. *Petalis* deflexis emarginatis, luteis, venosis: venis reticulatis furco-violaceis; *Stigmatibus* sordide luteis.

**Nota.** Nostra planta est omnino vera species *Linnaei*, quae ab *I. germanica* *Linn.* toto cœlo, ut ab *I. sambucina* *Linn.* differt.

pag. 84. post *IRIDEM sibiricam*.

**54.\*** *IRIS spuria* corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule tereti, foliis sublinearibus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 58.  
— *Roth Fl. Germ.* 2. p. 44.

*Iris spathulata* imberbis, foliis ensiformibus angustis erectis caule subbrevioribus, spathis viridibus, petalis majoribus spathulatis. *Lamarck Encycl. Bot.* 3. p. 300.

*Iris pratensis angustifolia* folio fœtido. *Bauh. Pin.* 32.

*Iris tenuifolia Michelsfeldensis spontanea.*

*Joh. Bauh. hist. 2. p. 729.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 4.*

*Germ. Bastard-Schwertel.*

*Gall. Iris spathulée.*

*Hab.* In pratis humidis prope *Michelsfelden*,  
nec non in Principatu superiore ad Lacum  
*Bodanicum* ubi eam legi Ann. 1816.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 2

Differt ab affini *I. sibirica*: *Floribus* fere  
duplo majoribus. *Germinibus* hexagonis.

54.\*\* *IRIS graminea* corollis imberbi-  
bus germinibus sexangularibus, caule an-  
cipiti, foliis sublinearibus. *Linn. Sp. pl.*  
1. p. 58.

*Iris angustifolia* tertia. *Clus. hist. 1. p. 230.*

*Icon. Jacqu. Fl. Aust. tab. 2.*

*Germ. Grasblättriger Schwertel.*

*Gall. Iris graminée.*

*Hab.* In montosis *Brisgoviaë*, ad cataractas prope  
*Trieberg et Zwerrenbach*, nec non in *Vog-*  
*eso* ad montem *Ballon*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 2

Facile distinguitur *Caule* foliis semper mul-  
to brevioribus, ancipiti. *Flores* mediocres, purpu-  
reo-dilute subviolacei. *Germina* hexagona.

pag. 84. ante *SCHOENUM nigricantem*:

55.\* *SCHOENUS Mariscus* culmo te-  
reti, foliis margine dorsoque aculeatis.  
*Linn. Sp. pl. 1. p. 82. Roth Fl. Germ. 2.*  
*p. 46. Smith. Fl. Brit. 1. p. 43.*



*Mariscus panicula ramosa, foliorum oris dorsoque serratis. Hall. helv. n. 1543.*

*Cladium germanicum culmo tereti, corymbis confertis, floribus fasciculatis. Schrad. Fl. Germ. 1. p. 75.*

*Pseudocyperus palustris foliis et carina serratis. Scheuchz. Agrost. p. 775. tab. VIII. fig. 7-11.*

*Cyperus longus inodorus germanicus. Bauh. Theatr. p. 220. Icon.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 1202. Sowerby Engl. Bot. tab. 950. Schrad. l.c. tab. 5. fig. 7.*

*Germ. Sumpfgras.*

*Gall. Choin Marisque.*

*Hab. Prope Waghäusel in pratis paludosis turfosis frequens. In Principatu superiori ad lacum Bodamicum in palude inter Petershausen et Wolmatingen post Cardeurum vidi.*

*Flor. Julio, Augusto. Semina Septembri matura. 2*

*Radix repens, valida, fibrosa, fusca. Culmus 2-5 pedalis, erectus, teres, superne subtrigonus, ramosus. Folia linearia, longe acuminata, margine carinaque serrulato-aculeata. Corymbi conferti, terminales lateralesque. Calycinæ glumæ imbricatæ, fusco-ferrugineæ. Stamina duo. Stylus unicus. Stigmata 2-3. Nucula putamine duplici, exteriori nitido, castaneo, interiori griseo.*

Gramen durum, indicium turfæ subjacentis, ad rariores floræ cives pertinet.

pag. 84. *SCHOENUS nigricans. L.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 1121.*

pag.

pag. 86. *SCHOENUS fuscus*.

*Icon Fl. Dan. tab. 1562. Sow. Engl. Bot. tab. 1575.*

pag. 88. *SCHOENUS compressus*.

*Icon. Sowerby Engl. Botany 79.*

pag. 94. post *SCIRPUM palustrem*:

62.\* *SCIRPUS uniglumis* culmo teretiusculo, vaginis aphyllis, spica oblonga terminali, glumis obtusiusculis, infima breviori spicam amplexente.

*Scirpus uniglumis. Link. Jahrbuch der Gewächskunde I. 3. S. 77. Schweig. et Kærte. Fl. Erlang. p. 12. et 159.*

*Scirpus palustris. γ. Decand. Fl. Franc. III. p. 133.*

*Scirpus intermedius* aphyllus, spica oblongo-ovata subacuta, bracteis rotundatis, squamis castaneis ovatis obtusiusculis, *Thuill. Flor. Paris. II. 1. p. 21.*

*Germ. Einbalgige Binse.*

*Gall. Scirpe uniglum.*

*Hab. In turfosis udis in Palatinatu transrhenum. t. D. Ziz.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 2*

Nimis affinis varietati minori *S. palustris*, a qua differre videtur: *Culmo* graciliori, *Spica* saturatius brunnea, *Gluma* infima spicam culmi-que apicem amplexante. *Radix* repens. *Stigmata* duo, ut in *S. palustri* a qua, vix specie differt.

pag. 94. *SCIRPUS cæspitosus*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1029.

pag. 96. *SCIRPUS Halleri*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1122.

*Hab.* Prope *Waghäussel* in paludosis.

pag. 97. *SCIRPUS multicaulis*.

Deleatur *Smithii Fl. Brit. Synon.* quod ad aliam speciem perennem: *Scirpi palustris* varietatem minorem *Linn. Fl. Lapp.* γ: pertinet: Deleantur porro *Ruppil* et *Morisoni* Synonyma, et *Icon Fl. Dan. tab.* 167. a *Cl. Smithio* et *Schradero* ad *S. multicaulem Scirp. palustrem* β. minorem relatum.

*Hab.* Porro prope *Wertheim* in solo lutoso-arenoso inundationibus sæpe exposito, prope *dem Bangertshofe t. Mertino*.

*Culmi* in individuis *Werthemiensibus* e radice sæpe 100-500. *Spica* basi perraro prolifera. *Stylus* sæpissime bifidus, perraro trifidus. *Semina* per lentem utrinque marginata, *Setulis* seu villis sæpissime 8-9, quandoque 6-7, cincta.

pag. 98. *SCIRPUS acicularis*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. t.* 749.

pag. 99. *SCIRPUS fluitans*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1216. *Flor. Dan. tab.* 1082.

pag. 103. post *SCIRPUM setaceum*.

70.\* *SCIRPUS supinus* culmo tereti nudo,

spicis subtribus ovatis subsessibus in medio culmo glomeratis.

*Scirpus supinus* culmo tereti, vaginis foliiferis, spiculis lateralibus glomeratis involucri monophyllo suffultis, fructu transversim undulato. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 138.

*Scirpus supinus* culmo tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 73. — *Dalib. Paris.* 16. — *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 33. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 58.

*Icon.* *Schrad. l. c. tab.* 1. *fig.* 1. (bona.)

*Germ.* *Kleine Binse.*

*Gall.* *Scirpe couché.*

*Hab.* Prope *Dachsland an der Pfederbach* in inundatis passim non infrequens, ubi legi 1806 et demum *Alexander Braun* 1820.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. 4

Differt a *Scirpo setaceo*: *Culmis* crassioribus, sæpe ad terram declinatis. *Spiculis* multo majoribus, ovato-oblongis, sæpissime ternis, e culmo supra interdum infra medium prodeuntibus.

*Spiculæ* interdum *Bractea* filiformi patenti, foliacea semiunciali suffultæ.

Species omnino à *S setaceo* distinctissima, ad rariores Floræ cives pertinet.

pag. 109. *SCIRPUS sylvaticus.*

*Icon.* *Sowerby Engl. Bot. tab.* 919.

pag. 109. post *SCIRPUM sylvaticum.*

74.\* *SCIRPUS radicans* culmo trigono folioso, cyma terminali supradecomposita,



involucro polyphylo cincta; spiculis oblongo-ovatis, glumis muticis, culmis sterilibus demum deflexis et apice radican-  
tibus. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 147. —  
*Willd. Enum.* p. 79.

*S. radicans* culmo triquetro folioso, umbella foliacea, culmis sterilibus deflexis apice radican-  
tibus. *Schkuhr. in Usteri Annal.* 4. p. 48. tab. 1. *Hoppé Taschenb.* 1796. p. 158.

*S. sylvaticus*  $\beta$ . *radicans.* *Willd. Sp. pl.* 1. p. 308.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1742. *Host. Germ. tab.* 69.

*Germ. Wurzelnde Binse.*

*Gall. Scirpe rhizophylle.*

*Hab.* Trans Rhenum prope Zweybrücken in pratis udis non infrequens t. *Cl. Bruchio* pharmacopœo et botanico meritissimo.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio Augusto matura. 24

Primo intuitu affinis *S. sylvatico*. *Culmus* bipedalis, tripedalis, erectus, triqueter, foliatus, lævis. *Folia* vaginantia, linearia, margine et carina hispida, læte viridia, erecta, plana, subpedalia, lineas 2 - 3 lata. *Involucrum* (saltem in individuis nostratibus) 2 - 5 phyllum. *Foliorum* inæqualibus, foliis similibus, duobus umbella longioribus. *Umbella* speciosa, supradecomposita, multifida. *Spiculæ* oblongo-ovatae, compressæ, 2 - 3 - 4 lineas longæ, lineam vix latae, viridescentes. *Glumæ* muticæ. *Culmi* steriles foliati, elongati, deflexi, apice radican-  
tes, comosoque-foliacei.

pag. 110. *ERIOPHORUM vaginatum* var.  $\beta$ .  
deleatur et ejus loco inseratur:

75.\* *ERIOPHORUM capitatum* cul-  
mis vaginatis teretibus, foliis canalicula-  
tis, spica subrotunda basi involucrata, radi-  
cibus repentibus. *Host. Gram.* 1. p. 30. —  
*Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 151.

*Eriophorum Scheuchzeri*. *Roth in Sims  
and König's Annals of Botany* I. 149.

*Juncus alpinus* capitulo tomentoso majore.  
*Scheuchz. Agrost. app.* 304. tab. 7. fig. 2.

*Icon. Host. l. c. tab.* 38. *Sowerby Engl.  
Botany.* 35. tab. 2387. *Fl. Dan.* t. 1501.

*Germ.* Grostköpfiges Wollgras.

*Gall.* Linaigrette a gros tête.

*Hab.* In montosis turfosis *Sphagno* repletis  
auf dem Kaltenbrunn, inter *Villingen et Kö-  
nigsfelden*, retro *Krummenschildach*, ad  
montem *Feldberg* *Brisgoviae* frequens cum  
*E. vaginato*.

*Flor.* Julio. *Semina* Augusto matura. 2

Differt ab affini *E. vaginato*: *Spica* ovato-  
subrotunda, densiore, duplo triplove majore,  
basi involucrata.

*Nota.* In horto cultum, constantissimum per-  
mansit.

75.\*\* *ERIOPHORUM alpinum* culmis  
nudis triquetris, spica pappo brevior.  
*Linn. Sp. pl.* 1. p. 77.

*Eriophorum* caule foliisque triquetris, spica  
pauciflora. *Hall. hist. n.* 1333.

*Linagrostis juncea alpina*, capitulo parvo; tomento rariore. *Scheuchz. Agrost. p. 305. tab. 7. fig. 4.*

*Juncus alpinus hombycinus. Bauh. pin. 13. prodr. n. 23.*

*Icon. Sowerby Engl. Botany. tab. 511.*

*Germ. Alpen-Wollgras.*

*Gall. Linaigrette des alpes.*

*Hab. In pratis udis montosis inter Triberg et Fürtwangen frequens, cum Carice pauciflora legi.*

*Flor. Majo, Junio. Semina Julio matura. 2*

*Culmi* ex una radice copiosi, erecti, semipedales, subpedales tenues, triquetri, nudi, retrorsum asperi. *Folia* radicalia longitudine culmi, tenuia, triquetra, aspera. *Spica* terminalis solitaria, tenuis, parva, pappo longissimo, albo, laxo, instructa.

pag. 111. *ERIOPHORUM polystachion.*

*Eriophorum latifolium* culmis trigonis, foliis planiusculis apice triquetris, pedunculis scabris. *Schrad. Fl. Germ. 1. p. 154. Hoppé Taschenb. 1800. Icon Sowerby Engl. Bot. tab. 563. (sub E. polystachio.)*

*Nota.* Linnæus, Pollichius, Curtis aliique, sub *E. polystachio*, nostram plantam et *E. angustifolium* comprehendebant.

76.\* *ERIOPHORUM gracile* culmis teretibus, foliis triquetris sursum canaliculatis, seminibus linearibus. *Roth Catalect. bot. fasc. 11. addenda (exclus. Syn.)*

*Eriophorum gracile* culmis foliisque triquetris, spicis pedunculatis erectis, pappo brevior. *Loiseleur Delongchamps Flor. Gallica* 1. p. 34.

*Eriophorum triquetrum* culmis trigonis, foliis triquetris, pedunculis scabris. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 152.

*Icon.* Sowerby *Engl. Botany tab.* 2402. *Fl. Dan. t.* 1441. (sub triquetro.)

*Germ.* Dünnes vielähriges Wollgras.

*Gall.* Linaigrette paniculée ménu.

*Hab.* Promiscue in iisdem cum *E. polystachio* regionibus passim frequens.

*Flor.* Aprili, Majo, Junio. 2

Medium tenet inter *E. polystachion* et *angustifolium*, a priori recedit *Statura* teneriori, graciliore; *Pappo* duplo fere brevior; *Seminibus* lineari-oblongis, nec obovatis. A. posteriori differt *Culmis* tenuioribus. *Foliis* triplo angustioribus, triquetris, superne tantum canaliculatis: *culmeis* angustissimis, brevibus. *Panicula Pappoque* duplo fere brevioribus. *Involucro* communi panicula breviori. *Seminibus*.

pag. 113. *ERIOPHORUM angustifolium*.

*Eriophorum angustifolium* culmis subtrigonis, foliis canaliculato-triquetris, pedunculis glabris. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 153. — *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 59.

*Linagrostis* panicula ampliore. *Vaill. Bot. Paris. tab.* 16. fig. 1.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 564. *Flor. Dan. t.* 1442.



pag. 118. ante PHALARIDEM *phleoidem*.

80.\* PHALARIS *canariensis* panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 79.

*Phalaris canariensis* panicula ovata spiciformi, glumis calycinis navicularibus integris, corolla quadrivalvi. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 62.

*Phalaris major* semine albo. *Bauh. Theatr.* p. 534. *Scheuchz. Agrost.* p. 52.

*Phalaris.* *Joh. Bauh. hist.* 2. p. 442. *Ic. Tabernæmont. Kräuterb.* p. 552. *Ic.*

*Icon.* *Schreb. Gram.* 85. tab. 10. fig. 2. *Sowerby Engl. Bot. tab.* 1310. *Host. Gram. tab.* 38. *Leers Fl. Herborn. tab.* 7. fig. 3 †

*Germ. Canariengras. Canarisches Glanzgras. Gall. Graine de Canarie.*

*Hab.* In Canariis. Circa *Carlsruhe* in ruderratis rarius, sine dubio ex hortis ubi colitur exulans.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. ☉

*Semina* ovata, compressa, nitida alba, Fringillis canariensibus acceptissima.

pag. 118. PHALARIS *phleoides*.

*Phleum Bæhmeri* panicula subspicata cylindracea, glumis calycinis lanceolatis obtusis submucronatis scabriusculis. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 186. — *Wibel. Fl. Werth.* p. 125.

*Icon.* *Sowerby Engl. Bot. tab.* 459. *Host. gram.* 2. tab. 34.

*Hab.* porro in Brisgovia *am Kaiserstuhl* in collibus apricis prope *Limburg* et alibi. Prope *Wertheim* ad margines sylvarum circa *Uettingen*, nec non in collibus calcareo-argillaceis, ubi cum amicissimo *Wibelio* 1813 vidi.

*Radix* perennis.

pag. 120. *PHALARIS aspera*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1077. (sub *Phleo paniculato*.) *Host. Gram. 2. tab.* 37.

*Hab.* prope *Wertheim* in collibus aridis apricis teste D. *Wibelio*. Prope *Boxberg* et *Märgentheim* in collibus asperis calcareis vidi 1815. Prope *Mainz* t. D. *Kælero*.

pag. 121. post *PHALARIDEM asperam*.

81.\* *PHALARIS arenaria* spica ovato-lanceolata obtusa, glumis exacte lanceolatis ciliatis, culmo basi ramoso. *Smith. Fl. Brit. 1. p.* 62. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p.* 23. *Willd. Sp. pl. 1. p.* 328.

*Phleum arenarium* panicula subspicata oblongo-obovata, glumis calycinis lanceolatis acutis carina ciliatis, culmis adscendentibus. *Schrad. Fl. Germ. 1. p.* 189. — *Linn. Sp. pl.* — *Roth. Fl. Germ. 2. p.* 77.

*Gramen typhinum maritimum minus.* *Scheuchz. Agrost. p.* 63. *Plucken. Phyt. tab.* 33. *fig.* 8.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 222. *Flor. Dan. tab.* 915.

*Germ. Sand-Glanzgras. Sand-Lieschgras.*  
*Gall. Phalaris de sable.*

*Hab* In arenosis apricis sterilibus, in Palatinatu trans rhenum, t. *D. Kochio.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

*Radix* fibrosa. *Culmi* plures adscendentes, digitales, palmares et altiores, teretes, simpliciusculi ramosique, glaberrimi, foliosi, superne nudi, sæpe purpurascentes. *Folia* lineari-lanceolata, acuta, plana, glaucescentia, margine scabriuscula. *Vaginæ* inflatæ, glabræ, striatæ. *Ligula* obtusa. *Spica* terminalis subpaniculata, oblongo-obovata, densa, semiuncialis et longior, erecta. *Calycinæ* glumæ æquales lanceolatæ, compressæ, trinerviæ, mucronulatæ, carina ciliatæ, margine membranaceæ.

Bonum et acceptum ovibus pabulum. Arenam figit.

pag. 128. post *PANICUM viride.*

85.\* *PANICUM germanicum* spica composita coarctata, spiculis glomeratis, involucellis setaceis flore longioribus, rachi hirsuta. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 536.

*Panicum germanicum* spica composita ovata, setis brevioribus, pedunculo hirsuto. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 71. *Hoffm. Fl. Germ.* 21.

*Panicum germanicum* sive panicula minore. *Bauh. Pin.* 27.

*Panicum* I. *Tabernæmont. Kräuterb.* p. 559. *Icon.*

*Germ. Kleine Kolben-Hirse. Kleiner Kolben-Fennch.*

*Gall.* *Panic d'Allemagne.*

*Hab.* Passim in agris sabulosis. Inter segetes hinc inde crescit. Vix spontaneum.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. ☉

Differt a *Panico italico*. *Statura* semper multo minori. *Spica* duplo triplove breviori, magis coarctata, ovato-cylindrica, basi non interrupta, viridi-rubella, *Involucellis* setaceis semper multo brevioribus, *Rachi* hirsuta, *Seminibus* minoribus.

In horto cultum, constans, et specie omnino diversum a *P. italico*.

*Nota.* Olim copiose in regionibus rhenanis colebatur, hodie rarius.

85.\*\* *Panicum italicum* spica composita basi interrupta nutante, spiculis glomeratis, involucellis setaceis flore multo longioribus, rachi tomentosa. *Willd.* *Sp. pl.* 1. p. 336. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 82.

*Panicum italicum* panicula majore. *Bauh. Pin.* 27. *Theatr.* 519.

*Panicum indicum.* *Tabernæmont. Kräuterb.* p. 660. *Icon.*

*Panicum Rumph. Amboin.* 5. p. 202. *tab.* 75. *fig.* 2.

*Icon.* Metzger. *Cereal.* *tab.* XIX. *fig.* A. C.

*Germ.* *Große Italianische Kolbenhirse.* *Egyptische große Kolbenhirse.* *Große gelbe Kolbenhirse.* *Großer welscher Fennch.*

*Gall.* *Panic ou Millet à épi alongé.* *Panic d'Italie.* *Millet d'Inde.*



*var. β.* Spica subovoidea minore, seminibus stramineis.

*Icon.* Metzger. l. c. tab. XIX. fig. B.

*Germ.* Kleiner gelber Kolbenhirse.

*Gall.* Millet des oiseaux à épi court et graines jaunes.

*γ.* Spica subovoidea minore, seminibus aurantiacis.

*δ.* Spica subovoidea minore, seminibus fusco - rubellis aut rubello - violaceis.

*Hab.* α. β. γ δ. in Indiis. Coluntur passim in agris hortisque.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto Septembri matura. ☉

Varietas major, hortos agrosque rusticorum in convallibus montosis e Granite et Greusio constructis, mire condecorat, cum primis in convallibus Bühlerthal et in Sasbachwalden, ubi Gramen speciosissimum 5 - 7 pedes altum. Spica composita basi interrupta, fertilissima, lutea, interdum ex luteo - aurantiaca, nutans, semipedalis, pedalis. Semina copiosissima, flavescencia, nitida.

Semina farinosa, nutrientia, sapida, in forma præcipue pultis aqua vel lacte coquantur.

pag. 131. post *Panicum sanguinale*.

87.\* *Panicum ciliare* spicis subdigitatis approximatis erectis filiformibus, rachi flexuosa, dentibus bifloris, floribus pedicellatis, valvula exteriori ciliata, culmo foliisque pilosis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 344.

*Digitaria ciliaris* spicis digitatis suboctonis erecto-patulis, foliis vaginisque pilosis, flosculis lanceolatis ciliatis. *Willd. Enum. p. 95. Kalle Gram. p. 27.*

*Syntherisma ciliare. Schrad. Fl. Germ. 1. p. 160.*

*Icon. Schrad. l. c. tab. 5. fig. 7.*

*Germ. Feinhaariger Fingerhirse.*

*Gall. Panic ciliée.*

*Hab. Circa Carlsruhe in aggeribus sabulosis sterilibus prope Mühlburg, Grünwinkel. versus dem Pulverthurm, nec non in Palatinatu passim non infrequens; prope Weisenheim t. Märklino.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. ☉*

A *Panico sanguinali* affini, cum qua sæpius confundebatur, facile distinguitur: *Foliis vaginisque pilosis, Flosculis ciliatis.*

Bonum et acceptum ovibus pabulum. Arenam figit.

pag. 131. PANICUM *Dactylon.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 850. — Host. Gram. tab. 13.*

*Hab. In Brisgovia ad montem Kaiserstuhl prope Sasbach et Limburg frequens, ubi legi. Ann. 1805. Prope Wertheim ad mœnum in vineis am Remberg t. D. Wibelio.*

pag. 136. post PHLEUM *nodosum.*

91.\* PHLEUM *alpinum* spica ovato-cylindræa, aristis longitudine glumarum. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 69.*

*P. alpinum* spica ovato-cylindræa. *Linn.*

*Sp. pl.* 1. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 77. —  
*Hoffm. Fl. Germ.* p. 23.

*P. alpinum* racemo spicato, ovato, oblongo, calycibus truncatis mucronatis, aristatis, carina ciliatis, aristis calycem æquantibus. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 184.

*P. spicis ovatis*, hirsutis, locustis longe bicornibus. *Hall. hist. n.* 1529.

Gramen typhoides alpinum, spica brevi densa et veluti villosa. *Scheuchz. Agrost. p.* 64. *tab.* 3.

*Icon. Oed. Fl. Dan. tab.* 215. — *Sowerby Engl. Bot. tab.* 519.

*Germ. Alpen Lieschgras.*

*Gall. Fleau des alpes.*

*Hab.* In Brisgovie montis *Feldberg* pascuis, nec non in vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen* prope *Weisbad am Wildkirchlein auf dem Gamor Kasten* et alibi non infrequens, ubi vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ♀

Differt a *P. pratensi*: Spica breviori semiunciali, vix unciali, ovato-cylindrica, obtusa, viridi ex atro-purpurascens. Glumis calycinis longius ciliatis. Aristis rectis, atro-purpureis, longitudine fere glumarum.

Bonum et acceptum in pratis pascuisque alpinis et subalpinis, bobus pabulum præbet.

pag. 159. *ALOPECURUS geniculatus.*

*var. β. paludosus.* Culmis vaginisque incano-viridibus, antheris defloratis fulvis.

*A. paludosus.* *Pal. de Beauv.*

*A. fulvus.* *Weihe Bot. Zeitung* 1820, S. 441

*Hab.* et floret in iisdem locis promiscue, frequens.

Vix ac ne vix pro peculiari specie habenda.

*Cl. Pollichius* in *Fl. Palatina*, *Host. gram. Austr.*  
et *Gaudin* in *Agr. helv.* omni jure sub *Alopecuro*  
*geniculato Linn.* comprehendunt.

Variat in uno eodemque individuo Glumis  
in medio dorsi et infra medium aristatis.

pag. 140. post *ALOPECURUM geniculatum*.

94.\* *ALOPECURUS utriculatus* culmo  
adscendente, racemo spicato ovato, glu-  
mis calycinis carina ultra medium dilatatis.  
*Schrad. Flor. Germ.* 1. p. 174.

*Phalaris utriculata* panicula spicata, pe-  
talis arista articulata, vagina supremi folii  
spathiformi. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 80.

Gramen pratense spica purpurea ex utriculo  
prodeunte, s. Gramen folio spicam am-  
plexante. *Bauh. Pin.* 3. — *Scheuchz.*  
*Agrost.* p. 55.

*Icon.* *Host. Gram.* 3. tab. 7.

*Germ. Schlauchartiger Fuchsschwanz.*

*Gall. Vulpine utriculée.*

*Hab.* in Palatinatu transrhenano in pascuis pro-  
pe *Zweybrücken t. D. Kochio.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

*Panicula* spicata ante anthesin in supremi  
folii vagina spathiformi inflata; occulta, sub  
anthesi ex parte conspicua; fructificata ex vagina  
seu utriculo prodians. *Variat* Aristis breviori-  
bus et longioribus.

Individua nostratia, simillima illis, quæ a me,  
in Hispaniæ collibus graminosis lecta sunt,



pag. 144. *AGROSTIS arundinacea*. Linn.

Sub hac militant tres diversæ species, scilicet.

- 1) *Agrostis arundinacea* nostra, (exclus. *Scopolii Halleri* et *Scheuchzeri* synonymis ibi allegatis,) seu :

*Arundo silvatica* panicula patente, calycibus acutis, pilis brevissimis, arista dorsali geniculata calycem excedente. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 218. tab. 4. fig. 7. *Flor. Dan.* tab. 1683.

*Calamagrostis arundinacea*. Roth. l. c.

- 2) *Agrostis acutiflora* s. *Arundo acutiflora*. *Schrad. et*

- 3) *Agrostis varia* s. *Arundo varia*. *Schrad.*

98 \* *AGROSTIS acutiflora* panicula patente, calycibus acuminatis, pilis corolla brevioribus arista dorsali geniculata calycem vix excedente. *Schrader Fl. Germ.* (sub *Arundine*) p. 217.

*Calamagrostis acutiflora*. *Decand. Fl. Franc.* VI. p. 255.

*Arundo Agrostis* calycibus unifloris, petalo majore aristato, arista è basi recta, glumis longiore. *Scopol. Fl. Carn. ed.* 1. p. 201. n. 2. ed. 2. n. 126.

*Arundo locustis* unifloris, glumis ex imo dorso aristatis. *Hall. Helv.* n. 1522.

Gramen avenaceum montanum panicula angusta e dilutissime fusco - albicante et papposa. *Scheuchz. Agrostr. app.* p. 507.

*Germ. Spitzblüthiges rohrartiges Strausgras.*

*Gall.*

*Gall. Agrostis roseau acutiflore.*

*Hab.* In Marggraviatu superiori in montis *Belchen* parte australi legit *Vulpinus*. *Brisgovia* in valle *Höllenthal*. In *Alsatia* circa *Markirch* in montosis t. *Lachenalio*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri matura. 4

Maxime affinis *Agrosti arundinaceæ* a qua tamen recedit: *Villis* copiosioribus corollam undique cingentibus, triplo longioribus, *Aristis* calycem vix excedentibus. *Calycibus* longius acuminatis et *Corolla* calyce dimidio fere minoribus. *Conf. Schrad. l. c.*

98.\*\* *AGROSTIS varia* panicula patente calycibus acutis pilis corollam æquantibus, arista dorsali geniculata calycem vix excedente. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 216. (sub *Arundine*.)

*Calamagrostis montana. Decand. Fl. Franc. VI. p. 254.*

*Calamagrostis arundinacea. Wibel. Fl. Werth. p. 122. (exclus. Synon. secundum Schraderum.)*

*Icon. Schrad. l. c. tab. 4. fig. 6.*

*Germ. Veränderliches rohrartiges Strausgras.*

*Gall. Calamagrostes de montaigne.*

*Hab.* In montosis et subalpinis uliginosis. In monte *Belchen*. In ditione Basileensi sub arcibus *Dornach*, *Wallenburg*, *Farnsburg*, in monte *Wasserfall* frequens. t. *Cl. Hagenbachio*. Prope *Wertheim* in sylvis prope *Uettingen* t. *D. Wibelio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. 24

Medium tenet locum inter *Agr. arundinaceam* et *Agr. acutifloram*. Differre videtur a priori: *Villis* corollam æquantibus, *Arista* dorsali calycem vix excedente, a posteriori. *Calycibus* minus acuminatis, *Villis* corollam æquantibus nec corolla brevioribus.

Sine dubio mera varietas *Agr. arundinaceæ*, quæ, pro diverso solo natali altiore, alpestri, montano, et demissiori, quammaxime ludit.

pag. 147. *AGROSTIS canina*.

*Trichodium caninum* paniculæ ramis trichotomis hispidulis, ramulis divergentibus flexuosis, calycibus acutis, arista dorsali infra medium proveniente. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 198.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1443. *Sowerby Engl. Bot. tab.* 1856.

pag. 150. *AGROSTIS alpina*.

*Trichodium alpinum* panicula angusta pauciflora ramis subdivisis patentibus glabris, calycibus acutis, arista dorsali infra medium proveniente. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 200. *tab.* 3. *fig.* 4.

*Hab.* In vicina Principatus superioris Helvetia ad Abbatis-cellenses retro *dem Weisbad, auf dem Gamor, Kasten et Sentis* ubi eam vidi 1818.

pag. 152. *AGROSTIS festucoides*.

*Trichodium rupestre* paniculæ ramis subtrichotomis hispidulis, calycibus acumi-

natis, corolla apice biaristata, arista dorsali supra basin proveniente. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 201. tab. 3. fig. 5.

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, retro *dem Weisbad*, auf *dem Sentis* ubi eam vidi 1818.

pag. 152. *AGROSTIS stolonifera.*

*Agrostis vulgaris* paniculae ramis laeviusculis, ramulis divergentibus, ligula brevissima truncata. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 206. tab. 2. fig. 3. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 79. *Sowerby Engl. Bot.* tab. 1671.

β. Floribus aristatis.

*Agrostis vulgaris* β. *Smith l. c.*

γ. Floribus viviparis. *Schrad. l. c. tab. 2. fig. 4.*

*Agrostis sylvatica.* *Poll. Fl. Pal. n.* 73.

*Nota.* Cl. Schreberus in excursoribus botanicis circa Erlangam nobiscum institutis, hocce gramen: *Agrost. stoloniferam* *Linn.* salutabat.

pag. 145. *AGROSTIS capillaris.*

*Icon.* *Sowerby Engl. Bot.* tab. 1189. (*sub A. alba.*)

pag. 155. *AGROSTIS alba.*

*Agrostis alba* paniculae ramis hispidis, ramulis patentibus ligula oblonga. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 209.

*Icon.* *Flor. Dan.* tab. 1623.

β. Floribus infra apicem corollae obsolete aristatis. *Schrad. l. c. tab. 2. fig. 2.*

*Agrostis gigantea.* *Roth. Fl. Germ.*

γ. Floribus viviparis.



*Agrostis capillaris*. *Leers. Herborn. n. 54. varietas tab. 4. fig. 3. † (secundum Schraderum.)*

pag. 157. *AGROSTIS pumila.*

*Hab.* copiose prope *Frauenalb* ad vias sabulosas humidas t. *Alex. Braunio.*

Flores sæpe, ustilagine corrupti.

*Cl. Smith et Schrader l. c. pro varietate Agr. vulgaris habent.*

*Obs.* Gramen in horto ex seminibus cultum constans!

pag. 157. *AGROSTIS minima.*

*Chamagrostis minima. Wibel. Flor. Werth. p. 126. Schrad. Flor. Germ. 1. p. 158.*

*Knappia agrostidea. Smith. Fl. Brit. 3. p. 1587. Sowerby Engl. Bot. tab. 1127.*

*Sturmia minima. Hoppé in Sturm Fl. Germ. fasc. 7.*

*Hab.* porro prope *Wertheim* ad *Mœnum* in sabulosis frequens ubi eam vidi cum amicissimo *D. Wibelio* 1813.

pag. 159. *AIRA aquatica.*

*Molinia aquatica. Wibel. Fl. Werth. p. 116.*

*Hab.* porro in fossis aquaticis prope *Durlach* frequens. Prope *Wertheim* ad rivulos ubique t. *Wibelio.*

pag. 161. *AIRA cæspitosa.*

*var.* Spiculis majoribus foliis latioribus.

*A. paludosa. Wibel. Fl. Werth. obs.*

*var.* floribus viviparis.

*Hab.* in pratis ad Lacum Bodamicum ubi eam vidi 1814.

pag. 167. *AIRA praeox.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* in sylvâ *die Hardt* prope *Alühlburg* versus *dem grossen Exercierplatze* non infrequens. Prope *Wertheim* ad medium in arenosis *in der Wittenbach* t. D. *Wibelho.*

pag. 170. *MELICA ciliata.*

*Hab.* In *Brisgovia* monte *Kaiserstuhl* prope *Hohenlimburg.* Prope *Borberg* in collibus asperis calcareis frequens ubi eam vidi 1813.

pag. 178. *POA alpina.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1003.

*Hab.* In vicinia principatus superioris auf dem *Gamor* et *Kasten* ubi vidi 1818.

pag. 179. post *POAM alpinam.*

122.\* *POA collina* panicula subpatente, ovata, densa; spiculis ovatis mucronatis, compressis 5-6-floris, ex viridi-albo-purpurascentibus, foliis radicalibus brevibus, linearibus, latis carinatis, acutis.

*Poa collina* panicula patente, spiculis ovatis compressis, acutis, corollae valvula exteriore dorso pubescente. *Host. Gram. Austr. II.*

*Poa brevifolia.* *Decand. Synops. n.* 1613. *Flor. Franc. Suppl. p.* 274. (omnino.)

*Poa trivialis.* *Poll. Fl. Palat. p.* 84. (omnino) (excl. *Linn. Syn.*)

*Poa angustifolia* β. Gmel. Fl. Bad. 1. p. 182. (excl. *Leersii*, *Rothii* et *Halleri* syn.)

*Icon.* Host. l. c. tab. 66.

*Germ.* Hügel-Rispengras. Kurzblättriges Rispengras.

*Gall.* Paturin de Collines.

*Hab.* In collinis aridis arenosis et calcareis tenui gramine vestitis cum *Alyso campestri* et *Poa cristata* retro Durlach, Grötzingen. In Marggr. superiori, prope Istein cum *Stipa pennata* et *Melica ciliata*. In Palatinatu circa Sandhausen, St. Ilgen, Walldorf in solo siccissimo arenoso. Inter Maynz et pagum Finden, Niederingelsheim et Bingen, ad viam montanam inter Weinheim, Benzheim et Darmstadt cum *Stipa pennata* et *Alyso campestri* t. Pollichio. In Sponhemia prope Weyler, Martinstein, et auf der Abtey in collibus aridis apricis.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio, Augusto matura. 4

Differt a *Poa alpina*: *Culmis* crassioribus, rigidioribus subbinodibus. *Foliis* radicalibus densius congestis, numerosioribus, multo latioribus, et brevioribus, lineam integram latis, semiunciam ad sesquiunciam longis, manifestius carinatis, acutis, recurvis. *Caulinis* 1-2 brevioribus. *Panicula* semper multo densiori. *Spiculis* numerosioribus, majusculis, sæpissime quinquefloris, rarius 6-7 floris.

*Poa* nostra collina nunquam in pascuis alpinis seu subalpinis sed semper in collibus, aliisque locis sterilibus demissioribus apricis sabulosis crescit, nec unquam germinibus monstrosis in petala foliacea excrescentibus instructa est, ut *P. alpina*.

**Obs.** Individua nostra conveniunt cum Cl. Hostii *P. collina* in collibus prope Viennam lecta, in herbario meo desiccata.

Minime confundenda aut pro eadem ventilanda, cum *P. Badensi* Hænke, quæ vix in patria nostra Badensi, sed in rupibus ad thermas Badenses prope Viennam Austriæ detecta, facile a nostra distinguitur: Culmis laxioribus, 3-4 nodibus, curvatis, Foliis radicalibus minus dense congestis, longioribus et angustioribus. Culmeis duplo triplove longioribus. Panicula multo minus densa, sed laxiori. Spiculis nunquam quinque aut sexfloris, sed semper 9-11 floris! majusculis. Veram *P. Badensem* ex loco natali ante oculos habeo, dum hoc scribo.

pag. 179. *POA laxa.*

**Icon.** Sow. *Engl. Bot. tab.* 1123. (sub *P. flexuosa*.)

**Hab.** In vicinia principatus superioris retro dem *Weisbad am Gamor et Kasten*.

pag. 182. *POA angustifolia.*

β. *minor.*

*Poa trivialis.* *Leers. fl. Herb. n.* 66. *tab. VI. fig. 2. (omnino.)* *Roth. l. c. omnino* et deleatur *Pollichii* allegata *P. trivialis*, quæ ad *P. collinam* Host seu *P. brevifoliam* Decand. pertinet.

**Nota.** sub *Poa angustifolia*, *P. triviali* et *P. pratensi* in Flora nostra, Linnæi species veras comprehendi et scrupulose descripsi.

pag. 184. *POA pratensis. Linn.*

*P. polymorpha.* *Wibel. Fl. Werth. p.* 113. (omnino.)

**Hab.** In pratis, vineis, murisque. Ad muros



in vineis prope Wertheim t. D. Wibelio  
ubique.

*Spicula* sæpissime 5-7-8 floræ, rarius trifloræ; secundum *Schraderum* plerumque quinquefloræ in surculis serius florentibus tantum trifloræ, secundum *Leersium l. c. p. 28.* 3-4-5 floræ. Minime pro *P. nemoralis* varietate habenda.

pag. 185. post *POAM pratensem.*

126.\* *Poa sudetica* panicula æquali diffusa, spiculis ovali-lanceolatis subtrifloris, flosculis liberis, vaginis ancipitibus, ligula brevi, radice repente. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 295. *Host. Gram.* 3. p. 9.

*Poa sudetica* panicula erecto patente, spiculis trifloris glaberrimis mucronatis, culmo erecto compresso, vaginis foliorum laxis ancipitibus. *Hænke. Sudet. p. 120.* *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 389.

*Poa rubens* panicula patula spiculis ovatis 3 5 floris acutis glabris, culmo tri-quadripedali, basi incurviusculo compresso, foliis latis brevibus. *Mæench. Method.* 187. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 389.

*Poa quadripedalis.* *Ehrh. gram.* 135.

*Icon.* *Host. l. c. tab.* 13.

*Germ.* *Schlesisches Rispengras.*

*Gall.* *Paturin de Silesie.*

*Hab.* Prope Wertheim in sylvis subumbrosis circa der *Niclausmühle* copiose post acutissimum D. *Wibelium* vidi.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

Differt a *Poa sylvatica* Poll. aut *trinervata Schraderi* Spic. Culmis longioribus, sæpe quadripedalibus, ancipitibus, compressis. Panicula minus diffusa, magis erecto-patente. Spiculis subtrifloris, glabris, minoribus.

Bonum pecoribus pabulum præbet.

pag. 186. *POA sylvatica* (Pollich.)

*Festuca sylvatica* panicula ramosissima diffusa erecta, spiculis oblongis muticis 3-5 floris, foliis lineari-lanceolatis, radice fibrosa. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 337.

*Festuca calamaria* panicula secunda erecta ramosissima coarctata, flosculis oblongis angulatis muticis, foliis ensiformibus striatis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 121.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1145. *Sow. Engl. Bot. tab.* 1005.

*Hab.* Prope *Wildbad* ubi vidi 1821. Circa *Wertheim* in sylvis cæduis in solo fertili saxoso supra *der Niclausmühle* legit meritisimus *Mertinus*.

pag. 187. *POA salina*.

*Poa retroflexa.* *Curt. Fl. Lond.*

*Icon. Curt. l. c. fasc.* 62. *Sow. Engl. Bot. tab.* 986. (sub. *P. distante*.)

pag. 191. post *POAM compressam*.

130.\* *POA pilosa* panicula patente stricta: ramificationibus primariis pilosis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 100. *Host. Gram.* 2. p. 49.

*Poa pilosa* panicula æquali: florifera contracta, fructifera diffusa, ramis inferiori-

bus ad basin et ramificationes pilosis, spiculis linearibus 7 - 9 floris, flosculis acutiusculis liberis, radice fibrosa. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 286.

Gramen paniculis elegantissimis, majus, locustis purpureo - spadiceis minoribus. *Scheuchz. Agrost.* p. 193. *tab.* 4. *fig.* 5.

*Icon.* *Host. l. c.* *tab.* 68.

*Germ.* *Haariges Rispengras.*

*Gall.* *Paturin à manchettes.*

*Hab.* In urbe *Bruchsal* ad arcem in pavimento non infrequens ubi eam vidi 1813.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. ☉

*Radix* fibrosa tenuis. *Culmi* ex radice sæpe plures, erecti, digitales, vix longiores, simpliciusculi ramosive, teretes, glabri, tenues, fusco-purpurascens. *Folia* plana, linearia, acuminata, margine carinaque scabra, utrinque ad vaginæ exortum pulchre fasciculato - pilosa. *Vaginæ* subcompressæ, striatæ, glabræ, sæpe fusco-purpurascens. *Panicula* ramosissima florens erecta, contracta, demum diffusa. *Pedunculi* *Pedicellique* oppositi alternive, flexuosi, angulati scabri, basi pilis tenuissimis fasciculati. *Spiculæ* tenues, lineares, compressæ, fusco - aut ex viridi - purpurascens, nitidæ 5 - 7 - 9 floræ. *Calycinæ* valvulæ inæquales. *Corollæ* valvula exterior compressa, obovata, carina scabriuscula.

*Nota.* Gramen pulchellum, pro Flora Badensi novum. Copiose in Galliæ meridionalis et Hispaniæ arénosis a me observatum.

131.\* *Poa megastachya* panicula æquali, patente, ramis inferioribus ad basin et

ramificationes pilosis, spiculis lanceolatis (majoribus) 15-25 floris, flosculis obtusis, radice fibrosa. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 288. *Kælle Gram.* p. 181.

*Poa Eragrostis.* *Cavanill Icon.* 1. p. 63.

*Briza Eragrostis* spiculis lanceolatis, flosculis viginti. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 103. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 110. — *Schreb. Gram.* 2. p. 83.

*Gramen paniculis elegantissimis sive Eragrostis major.* *Scheuchz. Agrost.* p. 194, *tab.* 4. *fig.* 4.

*Gramen eranthemum seu Eragrostis phalaroides paniculatum multiplici et tenui Brizæ spica.* *Barrel. Icon.* *tab.* 43.

*Gramen amoris dictum.* *Joh. Bauh. Hist.* 2. p. 470.

*Gramen Amourettes.* *Clus. Hist.* 218. *Icon.* *Icon.* *Schreb. l. c. tab.* 39. — *Cavanilles l. c. tab.* 92.

*Germ. Großsähriges Rispengras. Amouretten-Gras.*

*Gall. Paturin Amourette.*

*Hab.* In *Brisgovia* monte *Kaiserstuhl* inter *Saspach* et *Hohenlimburg* in arenosis ad *rhenum* non infrequens ubi vidi 1812. In sabulosis prope *Schwetzingen* cum *P. Eragrosti* passim, ubi vidi 1813. In *Palatina* prope *Weisenheim t. Märcklino.* In *Alsatia superiori t. Joh. Bauhino.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. ☉

Maxime affinis *Poæ Eragrosti*, a qua differt: *Culmis* crassioribus, firmioribus. *Foliis*



sublongioribus et latioribus. *Spiculis* majusculis, longioribus, obtusioribus, ex viridi-cinerascentibus, 15-15-20-25 floris.

**Nota.** Gramen per plures annos in horto botanico cum *Poa Eragrosti* cultum, constans,

pag. 192. ante *POAM nemoralem*.

**131.\*\*** *POA glauca* panicula attenuata erecta, spiculis ovatis subtrifloris, glumis subretusis basi villosis, stipula brevissima. *Smith. Fl. Brit. add.* 3. p. 157.

*Poa glauca* panicula subsecunda patula, spiculis ovatis subtrifloris, flosculis basi villosis connexis obsolete quinquenerviis, culmo foliisque glaucis, ligula truncata brevissima, radice fibrosa. *Willd. Enum. pl. Hort. Berol.* p. 105.

*Poa* panicula stricta, locustis bifloris, folliculis basi villosis. *Hall. hist. n.* 1468.

Gramen paniculatum, angustifolium montanum, panicula densa, locustis parvis muticis. *Scheuchz. Agrost.* p. 180. n. 4.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1720. *Flor. Dan. tab.* 964.

*Germ.* Graues Rispengras.

*Gall.* Paturin glauque.

*Hab.* In ditione Basileensi in muris t. *Lachenalia*, nec non in montosis rupibus calcareis apricis prope *Arlesheim* vidi 1810.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

*Radix* fibrosa, fusca. *Culmi* subpedales vix altiores, stricti, striati, glabri, duri, glauci. *Folia* erecto-patentiuscula, angusta, margine scabra, glauca. *Ligula* brevissima, retusa sub-

crenulata. *Vaginæ* subcompressæ, striatæ, glaucæ. *Panicula* 2-5 uncialis, erecta, subcoarctata. *Pedunculi* subterni, angulati, scabri. *Spiculæ* erectæ, ovatæ, ovato-lanceolatæ, bifloræ, rarius subtrifloræ, glaucæ, demum ex glaucopurpureo - spadiceæ. *Calycinæ* valvulæ subinaequales, acutæ, carinatae, laeves, altera majuscula trinervis. *Flosculi* lanceolati, vix nervosi, basin versus villosi, margine scariosi.

Totum gramen glaucum est. Affinis *P. nemorali*, a qua differt habitu et colore semper glauco. Ad rariores omnino Floræ cives pertinet.

In horto a nobis per plures annos ex seminibus culta, nullam mutationem passa est.

pag. 192. *POA nemoralis*.

*var.* Spiculis unifloris.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* et alibi in Sylva die *Hardt*.

Varietas mere depauperata, ex solo natali sicco sabuloso.

pag. 199.

135.\* *POA disticha* spica disticha terminali, hinc convexiuscula illinc plana. *Jacqu. Misc. Aust. 2. p. 74.* — *Willd. Sp. pl. 1. p. 400.*

*Poa disticha* racemo spicato ovato disticho. *Schrad. Fl. Germ. 1. p. 307.*

*Poa Seslerioides* spica ovata locustis subsessilibus sexfloris obtusis. *Allion. Fl. Pedemont. n. 2208.*

*Sesleria* locustis quinquefloris distichis, calyce tridentato. *Hall. Helv. n. 1447.*

*Icon. Jacqu. Icon. rar. tab. 19. Host. Gram. tab. 76. Allion. l. c. tab. 91. fig. 1.*

*Germ.* *Zweizeiliges Rispengras.*

*Gall.* *Paturin distiche.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia apud Abbatiscellenses in rupibus calcareis alpium *Sentis* et *Gamor*, ubi vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 24

*Radix* cæspitosa, fibrosa. *Culmi* 3-5 unciales vix longiores, erecti, teretes, graciles, subenodes. *Folia* radicalia basi culmum vaginantia, setacea, glauco-virescentia culmo subbreviora. *Culmea* subduo, linearia, plana, perangusta, acuta. *Spica* terminalis, ovata, disticha, densa, hinc plana, illinc convexa. *Spiculæ* subsessiles, alternæ, ovatæ, acutiusculæ, incumbentes, 4-5 floræ. *Calycinæ* glumæ subæquales, ovato-acutæ muticæ, basi viridulæ, medio sæpe cæruleæ, quandoque violaceæ, margine lato-membranaceo diaphano albescente cinctæ, pulchellæ. *Corolla* bivalvis, ovato-acuta; valvula exteriori majori, interiori lanceolata, alba, diaphana, membranacea, margine inflexa, fimbriata.

Pulchellum omnino gramen, habitus *Sesleriae*, structura *Poae*.

Individua *Carinthiaca*, in omnibus partibus simillima his a me in alpinis helvetiae et in Pyrenaeis lectis.

pag. 206. *SESLERIA cærulea.*

*Icon.* *Flor. Dan. tab.* 1506. *Sow. Engl. Bot. tab.* 1613.

*Hab.* In *Brisgovia* turfosis prope *Triberg* et *Furtwangen* nec non ad lacum *Bodamicum*.

pag. 208. *FESTUCA ovina* adde.

*var. β.* Spiculis muticis foliis capillaribus.

*Festuca ovina. Leers. Herborn. n. 74. β. tab. 8. fig. 4. ‡*

*Festuca tenuifolia. Schrad. Fl. Germ. 1. p. 315.*

Gramen capillaceum locustellis pennatis non aristatis. *Scheuchz. Agrost. p. 275. tab. 6. fig. 6.*

*Nota.* Vix pro peculiari specie ob varietates intermedias spiculis subaristatis, aristatis et muticis, Foliis brevioribus et longioribus, habenda.

pag. 211. *FESTUCA rubra.*

*Festuca rubra* panicula patente flosculis arista longioribus, radice repente. *Schrad. Fl. Germ. 1. p. 329.*

*Festuca rubra* panicula secunda, flosculis terectiusculis aristatis, foliis supra pubescentibus, radice repente. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 116.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 2056. Host. Gram. 2. tab. 82.*

A *Festuca ovina* et *duriuscula* facile *Radibus* repentibus sæpe stoloniferis, dignoscitur.

pag. 213. *FESTUCA heterophylla.*

*Hab.* Prope *Wertheim* ad marginem virgultosam sylvæ inter *Lengfürth* et *Heidesfeld* legit *Mertinus* 1822.

Specimina *Werthemiensia* speciosissima. *Folia* radicalia numerosissima, setacea, angusta, erecta, pedalia, sesquipedalia, læte viridia. *Caulina* breviora, latiora, dorso glabra, in parte



aversa profunde striata, villis brevibus scabriuscula. *Vaginæ* striatæ, glabræ. *Ligula* exserta, obtusa, mox fissa bipartita. *Culmus* tripedalis, erectus, trinodis, striatus, glaber, basi subincurvus. *Spiculæ* in panicula 4-5 uncias longa, subsecunda, 25-45, 5-7 floræ. *Aristæ* terminales 2-5 lineares, ex viridi-fuscae. *Antheræ* violaceæ.

**Nota.** Omnino diversa a *Festuca duriuscula* Linn. Paniculâ patens ante et post florescentiam, nunquam in spicam contracta.

pag. 214. *FESTUCA duriuscula.*

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 470.

*Radix* fibrosa densa, fusca, fusco-nigricans. *Culmi* pedales, sesquipedales, erecti, teretes, ultra medium foliati, subbinodes, læves. *Folia radicalia* culmeis longiora, filiformia, sulco exarata, subtrigona, scabra, tenacissima. *Culmea* brevia, lateribus conduplicatis setacea, lævia, tenacia. *Ligula* brevis, truncata, subauriculata, fusca. *Vaginæ* longæ, læves. *Panicula* secunda, 2-3-4 uncialis, oblongo-lanceolata, angusta, ante et post anthesin contracta. *Spiculæ* in panicula circiter 15-25, ovatæ, glauco-viridescens, (quandoque rubellæ) glabræ, aut subhirsutæ, 5-6 floræ. *Calycinæ* valvulæ inæquales, lineari-lanceolatæ, mucronatæ. *Corollæ* valvula exterior lanceolata, apice in *Aristam* tenuem, lineam ad sesquilineam longam rectam terminata.

*Varietas:* *Culmis* ex radice fibrosa copiosioribus, fere bipedalibus, subcompressis glabris glaucis. *Foliis* radicalibus fasciculatis, numerosis, filiformibus sulco exaratis, longioribus, curvatis, tenacissimis, glabris, glaucis,

cis, purpura mixtis. *Vaginis* glaucis, glabris. *Ligula* exserta. *Spiculis* in panicula paucioribus, glaberrimis, aristatis, ex glauco - purpurascentibus 4 - 5 floris. Prope *Wertheim* in vinearum muris calcareis *am Kalmuth* legit *Mertinus* 1822. 2

Minime cum *F. heterophylla* nostra confundenda, quae differt: Foliis radicalibus copiosioribus, multo longioribus — Panicula (*Spiculis*que majoribus copiosioribus) ante et post florescentiam non contracta. Aristis duplo longioribus.

pag. 215. *FESTUCA bromoides*. Linn.  
*Icon. Scw. Engl. Bot. tab. 1411. Flor. Dan. tab. 1445.*

β. Culmis longioribus tenerioribus, flosculis sæpissime monandris.

*Festuca sciuroides*. *Wibel. Fl. Werth. p. 104.*

*Festuca bromoides* panicula racemosa, flosculis arista brevioribus monandris, culmo superne nudo. *Schrad. Fl. Germ. 1. p. 325.*

*Hab.* In sylvaticis sabulosis sterilibus circa *Carlsruhe* prope *Mühlburg* versus *dem grossen Exercierplatze*, inter *dem Kühlsfelde* et *Durlach* copiose vidi. Prope *Wertheim* in collibus arenosis ad vias et in pascuis sabulosis post *D. Wibelum* vidi.

Hæc varietas mere differt a *Festuca bromoide* nostra seu *Linnaëana*: Culmis longioribus gracilioribus. Flosculis sæpissime monandris, nec triandris.

*Nota.* Individua numerosa, circa *Carlsruhe* examinata, persaepe flosculis triandris, praedita sunt. Individuum a *Cl. Vahl* in *Fl. Danica* et à *Cl. Sowerby* in *Engl. Botany* flosculis triandris depictum est.

*Vulpia sciuroides* mea, in Castilia lecta, semper monandra, longe differt a *Festuca bromoide* var. seu *F. sciuroide* *Wibelii*, *Rothii* et *Willdenovii*.

pag. 217. *FESTUCA decumbens*.

*Melica rigida*. *Wibel. Flor. Werth. p. 117.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 792.*

pag. 218. *FESTUCA elatior*.

*Icon. Curt. Fl. Lond. fasc. 6. tab. 7. Sowerby Engl. Bot. tab. 1592. (sub Festuca pratensi.)*

pag. 219. *FESTUCA arundinacea*.

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 1593. Curtis Fl. Lond. fasc. 6. tab. 8. (sub Festuca elatiori.)*

pag. 223. post *FESTUCAM fluitantem*.

151.\* *FESTUCA loliacea* spica disticha nutante, spiculis subsessilibus lineari-oblongis, flosculis cylindricis enervibus muticis. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 122. — Willd. Sp. pl. 1. p. 426. Curtis. Fl. Lond.*

*Festuca loliacea* racemo spicato elongato subnutante, spiculis remotis muticis dein patentibus, radice fibrosa. *Schrad. Flor. Germ. 1. p. 341.*

*Festuca elongata. Ehrh. Beitr. 6. p. 133.*  
*Poa locustis* distichis, spiculis muticis. *Hall. helv. n. 1452.*

*Icon. Curtis. Fl. Lond. fasc. 6. tab. 9. Sowerby Engl. Bot. tab. 1821.*

*Germ.* *Lolchartiger Schwingel.*

*Gall.* *Tetugue loliace.*

*Hab.* In stagnis, fossis aquaticis, pratis udis rhœnanis cum *F. fluitante* passim. Prope *Dachstand*. *Knielingen*, *Lauchenheim*, In Principatu superiori prope *Constantz*, *Mersburg*, *Salem* etc. Prope *Wœrthheim* in pratis aquosis prope *Reichelsheim* et *Brombach* trans *Tuberim*, in pratis succulentis inter *Bellingen* et *Dertingen* abunde.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 2

*Radix* sæpissime fibrosa, raro repens, per raro stolonifera, fusca. *Culmi* sesquipediales, bipediales et aliiotes, erecti, teretes, striati, glabri, foliati, simplices. *Folia* lineari-acuminata, plana, glabra, margine retrorsum scabra, lute viridia. *Vaginoe* longiusculæ, teretes, striatæ, glabræ. *Ligula* brevissima, obtusa. *Spica* (rarius *Racemus* spicatus) elongata, digitalis, semipedalis, pedalis et longior, erecta, quandoque subnutans, disticha, simplex, per raro basi subramosa. *Rachis* flexuosa. *Spiculæ* sæpissime sessiles, quandoque subpedunculatæ, remotæ, quandoque contiguæ, alternæ, lineari-oblongæ, 12 — 15 muticæ, 8 — 10 floræ, glabræ, rachis plus minusve adpressæ. *Calycis* valvulæ inæquales, muticæ, exteriori majori 4 — 5 — 7 nervis instructa. *Corollæ* valvula exterior obtusiuscula, margine membranacea.

*Variat* *Spiculis* inferioribus remotis subpedunculatis et sessilibus, superioribus dense congestis longioribus sessilibus. *Spiculis* in



Spica omnibus sessilibus rhachi appressis, duplo minoribus 5-7 floris. Cave ne hanc varietatem primo aspectu *Lolii* speciem mentiens, pro *Lolio perenni* habeas.

*Variat.* Spiculis minoribus remotis, duabus infimis *Gluma* calycina monovalvi, reliquis bivalvibus instructis.

Talia specimina Werthemii lecta, inter alia, benigne misit, acutissimus *Mertinus*.

*Nota.* Gramen maxime polymorphum sub varietate *Festucæ* fluitantis in Flora nostra allegavi.

pag. 225. *BROMUS secalinus*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1171. *Leers fl. Herb. t. XI. fig. 2.* omnino et quidem paniculae pars in statu juniore.

pag. 225. *BROMUS multiflorus* deleatur, est:

153. *BROMUS hordeaceus* panicula erectopatenti, spiculis ovali-lanceolatis, compressis, submultifloris, glumis margine albidis membranaceis, flosculis laxè imbricatis teretiusculis, aristis rectis, gluma longioribus. *mihi*

α. Spiculis majoribus multifloris mollissime pubescentibus.

*Bromus multiflorus* panicula patente, pedunculis subsimplicibus, spiculis ovato-lanceolatis compressis quindecimfloris, flosculis subimbricatis teretiusculis. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 126. (exclusis Leersii et Scheuchzeri synonymis.)*

*Bromus secalinus* β. *hordeaceus*. Linn.  
*Syst. pl. I. p.* 209.

Gramen avenaceum villosum locustis amplioribus viridantibus, margine argenteo cinctis. *Scheuchz. Agrost. p.* 253. *omnino!*

*Icon. Propria. Sowerby Engl. Bot. tab.* 1884.  
(*sub Br. multifloro*) *omnino.*

β. Spiculis submultifloris glabris aristatis.

γ. Spiculis submultifloris glabriusculis muticis breviterque subaristatis.

*Bromus arvensis. Weigel. Obs. Botan. p.*  
*6. tab. 1. fig. 3. omnino.*

*Germ. Gersten-Trespe.*

*Gall. Brome hordeacée*

*Hab. α.* inter segetes in Marggraviatu superiore prope *Rætelen, Kandern, Krenzach* et passim alibi non infrequens, ubi eam vidi 1810. β. promiscue cum γ. in agris demissioribus hordeaceis passim frequens.

*Flor. Junio Semina Julio matura. ☉*

*Var. α.* Habitus *Br. secalini*. *Radix* fibrosa, pallide fusca. *Culmi* 2 - 3 - 4 pedales, erecti, simplices, teretes striati, glabri, 4 - 5 geniculati, *Folia* linearia, acuta, 1 - 2 - 3 lineas lata, supra magineque praecipue rariter pilosa. *Vaginae* striato-sulcatae, nudae, glabrae, margine rariter quandoque pilosae. *Ligula* membranacea brevis, dentata, fusca, seu albida. *Panicula* erecto-patentiuscula, 4 - 5 - 7 uncias longa. *Pedunculi* semiverticillati, inaequales, angu-

lati, erectiusculi, setuloso-hispidi, superne incrassati. *Spiculae* ovali-lanceolatae, erectae, compresso-planae, unciales, subunciales, 4-5 lineas latae, 9-11-13 florum, mollissime pubescentes. *Flosculi* imbricati, margine albidi, membranacei. *Calycinae* valvulae inaequales, muticae, carinatae, nervosae, ciliato-villosae, margine membranaceae, albae. *Corollae* valvula exterior oblonga, concava, obtusa, apice bifida, Aristam infra apicem exserens, rectam setuloso-scabram, 5-6 lineas longam.

Maxime affinis *B. secalino*, a quo differt: *Culmis* saepe longioribus. *Foliis* latioribus. *Panicula* minus patente. *Spiculis* longioribus, erectis. *Flosculis* densius semper imbricatis, mollissime pubescentibus, margine albidis.

Hanc speciem sub *B. multifloro* in *Fl. Ba-densi* comprehendi.

Medium omnino tenet inter *Br. secalinum* et *Br. grossum*.

Differt a *Br. grosso*: *Foliis* latioribus. *Panicula* erecto-patenti. *Spiculis* erectis magis compressis, minus grossis et ponderosis.

Differt a *Br. commutato* Schrad. *Fl. Germ.* 1. p. 353. *Culmis* crassioribus, longioribus. *Foliis* non molliter villosis. *Vaginis* non pilis densis horizontalibus villosis. *Panicula* longiori, erecto-patenti, nunquam apice cernua. *Pedunculis* erectis, nec patentibus, manifeste setuloso-hispidis. *Spiculis* latioribus non lanceolatis, sed ovalilanceolatis, non glabris sed molliter villosis.

*Varietas*  $\beta$ . *Spiculis* subminoribus 7-9-13 floris, glabris, subvillosisque aristatis.

*Varietas γ.* Spiculis brevioribus 5 - 7 floris glabris, villosisque muticis, et passim in uno eodemque individuo breviter aristatis.

**Nota.** Varietates β. et γ. passim etiam circa Erlangam inter *Hordeum* vidi, quas Cl. Schreberus in excursioribus, pro *Br. hordeaceo* Linnaei declaravit.

**153.\*** *BROMUS grossus* panicula nutante, spiculis ovato-lanceolatis tumidis, subcompressis pubescentibus multifloris, aristis gluma longioribus rectis, foliis rariter pilosulis.

*Bromus grossus.* Desfont. Decand. Fl. Franc. n. 1629. - Loiseleur Deslonch. Flor. Gall. 1. p. 59.

*Bromus velutinus* panicula fructifera apice nutante, spiculis oblongo-lanceolatis tumidiusculis compressis, pubescentibus, flosculis subimbricatis, aristis gluma longioribus, primo rectis, dein patentibus, foliis subpilosis. Schrad. Fl. Germ. 1. p. 349.

Gramen Gros Montbelgardensium. Joh. Bauh. hist. 2. p. 435. (*Icon. mala.*)

*Festuca graminea* glumis hirsutis. Bauh. Pin. p. 9. — Scheuchz. Agrost. p. 250. tab. 5. fig. 9.

α. Spiculis ovatis latioribus pubescentibus 5 - 9 - 11 floris.

β. Spiculis ovato-subrotundis, pubescentibus floribus viviparis.

γ. Spiculis ovato-lanceolatis glabris 9 - 13 floris.



*Icon.* α. propria. *Schrad. l. c. tab. 6. fig.*  
3. β. *Icon. propria.*

*Germ.* Dicke Trespe.

*Gall.* Brome grosse.

*Hab.* inter segetes praesertim *Secale* et *Avenam*. Inter *Secale* in agris prope *Carlsruhe*, *Beiertheim*, *Mühlburg* et alibi cum varietate δ copiose. In monte *Thurnberg* retro *Durlach* cum var. β. et γ. non infrequens.

*Flor.* Junio Julio, *Semina* Augusto matura. ☉

Differt a *Bromo secalino*. *Panicula* laxiori; *Spiculis* majoribus ovato-lanceolatis, grossioribus ponderosioribus pubescentibus, incanis, 5-7-9-11-13 floris. *Flosculis* minus remotis. *Arista* gluma sua semper longiore, recta, villosa-aspera.

*Nota.* Gramen ex seminibus in horto cultum, constans.

153.\*\* *BROMUS commutatus* panicula apice nutante, spiculis lanceolatis compressis nudis, flosculis imbricatis, aristis rectis gluma longioribus, foliis villosis. *Schrad. Fl. Germ. 1. p. 353.*

*Icon.* *Propria.*

*Germ.* Verwechselte Trespe.

*Gall.* Brome commuté.

*Hab.* In *Briskovia* am *Kaiserstuhl* prope *Rothweil auf dem Eichelberg*, prope *Limburg* et alibi in campestribus passim frequens, ubi nuper legit *Alex. Braun*.

*Flor.* Junio. *Semina* Julio matura. ☉

*Radix* fibrosa. *Culmus* 2-3 pedalis, erectus, teres striatus, glaber, interdum villosulus. *Folia* linearia, acuminata, plana, glabra, saepius villosula, margine scabra. *Vaginae* teretes striatae, dense villosae. *Ligula* brevis, laciniata. *Panicula* terminalis, 3-4-5 uncias longa, erecto-patens, deflorata nutans. *Pedunculi* semiverticillati, seni, quini, tenues, nudiusculi laxi, subsimplices et ramosi. *Spiculae* exacte lanceolatae, acutae, compressae, nudae, 7-9-11 florum, laxius imbricatae cum aristis unciam ad quatuordecim lineas longae, 2-3 lineas latae. *Calycinae* valvulae subcompressae, glabriusculae, nudae, margine membranaceae. *Corollae* valvula exterior ovato-lanceolata, obtusa, margine membranacea, glabra, *Asistam* infra apicem exserens, rectam capillarem, gluma paulo longiorem; interior mutica, margine membranacea, inflexa.

Nota. Specimina ab Alex. Braunio l. c. lecta in omnibus partibus exacte conveniunt cum illis in Austria lectis.

153.\*\*\* **BROMUS** *racemosus* panicula rara erectiuscula, pedunculis simplicibus, spiculis ovali-oblongis glabris, subsex-floris, flosculis imbricatis, aristis rectis glumam aequantibus, foliis pilosulis.

B. *racemosus* panicula erectiuscula diffusa, pedunculis simplicibus, spiculis ovatis sex-floris, flosculis imbricatis depressis nervosis glabris. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 128.

B. *racemosus* panicula erecta, spiculis oblongo-ovatis subcompressis nudis, flosculis imbricatis, corollarum gluma exteriori

apice indivisa, aristis rectis glumam aequantibus, foliis obsolete pubescentibus. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 352.

*B. racemosus* racemo simplicissimo, pedunculis unifloris, floribus subsexfloris laevibus aristatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 114.

*Festuca avenacea*, spicis strigosioribus e glumis glabris compactis. *Ray. Syn.* 3. p. 414.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1079.

*Germ.* Traubenblutige Trespe.

*Gall.* Brome en grappe.

*Hab.* In pratis agris et pascuis circa Karlsruhe, Beierthelm, Ettlingen et alibi passim cum *B. molli*.

*Flor.* Majo. Junio. *Semina* Julio matura. ☉ ♂

A *Bromo molli* affini distinguitur. Habitu graciliori. *Panicula* rara, simpliciore, non contracta. *Pedunculis* simplicibus, longioribus, scabris. *Spiculis* longioribus glabris, nitidis.

*Panicula* constat racemo simplici, pedunculis alternis sæpius solitariis. *Linn. l. c.*

*Nota.* Affinis *B. molli*, qui secundum loca natalia demissiora et altiora sicca, sabulosa, aprica, quammaxime polymorphus est.

Toto cælo diverssus, a *Br. hordeaceo* nostro.

153.\*\*\*\* *BROMUS Badensis* panicula rara, erecta, pedunculis alternis setuloso-ciliatis simplicibus, spiculis ovalilanceolatis compressis subnovemfloris, setuloso-

hispidis, aristis rectis setulosis gluma sublongioribus, foliis superne pilosis, vaginis nudiusculis. *mihi.*

*Icon. Propria.*

*Germ. Badische Trespe.*

*Gall. Brome de Bade.*

*Hab.* In valle *Bühlerthal* ad viam inter *dem Eisenhammer* et *der Kirche* ad dextram *ander Bühlerbach* in graniticis non infrequens, ubi nuper legi.

*Flor.* Junio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. 24

*Radix* perennis, fibrosa, pallide fusca. *Culmi* numerosi, erecti, teretes, striati, glabri, 3-4-5 geniculati, tenues, pedales, sesquipedales, bipedales. *Geniculi* pubescentes. *Folia* linearia, acuminata, semilineam ad lineam lata, plana, striata, pallide viridia, subtus glabra, facie et ad oras pilis raris albidis instructa, erecta. *Vaginae* teretes, striato-sulcatae, glabrae, versus ligulam interdum rariter pilosae. *Ligula* brevis, obtusa pallide fusca. *Panicula* rara, erecta, 3-4-5-7 uncias longa. *Pedunculi* alterni, simpliciusculi, flexuoso-erecti, quandoque terni, bini, inæquales, angulati, apice incrassati, a basi ad apicem utrinque longe setuloso-hispidi, incani. *Spiculæ* in panicula (seu racemo) 5-7-9 rarius 11, erectæ, ovali-lanceolatae, compressæ, cum aristis septem lineas ad unciam longæ, semiunciam latæ, *flosculis* 7 sæpissime 9 rarius 11, laxè imbricatis compositæ, setuloso-hispidæ, canescentes. *Glumæ* calycinæ lanceolatae, subæquales, carina setuloso-hispidæ, margine membranaceæ, albidæ. *Glumæ corol-*



*linæ* calycinis conformes, exteriori parum infra apicem aristata. *Arista* recta, setulosa, gluma sua vix longiori.

**Nota.** Gramen frustra apud auctores quæsi. Habitus spicularum, fere ut in *Br. grosso*, a quo autem longe recedit. Radix perennis. Minime pro varietate *Br. pratensis* s. erecti habendum. Forsan Gramen: Gramini murali Dalechampii simile si non idem. Joh. Bauh. hist. pl. 2. 459. c. Icone mala. Citat Joh. Bauhinus flor. deum murinum Tabernemont. Icon p. 546. quæ omnino ad nostrum Bromum accedit. Dicit porro Bauhinus illud observasse in valle Griesbachiana ad acidulas, nec non Basileæ et Montbelgardi.

155. \*\*\*\*\* **BROMUS Kochii** panicula rara patenti-erectiuscula, pedunculis simplicibus, spiculis lanceolatis subundecimfloris compressis, glabris, aristis demum divaricatis gluma longioribus; foliis vaginisque pilosis (*mihi.*)

*B. patulus* Ræling. *Deutschl. Flor.* ed Mertens et Koch. 1. p. 685.

*B. commutatus.* Koch et Ziz. *Catal. pl. Palat.* (non Schraderi.)

*B. multiflorus* Decand. *Fl. Franc.* Host. *Gram.* 1. p. 10.

*Icon.* Host. l. c. tab. 11. propria

*Germ.* Kochischer Tresp.

*Gall.* Brome de Mr. Koch.

*Hab.* In Palatinatu prope *Dürkheim* in agris t. Kochio.

*Flor.* Majo Julio. *Semina* Julio matura. ☉

Affinis *Bromo arvensi*, a quo distinguitur *Panicula* multo minori. *Spiculis* brevioribus sapissime undecimfloris. *Aristis* rectis demum divaricatis.

**Nota.** Gramen in Palatinatu ante plures jam annos lectum, mihi missum sub Br. squaroso, differt ab eo, statura in omnibus partibus multo minore. *Spiculis* multo brevioribus et angustioribus lanceolatis, (non ovato-lanceolatis) subundecimfloris, non 14 ad 19 floris.

Differt a B. villosa! (nostro) *Panicula* non nutante, *Spiculis* multo minoribus lanceolatis, glabris, (non ovato-lanceolatis, villosis, incanis) *Aristis* multo tenuioribus et brevioribus, minus demum divaricatis.

pag. 252. *BROMUS asper.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1172.*

pag. 252. Synonymon *Pollichii* *BROMUS versicolor* ad Br. *asperum* a me allegatum, secundum Cl. *Schraderum* et *Kochium*, ad Br. *arvensem* Linn. pertinet.

pag. 254. *BROMUS sterilis.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2030.*

pag. 255. *BROMUS tectorum* panicula nutante, spiculis lineari lanceolatis hirsutis quinquefloris, aristis gluma longioribus, vaginis pilosis.

β. *Spiculis* subtenuioribus glabris.

*Hab.* In cultis, agris sabulosis passim cum Br. *molli*. Circa *Mühlburg* et *Dachslund*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Junio, Julio matura. ☉

pag. 237. *BROMUS pratensis*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 471. (sub Br. erecto.)*

*Hab.* Prope *Karlsruhe* in horti aulici parte sylvatica, ubi legit *A. Braun*. Prope *Wertheim* t. *D. Wibelio*. Prope *Worms* et *Mainz* t. *D. Kochio*.

pag. 239. *BROMUS arvensis* panicula laxa, patente; spiculis lineari-lanceolatis subcompressis glabris subseptemfloris, flosculis imbricatis margine membranaceis, aristis rectis longitudine flosculi, foliis vaginisquæ inferioribus piloso-villosis.

Delcatur synonymon *Pollichii* et *Weigelii* allegatum, sub quo *Pollichius* Br. nostrum *pratensem*, monentibus *Schradero* et *Kochio* comprehendebat.

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 1984.*

Emendatur in descriptione: *Spiculæ* lineari-lanceolatae, (non ovato-lanceolatae.)

pag. 240. post. *Br. arvensem*.

162.\* *BROMUS Scheuchzeri* panicula sparsa laxa, spiculis tenuibus filiformi-lanceolatis subquinquefloris glabris, aristis tenuissimis gluma longioribus, foliis vaginisque tomentosis. *mihi*.

*Bromus triflorus* panicula patente, floribus subtrifloris. *Linn. Sp. pl. 115 (omnino!)*

*Festuca triflora. Sowerby Engl. Bot.*

*Gramen Bromoides, panicula sparsa, locu-*

stis minoribus, aristatis. *Scheuchz. Agr.*  
p. 511. tab. V. fig. 19. (omnino)

*Icon. Propria. Sowerby Engl. Bot.* t. 1918  
(bona.)

*Germ. Scheuchzerischer Tresp.*

*Gall. Brome de Mr. Scheuchzer.*

*Hab. Inter Karlsruhe et Mühlburg in*  
agris arenosis cum Trifolio pratensi sativo et  
Bromo molli versus *dem Landgraben*. In-  
ter *Karlsruhe* et *Rintheim* in pratis non  
infrequens ubi legi ann. 1821 sequ. Inter  
*dem Kühlsfeld* et *Durlach* ad viam  
sylvaticam inter *Populum italicam* cum *Fes-  
tuca Bromoide* non infrequens.

*Flor. Julio. Semina Augusto matura. ☉*

*Radix* fibrosa, albido-cinerea. *Culmi* plu-  
rimi, sesquipedales, bipedales et longiores, basi  
incurvati, subdecumbentes, demum erecti, stri-  
ati, læves, 4-5 nodes. *Folia* 4-5-6 uncias  
longa, linearia, acuta, plana, lineam lata, in-  
feriora præsertim villosa-tomentosa, tomento  
molli albido. *Ligula* brevis, truncata. *Va-  
ginæ* teretes, striato-sulcatae, tomentoso-villosae,  
quandoque ciliato-villosulae incanae seu albidæ.  
*Panicula* speciosa, sparsa et laxiuscula, maxime  
ramosa, semipedalis, et longior. *Pedunculi* semi-  
verticillati, subseni, quini, inæquales, præ-  
longi, subdivisi, tenues, striato-angulati,  
retrorsum asperi. *Spiculæ* in panicula nume-  
rosæ, filiformi — lanceolatae, tenuissimæ, 4-  
5 floræ, glabrae, late virescentes, cum aristis  
6-7 lineas longæ, semilineam vix latæ. *Caly-  
cinæ* valvulae inæquales, lanceolatae, 5-nerviæ,  
margine membranaceæ, subpellucidæ, corollis  
breviores. *Corollæ* valvula exterior 3-nervia,



glabra, viridis, albido marginata, mox infra apicem subbifidum minutum *Aristam* exserens tenuissimam, subflexuosam, erectam, corolla longiorem, 4-5 lineas longam, ex viridi-rubellam. *Antheræ* tres, lineares, flavae.

*Variat.* *Culmis* subpedalibus tenerioribus. *Panícula, Spiculisque* depauperatis viridifuscis.

Gramen omnino pulchellum, hucusque a Floristis Germaniae, Helvetiae et Galliae sine dubio vix ullibi descriptum, denominavi in Cl. Scheuchzeri memoriam, qui l. c. egregie illud descripsit. D. Breynius, Scheuchzero, Gedano misit.

Affine Br. arvensi, a quo differt. Panícula multo delicatiori, sparsa, pedunculis pedicellisque copiosioribus, longioribus. Spiculis multo gracilioribus, brevioribus, 4-5 floris. Corolis semper viridibus, nunquam coloratis. Aristis flosculo longioribus tenuioribus. Demum foliis vaginisque inferioribus magis tomentoso-villosis.

**Nota.** Linnaei *Bromus triflorus*, gramen hucusque permultis botanicis dubium, ut ex Synonymo Scheuchzeri allegato patet, omnino huc pertinet.

pag. 242. *BROMUS montanus*. *Pollichii* monentibus *Schradero* et *Kochio* in *Cat. pl. Palat.* omnino ad Br. *asperum*. *Linnaeum* pertinet.

**Nota.** Descripsi gramen nostrum, ad individuum ab optimo Vulpio prope Mühlheim et Badenweiler lectum. Individuum certe non perfectum, sed depauperatum Br. *asperum*, quod mihi sub Br. *montano*, jam ante triginta annos misit. Est omnino *B. montanus* Scop. Fl. Carn. 1. p. 82. quem Linnaeus in Suppl. sub *B. aspero* comprehendit.

pag. 243. *BROMUS pinnatus.*

*Triticum bromoides. Wibel. Fl. Werth.*  
p. 104.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 730.*

pag. 244. *BROMUS gracilis.*

*Triticum teretiflorum. Wib. Fl. Werth.*  
p. 104.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 729. (sub Bromo*  
*sylvatico.*

pag. 251. *AVENA strigosa.*

*Icon. Metzger Cerealia. Tab. XV. fig. B.*

pag. 252. *AVENA orientalis.*

*Icon. Metzger. l. c. tab. XII. fig. B.*

*Variat flosculis muticis.*

pag. 253. *AVENA sativa.*

*α. alba aristata.*

*Icon. Metzger. l. c. tab. XII. fig. A.*

*Var. γ. alba mutica.*

*Germ. Weisser ungegrannter Rispenhafer.*  
*Gemeiner Hafer ohne Grannen.*

*Gall. Avoine ordinaire blanche et sans*  
*barbes.*

*Hab. . . . . Colitur passim in agris.*

Ad hanc varietatem sine dubio pertinet *Avena sativa præcox. Avena Georgiana alba. A. Podolica, August-Hafer, Frühhafer, Prachthafer aus Georgien und aus Podolien. Conf. Metzger. l. c. p. 51.*

*Variat* porro *A. sativa nigra*, flosculis muticis, et fuscis aristatis,

pag. 254. *AVENA nuda*.

*Icon.* Metzger l. c. tab. XVI. fig. A.

173.\* *AVENA chinensis* panicula erecta patente, spiculis 4-6 floris, 3-4 spermis praelongis, flosculis aristatis, seminibus nudis. Metzger *Cerealìa* p. 55.

*A. nuda*  $\beta$ . *Chinensis* Fischer in *Sp. plant.* Roemer et Schult. 2. p. 669.

*Icon.* Metzger l. c. tab. XIV. fig. A.

*Germ.* Chinesischer nackter Hafer.

*Hab.* In China. Colitur lucusque rarius in hortis et agris.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉  
Primo vere seritur.

Peculiaris et distincta omnino ab *Avena nuda* Linn. species, a qua differt: *Culmis* altioribus, crassioribus. *Panicula* magis patente. *Spiculis* non 3-4 floris, sed 4-6 floris, non bispermis sed 3-4 spermis. *Seminibus* multo semper majoribus.

pag. 257. *AVENA pubescens*.

*A. sesquitertia.* Linn. *Mant.* 1. p. 34. (excluso *Synonymo Scheuchzeri secundum Cl. Smithium.*) Hoffm. *Fl. Germ.* Roth. *Fl. Germ.* 2. p. 105.

*Icon.* *Flor. Dan.* tab. 1203.

**Nota.** Sub *Avena sesquitertia* Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 445 comprehendit *A. distichophyllum* Hostii et Schraderi, quam in Enumeratione plantarum sub *A. argentea* allegavit.

Multi botanici sub *A. sesquitertia*, levidensem varietatem *A. flavescens* comprehendunt.

**176.\*** *AVENA versicolor* racemo subsimplici, spiculis subquinquefloris, flosculis calycem excedentibus, foliis glabrisculis, radice fibrosa perenni. *Schrader. Fl. Germ.* 1. p. 184. — *Spec. pl. ed. Willd.* 1. p. 452. *Vill. Fl. Delph.* 2. p. 142.

*Avena Scheuchzeri.* *Allion. Fl. Pedemont.* n. 2259. *Host. Gram.* 2. p. 33.

*Avena* petiolis ramosis, locustis teretibus, quinquefloris basi pubescentibus. *Hall. Helv.* n. 1500.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum locustis variegatoribus majoribus aristatis. *Scheuchz. Agrost.* p. 231 et *Prodr. tab.* 3. (bona.)

*Icon.* *Host. l. c. tab.* 52. *Vill. l. c. tab.* 4. fig. 5.

*Germ.* *Bunter Hafer.*

*Gall.* *Avoine bigarrée.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris Helvetiae, in agro Abbatis-cellensium in pascuis alpinis *auf dem Sentis* ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2



*Radix* fibrosa, fusca. *Culmi* ex radice plures, semipedales, perraro subpedales, erecti, teretes, graciles, striati, glabri subbinodes, superne aphylli, nudi, inferne foliati. *Folia radicalia* cæspiticia, linearia, angusta, recurvata, obtusiuscula, pallide fusco-viridia, glabriuscula, unciam ad binas uncias longa; *Caulina* inferiora 1 - 2 erecta, linearia, planiuscula, latiora, glabra, obtusa, semiunciam ad unciam longa. *Vaginæ* teretes, striatæ, glabræ. *Ligula* exserta, acutiuscula. *Panicula* seu potius *Racemus* terminalis, simplex, erectus, semiunciam, unciam ad sesquiunciam longus, pauciflorus. *Rachis* flexuosa, scabriuscula. *Spiculæ* alternæ, breviter pedunculatæ, subdistichæ, erectæ, in racemo circiter 3 - 4, sæpissime 5, rarius 7 - 9, lanceolatæ, compressæ, nitidæ, ex fusco-purpureo-flavescente variæ, infimæ subtrifloræ, superiores 4 - 5 floræ. *Calycinae* glumæ inæquales. altera major, ovato-lanceolata, mucronata, 4 - 5 lineas longa, carinata, trinervata, glabrâ. *Corollæ* valvula exterior basi pilosula, striata, acuta, apice bidentata, ultra dorsum medium *Aristam* exserens, flosculo duplo triplove longiorem, sub geniculo tortilem, fusco-nigricantem. *Flosculus* in spicula summus pedicellatus, sterilis.

Affinis *Avenæ pratensi*, a qua differt *Culmis* brevioribus, non sesquipedalibus bipedalibus. *Racemo* breviori, semiunciali unciali, nec digitali et longiori. *Spiculis* paucioribus, brevioribus, lanceolatis, non cylindricis seu teretibus. *Colore* flosculorum et loco natali alpino.

Specimina pulcherrima maxime versicolora, in pyrenæis ad montem Canigou vidi.

pag. 259. *AVENA pratensis*.

*Icon. Leers Herborn. tab. 9. fig. 1. Host. Gram. tab. 51. Sowerby. Engl. Bot. tab. 1204.*

**Nota.** Minime confundenda aut pro eadem habenda cum *Avena bromoide subspicata*: spiculis binatis: altera pedunculata, aristis divaricatis, calycibus octofloris. *Gouan. Monsp. 22. Linn. Sp. pl. Appendix p. 1666. (excluso Halleri et Scheuchzeri Synonymo, quod ad *A. pratensem* pertinet.)*

Gramen alpinum avenaceum glabrum angustifolium, locustis aristatis in spicam dispositis. Scheuchz. *Agrost. p. 228. tab. 4. fig. 21. 22. a Cl. Willdenowio ad Avenam bromoidem citatum, non huc sed omnino ad Avenam pratensem pertinet.*

*Gouani* gramen, cum hoc clarissimo et amicissimo viro, 1789 circa Monspelium et copiosius in Catalonia et Aragonia legi. Differt ab *A. pratensi*: Culmis semper multo tenuioribus et longioribus. Racemo subspicato. Spiculis inferioribus et mediis semper binatis, altera sessili minore, altera pedunculata majori, lanceolata, compressa, nitida argentea, 8 flora. Aristis divaricatis, tenuioribus.

Neutiquam pro varietate *A. pratensis* habenda. Gramen ex seminibus Aragoniae lectis, in horto Carlsruhensi cultum, nullam mutationem passum est.

177. \*\* *AVENA tenuis* panicula æquali, spiculis subtrifloris, flösculis calycem excedentibus, inferiore apice uniaristato, reliquis apice aristis duabus brevibus et unica dorsali geniculata instructis, radice

fibrosa annua. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 375.

*Avena tenuis* paniculata, spiculis erectis subtrifloris, floribus omnibus fertilibus, infimo aristato, arista incurva, reliquis apice biaristatis, aristis brevibus rectis. *Moench. Meth.* 195. — *Willd. Sp. pl.* 1. p. 443.

*Avena dubia* paniculata, calycibus subtrifloris, flosculo infimo terminali arista recta, reliquis apice biaristatis, dorsali arista reflexa. *Leers. Fl. Herb.* n. 39. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 103. *Wibel. Fl. Werth.* p. 121.

*Bromus triflorus.* *Poll. Fl. Pal.* n. 119.  
(omnino, excluso Linnæi Synonymo.)

*Trisetum striatum.* *Pers. Syn.*

*Icon.* *Leers.* l. c. tab. 9. fig. 3. *Host. Gram.* tab. 55.

*Germ.* Dünner Hafer.

*Gall.* Avoine mince.

*Hab.* In palatinatu transrhenano in pratis prope Lauterecken, in collibus siccis lapidosis circa Grumbach; ubique in pascuis tenui gramine vertistis cum *Vulpia* s. *Festuca Myuros* inter *Kirnbecherbach* et *Rathsweiler*; prope *Cusel*: ad vias lapidasas circa *Neustadt an der Hardt*, inter *Dresen* et *Standebühl* teste *Pollichio* et *Kochio*. Prope *Wertheim* ad Moenum in agris sterilibus montis *Flochberg* prope vineas. t. D. *Wibelio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

*Radix* fibrosa. *Culmi* e radice plures, erecti, digitales, palmares, sesquipedales, teretius-

culi, glabri, ad genicula inferiora sæpe incurvati, subramosi. *Genicula* 4-5 glabra, purpurascentia. *Ligula* obtusiuscula, alba. *Vagina* striatæ, glabræ, glauco-virides. *Folia* lineari lanceolata, mucronata, plana, 3-4 uncias longa, sesquilineam fere lata, (siccitate convoluta,) striata, superne deorsum scabriuscula, inferne glabra, ex glauco-viridia. *Panicula* digitalis, palmaris, primum contracta, demum patens. *Spiculæ* parvæ, lanceolatæ, striatæ glauco-virescentes 3-4 floræ, cum aristis novem lineas longæ, dimidiam ad integram lineam latæ. *Calycis gluma* major ovato-lanceolata, mucronata, concava, fere spiculæ longitudine; altera minor, utræque glabræ, striatæ, margine argenteæ. *Flosculus* inferior apice uniaristatus, reliqui apice aristis duabus brevibus, et unica dorsali geniculata præditi.

Minime cum *Bromo trifloro* Linnaei. *Bromo Scheuchzeri* nostro aut *Festuca triflora* Sowerby Engl. Bot. confundenda.

pag. 261. ARUNDO *Phragmites*.

*Icon.* Sowerby Engl. Bot. tab. 401. Leers. Fl. Herb. tab. 7. fig. 1. Schrad. Fl. Germ. tab. 5. fig. 4.

pag. 262. post ARUNDINEM *Phragmitem*.

178.\* ARUNDO *Plinii* calycibus unifloris, panicula erecta densa, foliis planis utrinque glabris, margine retrorsum scabris.

A. *Plinii* calycibus unifloris, foliis utrinque glabris, margine introrsum scabris. *Turr.*



*Animadv. Bot. p. 11. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 41. n. 102.*

*A. mauritanica* culmo fruticoso, floribus paniculatis, calicibus uni-ad trifloris, gluma exteriori subaristata. *Desfont. Fl. Atlant. 1. p. 106. — Pers. Synops. 1. p. 102.*

*A. micrantha. Lamarck. Illust. Gen. 1. p. 196.*

*A. collina. Tenore Cors. di Lezion. botan. t. IV. p. 1. pag. 61. Flor. Napol. prodr. Suppl. III. p. 378.*

*A. Tyberina vulgaris. D. Scherard. Ray. hist. pl. 3. p. 615. — Scheuchz. Agrostogr. p. 125. tab III. fig. 3. A. C. D. (bona.)*

*A. semifarcta Rheni Bononiensis Plinii. Zannon. rar. stirp. hist. p. 27. t. 19. fig. 2. Mont. prodr. Gram. p. 52. tab. 3. jc. D. F.*

*Donax mauritanicus. Palis. de Beauv. Ess. p. 75. Roemer et Schult. Syst. veg. 2. p. 601.*

*Calamagrostis Plinii. Gmel. Syst. nat. 1. p. 172.*

*Germ. Plinisches Schilfrohr.*

*Gall. Roseau de Plinius.*

*Hab. In vicinia Principatus superioris in Helvetia im Rheinthal in pratis paludosis et fossis prope Sargans versus Ragaz, cum A. Phragmitide, ubi detexit Alexander Braun, 1822.*

*Flor. Augusto. Semina Septembri matura. 4*

Magnitudo A. *Phragmites*. Culmi simplices, erecti, articulati, teretes, striati, glabri, cavi. *Folia* arcte culmum fere integrum vaginantia, lineari-lanceolata, acuminata, erecta, plana, pallide viridia, utrinque glabra, margine retrorsum scabra, 5-7 lineas lata, pedalia. *Ligula* subfusca, parva, margine albide pilosula. *Vaginae* striatae, glabrae, glauco-viridescentes. *Panicula* terminalis, speciosa, erecta, densa, novem ad tredecim uncias longa, quatuordecim lineas ad binas uncias lata, circumscriptione lanceolata, e lutescente-fusca. *Pedunculi* numerosi, tenues, divisi, erecti. *Calyces* uniflori, erecti, tenues glabri, longe mucronati, tres ad quatuor lineas longi, bivalves, valvulis inæqualibus. *Corolla* basi pilosa: pilis sericeis albidis.

**Nota.** Individua loco citato lecta, in omnibus partibus simillima sunt illis, quae ad Tyberim Romae lecta sunt.

Planta pro Flora helvetica hucusque nova.

pag. 264. ARUNDO *epigejos*.

Arundo *epigejos* panicula stricta patente, calycibus acuminatis unifloris, arista dorsali recta pilis breviori, pilis calycem subaequantibus. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 211. tab. 4. fig. 1. exclus. *Sow. Engl. Bot.* tab. 102. quae ad *Phalaridem arundinaceam* Linn. pertinet.

180.\* ARUNDO *litorea* panicula diffusa, calycibus unifloris acuminatis, arista terminali brevi pilisque calycem subaequantibus. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 212.

Arundo *pseudophragmites*. *Hall. Fil.* in

*Roem. Archiv. 1. p. 2. p. 10. (a Schrader ad A. pseudophragmitem citata.)*  
*Gaud. Agr. helv. 1. p. 96.*

*Calamagrostis littorea. Decand. Fl. Franc. VI.*  
*p. 255.*

*Icon. Schrad. l. c. tab. 4. Fig. 2.*

*Germ. Ufer-Rohr. Ufer-Schilf.*

*Gall. Roseau de rivage.*

*Hab. In arenosis ad Rhenum circa Argentoratum t. D. Nestlero.*

*Flor. Julio, Augusto. Semina Septembri matuta. 4*

*Radix* repens. *Culmi* sesquipedales, bipedales, simplices, primo basin versus procumbentes, dein magis erecti, rigiduli, teretes, striati, in paniculae vicinia tantum scabriusculi. *Folia* linearia, acuminata, scabra, vaginis glaucescentibus, scabriusculis. *Ligula* exserta, obtusa. *Panicula* erectiuscula, subinde cernua, diffusa 4-6 uncialis. *Rachis* subflexuosa, scabra, inferiori parte semiteres, reliqua parte cum ramis angulata. *Rami* flexuosi, hispidi. *Calyces* uniflori, apice subfalcati, virescentes. *Corolla* calyce minor; gluma exterior secundum nervos hispida, nervo intermedio inter apicis lacinulas inaequales in *Aristam* subflexuosam hispidam, pilis vix breviorum producta. *Gluma* interior exteriori duplo minor apice magis vel minus emarginata. *Pili* basi conjuncti, copiosi, longitudine fere calycis. Sic *Schraderus*.

*Variat.* Culmis vaginisque totis glabris, rachimino scabra et panicula purpurascens.

**Nota.** Non confundenda cum *Arundine* effusa nostra, a qua differt. Culmis non 5-6 pedalis sed multo semper minoribus sesquipedalibus bipedalibus, non basi procumbentibus, sed erectis. Foliis longioribus laete virilibus, non scabris. Vaginis viridibus glabriusculis, non glaucescentibus scabriusculis. Panicula non novem ad 14 uncias longa, sed tantum 4-unciali.

pag. 267. Sub *ARUNDINE Calamagrosti* Linn. hucusque latebant duæ distinctæ species a *Cl. Schradero* egregie descriptæ, scilicet:

182. *ARUNDO Halleri* panicula diffusa calycibus unifloris acuminatis, arista dorsali recta, pilisque corolla paulo longioribus. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 215. (sub *A. pseudophragmite*.)

*Arundo Calamagrostis. Hall. fil. in Römer. Arch.* 1. p. 2. p. 10.

*Arundo Halleriana. Gaud. Agrost. helv.* 1. p. 97.

*Calamagrostis Halleriana. Decand. Fl. Franc. VI.* p. 256.

*Icon. Schrad. l. c. tab. 4. fig. 3.*

*Germ. Hallerisches Schilfrohr.*

*Gall. Roseau de Mr. Haller.*

*Hab.* Utrunque in pratis sylvaticis, dumetis præsertim ad Rhenum situs sæpe inundatis frequens.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. 24



Habitus *Arundin. Calamagrostis* in cujus consortio sæpe occurrit, cum qua a pluribus auctoribus Floræ germaniæ confundi videtur. *Schrad. l. c.*

*Variat.* Foliis facie pubescentibus. Culmo rachique scabriuscula et Floribus minoribus. *Schrad. ib.*

*Radix* repens. Descripsi in Flora Badensi sub *Arundine Calamagrosti. Pollichius in Fl. Palat.* sine dubio sub *Arundine Calamagrosti Arund. epigejum. Linn.* comprehendebat.

182.\* **ARUNDO** *Calamagrostis* panicula diffusa, calycibus acuminatis unifloris, arista terminali brevi, pilis corolla longioribus. *Schrad. l. c. p. 214. (exclus. Hall. fil. Pollichii et Rothii Synon.)*

*Arundo Calamagrostis* calycibus unifloris corolla longioribus, panicula erecta diffusa, floribus sparsis erectis, foliis linearibus. *Smith. Fl. Brit. (omnino ob aristam terminalem.) excluso Sowerby Engl. Bot. tab. 403. quæ omnino ad Arundinem epigejos pertinet, ut recte Sowerby in indice monet.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 2159. (bona) Flor. Dan. t. 1624. Schrad. l. c. tab. 4. fig. 4.*

*Germ. Wiesenrohr. Rohrgras.*

*Gall. Roseau plumeux.*

*Hab.* In pratis uliginosis, turfosis. In Principatu superiori prope *Bohlingen* et passim alibi, cum præcedenti specie.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri matura. 24

Maxime affinis præcedenti, a qua tamen distinguitur *Culmis* persæpe ramosis et *Floribus* plerumque minoribus. *Arista* terminali breviori.

Sine dubio Linnaeus sub *Arundine* *Calamagrosti* in *Flor. Suec.* et *Lappon*, comprehendebat.

**Nota.** *Calamagrostis lanceolata* Roth. *Fl. Germ.* a Cl. Schradero hic citata, ob *aristam* non terminalem, sed dorsalem, omnino non huc, sed ad præcedentem speciem pertinet.

pag. 271. post *LOLIUM perenne*.

183.\* *LOLIUM speciosum* spica breviter aristata, spiculis alternis sexfloris, gluma calycina spicula sublongiore, radice fibrosa perenni.

*Lolium speciosum.* (*Steven*), spica subaristata, calyce multifloro flosculis longiore. *Rœmer* et *Schult.* *Linn. Syst. veg.* 2. p. 750. *Marsch. a Bieberst. Fl. Taur. Caucas.* 1. p. 80. (omnino) 3. p. 89. an?

*Germ.* Schæner *Lolch*.

*Gall.* *Yvroie specieuse*.

*Hab.* Circa *Zweybrücken* in agris non infrequens t. Cl. *Bruchio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Julio Augusto matura. 24

*Radix* densa, fibrosa, fusca, *Culmi* 3-4

pedales, erecti, striati, glabri. *Folia* linearia, acuta, 2 - 3 lineas lata, glabra, læte viridia. *Vagina* sulcato-striata, glabra. *Ligula* truncata, brevis, pallide fusca. *Spica* terminalis, erecta, semipedalis et longior. *Spiculæ* in *Rachi* alternæ, sessiles, erectæ, circiter viginti, compressæ, sexfloræ, (magnitudine *Festucæ fluitantis*.) *Calycina* gluma spicula sua sublongior, obtusiuscula, glabra. *Corollinæ* glumæ ovatæ, valvula exteriori *Aristam* infra apicem brevissimam exserens.

**Nota.** Descripsi gramen ad individua a merittissimo Bruchio, Alex. Braunio benevole missa.

Convenit omnino differentiae specificae à Cl. Steven in Marsch. a Bieberst. Fl. Taur. Caucas. 1. p. 80. l. c. datae. Recedit autem a L. specioso Marsch. à Bieberst. l. c. 3. p. 89. radice non annua sed perenni. Affirmat porro vir clarissimus: majorem affinitatem cum varietate mutica L. olli temulenti eam habere. Nostrum e contrario gramen, vix ullam affinitatem cum L. temulento, sed magis cum L. perennis varietate aristata habet, a quo differt. Gluma calycina spicula sua sublongiore. Spiculis sexfloris, nec 7 - 9 - 14 floris.

pag. 271. *LOLIUM Halleri est L. tenue Linn.*

**Hab.** porro prope *Wertheim* in arenosis, ubi vidi 1815.

Gramen nostrum differt ab affini *Lolio perenni*, cum quo Cl. Schraderus sub varietate conjunxit. *Radice* fibrosa non repente, reliquisque notis in Flora nostra exhibitis.

Deleatur Nota. Lolium tenue meum annuum a me in Hispania lectum, nunc accuratius

examinatum, ad *Tristicti* speciem, et sine dubio ad levidensem varietatem *Tristicti Lachenalii* pertinet.

Misi Cl. Schrebero *Lolium Halleri* nostrum; qui pro *L. tenui* Linn. declaravit; omnes inquit characteres et synonyma a beato Archiatro (Linnaeo) allegata, optime conveniunt!

pag. 274. post *LOLIUM temulentum*.

185.\* *LOLIUM arvense* spica submutica, spiculis longitudine calycis, flosculis ellipticis, culmo glaberrimo. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 150.

*Lolium arvense* spica submutica, spiculis calycem æquantibus, radice annua. *Schrad. Fl. Germ.* 1. p. 399.

*Icon. Sowerby Engl. Botany. tab.* 1125.  
*Host. Gram. tab.* 28.

*Germ. Kleiner Sommerlolch.*

*Gall. Yvroie annuelle petite.*

*Hab.* In arvis sterilioribus sabulosis passim. Circa *Carlsruhe* retro *Beiertheim* in arvis versus *dem Pulverthurm*. In Palatinatu transrhenano circa *Lautern* t. *D. Kochio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Julio Augusto maturat. ☉

Primo intuitu maxime affinis *L. temulento*, a quo differt: Statura minore. *Vaginis foliisque* glabris. *Spica* graciliori. *Spiculis* calycem æquantibus, interdum paulo longioribus. *Flosculis* brevissime aristatis.

pag. 275. *ELYMUS europæus*.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1631. *Sowerby Engl. Bot. tab.* 1317.



ad pag. 276. post *Elymum europæum*.

- 186.\* *ELYMUS arenarius* spica erecta arcta, spiculis subtrifloris pubescentibus inferioribus et superioribus geminatis, intermediis ternis calyce ciliato brevioribus, foliis involutis rigidis. *Willd. enum. pl. p. 130.*

*Elymus arenarius* spiculis pubescentibus, flosculis muticis, foliis involutis. *Schrad. Fl. Germ. 1. p. 401.*

*Elymus arenarius* spica erecta, arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. *Linn. Sp. pl. 1. p. 122.*

*Triticum* radice perenni, spiculis binis lanuginosis. *Gmel. fl. Sibir. 1. p. 119. tab. 25.*

*Gramen caninum maritimum* spica triticea nostras. *Scheuchz. Agrostr. p. 6.*

*Icon. Schreb. Gram. 2. tab. 40. — Flor. Dan. tab. 847. Sowerby Engl. Botany. 24. tab. 1672.*

*Germ. Sand-Haargras.*

*Gall. Elyme des sables.*

*Hab.* In Palatinatu transrhenano, in locis sterilibus apricis arenosis. Circa *Homburg* prope *Zweybrücken* t. *Bruchio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturat. 24

*Radix* longe lateque extensa, repens. *Culmus* 2 - 3 pedalis, erectus, firmus, geniculatus, glaber, basin versus foliosus. *Folia* culmo subbreviora,

breviora, linearia, glauca, involuto - canaliculata, mucronata. *Vaginæ* striatæ. *Spica* erecta 3-4-7 uncias longa, subcompressa, multiflora, glauca. *Spiculæ* sessiles.

In maritimis arenosis abunde obvenit. Arenam optime figit.

Gramen durum pecoribus non acceptum.

pag. 279. *HORDEUM vulgare.*

*var. b.* seminibus vestitis, spica cærulescente.

*Icon.* Metzger l. c. tab. IX. fig. B.

*Germ.* Blauliche Wintergerste.

*Gall.* Orge commune à épi violet.

*var. c.* seminibus vestitis, spica nigricante.

*Icon.* Metzger. l. c.

*Germ.* Schwarze gemeine Gerste. Schwarze russische Wintergerste.

*Gall.* Orge commune à épi noir. Orge de Russie.

pag. 284. *HORDEUM secalinum.* Schreb.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 409. (sub *H. pratensi.*)

*Hab.* Prope Bruchsal in pratis humidiusculis an der Salzbach ubi vidi 1806. 4

*Variat.* Spica sæpe subpurpurascente, *Flosculis* lateralibus lanceolatis, subabortivis, dorso villosis, intermedio glabro. Illic pertinet *H. maritimum* Roth. *Fl. Germ.* 2. p. 151. minime confundendum cum *H. maritimo* Smith. *Fl. Brit.* 1. p. 156. Sow. Engl.

*Bot. tab.* 1205. Gramen annuum, digitale, vix altius, subprocumbens, ad genicula infractum, spica multo minori præditum. Specimina veri *H. maritimi* in hispaniæ maritimis vidi et ex seminibus ibi lectis, in horto *Carlsruhensi* colebatur.

**Nota.** Vix pro *H. nodoso* Linn. habendum, a quo, perill. Schreberus, circa gramina facile versatissimus et expertissimus, omnino distinxit.

## 194. TRITICUM *aestivum*.

a.) Spica laxa alba glabra aristata.

*Icon.* Metzger *europäische Cerealien. Tab. I. fig. A. B.*

*Germ.* *Weißer Bartweizen. Weißer Grannenweizen. Sommerweizen.*

*Gall.* *Froment barbu blanc. Blé grison.*

b.) Spica laxa aristata alba velutina.

*Icon.* Metzger *l. c.*

*Germ.* *Weißer sammtartiger Bartweizen.*

*Gall.* *Froment barbu blanc et velouté.*

c.) Spica laxa rufa, glabra, aristata.

*Icon.* Metzger *l. c.*

*Germ.* *Rother glatter Bartweizen.*

*Gall.* *Froment barbu roux et glabre.*

d.) Spica laxa rufa velutina aristata.

*Icon.* Metzger *l. c.*

*Germ.* *Rother sammtartiger Bartweizen.*

*Call. Froment commun barbu, roux et velouté.*

c.) Spica laxa fusca glabra aristata.

*Icon. Metzger l. c.*

*Germ. Brauner gemeiner Bartweizen. Fuchsweizen. Brauner Grannenweizen.*

f.) Spica laxa coerulescente glabra, aristata.

*Icon. Metzger l. c.*

*Germ. Blauer gemeiner Bartweizen.*

g.) Spica laxa nigra velutina, aristata.

*Icon. Metzger l. c.*

*Germ. Schwarzer gemeiner Bartweizen.*

## 195. TRITICUM *hybernum*.

a.) Spica laxa alba glabra, mutica, seminibus albidis.

*Icon. Metzger l. c.*

*Germ. Weißer Kolbenweizen mit weißlichen Saamen.*

*Gall. Froment à épi blanc sans barbes.*

b.) Spica laxa alba glabra mutica, seminibus aureis.

*Icon. Metzger l. c.*

*Germ. Weißer Winterweizen mit gelben Saamen. Weißer Kolbenweizen mit gelben Saamen. Talaveraweizen.*

*Gall. Froment d'hiver à épi blanc et à grains jaunes.*



c.) Spica laxa alba, velutina, mutica.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Weisser sammtartiger Kolbenweizen.  
Böhmischer Sammtweizen.

*Gall.* Froment commun sans barbe, velouté  
et blanc. Blé de Bohème.

d.) Spica laxa glabra, flava, mutica.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Gelber Kolbenweizen.

e.) Spica laxa rufa glabra mutica.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Rother Kolbenweizen. Gemeiner Winterweizen. Dessauer - Weizen.

*Gall.* Froment sans barbe à bâles rouges.

f.) Spica laxa rufa velutina mutica.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Rother sammtartiger Kolbenweizen.  
Rother Sammtweizen.

*Gall.* Froment commun sans barbes, velouté  
et roux.

g.) Spica compacta rufa, glabra, mutica.

*Icon.* Metzger l. c. Tab. II. fig. C. D.

*Germ.* Bengelweizen. Binkelweizen. Cretischer Weizen.

*Gall.* Froment commun à épi compact. Froment d'Alsace à épi court. Blé de Crète.

196. *TRITICUM turgidum*.

*var. β. Spica rufa glabra aristata.*

*Icon. Metzger. l. c. Tab. III. fig. A. B.*

*Germ. Rother englischer Weizen. Rother glatter Weizen.*

*Gall. Petanielle rouge et glabre. Froment rouge de Montpellier.*

*Hisp. Redondillo. Rodonello.*

*var. γ. Spica rufa velutina aristata.*

*Icon. Metzger l. c. Tab. II.*

*Germ. Rother sammtartiger englischer Weizen. Dickähriger Weizen. Tuneser Weizen. Arabischer Weizen. Glockenweizen.*

*Gall. Blé de Sicile. Gros blé. Froment rengflé. Petanielle roux.*

*var. δ. Spica ramosa rufa velutina aristata.*

*Icon. Metzger l. c. Tab. III. fig. C. D.*

*Germ. Rother sammtartiger Wunderweizen. Vielähriger arabischer Weizen. Wunderweizen. Maroccanischer Weizen.*

*Gall. Blé d'abondance. Blé de miracle. Blé de Smyrne. Blé de la Barbarie. Gros blé à épi rameux.*

196.\* *TRITICUM durum* culmo farcto, glumis pubescentibus aristatis, seminibus duris, spiculis quadrifloris. *Desfont. Fl. Atlant. 1. p. 114. Lagasca nov. gener. et sp. plant. p. 6.*

*T. fastuosum* glumis utrinque compressis late carinatis mucronatis pubescentibus, spica longa subpyramidata, semine tumido.  
*Lagasca l. c.*

*T. Trevesium.* Giovanni Mazzucato. p. 30.

*T. sativum* var. *durum.* Pers. Synops. 1. p. 109.

*Icon.* Giovanni Mazzucato l. c. tab. I. fig. I. — Metzger l. c. tab. IV. fig. A. D.

*Germ.* Weisser sammtartiger Bartweizen. Weisser zottliger Weizen.

*Gall.* Froment dur. Froment de Barbarie. var.  $\beta$ . Spica laxa alba glabra, aristata.

*Metzger l. c. p. 16.*

*Germ.* Weisser Bartweizen. Weisser welscher Weizen.

*Ital.* Blanshetta o Civitella del Toscani.

*Hab.* In Barbaria. Colitur passim in hortis agrisque. Seritur primo vere. Semina maturat Julio. ☉

## 197. TRITICUM *Spelta.*

var. a.) Spica alba, glabra, aristata.

*Icon.* Metzger l. c. tab. VI. fig. A. D.

*Germ.* Weisser Grannenspelz. Dünkel. Kern.

*Gall.* Épeautre barbu à épi blanc.

b.) Spica rufa glabra, aristata.

*Icon.* Metzger l. c. tab. IV. fig. A. D.

*Germ.* Rother Grannenspelz.

*Gall.* Épeautre barbu à épi rouge.

c.) Spica coerulescente velutina aristata.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Blaulicher Grannenspelz.. Blaulicher Sammtspelz.

*Gall.* Épeautre barbu bleu et velouté.

d.) Spica nigra velutina aristata.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Schwarzer Grannenspelz.

*Gall.* Épeautre barbu noir et velouté.

e.) Spica alba glabra mutica.

*Icon.* Metzger l. c. tab. VI. fig. B. E.

*Germ.* Weißer Spelz. Weißer Dünkel.  
Weißer Winterspelz. Weißer Vessen.

*Gall.* Faux Épeautre. Épeautre sans barbe, blanc et glabre.

*Ital.* Farco bianco.

*Hisp.* Escanda.

f.) Spica glabra, rufa, mutica.

*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Rother Spelz. Rother Winterspelz.  
Rother Dünkel. Rother Vessen.

*Gall.* Épeautre sans barbes roux et glabre.

g.) Spica coerulescente glabra, mutica.

Triticum Duhamelianum. Giov. Maz-  
zucato. tab. IV. fig. 2.



*Icon.* Metzger l. c.

*Germ.* Blaulichbrauner Spelz.

*Ital.* Grano rosso.

197.\* *TRITICUM polonicum* calycibus  
bifloris nudis, flosculis longissime arista-  
tis, rhacheos dentibus barbatis. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 127.

*T. majus*, longiore grano, glumis foliaceis,  
*polonicum*. *Moris. Hist.* 5. p. 175. *Sect.* 8.  
*tab.* 1. *fig.* 5.

*var. α.* Spica laxa alba, glabriuscula, ari-  
stata.

*Icon.* Metzger l. c. *tab.* V. *fig.* A. D.

*Germ.* Polnischer Weizen. Sibirischer Wei-  
zen. Wallachisches Korn. Astrachani-  
sches Korn. Aegyptisches Korn. Korn  
von Cairo.

*Gall.* Blé d'Egypte. Blé de Surinam. Blé  
de Magador. Blé de Pologne.

*Hab.* . . . . . Colitur passim in agris hor-  
tisque. Seritur primo vere.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. ☉

Varietatem: Spica velutina aristata et Spica  
glabriuscula submutica, nec non Spica ramosa, gla-  
briuscula, aristata, apud meritissimum Metzgerum  
in horto Heidelbergensi vidi, vid. ej. *Cerealia*.  
p. 24, 25, 26.

198.\* *TRITICUM dicoccum* spica op-  
posite compressa erecta, disticha, glabra

conferte imbricata, rhachi fragili, glumis acute bidentatis quadrifloris, flosculis binis intermediis muticis sterilibus, binis exterioribus aristis fertilibus, seminibus triquetris corticatis. *Schübler in Regensb. Bot. Zeitung n. 29. Ann. 1820. fig. 2.*

α. *album* spiculis maturis albescentibus.

β. *rufum* spiculis maturis rufescentibus.

*Triticum dicoccon. Schrank. Fl. Bav. p. 389.*

*Triticum amyleum. Seringe. Met. Bot. p. 134.*

*Zea verna. C. Bauh. hist. pl. II. p. 413.*

*Zea dicoccos vel Spelta major. Bauh. pin. 22. (omnino magis hic, quam ad Triticum Speltam pertinet.)*

*Icon. Metzger l. c. tab. VII. fig. A. D.*

*Germ. Ehmer, Emmer, Oemer, Immer.*

*Gall. Epeautre dicocque. Blé de Jerusalem. Blé Amidonier.*

*Hab. . . . . Colitur passim, cumprimis in Principatu Fürstenbergensi et Principatu superiore ad Lacum Bodanicum prope Constanz et albi.*

*Flor. Junio. Semina Julio, Augusto maturata. ☉*

Medium tenet locum inter *Triticum Spelta* et *Tr. monococcum*, a quibus omnino diversum,

Frumentum jam diu in Suevia cultum esse, patet ex Joh. Bauhini observatione, qui Anno 1596

mense Augusto inquit: observavi inter urbem Rothenburgum et Niederau fontem acidum, Triticum genus hoc, quod mihi denominarunt Welsche-Korn; inveni eodem mense etiam inter Kirchen urbem et Bol. Serunt verno tempore.

pag. 291. TRITICUM *Lachenalii*.

Triticum *Halleri* spica simplici, spiculis alternis linearibus teretiusculis muticis 5 - 9 floris. *Viviani Ann. Bot.* 1. 2. p. 155. *Fragm. Fl. Ital.* p. 24. tab. XXVI. fig. 1.

Triticum *tenellum*? *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 482. (exclus. omnibus præter *Halleri* synonym.)

Triticum *poa*. *Decand. Fl. Franc. V.* p. 285.

β. Spica à basi ultra medium ramosa.

*Hab.* Porro in agris cultis versus vallem *St. Amarin*, in adscensu montis *Ballon alsatiæ*, t. acutissimo *Villarsio*. Prope *Wertheim* ad *Moenum* in agris *Lino usitatissimo* cultis, non infrequens, ubi legi 1815. — var. β. in agris inter *Basileam* et *Weil* vidi 1810.

pag. 293. TRITICUM *junceum*. *Linn.*

*Icon.* *Sowerby Engl. Bot. tab.* 814. (*bona.*)

*Hab.* Porro in *Marggraviatu superiori* prope *Krenzach* frequens, ubi legi 1807.

*Rachis* in individuis nostratibus bene multis accurate oculis armatis examinata, striata, sæpissime glaberrima, rarius hispida. Individua in *Hispaniæ* et *Galliæ* maritimis a me lecta, nostra-

tibus habitu simillima, Rachi sæpissime hispida instructa sunt. Beatus *Linnaeus* aliique bene multi botanici, ambas varietates sub *Tritico junceo* comprehendebant. Synonyma *Halleri* et *Bauhini* a me citata, omnino ad nostrum gramen pertinent.

Nota. *Triticum junceum*, glaucum, acutum, rigidum et pungens Decand. Fl. Franc. VI. p. 281 — 283. *Triticum junceum* et rigidum Schrad. Fl. Germ. 1. p. 192 - 195 vix pro diversis speciebus habendæ a *Tritico junceo* *Linnaei*, gramine maxime pro diverso solo natali, polymorpha, vix ac ne vix diversae. Variat in locis salsis maritimis more *Tritici* repentis Linn. Culmi juncei, glauci, plus minurve rigidi. Folia angusta, patentia, demum convoluta, acuta, pungentia, rigida. Rachis in individuis a mare remotis nostratibus, sæpissime glabra, quandoque hispida. Glumae calycinae plus minusque truncatae, in locis a mari remotis, saepe acutiusculae.

*Triticum repens maritimum*. Koch et Ziz Cat. Plant. Flor. Palat. in sabulosis prope Moguntiam occurrens, totum glaucum, foliis demum involutis et pungentibus, spiculis muticis vel breviter mucronatis, Calycis carina non semper scabra, saepius laevi. Rachi scabra, quandoque laevi, à *Tritico junceo* Linn. non removendum est.

## TRIANDRIA

### TRIGYNIA.

pag. 305. post HOLOSTEUM:

LII.\* POLYCARPON.

*Linn. Gen. Plant. ed. Schreb. n. 138.*

*Calyx* pentaphyllus: foliolis ovatis, con-



cavis, carinatis, mucronatis persistentibus. *Corolla* Petala quinque, brevissima, ovata, emarginata, alterna, persistentia. *Capsula* ovata, unilocularis, trivalvis. *Semina* plurima ovata.

205. \* *POLYCARPON tetraphyllum*  
caule ramoso prostrato, foliis quaternis.  
*Linn. Suppl. p. 116. Hoffm. Fl. Germ.*  
*1. p. 44.*

*Anthyllis alsinefolia polygonoides major. Bar-  
rel. Icon. rar. tab. 534.*

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab. 1031.*

*Germ. Vierblättriges Nagelkraut.*

*Gall. Polycarpe quaterne.*

*Hab.* In sabulosis cultis sterilibus ad viam publicam inter *Graben et Waghäusel*, frequens, ubi legit *A. Braun. Ann. 1821*, prope *Mannheim t. D. Succowio.*

*Flor.* Augusto, Septembri. *Semina* Octobri, Novembri matura. ☉

*Radix* fibrosa albida. *Caules* tenues, ramosi, divaricati, digitales, semipedales et longiores. *Folia* sæpissime quaterna, quandoque opposita, obovata, integerrima, glabra. *Paniculæ* ramosissimæ, dichotomæ, multifloræ, *Stipulæ* et *Bracteæ* minutæ, acuminatæ, scariosæ, cinereo-albidæ. *Flores* numerosissimi, parvuli. *Petala* exigua, alba, subemarginata, calyce minora.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

Individua nostratia, simillima lectis a me in Gallia meridionali et in Hispania.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

---

pag. 307. FLORES *tetrapetali inferi.*

LXII.\* EPIMEDIUM. *Cal.* 4-phyllus caducus.  
*Cor.* 4-petala. Nectaria 4-  
petalis incumbentia. *Siliqua*  
monolocularis.

---

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

---

pag. 310. Ante GLOBULARIAM *vulgarem* :

206.\* GLOBULARIA *nudicaulis* caule  
nudo, foliis integerrimis lanceolatis. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 140. *Scop. fl. Carn. n.*  
154.

Globularia foliis ovatis oblongis integerrimis,  
caule nudo unifloro. *Hall. helv. n.* 217.

Scabiosa bellidis folio, humilis, caule nudo,  
radice non repente. *Moris. hist.* 3. p. 50.  
*Sect. 6. tab.* 15. *fig.* 4.

Bellis cœrulea caule nudo. *Bauh. pin* 262.

*Icon. Jaqu. Fl. Austr. tab.* 250.

*Germ.* *Nachtstielige Kugelblume. Nacktstielige blaue Maslieben.*

*Gall.* *Globulaire à épi nud.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* in rupibus caleareis *im Donauthal*, retro *Stetten am kalten Markt*, nec non in vicina helvetia prope *St. Gallen*, prope *dem Weisbad am Wildkirchlein* ubi vidi 1818.

*Flor.* Julio. *Semina* Augusto Septembri maturata. 2

Differt a *G. vulgari*: *Caule* aphylo sæpe altiori. *Foliis* radicalibus longioribus ovali-oblongis, firmioribus, integerrimis basi magis attenuatis, splendentibus, *caulinis* nullis, aut saltem versus basin demum folio uno alterove, multo minori. *Capitulo* florum majusculo.

pag. 310. *GLOBULARIA vulgaris.*

*Hab.* Porro in Brisgovia ad montem *Kaiserstuhl* in pascuis gramineis montosis *an den Schellinger Wiesen* infra *dem St. Katharinenkirchlein* abunde et quidem floribus cœruleis, violaceis et albis, ubi cum generoso *Yttaro* vidi 1805. Prope *Weinheim* supra vineas in montosis cum amicissimo artis veterano *Heinse et Rudie* pharmacopæo instructissimo vidi 1813 - 1815.

*Nota.* Jam saepius pulchellam plantam, in hortum botanicum Carlsruhensem transplantavi, difficile cicurandam.

pag. 311. *GLOBULARIA cordifolia.*

*Hab.* Porro in vicina Principatus superioris helvetia, apud *Abbatiscellenses*, retro *dem*

*Weisbad, am Wildkirchlein, Gamor et Kasten* in rupibus calcareis, ubi eam vidi 1818.

pag. 314. *DIPSACUS sativus*.

*Icon. Plenk. pl. officinal. tab. 50. Sow. Engl. Bot. tab. 2080.*

pag. 317. *SCABIOSA Succisa*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 878.*

*Var. δ.* Floribus semiimpletis impletisque, staminibus et partim pistillo destitutis.

*Hab.* Prope *Wertheim* in silva *Homburger Hölzchen* dicta t. *Mertino*.

pag. 321. *SCABIOSA arvensis*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 659.*

*Var. α.* Foliis omnibus integerrimis lanceolatis, glabriusculis corollulis subæqualibus, caule simplici unifloro.

*Var. β.* Foliis subintegris, acute lanceolatis, summis dentato - pinnatifidis, margine longe piloso - hirsutis, corollæ laciniis linearibus, staminibus tubo corollæ brevioribus, caule simplici unifloro.

*Var. γ.* Corollulis subæqualibus impletis, staminibus destitutis.

*Hab. Var. α. β. γ.* Prope *Wertheim* inter *Homburg* et *Erlenbach*, in silva *Homburgensi*, et in monte *Kalmuth* t. optimo *Mertino*.

pag. 323. *SCABIOSA columbaria*:

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1311.*



*Var. γ. prolifera* capitulis numerosis longe pedicellatis terminalibus.

*Hab.* Prope Wertheim in monte Waltersbach t. Mertino.

pag. 325. post SCABIOSAM ochroleucam:

216.\* SCABRIOSA *canescens* cano-tomentosa, corollulis quinquefidis radiantibus, caule multifloro, foliis radicalibus ovato-lanceolatis integerrimis, caulinis pinnatifidis pinnatisque. *Waldst. et Kitaibl. Plant. rar. Hung.* 1. p. 53.

*S. suaveolens* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis glabris radicalibus lanceolato-oblongis integerrimis, caulinis pinnatis, foliis linearibus. *Loiseleur de Longchamps Fl. Gall.* 1. p. 78. *Desfont. Hort. Paris.* 110.

*Icon.* *Waldst. et Kit. l. c. tab.* 55.

*Germ.* Weisgraue Scabiose.

*Gall.* Scabiose canescente.

*Hab.* Prope Carlsruhe retro Beiertheim in sabulosis sterilibus versus dem Pulverthurm non infrequens. Prope Wertheim in sabulosis apricis im Tännig copiose t. Mertino. In sabulosis transrhenum circa Kaiserslautern, Mainz et Mombach t. D. Kochio.

*Flor.* Augusto, Septembri. *Semina* Octobri matura. 24

Pedalis, sesquipedalis, ramosa, tota cano-tomentosa. *Flores* mediocres, violacco-coerulescentes,

lescentes, subsuaveolentes. Variat Foliis radicalibus obtusis, acutis, quandoque acuminatis. Floribus albidis.

Obs. In horto culta, constantissima.

pag. 333. *GALIUM rubioides* lege:

222. *GALIUM hyssopifolium* foliis quaternis, lanceolatis, trinerviis, duobus longioribus, glabris, fructibus glabris.

*Galium hyssopifolium.* Hoffm. *Fl. Germ.* 5. p. 71.

*Galium rubioides.* Poll. *Fl. Palat. n.* 148. (exclus. Linnæi synonym.)

*Galium boreale.* α. fructibus glabris. *Decand. Fl. Franc. VI. p.* 499. *Lamarck. Encycl.* 2. p. 576.

*Germ. Hyssopblättriges Labkraut.*

*Gall. Gaillet à févilles d'Hyssope.*

*Hab.* Passim cum *Galio boreali*. In pratis montosis et demissioribus sylvaticis. In Principatu Fürstenbergensi prope *Donqueschingen* in Brisgovia pratis udis prope *Triberg, Fürtwangen, Villingen, Dierheim* et alibi. Circa *Wertheim* in pratis inter *Haslach et Haselburg* et alibi frequens t. *Mertino*. Circa *Lautern* in pascuis siccis ac sylvis, in pratis inter *Lambsheim et dem Holzhof* post *Pollichium* 1822 vidi.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2

Maxime affinis *Galio boreali*, a quo tamen

facile distinguitur. *Caulibus* sæpissime altioribus, ramosioribus. *Foliis* quaternis duplo fere angustioribus, longioribus. *Pedicellis* multifidis. *Fructibus* glabris, (non hispidis) majusculis.

Planta in horto botanico, ex seminibus culta, constans, minime pro varietate *G. borealis* habenda.

**Nota.** Dum *Floram Badensem* scripsi individua hujus plantae, mihi ignota erant. Ex hoc tempore, specimina a Pollichio inter *Lambsheim* et dem *Holzhof* sub *Galio rubioide* descripta, legi. Maxime omnino recedunt a *Galio rubioide Linnæi*, ad quam pertinet: *Rubia quadrifolia* glabra *Joh. Bauh. hist.* 3. p. 717. *Icon. bona!* et *Galium latifolium glabrum Bauh. prodr.* 146. quod sub *Galio rubioide* in *Flora Badensi*, ex individuo herbarii mei descripsi.

Specimina florifera et fructifera pulcherrima *Galii hyssopifolii*, fructibus semper glabris, misit optimus *Mertinus*.

pag. 334. *GALIUM palustre*.

*Icon. Sowerby Engl. Bot. tab.* 1857.

pag. 335. *GALIUM uliginosum*.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1509. *Sowerby Engl. Bot. tab.* 1972.

pag. 336. *GALIUM spurium*.

Delcantur synonyma omnia (præter *Linnæi*.)

*Galium hispidum* foliis subsenis lineari-lanceolatis retrorsum hispidis, fructibus glabris subcompressis, seminibus reniformibus. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 184.

*Galium agreste*  $\beta$ . *lejospermum*. Wallr.  
*Sched. crit.*

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 1871.

*Hab.* Porro circa *Wertheim* in agris arenosis et lutosis vincis, in arenosis inter *Linum usitatissimum*, prope pagum *Faulenbach*, ad Tuberim in vincis retro *dem Kammerwalde* copiose t. *Mertino*.

*Flores* omnes hermaphroditi. *Corollæ* parvulæ, quadripartitæ, pallide albide - viridescentes, *laciniis* subacuminatis, patentissimis. *Germin* lente spectatum subverrucosum. *Fructus* glabri, ante maturitatem mitidi, per lentem orbiculatim striati, maturi nigricantes, compressi, reniformes.

Minime confundendum cum *Valantia Aparine* Linn. *Pollichii*, seu *Galio tricorni*. Smith. *Fl. Brit.* 1. p. 176.

pag. 558. *GALIMUM harcynicum*.

*Icon.* *Flor. Dan. tab.* 1633. (sub *saxatili*.)  
*Sowerby Engl. Bot. tab.* 815.

*Hab.* Porro per totum tractum sylvæ nigræ in montosis sylvaticis, nec non in sylva *Odenwald* prope *Eberbach*, *Erbach* et *Michelstadt*, ad montem *Mælibocum*, retro *Weinheim*. Circa *Wertheim* in lapidosis muscosis sylvæ *Spessart*. t. *Mertino*.

pag. 559. *GALIMUM Bocconi*.

*Hab.* Porro in collibus calcareis prope *Villingen*, *Donaueschingen*, *Engen* et albi. Circa *Wertheim* multis varietatibus, in ericetis montosis t. *Mertino*.



pag. 546. *GALIUM campanulatum*.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi, in collibus asperis calcareis lapidosis circa *Donaueschingen* et retro *Moeskirch* frequens.

*Nota.* Specimina nostratia in omnibus partibus similima illis, à Villarsio lectis.

pag. 548. *GALIUM rubrum Pollichii* delcatur et inseratur ejus loco.

232. *GALIUM anglicum* foliis subsenis lanceolatis mucronatis, margine cauleque scabris, pedunculis bifidis, fructu granulato. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 179. — *Huds. Fl. Angl.* 1. p. 69.

*Galium parisiense.* *Relh. Fl. Cant.* p. 67. (*secundum Cl. Smithium.*)

*G. rubrum* *Poll. Fl. Palat. n.* 156.

*Aparine minima.* *Raj. Syn.* 225. *tab.* 9. *f.* 1.

*Icon.* *Sowerby Engl. Bot. tab.* 384.

*Germ.* *Englisches Labkraut.*

*Gall.* *Caillet d'Angletaire.*

*Hab.* In palatinatu transrhenano retro *Kirchheim* in agris sterilibus inter *Gasum* et *Stetten* teste *Pollichio* et *Kochio*. Prope *Mainz t. D. Ziz.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. ☉

*Folia* sena vel septena, parva, desflexa. *Rami* floriferi alterni, subdichotomi, 3-5 flori. *Flores* parvi luteo-virescentes. *Fructus* subgranulati.

**Nota.** Planta nostra omni ex parte convenit cum ea, quam Cl. Sowerby l. c. depinxit. Minime confundenda cum *G. parisiensi* Linn. s. *G. litigioso* Decand. Fl. Franc. quod facile fructibus semper setuloso-hispidis, ab eo distinguitur.

pag. 349. *GALIMUM boreale.*

**Icon.** Sowerby *Engl. Bot. tab.* 105.

**Hab.** Porro in Principatu Fürstenbergensi prope *Donaueschingen*, *Engen* et alibi in pratis uliginosis frequens. Prope *Villingen*, *Dierheim*. In Brisgovia prope *Elzach*, *Triberg* in udis. Circa *Wertheim* cum *G. hyssopifolio* frequens. t. *Mertino*.

pag. 555. *GALIMUM Aparine* Linn.

β. minus foliis et fructibus minoribus. *La-mark. Encyclop. bot.* 2. p. 581.

*Galium infestum.* *Waldst. et Kit. pl. Hung. rar.*

*Galium agreste var. echinospermum.* *Wallr. Sched. crit.*

*Galium Vaillantii.* *Decand. Fl. Franc. IV. p.* 263.

*Aparine vulgaris* semine minori. *Vaill. Bot. Paris. p.* 14.

**Icon.** *Waldst. et Kit. l. c. tab.* 202. *Vaill. l. c. tab. IV. fig.* 4.

**Hab. et Flor.** Promiscue cum *G. Aparine* in agris cultis passim. ☉

Maxime affine *G. Aparine* et vix ab eo specie diversum. Prostant varietates interme-

diæ, quæ omnino seperationem non suadent. *Fructus* exacte ut in *G. Aparine* nunquam glabri sed setuloso-hispidi. Mimine pro varietate *G. spurii* Linn. habendum.

239.\* *PLANTAGO maritima* foliis semicylindricis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. Linn. *Sp. pl.* 1. p. 165. Poll. *Fl. Palat.* 1. p. 100.

*P. maritima* foliis linearibus subintegerrimis canaliculatis basi lanatis, spica cylindrica, scapo tereti. Smith. *Fl. Brit.* 1. p. 184.

*Coronopus maritimus* major. Bauh. *Pin.* p. 190.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 243. Sow. *Engl. Bot. tab.* 175.

*Germ. Meerstrands Wegerich.*

*Gall. Plantain maritime.*

*Hab.* In Palatinatu trans rhenum ad salinas; ad salinas Nauenheimenses cum *Bupleuro tenuissimo* et *Poa salina* abunde post *Pollichium* vidi.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 2

*Radix* fusiformis, fibrosa. *Folia* radicalia numerosa, linearia semicylindrica, subintegra aut rarer subdentata, canaliculata, 6-9 uncias longa, duas lineas vix lata, carnosa, glabra. *Scapus* erectus, teres, subpubescens, pedalis et altior. *Spica* erecta, cylindrica, 3-4 uncias longa, gracilis. *Bracteæ* ovatæ, obtusæ, margine membranaceæ.

**Nota.** Individua speciosissima, bi-tripedalia, basi lanata, in lacubus salsis Aragoniae et in maritimis vidi.

239. \*\* *PLANTAGO alpina* foliis linearibus planis, scapo tereti hirsuto, spica oblonga, erecta. *Willd. Sp. pl. 1. p. 645.* — *Linn. Sp. pl. 1. p. 165.*

P. foliis linearibus planis, spica cylindrica. *Hall hist. n. 657.*

P. alpina angustifolia. *Scheuchz. It. VII. p. 517.*

*Icon. Jacqu. Hort. vind. tab. 125.*

*Germ. Alpen-Wegerich. Nadelgras (alpicolis.)*

*Gall. Plantain des alpes.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen*, prope *dem Weisbad*, *dem Gamor*, *Kasten* in pascuis abunde, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 4

*Radix* multiceps, crassa, longa, ramosa. *Scapi* erecti, 2-3-7 unciales, teretes, hirsuti. *Folia* radicalia in orbem congesta, linearia, semilineam ad 3-4 lineas lata, glabriuscula, integra, 2-3-5 uncias longa, pallide quandoque læte viridia, ad terram expansa, sæpius subflexuoso-serpentina, quandoque erecta. *Spica* terminalis, florens oblonga, brevis, fructificata demum cylindrica, longa.

*Nadelgras* dicta alpicolis, qui plurimi ea pascua faciunt, in quibus abundat. *Hall. l. c.*



239. \*\*\* *PLANTAGO arenaria* piloso - cana, caule erecto ramoso herbaceo, foliis subintegerrimis, capitulis foliatis, bracteis foliolisque calycinis ovatis. *Waldst. et Kitaibl. pl. rar. Hung. 1. p. 51.*

*Icon. Waldst. et Kitaibl. l. c. tab. 51. Buliard herb. tab. 565. (sub P. Psyllio.)*

*Germ. Sandwegerich.*

*Gall. Plantain des Sables.*

*Hab. Circa Carlsruhe retro Beiertheim versus dem Pulverthurm in agris sterilibus sabulosis apricis frequens, nec non in Palatinatu prope Schwetzingen, inter Speier et Mannheim, prope Grosgerau et alibi vidi 1813.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Septembri maturat. ☉*

*Radix* fusiformis, subfibrosa. *Caules* ex radice copiosi, erectiusculi, expansique, ramosi, 4 - 5 uncias longi, piloso - canescentes, herbacei. *Folia* linearia, angusta, integriuscula, canescentepilosa. *Florum capitula* numerosa, ovata, erecta subfoliata, *bracteis* foliolisque calycinis ovatis, membranaceis, piloso - canescentibus, subviscidis, sabulo sæpe conspurcatis.

pag. 362. *CENTUNCULUS minimus.*

*Hab. porro circa Wertheim ad ripas Moeni prope Urphar cum D. Wibelio vidi.*

*Specimina Werthemienſia, 3 - 4 uncialia.*

pag. 564. post *SANGUISORBAM officinalem*.

## LXII.\* EPIMEDIUM.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 193.*

*Calyx* tetraphyllus: *foliolis* ovatis, obtusis, concavis, patentibus, parvis, caducis. *Corolla*: *Petala* quatuor, ovata, obtusa, concava, patentia. *Nectaria* quatuor, cyathiformia, fundo obtuso, magnitudine petalorum, petalis incumbentia, margine oris affixa receptaculo. *Germen* oblongum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* simplex. *Siliqua* oblonga, acuminata, unilocularis, bivalvis. *Semina* plurima, oblonga.

241.\* *EPIMEDIUM alpinum. Linn. Sp. pl. 1. p. 171. — Allion. fl. Ped. p. 238. Smith. Fl. Brit. 1. p. 187.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 458. Schkuhr. Bot. Handb. tab. 24.*

*Germ. Alpensocken - Blume.*

*Gall. Epimède des alpes.*

*Hab.* In parte sylvatica umbrosa horti aulici Durlacensis frequens, quo forte ex horto olim emigravit. In muris circa Basileam in *St. Albansloch t. Lachenatio*, sine dubio ex hortis. In Alsatiæ Vogesis ubi sine dubio per *Dr. Lindern* et post eum per *Cl. Hermannum* indigena facta.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri matuta. 24

*Radix* longe lateque repens. *Folia radicalia* longe petiolata, ternato-supradecomposita, florifera. *Foliola* opposita, petiolata, oblique cordata, acuta, serrata, glabra, læte viridia, subtus glauca. *Panicula* ex medio circiter petioli communis orta, erecta, ramosa. *Pedunculi* alterni, viscido-pilosuli, rubentes. *Flores* nuntantes. *Calyx* virens, caducus. *Petala* atrorubra. *Nectaria* hyalina, flavida. *Antheræ* filamentis longitudinaliter adnatæ.

*Nota.* Ad perpulchras omnino plantas pertinet.

pag. 373. post *ALCHEMILLAM vulgarem*.

246.\* *ALCHEMILLA alpina* foliis digitatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 179.

*A. alpina* foliis digitatis serratis subtus sericeis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 190.

*Alchemilla* foliis sericeis digitatis apice dentatis. *Hall. hist. n.* 1567.

*Icon.* *Oeder Fl. Dan.* tab. 49. *Sow. Engl. Bot.* tab. 244.

*Germ.* *Alpen Sinau. Alpen - Frauenmantel.*

*Gall.* *Pied de Lion des alpes.*

*Hab.* In ditionis Basileensis monte *Wasserfall. t. Cl. Hagenbachio*, in vicina Principatus superioris subalpina alpinaque helvetia, prope *Weisbad am Wildkirchlein*, *Gamor et Kasten* vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto mat-  
tura. 4

*Folia* digitata, quina, septena. *Foliola*  
lanceolato - cuneata, apice serrata, subtus sericeo - argentea.

# T E T R A N D R I A

## T E T R A G Y N I A.

pag. 579. POTAMOGETON *natans*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1822.

**Nota.** Secundum loca natalia, stagna, rivulos se-  
gniores et rapidiores quammaxime quoad lon-  
gitudinem caulium foliorumque nec non eo-  
rum formam plus minusque ovali - subrotun-  
dam, ovatam, ovato - lanceolatam, ellipticam,  
elongatamque, basi plus minusque excisam  
ludit. Folia superiora omnia coriacea, longe  
petiolata, laete et obscure viridia, plus minus-  
que interdum colorata, fuscescentia, rufescen-  
tia, ex rufo - purpurascentia. Folia inferiora  
praesertim infima tenuiora, interdum plus mi-  
nusve, saepe vix aut non pellucida. Semina  
compressa, subrotunda, margine obtusa aut  
obtusiuscula.

Ad principales varietates pertinet :

- α. *P. natans vulgare* foliis omnibus coria-  
ceis, infimis submersis lanceolatis; natan-  
tibus ovatis, ovalibus aut oblongo - ova-  
libus subcordatis. *Roehling Deutschl.*  
*Fl. v. Mertens et Koch.* 1. p. 837. *Koch.*  
*et Ziz. Cat. Pl. Palat.*
- β. *P. natans oblongum* foliis omnibus cori-  
aceis longe petiolatis ovali - oblongis, caule  
brevissimo.



*P. oblongum* (Vivian.) *Fragm. Fl. Ital.* p. 2.  
*Decand. Fl. Franc. Suppl.* p. 310. (omnino.)

*P. Plantago.* *Bast. Essai* p. 64.

*Icon.* *Vivian. l. c. tab.* 13.

*Hab.* Prope *Hagenau* Alsatiæ in lacu ubi cum amicissimo *Hermann* jam *An.* 1780 legi, prope *Bruyeres t. D. Mougeot.*

*Flor.* Junio, Julio, *Semina* Augusto maturatione. 24.

*Caulis* simplex, digitalis, vix altior. *Folia* omnia coriacea, longe petiolata, natantia, ovali-oblonga, plana, nervosa, læte viridia, subtus fusco-rubella, 13-14 lineas longa, 8-11 lineas lata. *Pedunculus* erectus aut subcurvatus, æqualis. *Spica* cylindrica, semiunciam ad septem lineas longa.

*Nota.* Memorabilis omnino varietas *P. natantis*, vix pro peculiari specie habenda. Descripsi ad individuum prope *Hagenau* a me lectum.

γ. *P. natans explanatum* foliis omnibus coriaceis, submersis tenuioribus non pellucidis, infimis lanceolatis, supremis explanatis ovalibus seu oblongo-ovalibus basi planis, non obtuse plicatis nec excisis. *Mertens et Koch. l. c. 1. p.* 837.

*P. natans* α. *major.* *Koch. et Ziz. Cat. Pl. Palat.*

δ. *P. natans angustatum* foliis submersis prælongis anguste lanceolatis pellucidis; natantibus coriaceis late lanceolatis, sum-

mis ovalibus basi planis non excisis. *Mert. et Koch. l. c. p. 838.*

*P. fluitans. Roth. Fl. Germ. 2. p. 202.*

ε. *P. natans intermedium* foliis submersis infimis anguste lanceolatis pellucidis, sequentibus late lanceolatis; natantibus infimis ovalibus magnis basi planis non incisicis, supremis dimidio minoribus basi obtuse plicatis subcordatis. *Mertens et Koch. l. c. p. 839.*

*P. natans var. c. media. Koch. et Ziz. Cat. Pl. Palat.*

ξ. *P. natans minor* foliis submersis infimis anguste lanceolatis subpellucidis; natantibus ovalibus seu ovatis, supremis subæqualibus basi integris seu subcordatis. *Mertens et Koch. l. c. Koch et Ziz. Cat. pl. Palat.*

*P. parnassifolius. Schrad. ined.*

250. \* *POTAMOGETON spatulatum*  
foliis submersis membranaceis pellucidis lanceolato-cuneiformibus, infimis subsessilibus, sequentibus sensim longius petiolatis; natantibus coriaceis, oblongo-ovalibus, obtusis, petiolo brevioribus, pedunculis æqualibus, fructibus lentiformi-compressis, margine carinatis, caule simplici. *Mertens et Koch. l. c. p. 840. Koch et Ziz. Cat. pl. Palat.*

*Germ. Spatelförmiges Samkraut.*

*Gall. Epi d'eau spatulée.*

*Hab.* In Palatinatu prope *Kaiserslautern t. D. Kochio.* Prope *Zweybrücken t. Cl. Bruchio.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2  
Folia natantia dilute viridia.

*Nota.* Specimina desiccata possideo. Maxime omnino affinis *P. natanti*, a quo differre videtur foliis infimis submersis subsessilibus anguste lanceolato - cuneiformibus. Fructibus margine carinatis.

Forsan planta hybrida ex patre *P. natantis* et matre *P. rufescentis*.

250. \*\* *POTAMOGETON rufescens*  
(*Schrad.*) foliis submersis sessilibus pel-  
lucidis membranaceis lanceolatis utrinque  
acutis; natantibus coriaceis obovatis ob-  
tusis petiolatis, pedunculis æqualibus,  
fructibus compressis margine carinatis,  
caule simplici. *Mertens et Koch l. c.*  
*p. 841.*

*P. semipellucidum.* *Koch et Ziz. Cat. pl. Palat.*

*P. obscurum.* *Decand. Fl. Franc. Suppl.*

*p. coloratum.* *Hornem. in Flor. Dan.*

*P. fluitans.* *Smith. Fl. Brit. 3. add.*

*Icon.* *Flor. Dan. tab. 1449. (bona.) Sow.*  
*Engl. Bot. tab. 1286.*

*Germ.* Röhliches Samkraut.

*Gall.* Fpi d'eau rufescente.

*Hab.* In lacubus, palustribus stagnis et rivu-

lis cis et trans rhenum passim, in fossis aquaticis circa *Sanddorf* prope *Mannheim*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 24

*Nota.* Maxime omnino affinis *P. heterophyllo* (*Schreberi*) quod variat foliis superioribus natantibus, ellipticis, obovatis obtusis, et lanceolatis viridibus, rufescentibus et subpurpurascentibus.

Differt ab eo, Pedunculis non incrassatis sed aequalibus, Caule subsimplici, fructibus margine carinatis.

250. \*\*\* *POTAMOGETON plantagineum* foliis omnibus petiolatis membranaceis pellucidis, margine glabris, infimis submersis lanceolatis; natantibus subcordato-ovatis, petiolis foliis duplo brevioribus, pedunculis aequalibus, fructibus compressis margine obtusis, caule ramoso. *Mertens et Koch l. c. p. 842.*

*P. plantagineus Du-Croz* foliis superioribus natantibus ovatis subquinquenerviis; inferioribus oblongis omnibus membranaceis, petiolis immersis aphyllis. *Roem. et Schult. Linn. Syst. veg. 3. p. 504.*

*Germ. Wegerichblättriges Samkraut.*

*Gall. Épi d'eau à sévilles de Plantain.*

*Hab.* Prope *Waghäusel* in fossa aquatica ad viam publicam t. *D. Griesselich*, prope *Mainz* retro *Mombach* in paludibus t. *D. Ziz.*



*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri matura. 24

Medium tenet inter *P. natans* et *lucens*. Differt a *P. natante*: *Foliis* omnibus membranaceis pellucidis. *Petiolo* folio duplo previo, a *P. lucenti* magis affini: *Foliis* longius petiolatis, margine glabris, superioribus omnibus subcordatis. *Pedunculis* gracilioribus superne non incrassatis. *Spicis* tenuioribus.

**Nota.** Forsan planta hybrida ex patre *P. lucentis* et matre *P. natantis*.

pag. 380. POTAMOGETON *perfoliatum*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 168.

pag. 381. POTAMOGETON *densum*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 397. *Flor. Dan.* tab. 1264. (*bona.*)

pag. 382. POTAMOGETON *lucens*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 376.

β. *Foliis* longioribus angustioribus lanceolatis.

*Icon.* *Flor. Dan.* tab. 1655. (*bona.*)

*Hab.* In rivulis cis et trans rhenum.

**Nota.** Planta maxime variabilis. *Caules* plus minusve elongati, saepe flexuosi. *Folia* ovalia, ovali-lanceolata, lanceolata, utrinque acuta, longiora et breviora, in rivulis rapidioribus non raro praelonga, acuminata. Hic sine dubio pertinet *P. praelongum* Wulf. in Roemer Arch. 3. p. 331. *Flor. Dan.* tab. 1687.

pag.

pag. 383. *POTAMOGETON heterophyllum*.

*P. heterophyllum* foliis submersis membranaceis pellucidis sessilibus lanceolatis acuminatis versus basin attenuatis; natantibus petiolatis ovatis aut ovatis acuminatis, pedunculis superne incrassatis, fructibus compressis margine obtusis, caule ramossissimo. *Mertens et Koch. l. c. p. 843.*

*P. heterophyllum* foliis submersis membranaceis lineari-lanceolatis sessilibus; natantibus coriaceis ellipticis petiolatis, pedunculis incrassatis. *Smith. Fl. Brit. p. 1590.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1285. Flor. Dan. tab. 1265. (bona.)*

β. *P. heterophyllum latifolium. Mert. et Koch l. c. p. 815.*

*Hab. β. in fossis aquaticis prope Mannheim. t. Petiv, prope Mainz retro Mombach t. Cl. Ziz.*

*Variat. Foliis angustioribus et latioribus.*

pag. 384. *POTAMOGETON crispum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1012.*

pag. 385. *POTAMOGETON serratum Linn.*

**Nota.** Linnaeus, Rothius alique, sine dubio nobiscum sub *P. serrato* varietatem majorem *P. rufescentis* comprehendebant. Planta affinis *P. crispum* Linn. a quo differt: Caulibus praelongis teretibus subsimplicibus. Foliis inferioribus triplo longioribus latioribus, exacte lanceolatis, superioribus etiam majoribus, subcoriaceis, subun-

dulatis, (non serratis.) Spicis multo majoribus, densioribus, multifloris. Pedunculis duplo longioribus et crassioribus. Conf. Roth. Fl. Germ. 2. p. 265 Ill. Schreberus in excursioribus botanicis, pro P. serrato Linn. declaravit. Cl. Mertens et Kochius l. c. p. 641. Rothii (seu Linnaei) plantam, ad P. rufescens citant.

pag. 386. POTAMAGETON *compressum*.  
Linn.

P. *compressum* foliis linearibus obtusis basi biglandulosis, spica pauciflora, caule compresso. Willd. in Berol. Mag. Ann. 1809. p. 297.

P. *compressum* foliis linearibus obtusis, caule compresso. Smith. Fl. Brit. 1. p. 195. (omnino.)

P. *obtusifolium*. Mertens et Koch. l. c. p. 855. et P. *compressum* ib. p. 856. (omnino.)

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 418. (sub P. *compresso*) et tab. 2253 (sub P. *gramineo*.)

Hab. Prope Durlach in fossis aquaticis et rivulis lente fluentibus et passim alibi abunde. In Palatinatu t. D. Kochio.

Folia linearia obtusa, apice aristato-mucronulata. Spica parva, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 flora, plus minusve, sæpe non interrupta.

Nota. Est omnino verum P. *compressum* Linnaei, quod amicissimus Schreberus in excursioribus nobiscum institutis, pro P. *compresso* semper declarabat. Individua anglica, nullo modo a nostratibus diversa.

sunt. *P. gramineum* Sow. l. c. ad quod Cl. vir *P. gramineum* Smith. Fl. Brit. citat, non differt a *P. compresso* ut facile patet.

pag. 387. post *P. compressum*.

257.\* *POTAMOGETON complanatum*  
foliis linearibus acutiusculis basi eglandulosis, spica multiflora, caule compresso.  
*Willd. Berol. Mag. Ann. 1809. p. 297.*

*P. zosteraefolium* (*Schumacher*) caule compresso foliis linearibus acutis basi eglandulosis (spica multiflora) *Chamisso Adnot. ad Kunth. Fl. Berol. p. 7.*

β. *P. acutifolium.* (*Link*) foliis lanceolato-linearibus planis integerrimis in mucronem attenuntis eglandulosis, spicis laxiusculis.  
*Roem. et Schult. Linn. Syst. veg. III. p. 513.*

*P. acutifolium. Mertens et Koch. l. c. p. 854.*

*P. cuspidatum. Schrad. ined.*

*Icon. β. Flor. Dan. tab. 1747. (bona.)*

*Germ. Zusammgedrucktes spitzblättriges Samkraut.*

*Gall. Epi d'eau comprimé à févilles cuspidées.*

*Hab. β. In rivulis segnioribus prope Durlach et passim alibi cum P. compresso, nec non in Palatinatu trans rhenum t. Ziz, in Wetteravia t. meritissimo Steinio pharmacopæo.*

*Flor. Julio, Augusto. Semina Septembri maturata. 2*



$\alpha$ , et  $\beta$ . In omnibus partibus maxime affinis *P. compresso*, a quo mere differre videntur: *Foliis* longioribus 3-4 uncialibus non obtusis sed acutiusculis basi subglandulosis. In *var.*  $\alpha$ . *Spica* 10-12 flora, in  $\beta$ . *Spica* 4-5-7 flora.

Sine dubio merae varietates *P. compressi* Linn. Sic mihi saltem videtur.

**Nota.** Varietatem  $\beta$ . cum Cl. Schrebero, circa Erlangam Ann. 1783 legi, qui eam pro varietate levidensi, *P. compressi* Linn. habuit.

pag. 387. *POTAMOGETON gramineum*.

Deleatur. Nostra sub *P. gramineo* descripta planta, ad varietatem tenuiorem *P. heterophylli* pertinet.

**Nota.** *Potamogeton gramineum* Smith. Fl. Brit. 1. p. 196. Sow. Engl. Bot. tab. 2253. nullo modo diversum est a *P. compresso* Linnaei. Conf. Sow. Engl. Bot. tab. 418.

pag. 388. *POTAMOGETON marinum*. Linn.

*P. pectinatum*  $\beta$ . foliis setaceis parallelis approximatis distichis basi vaginantibus. Smith. Fl. Brit. 1. p. 197.

*Peucedanum aquaticum* IV. *Tabernaemont.* p. 187. *Icon*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 323. (sub *P. pectinato*.) Flor. Dan. tab. 1746. sub *P. pectinati* varietate.

**Nota.** Planta a nobis, Hallero, Pollichio Rothio et Hoffmanno allegata et descripta, omnino est eadem cum Linnaeana, sub *P. marino* determinata.

pag. 389. *POTAMOGETON pusillum*.

*P. pusillum* foliis linearibus oppositis alternisque stipula angustioribus basi patentibus, caule tereti, pedunculis axillaribus. *Smith. Fl. Brit. p. 197.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 1451. (bona.) Sow. Engl. Bot. tab. 215.*

*Stipulae* amplexicaules, foliis latiores. *Pedunculi* axillares, solitarii, spica longiores.

pag. 394. *TILLEA aquatica. Linn.*

Bulliarda *Vaillantii* caule erecto dichotomo, foliis oblongis acutis flore pedunculato previoribus. *Decand. pl. grass. tab. 74. Fl. Franc. n. 3602.*

**Nota.** Plantula a Zeyhero l. c. lecta, frustra a me aliisque ex hoc tempore, ibi quaesita est.

---

CLASSIS V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

pag. 396, post LITHOSPERMUM.

LXXIV.\* ONOSMA. *Cor.* fauce nuda, ventricosa. *Sem.* quatuor.

post LYCOPSIN.

LXXXI.\* ASPERUGO. *Cor.* fauce fornicata infundibuliformis, *Fructus* compressus.

pag. 397, post LYSIMACHIAM.

LXXXVIII.\* SOLDANELLA. *Caps.* monocularis, *Cor.* lacera. *Stigma* simplex.

pag. 398, post POLEMONIUM.

XCI.\* AZALEA. *Caps.* 5-locularis. *Cor.* campanulata. *Stigma* obtusum.

pag. 400, ante GLAUX.

CIX.\* ILLECEBRUM. *Caps.* monosperma super. *Cal.* quinquephyllus cartilagineus.

DIGYNIA.

pag. 401, post WILLEMETAM.

CXVI.\* SALSOLA. *Semen* uncium cochleatum, tectum. *Cal.* quinquephyllus.

pag. 402. post CAUCALIDEM.

CXXVI. \* TORDYLIUM. *Flor.* radiati fertiles. *Involucr.* simplex. *Sem.* orbiculata, compresso-plana, setuloso-muricata, margine incrassata, crenulata.

### TRIGYNIA.

pag. 405. ante STAPHYLEAM.

CLV. \* RHUS. *Cor.* 5-petala. *Bacca* monosperma.

### PENTAGYNIA.

pag. 406. post DROSERAM.

CLXII. \* SIBBALDIA. *Cor.* quinquepetala. *Cal.* decemfidus. *Semina* quinque nuda.

### PENTANDRIA MONOGYNIA.

pag. 409. MYOSOTIS *palustris* foliis obovato-lanceolatis obtusis scabriusculis racemis cbracteatis, pedicellis in fructu divergentibus, calyce quinquedentato obtuso patente fere duplo longioribus, limbo explanato tubo longiore. *Lehm. Asperif. p.* 88.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1975.

*Variat:* Caulibus basi decumbentibus repentibus radican- tibus.

*M. repens.* *Donn. Cat. pl. hort. Cantabr. suppl. Icon. Sturm l. c. Hest.* 42.

Caulibus tenuioribus strictioribus, pilis cauli adpressis.



*M. strigulosa.* Rehb. *Amoen.* 1. *Icon. Sturm. l. c.*

Pedicellis fructiferis laxè dispositis plus minusve elongatis :

*M. laxiflora.* Reichenb. *Icon Sturm. l. c.*

Varietas prior, in aquosis, succulentis inundatisque, hinc inde. Varietas *strigulosa*, in pratis magis elevatis humidiusculis. *Var. ultima* in fossis fossulisque aquaticis, nec non in udis. Planta pro solo humido, aquoso umbroso et aprico, maxime variabilis. Flores in uno eodem sæpe individuo majores et minores. Ex hac sola specie in regionibus rhenanis ultra triginta varietates conspicuæ, ex quibus facile, more nonnulorum botanicorum tot species creantur. Quid est species? — — —

267.\* *MYOSOTIS sylvatica* foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis molliter hirsutis, racemis longissimis laxis ebracteatis, pedicellis in fructu divergenti patentibus, calyce quinquesido clauso paulo longioribus, limbo explanato tubo longiore, *Lehm. Asperifol.* 1. p. 85.

*M. sylvatica* calicibus patulis quinquepartitis, laciniis inæqualibus acutis, pilis longis hirsutis, *Ehrh. herb. Roem. et Schult. l. c.* 4. p. 102.

*M. rupicola.* Sow. *Engl. bot. tab.* 2559.

*M. perennis*  $\beta$ . *Decand. Fl. Franc. n.* 2725.

*Scorpiurus* radice longa fibrata perenni.  $\beta$ . *Hall. helv. n.* 591.

*Icon. Fl. Dan. tab. 583. l. a sinistra.*  
*Sturm. Deutschl. Fl. H. 42. Ray. Syn.*  
*3. s. 2. tab. 9.*

*Germ. Wald-Vergifsmeynicht.*

*Gall. Scorpionne des forets.*

*Hab.* In sylvaticis colliculosis, montosis, ad  
 sylvarum marginalin passim frequens, nec  
 non in rupibus.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

Differt a *M. palustri*: *Caulibus* crassiori-  
 bus, *Foliisque* semper piloso-hirsutis. *Corol-*  
*lis* majusculis. *Calycibus* pilis copiosis patulis  
 instructis.

Medium tenet inter *M. palustrem* et *arven-*  
*sem*. In horto culta, constans.

pag. 410. *MYOSOTIS arvensis* foliis oblon-  
 go-lanceolatis acutis hirsutis, racemis  
 ebracteatis, pedicellis in fructu patentibus  
 calyce quinquefido erecto clauso duplo  
 longioribus, limbo erecto-patente longi-  
 tudine fere tubi. *Lehm. Asperif. 1. p. 90.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2558.*

Pro diverso solo natali arvensi et campestri,  
 aprico, secco, sabuloso, calcareo et argillaceo,  
 quammaxime polymorpha est *Caules* solitarii  
 simpliciusculi, mox multi, ramosuli, ex eadem  
 radice, erectiusculi, patentiusculi, quandoque  
 strictissimi. Huc pertinet:

*M. intermedia. Link Enum. hort. Berol.*  
*Icon. Sturm. l. c.*

Maxima, pedalis et altior. Medium quasi te-  
 net, inter *M. sylvaticam* et *arvensem*.

*Hab.* In pratis et agris cultis.

*M. stricta.* Link. l. c. Icon. Sturm. l. c.

Caulibus strictis pedunculis calyce brevioribus.

*M. collina* Wallr. sched. 75.

*Hab.* In agris pascuisque apricis sabulosis.

*M. basiantha.* Reichenb. Icon. Sturm. l. c.

Caule simplici, stricto, floribus a basi ad apicem caulis provenientibus subsessilibus.

*Hab.* In agris sabulosis sterilibus.

*M. multicaulis.* Reichenb. in Sturm.

*M. ramosissima.* Roem. et Schult. Linn.

*Sp. pl. IV. p. 704.* Icon. Sturm. l. c.

Caulibus numerosis tenuibus.

*Hab.* In agris sabulosis pascuisque.

pag. 411. post *MYOSOTIN arvensem.*

268.\* *MYOSOTIS nana* foliis oblongo-lanceolatis villosis, racemis paucifloris inferne foliosis, nucibus margine crenulato-denticulatis. *Lehm. Asperifol. 1. p. 103.*

*M. nana* seminibus læviusculis, margine serrulatis, caule simplici paucifloro, foliis oblongis villosis. *Willd. Sp. pl. 1. p. 747.*

*M. nana* foliis lanceolatis tomentosis, seminum marginibus serrulatis invicem junctis. *Vill. Delph. 2. 4. p. 459.*

*M. terglovensis.* Hacqu. pl. alp. Carn. p. 12.  
Scorpiurus foliis ovatis, spica pauciflora, calycibus tomentosis. *Hall. helv. n. 592.*

*Icon.* Sturm *Deutschl. Fl. Hest.* 42. Vill.  
l. c. tab. 13. Hacqu. l. c. tab. 2. fig. 6.

*Germ.* Niederes Alpen - Mausohr. Alpen-  
Vergiftmeinnicht.

*Gall.* Scorpionne nain.

*Hab.* In vicina principatus superioris helve-  
tia apud Abbatiscellenses retro dem *Weis-  
bad am Gamor, Sentis et Kasten* in ru-  
pibus, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matu-  
ra. 4

Plantula pulchella. *Cauliculi* ex radice plu-  
res, 1 - 2 - 3 unciales, erecti, simplices, setuloso-  
villosi, 2 - 3 - 4 flori, foliosi. *Folia* radicalia in  
rosulam digesta, obovali-lanceolata, *caulina* al-  
terna, lanceolata, pallide viridia, pilis prælon-  
gis mollibus incanis obsessa. *Flores* terminales,  
spicato-racemosi. *Corollæ* ratione plantulæ sat  
magnæ, cœruleæ, rarius albidæ, suaveolentes.

pag. 416. LITHOSPERMUM *purpureo-coe-  
ruleum.*

β. Corollis albis subminoribus, limbo - ere-  
cto - patenti.

*Hab.* Prope *Wertheim* in collibus virgulto-  
sis calcareis inter *Böttigheim et Neubrunn*,  
coacervatim unico in loco. *Benevole* mihi  
misit oculatissimus *Mertinus Ann.* 1821.

pag. 419. post *ANCHUSAM angustifoliam.*

274.\* *ANCHUSA italica* foliis lucidis  
strigosis, racemis bipartitis diphyllis, flo-  
ribus subæqualibus fauce barbatis. *Retz.*



*Obs.* 1. p. 12. — *Willd. Sp. pl.* 1. p. 756.  
*Suter. Fl. Helv.* 1. p. 104.

*A. italica* foliis lanceolatis undulatis, summis acuminatis, squamulis faucis corollæ penicilliformibus. *Trew. Dec.* 2. p. 14.

*A. paniculata* caule erecto ramoso, foliis lanceolatis undulatis strigosis lucidis, racemis conjugatis divaricatis paniculatis bracteatis, calycibus tubo corollæ subæqualis longioribus, laciniis subulatis, fornicibus penicilliformibus. *Lehm. Asperif.* 1. p. 250.

*Icon.* *Trew. l. c. tab.* 13. (*optima.*)

*Germ.* *Italienische Ochsenzunge.*

*Gall.* *Buglose d'Italie.*

*Hab.* In Brisgovia ad montem *Kaiserstuhl* inter *Rothweil et Büchsenberg*, ubi legit *Krieg Stud. Med. Ann.* 1821.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturantur. ♂

Planta speciosa. *Caules, Rami, Folia, Bracteæ, Calyces* quammaxime strigosæ, strigis albidis. *Corollæ* majusculæ, cœruleo-violaceæ, squamulis faucis, pulcherrime penicilliformibus.

Individua nostratia simillima lectis a me in Gallia meridionali et in Hispania cultisque in horto Carlsruhensi ex seminibus.

Ad rariores et novas Floræ germaniæ cives pertinet.

pag. 421. *CYNOGLOSSUM sylvaticum.*

*Icon.* *Sowerby Engl. Bot. tab.* 1642.

276. \* **CYNOGLOSSUM** *Omphalodes*  
repens, foliis radicalibus cordatis. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 195. *Hoffm. Fl. Germ.* 63.

C. *Omphalodes* foliis radicalibus ovato-cordatis, caulinis ovatis petiolatis. *Willd.*  
*Linn. Sp. pl.* 1. p. 766.

C. fructu glabro foliis petiolatis ovatis, caule repente. *Scop. Fl. Carn. ed.* 2. n. 190.

*Omphalodes verna.* *Lehm. Asperif.* 1. p. 185.

*Picotia verna.* *Roemer et Schult. Linn. Sp. pl.* 4. p. 85.

*Borago minor verna repens*, folio lævi. *Morris. hist.* 3. p. 437. S. 11. tab. 26. fig. 3.

*Symphytum minus boraginis facie.* *Bauh. pin.* 209.

*Icon.* *Sturm Fl. Deutschl. Fasc.* 21. *Bull. herb. tab.* 309. *Scopol. l. c. tab.* 3.

*Germ.* *Frühlings - Hundszunge. Hundszunge mit Vergifsmeinnicht - Blüthen. Portugiesisches Vergifsmeinnicht.*

*Gall.* *Cynoglosse printanniere.*

*Hab.* In Lusitaniæ Carniolæ et Transylvaniæ nemorosis. Colitur in hortis rusticorum et aliorum.

*Flor.* Primo vere. *Semina* Julio, Augusto matura. 24

Planta nostratibus notissima, pulchella. *Flores* racemosi, amœni, cœrulei, cœruleo - rubelli et albid.

276. \*\* *CYNOGLOSSUM scorpioides*

caule prostrato, foliis lanceolatis, scabris, pedunculis axillaribus unifloris, seminibus umbilicatis glabris. *Hænke in Jacq. Collect. 11. p. 1. Willd. Sp. pl. 1. p. 766.*

*C. scorpioides* caule prostrato dichotomo subtetragono, foliis inferioribus oppositis reliquis alternis, pedunculis axillaribus unifloris, fructiferis deflexis, seminibus umbilicatis glabris. *Schmidt. Bohem. 1. n. 220.*

*Omphalodes scorpioides* caule prostrato dichotomo, foliis scabris, radicalibus spatulatis, caulinis lanceolatis sessilibus inferioribus oppositis reliquis alternis, pedicellis axillaribus. *Lehm. Asperifol. 1. p. 189. et in neue Schrift. d. Gesell. naturforsch. Freunde zu Berlin 7. Band. p. 100.*

*Icon. Lehm. l. c. tab. 8. Sturm. Fl. Deutschl. Fasc. 21.*

*Germ. Vergiftmeinnichtartige Hundszunge.*

*Gall. Langue de chien Scorpionne.*

*Hab. Inter Wertheim et Würzburg in nemorosis subhumidis umbrosis t. optimo Wilbelio.*

*Flor. Martio, Aprili. Semina Junio maturat. ☉ ♂*

*Radix* parvula fibrosa. *Caules* digitales, palmares et longiores, prostrati, subtetragoni, subdichotomi, glabriusculi, læte viridescentes. *Folia* inferiora opposita, in petiolum decurrentia, obovata, superiora alterna, sessilia, lanceolata, omnia scabra, læte viridia. *Flores* ex axil-

lis foliorum superiorum solitarii. *Calyx* quinquepartitus, strigosus: laciniis lanceolatis acutis, demum ovatis et elongatis. *Corolla* infundibuliformi-rotata, pallide cœrulea, parva. *Tubo* brevissimo cylindrico, albido. *Famis* squamulis quinque flavescentibus. *Limbi* laciniis quinque, ovatis, obtusis, integerrimis. *Semina* quatuor, subrotunda, umbilicato-urceolata, glaberrima, fusca.

Planta pulchella, eminus visa, *Myosoti* palustri aemula, caeterum ab ea quammaxime diversa. Ad raras omnino *Florae Germaniae* cives pertinet.

pag. 424. *PULMONARIA angustifolia*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1628.

pag. 428.

279\* *SYMPHYTUM tuberosum* radice tuberosa dentata, foliis summis oppositis, corollis obtuse denticulatis, erectis, radiis faucis et stylo inclusis. *mihi*.

*S. tuberosum* foliis summis oppositis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 195.

*S. tuberosum* foliis ovatis semidecurrentibus, summis oppositis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 219.

*S. majus* tuberosa radice. *Bauh. pin.* 259. *Camerar. Epit.* p. 701. *Icon. Clus. hist.* p. 166. *Icon. Tabernamont.* p. 950. *Icon.*

*Icon. Jacqu. Obs.* 3. tab. 63. *Flor. Austr. tab.* 125. Sow. *Engl. Bot. tab.* 1502.

*Germ.* Knolliger Beinheil.

*Gall.* Consoude tuberoese.



*Hab.* In Gallia australi, Austria. Colitur passim in hortis.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* dentato-tuberosa, extus albida. *Caulis* sesquipedalis et altior, erectus. *Folia* alterna, subsemidecurrentia, summa opposita. *Flores* corymboso-racemosi, erecti. *Corollæ* pallide luteæ, obtusæ. *Faucis* radii quinque inclusi. *Stylus* inclusus.

279. \*\* SYMPHYTUM *Clusii* radice tuberosa, foliis summis oppositis, corollis acute denticulatis pendulis, radiis faucis et stylo longe exsertis. *mihi.*

Symphitum tuberosum minus. *Clus. hist. plant. p. 166. Icon.*

*Germ.* *Clusischer Beinheil.*

*Gall.* *Consoude de Mr. Clusius.*

*Hab.* Circa *Heidelberg* in vineis non infrequens.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* tuberosa, subrotunda, extus nigra. *Caulis* sesquipedalis, erectus. *Folia* alterna, subsemidecurrentia, summa opposita. *Flores* corymboso-racemosi, penduli. *Corollæ* pallide luteæ, acutæ. *Faucis* radii quinque, erecti, longe exserti. *Stylus* longe exsertus.

Species omnino distincta a *S. tuberoso*: *Radice* tuberosa subrotunda, extus nigra, non tuberoso-dentata alba. *Floribus* minoribus, pendulis.

dulis. *Corollis* magis pallide lutescentibus, non obiter obtuse denticulatis, sed profundius acute denticulatis. *Faucis* radiis non inclusis, sed longe semper exsertis. *Stylo* non incluso, seu subincluso, sed semper longe exserto.

**Nota.** Clusii Icon optime nostram plantam repræsentat, pictor ex incuria, radicem minus tenuem dedit et tubera omisit, monente ipso Clusio l. c.

Plantam pro Flora germanica omnino novam, nuper per Alexandr. Braunium mihi benevole Schimper stud. theologiae, sub Symphyto bulboso misit. Radicem habet tuberosam, non bulbosam.

**Nota.** Planta in horto culta, constantissima. Tubera rotunda extus nigra, glabra, nunquam dentata.

pag. 429. post CERINTHEM minorem.

#### LXXIV.\* O N O S M A.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 247.*

*Calyx* quinquepartitus, *laciniis* lanceolatis, erectis, persistentibus. *Corolla* monopetala, campanulata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* tubuloso-ventricosus, tubo paulo crassior: ore subquinquefido. *Faux* nuda, pervia. *Filamenta* subulata, brevissima. *Antheræ* sagittatæ, erectæ, longitudine corollæ. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum. *Semina* quatuor in calyce persistente.

280.\* *ONOSMA echiioides* foliis lanceolatis hispidis, fructibus erectis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 195.

*O. echiioides* tuberculato-hispidum: pilis erectis, caule ramosissimo, foliis lanceolatis floralibus ovato-cordatis undato-sinuatis, nucibus glabris nitidis. *Lehm. Asperif.* 2. p. 566.

*Symphytum* foliis lingulatis, hispidis. *Hall. hist. n.* 601.

*Cerinthe echiioides.* *Scop. fl. Carn.* 2. n. 197. *Linn. Sp. pl. ed.* 1. p. 137.

*Anchusa tertia.* *Camerar. Epit. p.* 756. (*Icon. optima.*)

*Anchusa lutea minor.* *Bauh. pin.* 255.

*Icon. Jacqu. fl. Austr. tab.* 295. *Schkuhr. bot. Handb. tab.* 51.

*Germ. Natterkopfartige Lotwurz.*

*Gall. Onosme echioide.*

*Hab.* In collibus apricis arenosis sterilibus prope Moguntium circa *Mombach* cum *Scorzonera purpurea* frequens, teste D. Ziz.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto maturat. 2

*Radix* ramosa. *Caulis* erectus, pedalis et altior, ramosus, teres, hispidus. *Folia* caulina alterna, sessilia, lanceolato-lingulata, integra, hispida; *ramea* basi latiora, ovato-lanceolata. *Flores* breviter pedunculati. *Pedunculi* hispidi, uniflori. *Calyx* profunde quinquepartitus, hispidissimus. *Corolla* pallide ochroleuca.

*Nota.* Planta nostra, sine dubio a quibusdam sub *O. arenaria* allegata, vix pro peculiari

specie ab *O. echioides* Linn. diversa, habenda est. Halleri et Camerarii citata planta, in helvetia a me lecta, certe a nostrate non differt, nec Jacquini planta, a nostra, diversa est.

Obs. In horto Carlsruhensi per plures annos culta, constantissima.

pag. 430. post LYCOPSIUM.

# LXXXI.\* ASPERUGO.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 249.*

*Calyx* monophyllus, quinquefidus, erectus, denticulis inæqualibus, persistens. *Corolla* monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, brevissimus. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus, parvus. *Faux* clausa: squamulis quinque, convexis, prominentibus, conniventibus. *Calyx* fructiferus compressus, maximus, lamellis plano-parallelis sinuatis. *Semina* quatuor oblonga.

282.\* *ASPERUGO procumbens* calycibus fructus compressis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 198. — *Hoffm. Fl. Germ* p. 65. *Roth. fl. Germ.* 2. p. 217. — *Hall. hist.* n. 606. *Lehm. Asperifol.* 1. p. 205.

*Buglosum* sylvestre caulibus procumbentibus. *Bauh. pin.* 257.

*Icon. Schkuhr. bot. Handb. tab.* 31. *Sow. Engl. Bot.* 10. tab. 661.

*Germ. Liegendes Scharfkraut. Blauer Kleeber.*

*Gall. Rapette couchée.*



*Hab.* In ruderatis circa *Carlsruhe* rarius. Prope *Wertheim* in ruderatis arcis. t. *D. Wibelio* nec non in Palatinatu transrhenano teste *D. Kochio*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto maturat. ☉

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caulis* procumbens, diffusus, angulosus, hispidus, palmaris, pedalis, ramosus, subdichotomus, foliosus. *Folia* alterna, petiolata, subdecurentia, oblonga, integriuscula, hispida. Flores axillares, solitarii, pedunculati. *Corollæ* parvæ, cœruleæ, interdum albidæ. *Calyx* fructiferus complanatus, acutus, palmato-dentatus, reticulatus, margine setosus.

Planta tenella, ovibus acceptum et bonum pabulum præbet.

284.\* *ANDROSACE elongata* foliis lanceolatis dentatis, umbella fructifera elongata, corollis calyce angulato brevioribus. *Linn. Syst. veg. p.* 192.

*A. elongata* ramosissima, scabriuscula, ramis patentissimis, foliis oblongis subdentatis, pedunculis propriis elongatis, calycis laciniis lanceolatis integerrimis, corollis minimis. *Spreng. pug. 2. p.* 40.

*A. elongata* foliis subdentatis, pediculis longissimis, corollis calyce brevioribus. *Jacqu. Obs. 1. p.* 51. — *Roth. Fl. Germ. 2. p.* 252. — *Hoffm. Fl. Germ. p.* 66.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 19. *Fl. Austr. tab.* 550.

*Germ.* Verlängerter Mannsharnisch.

*Gall. Androsace alonge*

*Hab.* In Palatinatu transrhenoano circa *Kaiserslautern* t. *D. Kochio*.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Julio matura. ☉

Differt ab *A. maxima*: *Scapis* numerosioribus, filiformibus. *Umbellæ* radiis pluribus, longis, post florescentiam maxime elongatis, divaricatis. *Calycibus* post florescentiam non excrecentibus, majoribus. *Involueris* acuminatis, *Corollis* minoribus.

Ad rariores Florae cives pertinet.

284.\*\* *ANDROSACE septentrionalis*  
foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 206. *Roth. fl. Germ.* 2. p. 252. *Hoffm. fl. Germ.* p. 67.

*A. septentrionalis* scabriuscula erecta, foliis dentatis, basi attenuatis, pedunculis propriis elongatis, calycis laciniis lanceolatis integerrimis, corolla calycem excedente, laciniis ovatis integris. *Spreng. pug. II.* p. 40.

*Androsace montana* flore minore. *Buxb. act.* 2. p. 369. *tab.* 23. *fig.* 2.

*Alsine verna androsaces capitulis.* *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.

*Icon.* *Mill. Dict. tab.* 30. *fig.* 2.

*Germ.* *Mitternächtlicher Mannsharnisch.*

*Gall.* *Androsace septentrionale.*

*Hab.* Copiose in agris apricis sterilibus sabu-

losis, prope *Wertheim* ad Mœnum, ubi eam legi cum amicissimo *D. Wibelio* et *D. Starkio*, *Ann.* 1813.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio maturat. ☉

*Radix* fibrosa, tenuis, albida. *Folia* radicalia in rosulam digesta, in petiolum decurrentia, lanceolata, denticulata, hispidula, unciam longa, 1-2 lineas lata. *Scapi* 1-2-5, stricti, digitales, palmares, glabriusculi, per lentem hispiduli, tenues, simplicissimi. *Flores* scapum terminantes, in umbellam simplicem digesti. *Umbella* erecta, 5-8-9-20 flora. *Radii* erecti, filiformes, striati, inæquales, semiunciam ad sesquiunciam longi. *Involucrum*, 5-9-20 phyl-  
lum, patens. *Foliola* ovata, acuta, integra, glabriuscula, 1-2-3 lineas longa, semilineam lata. *Corolla* albida, calyce brevior.

284. \*\*\* *ANDROSACE villosa* foliis obtuse lanceolatis, pilosis, calycibus ovato-campanulatis semiquinquefidis hirsutis. *Wulfen ap. Jacqu. Collect.* 1. p. 195.

A. *villosa* foliis pilosis, perianthiis hirsutis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 203.

A. foliis lanceolatis pubescentibus, corollis albis fauce roseis luteisve. *Scop. Carn.* 1. n. 202.

*Aretia* foliis ovatis villosis, scapis umbellatis. *Hall. hist. n.* 620.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 12, *fig.* 3.

*Ger m.* *Rauhhaariger Mannsharnisch.*

*Gall.* *Androsacé vêlu.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris, retro *St. Gallen*, prope *dem Weisbad*, am *Gamor et Hohenkasten* ad rupium fissuras non infrequens ubi vidi 1818. Eandem in monte *Jura* observavi.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4

*Radix* fibrosa, tenuis, fusca. *Scapi* ex radice plurimi, unciales, biunciales et sublongiores, erecti, firmi, teretes, atropurpurei, ciliati. *Folia* radicalia numerosa, in rosulam digesta, sessilia, lanceolata, obtusiuscula, plana, integra, glauco-viridia, tres lineas longa, lineam lata, villosa, apice pilifera. *Umbella* terminalis, 2-3-5 radiata, *Radii* filiformes, erecti, 2-3-5 lineas longi, villosi, uniflori. *Involucrum* 2-3-5 phyllum. *Foliolis* lanceolatis, patentibus, villosis - ciliatis, umbella brevioribus. *Calyx* ovato-campanulatus, semiquinquefidus, villosis-hirsutus. *Corolla* lactea, pulchella, versus faucem amœne rosea, interdum lutea.

*Nota.* Linnaeus comprehendebat sub *A. villosa*, nostram plantulam et *A. Chamaejasme*, ad quam synonyma *Bauhini* et *Clusii* ibi allegata pertinent, quae omnino quidem affinis, ab ea tamen distinguitur: *Calyce* turbinato, tubuloso, quinquefido. *Foliis*, *scapis*, *involucris*, magis viridibus, pubescentibus, nec villosis - ciliatis. *Corollis* minoribus. Confer *A. villosam* *Jacqu. Fl. Austr. tab. 332.* quae omnino ad *A. Chamaejasme* pertinet.

pag. 438. post *ANDROSACEM Lachenalii*.

286.\* *ANDROSACE Halleri* caespitosa, foliis linearibus margine ciliatis numero-



sissimis sesilibus, scapo multifloro, involucris umbellam subæquantibus. *mihi.*

*A. carnea* β. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 204.

*Androsace angusto nervoso folio multiflora.*  
*Hall. Stirp. helv. tab. VII.*

*Aretia foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis.* *Hall. Stirp. Helv. p. 486.*

*Aretia foliis crassis rugosis, gramineis, scapis multifloris.* *Hall. Hist. n. 619. tab. 17.*

*Icon.* Propria.

*Germ.* *Hallerscher Mannsharnisch.*

*Gall.* *Androsace de Mr. Haller.*

*Hab.* In rupibus summi jugi montis *Ballon* Alsatiae, teste *Hallero*, *Miegio*, *Schauenburgio*, *Villarsio et Nestlero* frequens.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio Augusto maturat. 4

*Radix* ramosa, fibrosa, tenuis, dura fusca. *Scapi* 2 - 3 - 4 uncias longi, erecti, firmi, canescente-hirsuti. *Folia* radicalia caespiticia, numerosissima, in rosulam expansa, sessilia, linearia, plana, crassiuscula, acutiuscula, margine setuloso-albide ciliata, unciam ad 14 lineas longa, semilineam ad lineam lata, læte viridia. *Umbella* terminalis, 2 - 3 - 5 - 9 radiata. *Radii* firmi, erecti, inæquales, 2 - 3 - 5 lineas longi, hirsuti, uniflori. *Involucrum* 2 - 3 - 5 - 9 phyl- lum. *Foliotis* linearibus, patentibus, subhirsutis, longitudine fere radiorum. *Calyx* pentagonus, ultra medium quinquefidus: *Laciniis* ova-

to-lanceolatis, erectis, subpubescentibus, læte viridibus. *Corolla* carnea aut dilute rosea.

Differt ab *A. carnea* Linn. *Foliis* non subulatis, non glabris sed linearibus planis, margine semper setuloso-ciliatis.

Individua pulcherima loco citato 1806 Villarsio lecta, misit sub *A. carnea* amicissimus Nestler.

Specimina ad montem Canigou pyrenaeorum a me lecta, nostratibus duplo fere minora.

Nota. Distinctissima omnino ab *Androsace carnea*, *A. Lachenalii*, *A. obtusifolia* et *A. Chamaejasme* species.

pag. 442. PRIMULA *farinosa*.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 6.

pag. 444. post PRIMULAM *farinosam*.

290.\* PRIMULA *pubescens* (Wulfen)  
foliis oblongis crenatis subhirsutis viscosis margine ciliatis, umbella multiflora erecta, scapo calycibusque pubescenti-viscosis. Lehm. Monogr. Primul. p. 75.

P. *pubescens* foliis planis serrulatis subvillosis. Wulf. in Jacqu. Misc. 1. p. 159.  
Lois. Fl. Gall. 1. p. 114.

P. *villosa* β. *pubescens*. Willd. Sp. pl. 1. p. 803.

P. *hirsuta*. Decand. Fl. Franc. n. 2373.  
Suppl. p. 384.

Auricula Ursi rubro flore. II. Clus. Pannon.  
p. 545. 546.

*Auricula alpina rubra.* *Tabernaemont. pag.*  
506. *Icon.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 18. fig. 2.*

*Germ. Feinhaarige Schlüsselblume.*

*Gall. Prime-vère pubescente.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris, retro  
*dem Weisbad* ad montem *Gamor*, ubi  
eam post *Gesnerum Ann.* 1818 vidi.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matu-  
ra. 24

Differt a *P. villosa*: *Foliis* longioribus,  
minus hirsutis, sed villis minoribus præsertim  
ad oras conspicuis. *Corollis* saturate et ele-  
ganter rubris, annulo flavo ad faucem tubi co-  
ronatis (non rubro-violaceis cum corona fau-  
cis flava.)

*Obs.* Planta in Horto culta constans.

pag. 445. *PRIMULA Auricula.*

*Hab.* In *Brisgovia* inter rupium ex granite fissu-  
ris *im Höllenthal* varius. In Principatu  
superiori retro *Moeskirch im Donauthale*,  
in rupibus calcareis. In vicina helvetia ad  
montem *Gamor et Kasten* vidi 1818.

pag. 445. post *PRIMULAM Auriculam.*

291. \* *PRIMULA integrifolia* foliis  
integerrimis ellipticis ad oras subcrenato-  
cartilagineis, umbella erecta, calycibus  
longe tubulosis obtusissimis. *Jacqu. Misc.*  
1. p. 160. *Lehm. Monogr. p. 73.*

*P. integrifolia* foliis integerrimis glabris oblongis, calycibus tubulosis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 205.

*P.* foliis ciliatis ellipticis carnosis integerrimis. *Hall. hist. n.* 615.

Auricula Ursi quarta. *Clus. hist.* 1. p. 303.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 327. *Sturm. Deutschl. Fl. Fasc.* 24.

*Germ. Ganzblättrige Aurikel.*

*Gall. Oreille d'ours à sévilles antiers.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris, ad montem *Gamor et Hohenkasten* ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto Septembri matura. 4

*Folia* in rosulam congesta, ovato-lanceolata, integra, carnosa, glabra, pallide viridia, margine ciliata. *Scapus* 1-2 uncialis, pauciflorus. *Umbella* erecta. *Calyces* longe tubulosi, obtusi. *Corollæ* laciniae semibifidae, suaviter carneo-rubellæ.

pag. 452 ad *LYSIMACHIAM vulgarem.*

*Obs.* Radices hujus in rivos fluviosque adjacentes, spargunt sarmenta praelonga, octo ad viginti pedes excedentia, filiformia, tenacia, fusco-purpurascentia, hinc radicania. Legit acutissimus Mertinus prope Wertheim ad Moenum et benevole misit cum annotatione: apud vulgum sub nomine *Zahnwehstrang* ibi notissimum et in doloribus dentium saepe exoptatissimum remedium!



pag. 453. *LYSIMACHIA thyrsiflora*.

*Icon.* Sowerby *Engl. Bot. tab.* 176.

*Hab.* Prope Rastadt in palude, ubi eam vidi  
*Ann.* 1806.

pag. 456 post *LYSIMACHIAM Numulariam*.

### LXXXVIII.\* SOLDANELLA.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n.* 260.

*Calyx* quinquepartitus, rectus, persistens: *laciniis* lanceolatis. *Corolla* monopétala, campanulata, sensim ampliata, recta, ore lacero multifido, acuto. *Antheræ* sagittatæ. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, persistens. *Stigma* simplex. *Capsula* oblonga, teres, oblique striata, unilocularis, dehiscens apice multidentato. *Semina* numerosa, acuminata, minima. *Receptaculum* columnare liberum.

298.\* *SOLDANELLA alpina* scapo sub-  
bifloro, foliis reniformibus, floribus nu-  
tantibus.

*Soldanella alpina* *Linn. Sp. pl.* 1. p. 206.

*Soldanella.* *Hall. hist. n.* 654.

*Soldanella alpina rotundifolia.* *Bauh. pin.*  
p. 295.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 13.

*Germ.* *Alpen-Soldanelle.*

*Gall. Soldanelle des alpes.*

*Hab.* In monte *Feldberg* Brigoviae in humidis cum *Bartsia alpina*, frequens, ubi eam legi 1805.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio Augusto maturat. 24

*Scapus* digitalis et altior, erectus, nudus, sæpissime biflorus, interdum triflorus. *Folia* radicalia petiolata, ex reniformi-rotunda, integruscula, læte virida. *Flores* nutantes. *Corollæ* saturate aut violaceo-coeruleæ, pulcherrimæ.

*Nota.* Ad pulcherrimas omnino floræ cives pertinet.

pag. 465. post *POLEMONIUM coeruleum*:

# XCI. \* A Z A L E A.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 277.*

*Calyx* quinquepartitus, acutus, erectus, parvus, coloratus, persistens. *Corolla* monopetala campanulata semiquinquesida. *Stamina* receptaculo inserta. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, persistens. *Capsula* subrotunda, quinquelocularis, quinquevalvis. *Semina* plurima, subrotunda.

304. \* *AZALEA procumbens* ramis diffuso-procumbentibus. *Linn. Sp. pl. 1. p. 852. Linn. Fl. Lapp. 90.*

*A. procumbens* ramis diffuso-procumbenti-

bus, foliis oppositis revolutis glaberrimis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 251.

A. caule procumbente, foliis ovatis margine introverso. *Hall. helv. n.* 666.

*Loiseleuria procumbens.* *Desv. Journ. de Bot.* III. p. 35. *Roemer et Schult. Linn. Sp. pl.* 4. p. 353.

*Chamærhododendros supina*, ferruginea, thymifolio, alpina. *Boccon. Mus.* p. 64. tab. 13.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 9. *Sow. Engl. Bot. tab.* 865. *Lamark Illustr. tab.* 110. *Linn. Fl. Lapp. tab.* 6. fig. 2.

*Germ. Niederliegende Azalea.*

*Gall. Azalea couché.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, retro dem *Weisbad* in pascuis montosis montis *Gamor* ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. h

*Fruticulus.* *Cauliculi* lignosi, procumbentes, semipedales et longiores, fusci, ramosissimi, teretes, tenues, foliosi. *Folia* opposita, breviter petiolata, elliptica, obtusa, margine revoluta, integra, splendentia, firma, sempervirentia, parvula. *Flores* terminales, terni, quaterni, pedunculati, erecti. *Calyces* parvuli, purpurascens. *Corollæ* parvulæ, campanulatæ, dilute rubellæ, seu rosæ. *Capsula* subrotundo-ovata, acuta, subquinelocularis.

*Nota.* Capsulae in nostris saltem individuis et aliis helveticis, anglicis, et in pyrenæis a me

lectis, omnino subquineloculares, interdum triloculares, perraro biloculares sunt. Cl. Sowerby l. c. Cl. Lamarck l. c. capsula quineloculari, et Cl. Gaertn. Sem. tab. 63. capsula triloculari depinxerunt. Cl. Hallerus et Smith. l. c. capsulam quinelocularem notant.

In speciminibus in hortum Carlsruhensem, ex pyrenaeis a me allatis, ibique per plures annos cultis, capsulas quineloculares semper observavi.

pag. 474. post CAMPANULAM *persicifoliam*.

310.\* CAMPANULA *pyramidalis* foliis laevibus serratis cordatis: caulinis lanceolatis, caulibus juncis simplicibus, umbellis sessilibus lateralibus. *Linn. Syst. veg.* 173. *Hoffm. Fl. Germ.* 72. *Roth. fl. Germ.* 2. p. 253. *Scop. fl. Carn.* 1. p. 146.

C. *pyramidalis* foliis ovatis glabris subserratis, caule erecto paniculato, ramulis brevibus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 238.

Rapunculus hortensis latiore folio s. pyramidalis. *Bauh. pin.* 93.

*Germ.* Pyramidenförmige Glockenblume.

*Gall.* Campanule pyramidale.

*Hab.* In principatu superiore, ad rudera arcis Hohenbodmann ex rupibus, non infrequens ubi eam vidi *Ann.* 1814.

*Flor.* Julio, Augusto. Semina Septembri, Octobri matura. ♂

*Radix* napiformis, lactescens. *Caulis* ere-



ctus 4-5 pedalis, simpliciusculus, sæpius ab imo ad summum ramis brevibus instructus, foliosus. *Folia* sparsa, longius petiolata, ovata, margine crenulato - denticulata, glabra, infima cordato-ovata, glabra, læte viridia. *Flores* numerosi, pedunculati. *Corollæ* pulchræ, cœruleæ, cœruleo-violaceæ, quandoque albidæ, ultra medium quinquesidæ. *Calycini* dentes patentes.

**Nota.** Planta pro Flora nostra rara novaque.

pag. 474. *CAMPANULA latifolia.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 302.*

*Hab.* In Brisgovix monte *Feldberg*, ubi eam vidi 1805.

310. \*\* *CAMPANULA rhomboidea*  
foliis rhomboidibus serratis, spica secunda, calycibus dentatis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 233.* — *Roth. Fl. Germ. 2. p. 253.* — *Hoffm. Fl. Germ. p. 72.*

*C.* caule lævi simplici, foliis glabris ovato-lanceolatis serratis, petiolis paucifloris. *Hall. hist. n. 693.*

*C.* Drabæ minoris foliis. *Bauh. prodr. p. 36.*

*Rapunculus alpinus* (Teucree folio) rhomboidalis. *Boccon. Mus. 75. tab. 61.*

*Germ. Rautenblättrige Glockenblume.*

*Gall. Campanule à fêvilles rhomboidales.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* supra *Werrewag* in pratis montosis, nec non in vicina helvetia retro

tro dem *Weisbad* in pratis subalpinis alpinisque, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 24

*Caulis* erectus, simplex, sesquipedalis et altior, angulatus, laevis. *Folia* alterna, breviter petiolata, rara, ovato-rhomboidea, glaberrimula, tenera, serrata, unciam longa, semiunciam lata, *Flores* spicato-racemosi, secundi. *Pedunculi* breves, bi- seu triflori. *Bractea* lineares, subdentatae. *Corollae* ventricosae, mediores, cyaneae, interdum albæ, nutantes. *Calycis* dentes lineari-capillares.

Rariorem Florae civem agnoscas.

pag. 475. *CAMPANULA rapunculoides.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1369.

pag. 476. *CAMPANULA Trachelium.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1000.

pag. 477. *CAMPANULA glomerata.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 90.

pag. 479. post *CAMPANULAM Cervicariam.*

315.\* *CAMPANULA barbata* capsulis quinquelocularibus obtectis, caule simplicissimo subunifolio, foliis lanceolatis, corollis barbatis. *Linn. Syst. pl. p.* 462. *Jacqu. obs. 2. p.* 14. *Roth. fl. Germ. 2. p.* 258.

*Campanula caule simplici, foliis ligulatis asperis, petiolis unifloris, floribus hirsutis.*  
*Hall. hist. n. 694.*

*Campanula foliis echii, floribus villosis.* *Bauh. pin. 94. Prodr. 36. Icon.*

*Campanula alpina asperior, foliis echii, flore magno villosa.* *Pluk. Phyt. 153. fig. 6.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 37.*

*Germ. Rauhaarig - blütige Glockenblume.*

*Gall. Campanule a fleur barbue.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris. Prope *St. Gallen*, nec non *am Hohengamorkasten et Sentis* in pascuis subalpinis abunde. Vidi *Ann. 1818.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. 4

*Caulis* digitalis, palmaris, sphithamæus, erectus, simplex, angulatus, hirsutus. *Folia radicalia* in orbem digesta, sessilia, ligulato-lanceolata, obtusa, integerrima, hirsuta, sesquiunciam longa, 4-5 lineas lata; *caulina* alterna, sessilia, lineari-lanceolata, radicalibus multo minora et angustiora, numero 1-2-3. *Flores* terminales, 1-2 sæpe 3, pedunculati, nutantes, secundi. *Corolla* mediocris, cærulea quandoque albida, intus præsertim et ad marginem longius albide barbata. *Capsula* oblecta calycis sinubus reflexis, hirsutis.

Pulchella omnino planta, Capris acceptissima, in pascuis subalpinis alpinisque calcareis Abbatiscellensibus abundans.

315.\*\* *CAMPANULA thyrsoides* hispida, racemo ovato oblongo terminali, caule simplicissimo, foliis lanceolato - linearibus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 235. *Jacqu. Obs.* 1. p. 33. *Roth. Fl. Germ.* 11. p. 257. *Hoffm. Germ.* p. 73.

C. foliis lingulatis asperis, floribus hirsutis, densissime spicatis. *Hall. helv. n.* 688.

C. foliis echii. *Bauh. pin.* 94.

Cervicaria major tenuifolia. *Thal. Harc.* 32. tab. 4.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 21.

*Germ.* Strausblütige Glockenblume.

*Gall.* Campanule en thyrses.

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia in calcareis montis *Gamor et Kasten* ubi eam vidi 1818, nec non in *Jurasso*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturat. 4

*Radix* ramoso - fibrosa, dura. *Caulis* erectus, palmaris et altior, simplex, firmus, angulatus, strigoso - hirsutus. *Folia radicalia* in rosetulam digesta, ovato - lanceolata, *caulina* sparsa, sessilia, lanceolato - lingulata, integra, albide hirsuta, radicalibus longiora et angustiora. *Racemus* terminalis, subspicatus, densus, ovali-cylindricus. *Calyx* albide strigoso - hirsutus. *Corollæ* graciles, sordide albidæ pallideque cærulescentes, hirsutæ.

*Obs.* Flores sæpissime in spica densa sessiles. Spica ima parte foliosa. Individua ex seminibus



in horto Carlsruhensi culta, in omnibus partibus justo majora. Flores minus dense congesti, subsessiles aut breviter pedunculati.

Specimina hujus longe speciosa, in pyrenaeis vidi.

315. \*\*\* *CAMPANULA Medium* capsulis quinquelocularibus obteectis, caule simplici (ramoso) erecto folioso, floribus erectis, *Linn. Sp. pl.* 1. p. 236. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 258. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 75.

C. calycibus tergo lamellis quinque notatis. *Linn. Hort. Cliff.* p. 64.

C. hortensis folio et flore oblongo. *Bauh. pin.* 94.

*Viola Mariana* alba et purpurea *Tabernæmont. p.* 698. *Icon. Dodon. Pempt. p.* 163. *Icon.*

*Icon. Knorr. delin.* 1. tab. 5. f. 2.

*Germ. Großblühende Glockenblume. Marienglöcklein.*

*Gall. Campanule à grandes fleurs.*

*Hab.* In Gallia australi. Colitur in hortis multis, præsertim rusticorum ex quibus rarius cum rejectamentis in ruderata ad pagos et urbes migrat.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. ♂

*Radix* ramosa, crassiuscula, alba, fibrosa. *Caulis* pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, angulosus, setuloso-scaberrimus, (in nostris in-

dividuis hortensibus et emigratis) ramosus. *Rami* alterni, erecti, angulati. *Folia* alterna, subsessilia, lanceolata, margine suberenulato-undulata, scabra. *Flores* axillares, pedunculati. *Pedunculi* foliis longiores, 1-2-3 flori. *Calyx* scaber. *Corollæ* speciosissimæ, campanulato-ventricosæ, erectæ, obtuse quinquefidæ, cæruleæ, violaceæ, pallide rubellæ, et nivææ. *Capsula* quinquelocularis, calycis sinibus reflexis, obtecta.

Verum hortorum præsertim rusticorum decus, ubi quandoque floribus impletis obvenit. *Flores* apibus accepti.

Radix dulcis, edulis, hinc inde acetariis additur. Olin sub radice *Violæ Marianæ* s. *Medii*, medicis ob refrigerantes et subadstringentes vires cognita.

pag. 481. *CAMPANULA hybrida.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab 575.*

pag. 482. post *CAMPANULAM hybridam.*

**317.\*** *CAMPANULA hederacea* foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo. *Linn. Sp. pl. 1. p. 240. Roth. Fl. Germ. 2. Hoffm. Fl. Germ. 74. Smith. Fl. Brit. 1. p. 259.*

C. foliis subrotundis quinquangularibus basi emarginatis glabris, floribus solitariis. *Læfl. It. 127.*

C. cymbalarix vel hederæ folio. *Bauh. pin. 95. prodr. 84. Moris. hist. 2. p. 456. sect. 5. tab. 4. fig. 18.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. 1. tab. 73. Flor. Dan. tab. 330.*

*Germ. Epheublättrige Glockenblume.*

*Gall. Campanule à févilles de Lierre.*

*Hab.* In Palatinatu transrhenano prope *Kaiserslautern* in umbrosis humidis, t. *D. Kochio.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* tenella, ramuloso-fibrosa. *Caulis* diffusus, prostratus, ramosus, glaber, tenuis, foliosus. *Folia* petiolata, opposita alternave, cordata, subquineloba, glabriuscula, tenera. *Flores* subterminales, longe pedunculati, solitarii, uniflori, nutantes, tenelli, pallide cœrulei. *Capsula* semiorbicularis, parva.

Pulchella omnino plantula, rarioribus Florae civibus adscribenda. Individua nostratia in omnibus partibus simillima illis, in hispania a me observatis. Plantula ex seminibus in Cataloniae umbrosis et in pyrenaeis a me lectis, in horto Carlsruhensi culta, constantissima,

pag. 483. PHYTEUMA orbicularis.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 142.*

*Hab.* In pratis montosis retro *Schelling* ad montem *Kaiserstuhl* Brisgoviae, ubi eam vidi *Ann.* 1807. In Principatu Fürstenbergensi prope *Donaueschingen*, *Engen* in convallibus *Griechenthal* et alibi frequens, nec non in Principatu superiori retro *Mæskirch* in calcareis montosis ubi eam vidi 1818.

pag. 490.

322. \* *LONICERA sempervirens*  
verticillis aphyllis terminalibus, foliis sum-  
mis connato - perfoliatis (corollis cocci-  
neis.) *Linn. Sp. pl. 1. p. 180.*

Periclymenum perfoliatum virginianum sem-  
pervirens et florens. *Herm. Lugdb. 484.*  
*tab. 485.*

*Icon. Psleger arb. et frut.*

*Germ. Immergrünes Geisblatt.*

*Gall. Chevreféville à fleurs rouges.*

*Hab.* In Virginia. Hospitatur in hortis angli-  
cis, aliisque *Carlsruhe, Durlach, Ettlin-*  
*gen, Berghausen, Baden* frequens, nec  
non in hortis rusticorum.

*Flor.* Aestate in autumnum. †

*Folia* oblonga interdum subrotunda, sub-  
tus albido - glauca, summa connato - perfoliata.  
*Corollæ* subæquales, extus pulcherrime coccineæ,  
intus fulvæ.

Summum saepe hortorum decus.

323. \* *LONICERA tatarica* peduncu-  
lis bifloris, baccis distinctis, foliis corda-  
tis obtusis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 180.*

Chamæcerasus fructu geminò rubro, foliis  
glabris cordatis. *Amm. Ruthen. 184.*

*Icon. Pall. Fl. Ross. tab. 36. Psleger. arb.*  
*et frut.*

*Germ. Tatarische Lonicere.*



*Gall. Lonicere de Tartarie.*

*Hab.* In Tartaria. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Ettlingen, Rastadt, Favorite, Baden, Schwetzingen, Donaueschingen, Möersburg.*

*Flor.* Aestate. †

*Frutex. Folia* cordata, obtusiuscula, glabra. *Corollæ* albido-incarnatæ, interdum albidæ: labio superiore tripartito: lacinia media bilida, inferiore simplici. *Baccæ* rubræ.

*Nota.* Nullibi apud nos spontanea. Individua mihi passim ab amicis pro spontaneis missa, sine dubio ex hortis et arbustis emigrata sunt.

pag. 490. *LONICERA nigra.*

*Hab.* In dumetis prope *Tryberg* non infrequens, ubi eam legi 1810.

pag. 494. post *LONICERAM alpigenam.*

325. \* *LONICERA coerulea* pedunculis bifloris, baccis coadunatis globosis, stylis indivisis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 180.*

*Caprifolium* foliis ovatis, bacca singulari ovata, biflora. *Hall. hist. n. 674.*

*Ghamæcerasus montana*, fructu singulari cœruleo. *Bauh. pin. 451.*

*Periclymenum rectum* fructu cœruleo. *Clus. Pannon. 85.*

*Icon. Pallas Fl. Ross. tab. 37. Jacqu. Fl. Austr. V. app. tab. 17.*

*Germ. Blaue Lonicere.*

*Gall. Lonicere à fruits bleus.*

*Hab.* In Alsatiae Vogesis, in monte *Ballon*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri matuta. ♀

*Frutex* circiter tripedalis, difformis, cortice flavo. *Folia* opposita, breviter petiolata, ovata, obtusa, integerrima, juniora ciliata. *Pedunculi* biflori. *Corollae* bilabiatae, parvae, subhirsutae, albido - ochroleucae. *Labium* superius bifidum, inferius trifidum. *Bacca* globosa, aut subovata, caerulea, intus purpurea. *Semina* subrotunda, compressa, decem ad duodecim.

pag. 497. post VERBASCUM *Thapsus*.

326.\* VERBASCUM *cuspidatum* foliis decurrentibus crenulatis tomentosis, superioribus cuspidatis, racemi fasciculis remotiusculis, antheris duabus oblongis. *Schrad. Monogr. p. 23. n. 4.*

*Icon. Schrad. l. c. tab. 1. fig. 1.*

*Germ. Zugespitztes Wollkraut.*

*Hab.* Et floret promiscue cum præcedenti specie. ♂

*Vix* specie distincta a *V. Thapsus*. *Linn.* a qua differre videtur. *Caule* sæpius humiliore, minus crasso. *Foliis* superioribus bracteisque magis cuspidato - acuminatis. *Spicis* basi præsertim magis interruptis et *Corollis* majusculis.

**Nota.** *Verbascum Thapsus* secundum locum natalem siccum, apricum, sabulosum, quoad caules, folia, bracteas et corollas quammaxime differt. Varietates omnino intermediae prostant.

pag. 498. post *VERBASCUM phlomoidem*.

327.\* *VERBASCUM montanum* foliis tomentosis, radicalibus oblongo-ellipticis crenatis petiolatis, caulinis oblongis, acutiusculis obsolete crenulatis, superioribus acutis, læviter decurrentibus, racemo subspicato, florum fasciculis subconfertis, antheris subæqualibus. *Schrad. Monogr.*

*Germ. Bergwollkraut.*

*Hab. et Flor.* Promiscue in iisdem cum *V. phlomoide* locis. ♂

Nimis omnino affinis *V. phlomoidi*, Linn. et vix specie ab eo diversum. Varietates hujus intermediae omnino prostant.

pag. 499. *VERBASCUM pulverulentum*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 487.*

pag. 500. *VERBASCUM Lychnitis*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 58.*

pag. 501. *VERBASCUM nigrum*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 59.*

pag. 502. *VERBASCUM Blattaria*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 595.*

pag. 504. post *VERBASCUM Blattaria*.

331.\* *VERBASCUM phoeniceum* foliis ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoso. *Linn. Sp. pl. 1. p. 495. Roth. Germ. 2. p. 241. Hoffm. Germ. 77.*

*Blattaria purpurea.* *Bauh. pin. p.* 241.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 125.

*Germ. Violettes Schabenkraut.*

*Gall. Molene purpurine.*

*Hab.* Ad viam publicam inter *Heidelsheim* et *Bruchsal* rarius t. meritissimo Theologo *Langio*. Prope *Hasmersheim am Hühnerberg* ad *Nicarum*, in calcareis collibus passim rarius vidi 1813.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. ♂

Differt ab affini *V. Blattaria*: *Corollis* semper purpureo-violaceis. *Filamenta* duo inferiora barbata, atropurpurea, tria superiora barba alba instructa.

Ad rariores Florae cives pertinet. Planta ex seminibus in horto culta, constans.

**Nota!** In toto tractu illo, prope *Hasmersheim* cis et trans *Nicarum* calcareo et gypsaceo, abundant *Sal gemmae* et fontes quammaxime salsae, ut jam *Ann.* 1813 probe perspexi et nostratibus ad oculos demonstravi. Eandem opinionem, jam *Ann.* 1807 de regionibus analogis circa *Unadingen Dierheim* et *Donaueschingen in der Baar* de *Sale gemmae* et salinis ditissimis ibi hucusque sub *Gypsi stratis* occultis habui et reiteratis vicibus declaravi. Vid. *C. C. Gmelin, über den Einfluss der Naturwissenschaft auf das gesammte Staatswohl.* *Carlsru. Ann.* 1809. pag. 138 — 143.



pag. 510. post NICOTIANAM *Tabacum*.

334.\* NICOTIANA *macrophylla* foliis ovato-acutis amplexicaulibus basi auriculatis, corollæ fauce inflato ventricoso, laciniis limbi ovatis acutis. *Willd. Enum. p.* 229. *Lehmann. hist. Nicot. n.* 5.

N. *macrophylla* foliis oblongo-ovatis auriculatis amplexicaulibus, floribus paniculatis acutis. *Spreng. Ind. hort. Halens.* 1807.

*Germ. Großblättriger Tabac.*

*Gall. Tabac à févilles grandes.*

*Hab.* In America. Colitur passim in Palatinatu Badensi et alibi.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto Septembri matura. ☉

Differt ab affini N. *Tabaco*: *Foliis* multo majoribus, latioribus, ovatis, basi auriculatis, amplexicaulibus. *Floribus* copiosioribus, laxè paniculatis. *Corollis* fauce inflato-ventricosis.

334.\*\* NICOTIANA *fruticosa* foliis lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, floribus acutis, caule fruticoso. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 258.

N. *fruticosa* foliis lanceolatis acuminatis petiolatis, caule fruticoso, laciniis limbi corollæ acuminatis. *Willd. Enum. p.* 229. — *Lehm. hist. Nicot. n.* 5.

*Germ. Chinesischer Tabac. Stauden-Tabac.*

*Gall. Tabac de la Chine.*

*Hab.* In China. Colitur circa *Carlsruhe* prope *Beiertheim* et in Palatinatu passim.

*Flor.* Julio Augusto. *Semina* Septembri matura. ☉ ♀

Differt a *N. Tabaco*: *Caulibus* durioribus, tenuioribus. *Foliis* petiolatis, lanceolatis acuminatis, multo angustioribus. *Corollis* tenuioribus, laciniis limbi longius acuminatis.

*Nota* Planta in agris culta, omnino annua, in Caldario vel Tepidario servata, perennans, suffruticosa.

334. \*\*\* *NICOTIANA rustica* foliis petiolatis ovatis obtusis integerrimis, corollæ tubo cylindrico, calyce duplo longiore, limbo obtuso. *Willd. Enum. p.* 230. *Lehm. l. c.* 13.

*N. rustica* foliis petiolatis ovatis, integerrimis, floribus obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 258.

*Icon. Blackw. tab.* 457.

*Germ. Bauern - Tabac.*

*Gall. Tabac rustique.*

*Hab.* In America. Colitur circa *Carlsruhe*, *Mühlburg*, *Beiertheim* et alibi.

*Flor.* Julio, Augusto, Septembri. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

*Folia* petiolata, ovata, obtusa, integra, viscida. *Corollæ* cylindricæ, breves, obtusæ, pallide luteo-virescentes.

pag. 513. post *ATROPAM Belladonnam*.

335.\* *ATROPA physaloides* caule herbaceo, foliis sinuato - angulatis, calycibus clausis acutangulis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 260. *Jacqu. Obs.* 4.

*Nicandra physaloides.* *Gært. Sem.* 2. p. 237. *tab.* 131. *Willd. Enum. pl. H. Berol.* p. 231.

*Alkekengi* calyce profunde diviso, fructu sicco. *Act. Petrop.* 1761. p. 319.

*Alkekengi* amplo flore violaceo. *Fevill. peruv.* 724.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 98. *Fevill. l. c. tab.* 16.

*Germ.* Schluttenartiges Tollkraut.

*Gall.* Belladonne physaloide.

*Hab.* In Peru. Circa *Carlsruhe* inter *Dachsland* et *Gnülingen* ad viam sylvaticam legit nuper meritissimus professor Lycei *Carlsruhensis* et theologus *Stern*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Baccas* Septembri maturat, ☉

*Radix* ramoso - fibrosa. *Caulis* 3 - 4 - 5 pedalis, erectus, angulatus, ramosus. *Folia* alterna per petiolum decurrentia, oblonga, obtuse sinuata. *Pedunculi* solitarii, nudi, uniflori. *Calyx* ovatus, basi excisus, angulis quinque compressis profunde quinquepartitus: *Foliolis* sagittato - ovatis. *Corolla* campanulata, quinqueloba, obtusa: *Limbo* erecto subplicato - cœrulescente. *Barca* exsucca, 3 - 4 - 5 locularis, cernua, tecta calyce, *Semina* subrotunda, compressa.

Planta speciosa, sine dubio ex horto in l. c. migrata. Narcoticas qualitates possidet. Media inter *Atropam* et *Physalidem*.

pag. 519. *SOLANUM nigrum*. Linn.

α. *vulgatum* caule inermi herbaceo; foliis ovatis angulatis. Linn. l. c.

β. *patulum* ramis teretibus glabris, foliis integerrimis glabris. Linn. l. c.

*Solanum procerius patulum vulgaris fructu.*  
*Dill. hort. Eltham. p. 367. tab. 274. fig. 355.*

γ. *virginicum* ramis angulatis dentatis, foliis repandis glabris. Linn. l. c.

δ. *melanocerasum* caule inermi herbaceo, ramis glabris angulatis dentatis, foliis ovatis dentato - angulatis glabris, racemis subumbellatis extrafoliaceis pedunculatis.  
*Willd. Enum. pl. H. Berol. p. 257.*

*Solanum nigrum vulgari simile, caulibus exasperatis.* *Dill. h. Eltham. 368. tab. 275. fig. 256.*

*Hab.* β et γ promiscue cum α circa *Carlsruhe, Durlach, Ettlingen, Baden, Constanz* et alibi in ruderalis cultisque.

Baccæ maturæ in varietatibus, omnes nigræ. Planta maxime præsertim in ruderalis pinguioribus humidis et macris sabulosis siccioribus polymorpha. Varietates complures levidenses inter α et γ mediæ, vix suadent separationem a *S. nigro Linnæi*. In regionibus calidioribus galliæ et hispaniæ cumprimis circa urbium rudrata et culta magis adhuc, quam in nostris terris variat.



340. \* *SOLANUM puniceum* caule inerami herbaceo, ramis angulatis exasperatis, foliis ovatis repandis, cymis nutantibus; baccis puniceis. *mihi*.

*S. miniatum (Bernhardi)* caule inermi herbaceo, ramis strigoso-pubescentibus angulatis dentatis, foliis ovatis repandis glabriusculis, racemis subumbellatis extrafoliaceis pedunculatis. *Willd. Enum. pl. H. Berol. p. 236. Decand. Fl. Franc. VI. p. 417.*

*Solanum puniceum. Cord. hist. 158.*

*Solanum officinarum acinis puniceis. Bauh. pin. p. 166. Tournef. instit. 1. p. 148.*

*Solanum hortense sive vulgare acinis rubris. Bauh. hist. 3. p. 608.*

*Solanum hortense baccis rubentibus. Dodon. Pempt. p. 453.*

*Germ. Rothbeeriger-Nachtschatten.*

*Gall. Morelle à fruit rouge.*

*Hab. Circa Carlsruhe et alibi in hortis, cultis, arvis, ruderatis, sterilibus cum S. luteo et nigro passim non infrequens.*

*Flor. Junio, Julio, Augusto. Bacca Augusto, Septembri matura. ☉*

Maxime affinis *S. luteo* nostro, a quo distinguitur: *Foliis* minus villosis. *Baccis* maturis puniceis, nec luteis.

*Nota.* Baccae semper puniceae, non miniatæ, hinc nomen triviale ex Cordo et Casp. Bauhino praeferendum erit.

An planta hybrida ex *S. luteo* et nigro?

340. \*\*

340. \*\* *SOLANUM luteo-virescens*  
 caule herbaceo inermi, ramis angulatis exasperatis, foliis ovatis repandis, cymis nutantibus, baccis luteo-viridescentibus. *mih.*

*S. humile* (*Bernhardi*) caule inermi herbaceo, ramis glabris angulatis dentatis, foliis ovatis subrepandis, superioribus integerrimis, racemis subumbellatis extrafoliaceis pedunculatis. *Willd. Enum. pl. H. Berol. p. 256. Decand. Fl. Franc. VI. p. 417. Roem. et Schult. Linn. Sp. pl. 4. p. 590.*

*Solanum officinarum* acinis e luteo-viridescentibus. *Tournef. Inst. 1. p. 148.*

*Germ. Gelbgrüner Nachtschatten.*

*Gall. Morelle à fruit verdâtre.*

*Hab. Circa Carlsruhe, Mühlburg et alibi cum præcedentibus passim.*

*Flor. Junio, Julio, Augusto. Baccæ Augusto Septembri maturæ. ☉*

Maxime affinis *S. luteo*, a quo distinguitur: *Caule* sæpissime demissiori, *ramis* magis diffusis, subangulatis, exasperatis. *Foliis* minus villosis. *Baccis* non luteis, sed aqueose e luteo-viridescentibus.

Moschum subredolet. In horto culta constans. Vires narcoticas habet præcedentium. An planta hybrida ex *S. luteo* et *S. nigro*. Variat Baccis variegatis marmoreis lutescente-viridibus. Hic pertinet *S. ochroleucum*. *Decand. Fl. Franc. VI. p. 418.*

pag. 536.

350.\* *RIBES glandulosum* inerme, racemis erectis piloso-glandulosis, floribus planiusculis, foliis acuminato-lobatis dentatis, caule adscendente. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 1154. *Ait. h. Kew.* 1. p. 279.

*R. prostratum* inerme, baccis hirsutis. *l'Herit. Stirp.* 1. p. 3. *Lamark. Encycl.* 5. p. 48.

*Icon. l'Herit. l. c. tab. 2. Pfleger. frut.*

*Ger m. Drüsentragender Johannis-Beer-Strauch.*

*Gall. Grossélier couché.*

*Hab.* In Americæ borealis insula *Newfoundland*. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe*, *Schwetzingen*, *Favorite*, *Baden*, et alibi.

*Flor.* Majo, Junio. *Baccas* Julio Augusto maturat.  $\frac{1}{2}$

*Frutex.* Rami tenelli inermes, adscendentes. *Folia* lobata, acuminata, dentata. *Pedicelli* calycesque piloso-glandulosi. *Baccæ* hirsutæ.

Introducta Ann. 1785 in terris Badensibus per divum Carolum Fridericum. Jam ex hortis et arbustis passim in adjacentes regiones emigrata.

350.\*\* *RIBES floridum* inerme, racemis pendulis, floribus cylindricis, bracteis flore vix brevioribus. *l'Herit. Stirp.*

nov. 1. p. 4. *Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 1156.*

*R. pensylvanicum* inerme, foliis utrinque punctatis, floribus racemosis subcylindricis, bracteis pedicellis longioribus. *La-mark. Encyl. 3. p. 47.*

*R. americanum nigrum. Mæench. Weisenst. p. 104.*

*Ribesium nigrum pensylvanicum* floribus oblongis. *Dill. Elth. 324.*

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Mæench. l. c. tab. 7. Dill. l. c. tab. 244.*

*Germ. Pensylvanische schwarze Johannisbeere.*

*Gall. Grosselier de Pensylvanie.*

*Hab. In Pensylvania. Hospitatur in hortis anglicis Carlsruhe, Schwetzingen, Heidelberg, Rohrbach, Favorite, Baden, Donaueschingen et alibi.*

*Flor. Majo, Junio. Baccas Augusto maturat. h*

*Frutex. Folia* utrinque minute glanduloso-punctata. *Glandulæ nitidæ, flavæ. Baccæ nigræ, flavo-glandulosæ, edules.*

Jam passim ex hortis et arbustis in adjacentes regiones emigranta. Flores apibus accepti.

pag. 543.

355. \* *HEDERA quinquefolia* foliis quinatis ovatis serratis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 292.*



*Vitis hederacea* foliis quinatis ovatis acuminatis serratis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 1. p. 1182.

*Cissus quinquefolia.* *Desfont. hist. des arbres et arbrisseaux.* 1. p. 443.

*Ampelopsis* caule radicante - scandente; foliis quinato-digitatis; foliolis petiolatis ovalibus acuminatis, superne grandidentatis; racemis subsessilibus, confertiuscule multifloris. *Mich. Amer.* p. 160.

*Edera quinquefolia canadensis.* *Corn. Canad.* 99.

*Icon.* *Corn. l. c. tab.* 100. *Pfleger. frut. Germ. Canadaisches Epheu.*

*Gall.* *Lierre de Canada. Vigne vierge.*

*Hab.* In Canada. Hospitatur in hortis anglicis aliisque passim rusticorum. Copiose *Carlsruhe, Schwetzingen, Durlach, Bruchsal, Rastadt, Favorite, Baden, Lahr, Zell am Hammersbach* et alibi.

*Flor.* Majo, Junio. *Baccas* Octobri Novembri maturat. ♀

Longe lateque cooperit muros domunculas arboresque. Cirri oppositifolii. Folia post autumnum saepe tota, rubro-purpurascentia. Hinc inde ex hortis jam emigravit in regiones adjacentes.

pag. 545.

### 357. *VITIS vinifera.* L.

β. *monstrosa barbata.* *C. C. Gmelin in Verhandl. des Landw. Vereins zu Ettlingen.* 1. Jahrg. 1821. p. 45. sequ.

*Uva barbata. Tabernæmont. p. 1287. Icon.*

*Uva monstrosa barbata. Joh. Bauh. hist. pl.  
2. p. 75. Icon.*

*Icon. Propria. Gmel. l. c. Icon.*

*Germ. Barttraube. Wundertraube.*

*Hab.* In vinea prope *Bühl et Baden* ubi eam vidi 1811 et 1819. Prope *Friedelsheim* in Palatinatu legit Illustrissimus princeps *Ernestus* Marchio Badensis Anno 1599.

Venit ex uvae vitis varietate nostratibus *Elbe, Elbtraube, Elbelin* nota. De hac monstrositate insigni Joh. Bauhinus l. c. scribit: Res sane rara! nec vulgi modo rumore sparsa, sed principum cura cognita et ad prototypum depicta. Racemus uvarum est geminus suo quisque pediculo communi ramo haerens. Hoc naturale. At uterque coma obseptus erat crinita, flavescente ad duos fere cubitos longa, inferne in unum juncta et confusa: Hoc vero novum est, atque monstrosum. Picturam cum descriptione ex authentico, ad me misit, Cl. D. *Rentzius*, fontis admirabilis medicus *Bollensis* ordinarius. Dicitur ab Illustrissimo Principe *Ernesto* Marchione Badensi repertus prope *Friedelsheim* in palatinatu anno 1599, et *Durlacum* missus ut spectaculi eicone tenus ad posteritatem quoque rediret. Hujus etiam rei fidem nobis fecit *Laurentius Zysar*, qui et vidisse et diligentius consideratos manibus palpasse, ad eundem *Rentzium* scripsit.

*Nota.* Uvae barbatae l. c. 1811 et 1819 a me degustatae, maturae, dulces, sapidae. Filamenta copiosa 2-3-4 pedalia, tenuia, barbam pulcherrimam mentientia, ex baccis et earum passim seminibus orta sunt.

ad pag. 547. ante GLAUX.

CIX.\* I L L E C E B R U M.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 407.*

*Calyx* pentaphyllus cartilagineus, quinqueangularis: *foliolis* coloratis, acuminatis, apicibus distantibus, persistentibus. *Corolla* nulla. *Filamenta* 5, intra calycem. *Germen* ovatum acutum in *Stylum* brevem bifidum desinens. *Stigma* simplex, obtusum. *Capsula* subrotunda, utrinque acuminata, quinquevalvis, unilocularis, calyce tecta. *Semen* unicum, subrotundum, utrinque acutum.

358. \* *ILLECEBRUM verticillatum*  
floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Linn. Sp. pl. 1. p. 298* —  
*Hoffm. Fl. Germ. 82. Roth. Fl. Germ. 2. p. 280.*

*Paronychia serpillifolia palustris. Vaill. bot. Paris. 157. tab. 15. fig. 1.*

*Polygala repens nivea. Bauh. pin. 215.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 335. — Sowerby. Engl. Botany. tab. 395. Schuhr. bot. Handb. tab. L.*

*Germ. Wirtelblütige Knorbelblume.*

*Gall. Paronyche verticillée.*

*Hab. In Brisgovia prope Elzach in arenosis ericetosis versus der Eck ad viam copiose, teste Spinnero acutissimo et Kreuzero.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri mat-  
tura. ☉

*Radix* tenuis, albida, fibrosa, repens. *Cau-  
les* procumbentes, radiculati, filiformes, tenues,  
digitales, semipedales et longiores ramosi. *Fo-  
lia* opposita, sessilia, ovata, integra, parva.  
*Flores* axillares, verticillati, numerosi, sessiles,  
parvi. *Calyces* cartilaginei, nivi, apice ari-  
stati.

*Nota.* Plantula ex seminibus in horto culta, om-  
nino annua, nec perennis.

pag. 547. *GLAUX maritima.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 15.

pag. 553. *THESIUM montanum.*

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi prope *Do-  
naueschingen, Fürstenberg, Geisingen,  
Engen*, in convallibus *Griechenthal* non  
infrequens, ubi exemplaria speciosa, tripe-  
dalia et altiora vidi.

pag. 556. *VINCA minor.*

Variat Foliis latioribus et angustioribus.

362.\* *VINCA major* caulibus erectis,  
foliis ovatis, floribus pedunculatis. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 304.

*Vinca major* caulibus erectiusculis, foliis ova-  
tis, ciliatis, floribus pedunculatis, denti-  
bus calycinis setaceis elongatis. *Smith.*  
*Fl. Brit.* 1. p. 270.

*Pervinca* caulibus erectis, foliis ovato-lanceo-  
latis ciliatis, petiolis unifloris. *Hall. hist.*  
*n.* 575.



*Clematis daphnoides major.* *Bauh. pin.* 302.  
*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 514. *Curtis fl.*  
*Lond. tab.* 13.

*Germ.* *Großes Immergrün.*

*Gall.* *Pervenche majeure.*

*Hab.* In Marggraviatu superiore prope *Ffiringen* ad vias in sepibus humidis passim non infrequens, ubi eam legi *Ann.* 1814.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Augusto maturat. *Frutex.*

Differt a *Vinca minore*: *Statura* in omnibus partibus multo majori. *Caule* erecto, crassiori. *Foliis* duplo triplove majoribus, late ovatis, junioribus margine minute ciliatis. *Dentibus calycinis* setaceis, elongatis. *Corollis* duplo majoribus, cœruleis.

Minime pro varietate *V. minoris* habenda. In horto jam ultra 30 annos culta, constantissima permansit.

Rarioribus omnino et perpulchris Florae civibus adnumeranda.

## PENTANDRIA DIGYNIA.

pag. 561. *HERNIARIA hirsuta.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1379.

pag. 563. *CHENOPODIUM urbicum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 717.

pag. 565. *CHENOPODIUM rubrum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1721.

pag. 566. *CHENOPODIUM murale.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1722.

pag. 566. *CHENOPODIUM album*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1723.*

pag. 568. *CHENOPODIUM hybridum*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1919.*

pag. 568. post *CHENOPODIUM viride*.

**371. \*** *CHENOPODIUM opulifolium*  
foliis cuneiformi-deltoides, grosse inæqualiter sinuato-dentatis, racemis erectis, subfoliatis.

*Chenopodium opulifolio. Vaill. Bot. Paris.*

*Icon. Vaill. l. c. tab. VII. fig. 1. (optima.)*

*Germ. Gänsefuß mit Wasserhollunder-Blättern.*

*Gall. Putte d'oie à févilles d'Obier.*

*Hab. In ruderatis circa Carlsruhe, Mühlburg, Grünwinkel, Ettlingen, Heidelberg et alibi passim. In Palatinatu transrhenano prope Dürkheim t. D. Kochio.*

*Flor. Junio, Julio, Augusto. Semina Augusto, Septembri matura. ☉*

Sine dubio hucusque sub *Ch. albo*, vel *viridi Linn.* militabat, a quo distinguitur: *Foliis* semper cuneiformi-deltoides, grosse inæqualiter sinuato-dentatis, postice integris, 10 ad 14 lineas latis et longis. *Racemis* brevioribus, subfoliatis, farina albida adpersis.

*Obs. Planta in horto Carlsruhensi culta, mutationem non passa est.*

371. \*\* *CHENOPODIUM ficifolium*  
 foliis hastato-sinuatis erosis postice integris: superioribus oblongis integerrimis, seminibus punctatis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 276. *Spreng. Fl. Hall.* p. 87.

*Chenopodium viride.* *Curt. Fl. Lond. Fasc.* 2. tab. 16.

*Blitum Ficus folio.* *Dill. in Raj. Syn.* 155.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 1724. (non bona.)

*Germ.* Gänsefuß mit Feigenblättern.

*Gall.* Patte d'oie à févilles de Fiquier.

*Hab.* In ruderalis prope *Carlsruhe* et *Durlach* legit *A. Braun.* Circa *Mainz* t. *D. Kochio* et *Ziz.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. ☉

Differt a *Ch. viridi* affini: *Foliis* cuneiformi-hastatis, denticulato-erosis, angustioribus, magis viridibus, supremis-lanceolatis, integris. *Racemis* laxioribus. *Seminibus* excavato-punctatis.

Minime confundendum, cum *Ch. viridi* *Linn.* quod ad vulgatissimas apud nos plantas pertinet.

Rariorem florae civem agnoscas.

pag. 571. *CHENOPODIUM glaucum.*

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 1454.

pag. 576. *WILLEMETA arenaria.*

*Kochia arenaria.* *Roth.*

pag. 578. post WILLEMETAM.

CXVI.\* S A L S O L A.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 437.*

*Calyx* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, concavis, persistentibus. *Corolla* nulla. *Staminum* Filamenta quinque subulata, brevissima, laciniis calycis inserta. *Germen* globosum. *Stylus* tri- seu bipartitus, brevis. *Stygmata* recurva. *Capsula* ovata, calyce obvoluta, unilocularis. *Semen* unicum, maximum, cochleæ instar spirale.

378.\* *SALSOLA Tragus* herbacea, erecta, foliis subulatis, spinosis, lævibus, calycibus ovatis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 322.*

*Kali Tragus. Scop. fl. Carn. 1. p. 175.*

*Kali spinosum cochleatum. Bauh. pin. p. 289.*

*Kali spinosum, foliis longioribus et angustioribus. Tournef. inst. 247.*

*Tragon Mathioli. Lobel. Icon. 797.*

*Drypis Theophrasti vel ej. species. Tabernæmont. p. 423.*

*Icon. Tabernæmont. l. c. (bona.)*

*Germ. Glattes Salzkraut.*

*Gall. Soude épineuse.*

*Hab. In Palatinatu Badensi prope Schwetzingen retro der Sandgrube in agris apricis*



sabulosis sterilibus abunde, ubi eam legi  
*Ann.* 1812.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septem-  
bri maturat. ☉

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caulis* erectus, an-  
gulato-sulcatus: sulcis amœne rubellis, glabrius-  
culus, sæpe subhirsutus, 1 - 2 - 2½ pedes altus,  
ramosissimus. *Rami* alterni, sparsi, patentes. *Fo-*  
*lia* lineari-subulata, semiteretia, carnosae, glabra,  
spinula albida terminata. *Flores* axillares, soli-  
tarii, sessiles,

*Nota.* Planta spontanea in regionibus maritimis  
obveniens, sine dubio, in loco citato, ubi  
summa in abundantia conspicua est, olim  
disseminata, hinc indigena facta est.

pag. 578. *ULMUS campestris.*

*Ulmus campestris* foliis duplicato-serratis  
scabris basi inæqualibus, floribus subses-  
silibus congestis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p.  
287.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1886.

pag. 581. *ULMUS suberosa.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2161.

pag. 582. *ULMUS effusa.*

*Ulmus montana* foliis duplicato-serratis acu-  
minatis basi inæqualibus, floribus pedun-  
culatis effusis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p.  
282.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 1887.

pag. 583. *SWERTIA perennnis.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 1441.*

*Hab.* Porro in vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen* prope *dem Weisbad* non infrequens, ubi eam vidi 1818.

*Nota.* Post meritissimum *Vulpium* in monte *Feldberg* *Brisgoviae* vidi 1805 et sequ.

pag. 585. *GENTIANA lutea.*

*Hab.* In monte *Gniebis* inter *Griesbach* et *Rippolsau*, nec non *auf den Hornisgründen* retro *dem Mummelsee* nuper vidi. In Principatu *Fürstenbergensi* in collibus herbidis prope *Donaueschingen*, et alibi frequens. In Principatu superiori retro *Mäskirch im Donauthale*. In vicina helvetia retro *St. Gallen*, prope *dem Weisbad am Wildkirchlein*, *Gamor*, *Kasten* et *Sentis* ubi eam vidi 1818.

pag. 587. post *GENTIANAM purpuream.*

384. \* *GENTIANA punctata* corollis subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, calycibus membranaceis truncatis. *Frælich. l. c. p. 24. n. 4.*

*G. punctata* corollis subquinquefidis campanulatis punctatis, calycibus quinquedentatis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 529.*

*G. foliis ovato-lanceolatis, nervosis, floribus campaniformibus, fasciculatis, creberrime punctatis.* *Hall. hist. n. 638.*

*G. major, flore punctato.* *Bauh. pin. 187.*

*G. major, pallida, punctis distincta. Clus. hist. 1. p. 312.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. 5. tab. 28.*

*Germ. Punctirter Enzian.*

*Gall. Gentiane ponctuée.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses retro *dem Weisbad, auf dem Gamor*, ubi post *Gesnerum* vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2

*Radix* teres, crassa, subramosa, extus fusca, rugulosa, intus albida. *Caulis* erectus, sesquipedalis, bipedalis, firmus, nitidus, viridis, basi sæpe purpurascens. *Folia* ovata, acutiuscula, inferiora petiolata, superiora sessilia paullo angustiora, acuminata, basi coadunata, quinquennervia, nitida, læte viridia. *Bractæ* duolaterales, lanceolato-ovatae, acuminatae nervosae, flore breviores. *Flores* terminales, verticillati, subquini et subsolitarii in axillis foliorum superiorum, subsessiles. *Calyx* campanulatus, 5-6-7 fidus, membranaceus, albidus, subtruncatus. *Corolla* campanulata, ampla, diaphana, pallide sulphurea, 3-6-7 fida, punctis purpureis interdum cœrulescentibus, irregularibus inordinatis, creberrimis sparsa.

pag. 591. *GENTIANA acaulis.*

$\alpha$  et  $\beta$ . *Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses, retro *St. Gallen*, prope *dem Weisbad am Wildkirchlein, Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

pag. 593. *GENTIANA verna*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 493.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen* et prope *dem Weisbad*, ubi eam abundanter 1818 vidi.

pag. 593. *GENTIANA utriculosa*.

*Icon.* Sturm. *Deutschl. Fl.* 1. Fasc. 50.

*Hab.* In pratis montosis prope *Schellingen am Kaiserstuhl* in *Brisgovia*.

pag. 595. post *GENTIANAM utriculosam*.

389. \* *GENTIANA bavarica* corolla quinquefida infundibuliformi, foliis ovatis obtusis, radicalibus confertis imbricatis, caulinis minoribus. *Fræhlich. l. c. p.* 71. *n.* 27.

*G. bavarica* corolla quinquefida infundibuliformi serrata, foliis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1. *p.* 331. — *Hoffm. Fl. Germ.* 87. — *Roth. Fl. Germ.* 2. *p.* 286.

*G. serpyllifolia* corolla quinquefida infundibuliformi: lobis integerrimis acutiusculis, foliis obtusis. *Lamarck Encycl.* 2. *p.* 640.

*G. foliis ovatis, caule unifloro.* *Hall. hist.* *n.* 645.

*Gentianellæ alpinæ species* 1. *Gesner. ed. Schmid.* 2. *p.* 45. *tab.* 27. *fig.* 85.

*Gentianella autumnalis serpyllifolia bavarica*



major. *Barr. obs.* 4. n. 26. *lc.* 101. *superior.*

*Gentianella elegantissima*, majuscula, radiculis reptantibus. *Camerar. hort. p.* 65. *tab.* 15. *fig.* 1.

*Icon.* *Sturm. Deutschl. Fl.* 1. *Fasc.* 41.

*Germ.* *Bayerischer Enzian.*

*Gall.* *Gentiane de Baviere.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* supra *dem Donauthale* in pascuis montosis calcareis retro *Werrewag* et *Stetten am Kalten Marckt*, nec non in vicina helvetia prope *St. Gallen*, circa *dem Weishad am Gamor* et *Kasten* non infrequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. 24

*Radix* ramuloso-fibrosa, tenuis, multiceps, *Caules* ex radice plures, adscendentes, 1-2-3-5 unciales, teretiusculi, foliosi, uniflori. *Folia radicalia* conferta, imbricata, caulinis minora, obovata; *caulina* remota, basi coadunata, ovata, omnia obtusissima, crassiuscula, enervia. *Flos* terminalis, solitarius, pedunculatus, erectus, sæpe foliis ultimis subinvolutus. *Calyx* infundibuliformis, pentagonus, alis angustis carinatus, viridi-cœrulescens, quinquefidus: *laciniis* lanceolatis, acuminatis, tubo corollæ dimidio brevioribus. *Corolla* infundibuliformis, pulcherrime saturate cœrulea, *tubo* elongato cylindrico, striato; *limbo* quinquefido: *laciniis* ovatis, acutiusculis seu obtusis serrulatis, patentibus.

Variat in subalpinis alpinisque statura majori et minori. *Corollae* laciniis integerrimis sive serrulatis,

culatis, majoribus et minoribus. Folia quo magis caulis longitudine decrescit, eo latiora, rotundiora et imbricata sunt, ac rosulas compactas efformant. Froelich. l. c.

Individua vix unciam alta, aliaque bi-tri, quinqueuncialia, in alpinis helvetiae et in Pyrenaeis vidi.

pag. 596. *GENTIANA Amarella.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 236.*

**Nota.** Pro diverso loco natali calcareo, siliceo, demissiori, montoso, subalpino, alpino, siccio, humido et uliginoso maxime variat. Caule plus minusque ramoso, interdum a basi ramoso subpyramidalis: *G. pyramidalis*. Nees ab Esenb. bartmündige Enzianen in Nov. Act. Acad. Caes. Nat. Cur. l. p. 164. Caule brevi ramoso basi subalato: *G. uliginosa*. Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 1347. Reichenb. Ic. pl. rar. Cent. I. p. 46. tab. 58. Nees ab Esenb. l. c. p. 167. Caule a basi ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis obtusis: *G. obtusifolia*. Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 1347. Nees ab Esenb. l. c. p. 163. *Hippion obtusifolium*. Schmidt Bohem. n. 126. Roem. Arch. 1. p. 22. tab. 2. fig. 3. Caule elongato inferne ramoso, foliis obtusiusculis: *G. spathulata*. Reichenb. l. c. p. 78. tab. 92. *G. montana*. Nees ab Esenb. l. c. p. 170. et *G. chloraefolia* ej. Caule superne ramoso, ramis internodiis longioribus, foliis ovato-lanceolatis: *G. germanica*. Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 1346. Nees ab Esenb. l. c. p. 174. Sturm. Deutschl. Fl. Fasc. 23. Ic. Caule subsimplici superne subcorymboso, foliis ovato-lanceolatis angustioribus: *G. gracilis*. Nees ab Esenb. l. c. p. 176. Caule simplicissimo unifloro: *G. uniflora*. Willd. Linn. Sp. pl. 1. p. 1346. Nees ab Esenb. l. c.

p. 177. *Hippion gentianella*. Schmidt.  
Bohem n. 128. Roemer. Arch. p. 23.  
tab. 3. fig. 4

Varietates 7-8 immo adhuc plures in ter-  
ris Badensibus et adjacentibus conspicuae sunt.

390.\* *GENTIANA campestris* corollis  
quadrifidis hypocrateriformibus obtusis,  
fauce barbatis, calycis laciniis duabus  
maximis. *Fræcl. l. c. p. 91. n. 56. var. β.*

*G. campestris* corollis quadrifidis fauce bar-  
batis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 334.*

*G. campestris* corolla quadrifida hypocrate-  
riformi fauce barbata, laciniis calycinis  
exterioribus maximis. *Smith. Fl. Brit.*  
1 p. 288.

*G. faucibus barbatis, calycis foliis quaternis  
alterne majoribus. Hall. hist. n. 650.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 237.*

*Germ. Feld - Enzian.*

*Gall. Gentiane des champs.*

*Hab.* In montosis et subalpinis. In montis  
*Feldberg* Brisgoviae pascuis siccis cum *Or-  
chide globosa*. In Ditione Basileensi in  
monte Muteto. In Alsaliae monte *Ballon*  
nuper legit *D. Griesselich*. In vicinia Prin-  
cipatus superioris apud Abbatiscellenses re-  
tro *St. Gallen* et prope *dem Weisbad*  
ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri ma-  
tura. ☉

Primo intuitu maxime affinis *G. Amarellae*

cum qua sæpius confundebatur. Ab ea tamen differt: *Calyce* quadripartito: *laciniis* duabus ovatis, longe majoribus, amplissimis, basi dilatatis; *Corollis* quadrifidis: *tubo* magis cylindrico, *limbi* laciniis latioribus, obtusiusculis; *Filamentis* brevioribus; *Germine* sessili nec pedunculato.

Ne confundas varietatem *G. Amarellae* corollis quadrifidis instructam cum hac specie, a qua differt: *Calycis* laciniis uniformibus, nec duabus amplissimis.

## PLANTAE UMBELLATAE.

pag. 607. *ASTRANTIA major*.

*H a b.* In Principatu Fürstenbergensi prope *Unadingen* in collibus gypsaceis herbosis non infrequens, ubi eam vidi 1807.

pag. 608. post *ASTRANTIAM majorem*.

396. \* *ASTRANTIA minor* foliis digitatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 340.

*A.* foliis septenis digitatis serratis. *Hall. Stirp. helv. n.* 791.

*Helleborus niger* Saniculæ facie minor. *Bauh. Prodr. p.* 97.

*Helleborus minimus alpinus* *Astrantiæ* folio. *Boccone plant. rar. tab.* 5. *fig.* 3.

*Icon. Lamarck Illustr. tab.* 191. *fig.* 2.

*Germ. Kleine Astrantie.*

*Gall. Astrance mineur.*

*H a b.* In vicinia principatus superioris apud *Abbatiscellenses* ad montem *Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.



*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. 2

Differt ab *A. majori*: *Caule* digitali semipedali vix altiori, tenuiori. *Foliis* digitatis, senis, septenis novenisque. *Foliolis* lanceolatis, argute serratis, semper multo minoribus. *Umbella* multo minori. *Involucris* radiis acutioribus.

Plantula elegans, in horto culta, constantissima permansit.

pag. 610. *BUPLEURUM longifolium*.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* in *Donauthale* prope *Werrewag* ad rupium fissuras, ubi vidi 1818.

pag. 610. post *BUPLEURUM longifolium*.

398.\* *BUPLEURUM stellatum* involucellis membranaceis coadunatis, coloratis flosculos superantibus; universali subtriphyllo, foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis.

*B. stellatum* involucellis coadunatis: universali triphyllo. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 340.

*B. foliis* gramineis, involucri peculiari octies emarginato. *Hall. hist. n.* 771.

Perfoliata alpina angustifolia media. *Bauh. Prodr.* 129.

*Icon.* *Haller. l. c. tab. VIII.*

*Germ.* Sternförmiges Hasenöhrlein.

*Gall.* *Buplevre étoilée.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud

Abbatiscellenses retro *Weisbad* ad montem  
*Gamor et Hohen-Sentis*, ubi vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septem-  
 bri matura. 24

*Radix* prælonga, ramosa, multiceps, dura.  
*Caulis* erectus, semipedalis, pedalis et altior,  
 obsolete angulatus, striatus, lævis, nudiusculus.  
*Folia* radicalia numerosa, erecta, lineari-lan-  
 ceolata, subcurvata, integra, basi attenuata, api-  
 ce mucronulata, glabra, 5-6-7 uncias longa,  
 2-5 lineas lata. *Caulina* subnulla, aut saltem  
 unicum. *Umbella* terminalis. *Radii* 3-5-7,  
 erecti, filiformes, 1-2-3 uncias longi. *Invo-  
 lucrum* universale, 1-2-3 phyllum. *Foliola*  
 inæqualia, sessilia, ovata, acuta, patentia, radiis  
 breviora, viridia, glabra. *Involucrum* parziale,  
 coadunatum, crenato-lobatum, membranaceum,  
 diaphanum, viridi albidum, lobulo singulo mu-  
 cronulatum, patentissimum, unciam latum, ro-  
 tundum, venis reticulatis rubellis pictum, flos-  
 culos superans. *Flosculi* pedicellati, parvi, pal-  
 lide albedo-lutescentes.

Planta omnino Involucellis peculiaribus, pul-  
 chra. Minime confundenda cum *B. pyrenaico*,  
 quod ab ea differt: Caule altiori. Foliis radi-  
 calibus in petiolum decurrentibus, lanceolatis, acu-  
 minatis, latioribus, 5-7 lineas latis; caulinis 2-  
 3 alternis, amplexicaulibus, cordato-lanceolatis. In-  
 volucellis pentaphyllis, subrotundis, basi tantum  
 subconnatis, longitudine flosculorum.

398. \*\* *BUPLEURUM angulosum*  
 involucellis pentaphyllis ovatis acutis,  
 flosculos superantibus; universali triphyl-  
 lo ovato, acuto, foliis radicalibus lineari-

lanceolatis, caulinis amplexicaulibus, ovato - lanceolatis.

**B.** *angulosum* involucellis pentaphyllis orbiculatis, universali triphyлло ovato, foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 341. *an?* (*excl. var. β.*)

**B.** foliis radicalibus gramineis, caulinis ovato - lanceolatis amplexicaulibus, calycibus umbellarum quinquefoliis. *Hall. hist. n.* 770. *var. a. magna, omnino.*

*Germ.* Eckiges Hasenöhrlein.

*Gall.* Buplevre angulé.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses, *auf dem Hohen - Sentis*, a me observatum 1818. In convallibus montis *Jurassi t. Hallero.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matura. 4

*Radix* gracilis, longa, multiceps, dura. *Caulis* sesquipedalis et altior, erectus, striatus, glaber, simpliciusculus, quandoque superne ramis aliquot instructus. *Folia* radicalia numerosa, linearia, acuta, in petiolum decurrentia, lineam ad duas lineas lata, 4 - 5 uncias longa, glabra; *Caulina* alterna, 2 - 3 sessilia, amplexicaulia, ovato - lanceolata, angusta. *Umbella* terminalis. *Radii* 7 - 8 - 9, erecti, filiformes, circiter biunciales. *Involucrum universale* triphyllum. *Foliola* sessilia, inæqualia, late ovata, acuta, mucronulo terminata, 4 - 6 lineas longa, 3 - 4 lineas lata, patentia, viridia, glabra. *Involucrum parziale* quinquephyllum: *Foliola* ovata, acu-

ta, 3 lineas longa, 2 lata, subtus nervoso-costata, flosculos superantia.

**Nota.** Linnaeus sine dubio sub *B. anguloso*, longe aliam speciem comprehendebat, involucellis orbiculatis, non ovatis acutis. Ad quam citat *Perfoliatam alpinam angustifoliam* majorem, folio anguloso *Bauh. Prodr.* 129 non in helvetia sed in Pyrenaeis obviam, quae ut ex descriptione *Bauhini* patet, ad *B. pyrenaicum Gouani* pertinet.

**398.\*\*\* BUPLEURUM *ranunculoides***  
involucellis pentaphyllis lanceolatis obtusis aristatis flosculos superantibus: universali subtriphylo, ovato acuminato, foliis radicalibus linearibus angustatis, caulinis subamplexicaulibus brevioribus linearibus.

*B. ranunculoides* involucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus: universali triphylo, foliis caulinis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 342.

*Bupleurum.* *Hall. hist. n.* 770. *var. β.* humilis alpina, vix dodrantalis, unico folio.

*Perfoliata alpina angustifolia*, minima. *Bauh. Prodr. p.* 130.

*Perfoliata minor foliis gramineis.* *Bauh. hist.* 3. p. 199.

*Perfoliatum gramineum helveticum alpinum pumilum*, facie ranunculi. *Lobel. Icon.* 137.

*Germ. Ranunkelartiges Hasenöhrlein.*

*Gall. Buplevre ranunculé.*



*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscelesenses retro *dem Weisbad auf dem Hohen-Sentis*, ubi vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 4

*Radix* longa, gracilis, dura multiceps. *Caulis* palmaris, pedalis, flexuoso-erectus, teres, tenuis, glaber, simpliciusculus. *Folia* radicalia numerosa, erecta, linearia, acuta, angustata, 5-7 uncias longa, semilineam vix lata; *Caulina* alterna, 2-3-5-6, sessilia, semiamplexicaulia, breviora, 1-2 uncias longa, linearia, subcurvata, radicalibus angustiora. *Umbella* terminalis. *Radii* 5, sæpe 6, interdum 7, filiformes, tennes, subinæquales, semiunciam ad duodecim lineas longi. *Involucrum universale*, 1-2-3-phyllum: *Foliolis* ovato-lanceolatis, acuminatis inæqualibus, 4 ad 7 lineas longis. *Involucrum* parziale, pentaphyllum. *Foliola* æqualia, lanceolata, obtusa, apice mucronata, subtus nervoso-costata, pulchella, *Flosculis* sublongiora, sæpius ex fusco-purpurascentia.

*Nota.* Plantam nostram in helvetiae alpinis obviam, descripsi.

Individua passim in Pyrenaeis lecta, recedunt ab helveticis: Caulibus minus tenuibus. Foliis radicalibus caulinisque, linearilanceolatis, duplo triplove latioribus, saturatius viridibus. Involucra et Involucella, ut in helveticis speciminibus, et purpura tincta sunt.

pag 613. *BUPLEURUM Pollichii.*

Non est peculiaris species, sed mera varietas *Bupleuri tenuissimi* Linn.

*Bupleurum tenuissimum* umbellis simplicibus

alternis subtrifloris, involucris pentaphyllis subulatis. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 292. Linn. Sp. pl. 1. p. 343. (omnino.)*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 475. (bona.) Flor. Dan. t. 1090.*

**Nota.** Bupl. tenuissimi specimina, in hispania a me lecta et descripta, a basi ad apicem ramosa, et quidem nunquam non ramosissima. Folia rigidiora et acutiora. Confer *Barrel. Icon. 1248.*

Individua *Pollichii*, similima a *Sowery* depictis.

pag. 617. *TORILIS helvetica.*

*Caucalis infesta* umbellis multifidis confertis, involucro universali subnullo, foliolis pinatifidis, ramis divaricatis. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 299.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1314. Curtis. Fl. Lond. tab. 23. (sub Caucalide infesta.)*

pag. 619. post *TORILEM Scandicinan.*

404. \* *TORILIS nodosa* umbellis oppositifoliis subsessilibus glomeratis, foliis bipinnatis strigosis, caule prostrato.

*Tordylium nodosum* umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 346. Hoffm. Fl. Germ. p. 92.*

*Caucalis nodosa* umbellis lateralibus simplicibus subsessilibus, caule prostrato. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 299. Scop. Carn. n. 315. Roth. Fl. Germ. 2. p. 309.*

*Caucalis nodosa*, echinato semine. *Bauh.*  
*pin.* 153. *Prodr.* p. 80.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. append. tab.* 24. *Sow.*  
*Engl. bot. tab.* 199.

*Germ.* *Seitenblüthiges Drehkraut.*

*Gall.* *Caucalide noveuse.*

*Hab.* In Brisgovia *am Kaiserstuhl* in arvis et  
ad margines agrorum, nec non in vineis  
prope *Altbreisach, Bükensohl et Achkarn*  
ubi eam vidi 1812 sequ.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. ☉

*Radix* fusiformis tenuis. *Caules* palmares,  
semipedales, subpedales et longiores, prostrati,  
teretes, ramosi, foliosi, retrorsum strigulosi. *Fo-*  
*lia* alterna, bipinnata. *Pinnulae* incisae, pinnati-  
fidae. *Umbellae* oppositifoliae laterales, subsessi-  
les, dense glomeratae. *Flores* albi.

*Nota.* Rariorem Florae civem agnoscas.

pag. 625. *CAUCALIS latifolia.*

*Icon.* *Sow. Engl. bot. tab.* 198.

pag. 626. post. *CAUCALIDEM.*

## CXXVI.\* TORDYLIUM.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n.* 463.

*Umbella universalis* inaequalis, multiplex.  
*Partialis* similis brevissima, plana. *Involucrum*  
*universale* polyphyllum, *foliolis* indivisis. *Par-*  
*tiale* dimidiatum, extrorsum umbellula longius.  
*Flosculi* omnes fertiles, *disci* æquales: *radii* ex-

timo petalo maximo bipartio. *Semina* subrotunda fere plana, margine elevato - crenulato.

408.\* *TORDYLIUM maximum* umbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso - serratis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 345. *Hoffm. Germ.* p. 92. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 349. *Scop. Carn.* n. 319.

*T. maximum* umbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso - serratis, caule setis deflexis aspero. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 295.

*T.* foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, seminibus limbo lævi. *Hall. helv.* n. 811.

*Caucalis* major semine minus pulchro hirsuto. *Bauh. hist.* 3. p. 85.

*Seseli creticum* majus. *Bauh. pin.* p. 161. *Tabernæmont.* p. 308. *Icon.*

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr.* tab. 142. *Sow. Engl. Bot.* tab. 1173.

*Germ.* *Gröster Zirmet.*

*Gall.* *Tordyle élevée.*

*Hab.* In Palatinatus ruderatis t. *D. Kochio et Ziz.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

*Radix* fusiformis. *Caulis* erectus, 3-4 pedalis, sulcatus, foliatus, ramosus, setis deflexis scaber. *Folia* impari-pinnata, caulina: foliolis lanceolatis elongatis, inciso - serratis setulosis. *Pedunculi* oppositifolii, elongati. *Flores* albi, sæpe rubicundi.



Ad rariores Florae cives pertinet.

Individua grandosa, in Galliae et Hispaniae ruderalis vidi.

pag. 629. **BUNIAM** *Bulbocastanum*.

*Hab.* Prope *Weinheim* in agris non infrequens ubi vidi cum amicissimo *Heinse* 1813.

pag. 632. **CONIUM** *maculatum*.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* prope *Rippur* frequens.

pag. 640. **SELINUM** *Lachenalii*.

Est *Seseli pyrenaicum* Linn. Ab hinc tempore individua perfectiora florifera, ex monte *Bloutberg* Alsatiæ a meritisimo *D. Nestlero* obtinui, quæ omnino *Selinum pyrenaicum* Gouani seu *Seseli pyrenaicum* Linn. repræsentant.

*Icon.* Propria.

pag. 643. **ATHAMANTA** *Libanotis*.

*Icon.* Sow. Engl. bot. tab. 158.

*Hab.* Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut*. t. *D. Wibelio*. In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthale* in rupibus calcareis graminosis *auf Werrewag* non infrequens, ubi eam vidi 1816. In Principatu *Fürstenbergensi* prope *Engen im Griechenthal* passim vidi.

pag. 645. **ATHAMANTA** *cretensis*.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris, apud *Abbatscellenses* retro *dem Weisbad am Wildkirchlein et Gamor* ubi eam vidi 1818.

pag. 656. *LASERPITIUM latifolium*.

*Icon. Fl. Dan. tab. 1515.*

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi prope *Undingen* in collibus gypsaceis, ubi eam vidi 1807.

*Varietatem:* Foliis pubescentibus, prope *Wertheim* legit optimus *Mertin.* 1822. Minime confundenda cum *L. Cervaria* nostra, a qua differt: foliis multo majoribus denticulatis, (non argute serratis) pubescentibus, mollibus, non hispidis scabris.

pag. 658. post *LASERPITIUM Cervaria*.

425. \* *LASERPITIUM prutenicum*  
foliolis lanceolatis integerrimis: extimis coalitis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 557. Roth. Fl. Germ. 2. p. 361. — Hoffm. Fl. Germ. p. 97.*

*L. daucoides prutenicum*, viscoso semine.  
*Breyn. Cent. 167. tab. 48.*

*L. minus Rivin. pent. t. 23.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 153. Flor. Dan. tab. 1751.*

*Germ. Preussisches Laserkraut.*

*Gall. Laser de Prusse.*

*Hab.* Prope *Wertheim* in virgultosis et agris inter *Külsheim* et *Königsheim* ubi legit *Mertinus* 1821. In prato sylvarico prope *Igelheim* circa *Speier*. Circa *Mainz* teste *D. Kælero et Ziz.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matura, 4

*Radix* fusiformi - cylindrica. *Caulis* sesquipedalis et altior, erectus, sulcato - angulatus, ramosus, hispidus. *Folia* bipinnata, subtus ad costam et marginem hispida: *foliolis* pinnatifidis: *laciniis* ovatis, acutis. *Umbella* terminalis, multiradiata, alba. *Radix* rigidi, hispidi. *Involucrum Involucellumque* 7-9 phyllum, reflexum, margine membranaceum, subciliatum.

Ad rariores Florae cives pertinet. Semina acria, aromatica.

425.\*\* LASERPITIUM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 357.

*L.* foliis duplicato - pinnatis, pinnulis integerrimis lanceolatis simplicibus et ternatis. *Hall. hist. n.* 794.

*Siler montanum.* *Moris. hist.* 3. p. 276. *S.* 9. *tab.* 3. *fig.* 2.

*Ligusticum* quod *Seseli* officinarum. *Bauh. pin.* 162.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 145.

*Germ.* *Laser. Laserkraut.*

*Gall.* *Laser Siler.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiszellenses retro *dem Weisbad* ad montem *Gamor* in rupibus calcareis, ubi vidi 1818. In monte Jura passim.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturatione. 4

*Radix* ramosa, crassa. *Caulis* sesquipedalis, tripedalis et altior, striatus, glaber, ramo-

sus. *Folia* ampla, duplicato-pinnata. *Foliola* simplicia aut tripartita, longe lanceolata, angusta, integra, glabra, apice obtusiuscula, glaucoviridia. *Umbella* terminalis magna, multiradiata, alba. *Involucrum* reflexum. *Involucellum* polyphyllum angustum. *Semina* fusco-cinerea, aromatica.

*Pharm. SILERIS MONTANI Semina.*

Fragrantia, amara, aromatica, carminativa, stomachica, diuretica. In medicina hodie nimis neglecta, alpicolis usitata.

pag. 665. *ANGELICA sylvestris.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 1128.*

pag. 667. post *ANGELICAM sylvestrem.*

429.\* *ANGELICA Archangelica* foliorum impari lobato. *Linn. Sp. pl. 1. p. 360. — Roth. Fl. Germ. 2. p. 360. — Hoffm. Fl. Germ. 99.*

A. foliis duplicato-pinnatis, ovato-lanceolatis, serratis. *Hall. hist. n. 807.*

*Angelica sativa. Bauh. pin. 155.*

*Angelica major. Dod. Pempt. 318.*

*Angelica I. Tabernæmont. p. 230. Ic.*

*Icon. Oed. Fl. Dan. tab. 206. Sow. Engl. Bot. tab. 2561. — Blackwell. tab. 496.*

*Germ. Engelswurtz. Garten-Angelic.*

*Gall. Angélique des Jardins.*

*Hab. In Vogesis ad montem Ballon t. Nestlero.*



Colitur passim in hortis cum primis rusticorum.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturatione. ♂

*Radix* fusiformi - cylindrica, crassa, carnosissima, intus albida, lactescens: succo lutescente, extus plus minusve rugosa, cinereo - rufescens, undique fibris teretibus, crassis elongatis descendentibus instructa. *Caulis* 3 - 5 pedalis, erectus, crassus, teres, glaber, lineatus, ramosus. *Folia* crasse petiolata, maxima, supradecomposita. *Foliolis* oppositis, ovatis, inciso - serratis: impari trilobo. *Aginae* amplae, ventricosae, membranaceae. *Umbellae* terminales, subglobosae, multiradiatae. *Radii* subaequales, pubescentes. *Umbellulae* globosae, multiradiatae. *Involucrum* universale submonophyllum, concavum, membranaceum, deciduum. *Involucella* polyphylla: *Foliolis* setaceis, reflexis. *Flores* albide flavescentes, omnes fere fertiles. *Semina* ovalia, utrinque obtusa, pallide cinerea, hinc plana, sulco longitudinali, inde convexa, dorso elevato angulis tribus parallelis, latere undique marginato.

*Pharm. ANGELICAE sativae Radix, Semina.*

*Radix* maxime aromatica, fragrans, acris, subdulcescens, amarus, calida, ad praestantissima medicamenta pertinet. In vasis vitreis bene clausis servanda. Oleum aethereum continet.

*Radix* recens fermentata, spiritum ardentem dat Moschi odore. Hall. l. c.

Petoli et rami recentes, saccharo conditi, gratissimi sunt, et mensis magnatum imponuntur. In hocce condicio parando, Parisienses excellunt.

*Semina* aromatica, fragrantia, grata.

pag.

pag. 675. *OENANTHE fistulosa*.

*Icon. Sow Engl. bot. tab. 363.*

*var* β. Radice tuberoso - fasciculata, extus fusca, intus albida, superne stolonifera.

*Hab.* Prope *Wertheim* in udis ad Mœnum ubi legit acutissimus *Mertinus*. *Ann.* 1821.

Differt a nostra *Oe. fistulosa*. Radice non fibrosa, sed tuberosa, fasciculata. *Tubera* sessilia, oblonga, quinque ad septem, unciam, sesquiunciam ad binas uncias longa, quatuor ad sex lineas lata. *Caulis*, *Stolones*, *Folia*, *Inflorescentia*, *Semina* exacte ut in *Oe. fistulosa*. *Involucrum univrsale* monophyllum, persæpe plane nullum. Vix ac ne vix specie diversa, ab *Oe. fistulosa*. *Linn. Cl. Smith. in Flor. Brit.* 1. p. 317. hanc plantam tuberosam stoloniferam descripsit sub *Oe. fistulosa*.

*Obs.* Radix in solo minus udo aquoso crassior evadit.

pag. 676. *OENANTHE Tabernamontani*. Deleatur syn. *Oe. pimpinelloides*. *Pollichii Fl. Palat. n.* 291. quod omnino ad *Oe. Lachenalii* nostram pertinere videtur. Deleatur porro: *Hab.* In Palatinatu transrhenano,

pag. 678. *OENANTHE Lachenalii*.

*Oe. rhenana Decand. Fl. Franc. VI.* pag. 506. *Hab.* In Palatinatu transrhenano in pratis paludosis inter *Dürckheim* et *dem Holzhof*, inter *Alzey* et *Oppenheim* in pratis udis passim.

pag. 679. *OENANTHE Pollichii.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 548. (sub peucedanifolia.)*

*Hab. Am Kaiserstuhl* Brisgoviae *in der Faulenwag* frequens, ubi vidi 1818.

pag. 683. *PHELLANDRIUM Mutellina.*

*Hab. In monte Feldberg* Brisgoviae, ubi vidi 1805. In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses retro *dem Weisbad, am Gamor, Kasten et Sentis* in pascuis frequens, ubi vidi 1818.

pag. 685. *CICUTA virosa.*

*Hab. In Principatu Fürstenbergensi prope Donaueschingen* abunde.

pag. 713. *SESELI annuum.*

*Hab. In Brisgovia am Kaiserstuhl cum Sesele Hippomaratro* frequens: *Varietas* caule vaginisque rubellis.

pag. 715. *SESELI Hippomarathrum.*

*Hab. In Brisgoviae monte Kaiserstuhl* in pascuis asperis prope *Rothweil* frequens, ubi vidi 1807.

pag. 720. *ANETHUM Fœniculum.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 120. Planta bien-nis.*

460.\* *ANETHUM graveolens* fructibus compressis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 377. — Hoffm. Fl. Germ. p. 106.*

A. hortense. *Bauh. pin.* 147.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1572. *Blackw. tab.* 545.

*Germ. Dill. Gemeine Dill.*

*Gall. Aneth odorant.*

*Hab.* Inter segetes Lusitaniæ, Hispaniæ, et circa Astrachan. Colitur passim in hortis, agris et vineis.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

*Radix* fusiformi-cylindrica, ramosa, descendens, alba. *Caules* sæpissime plures ex una radice, erecti, 2-3 pedales, remote ramosi, geniculati, glabri, striati: *striis* alternis parallelis albis rubicundisque, rore glauco tincti. *Folia* alterna, petiolata, glabra, duplicato-pinnata: *pinnis* pinnatifidis, *laciniis* subulatis, acutis. supra planiusculis. *Petioles* teretes, albide striati, basi vaginati. *Vagina* basi amplexicauli, lanceolata, arcta, concava, striata. *Umbellæ* terminales, amplæ, planæ, pedunculatæ, nudæ, multiradiatæ. *Involucrum* nullum. *Corollæ* luteæ. *Semina* ovata, utrinque compressa-plana, striata, glabra.

*Pharm. et culin. ANETHI Herba. Flores. Semina.*

Tota planta aromatica, odorata, fragrans. Oleum continet æthereum dilute citrino-aureum.

Herba Anethi tenerior, ut et Umbellæ florentes, pro vario usu in culinis adhibentur.

Semina in officinis pharmaceuticis sæpe cum seminibus Foeniculi confunduntur.



pag. 726. post *PIMPINELLAM dissectam*.

464. \* *PIMPINELLA Anisum* foliis radicalibus trifidis incis. *Linn. Sp. pl.*  
1. p. 399.

*Sison Anisum. Spreng. Umbell. Prodr.*  
p. 55.

*Anisum foliis radicalibus simplicibus. Hort.*  
*Cliff.* 107.

*Anisum vulgare. Clus. hist.* 2. p. 202.

*Icon. Blackw. tab.* 574.

*Germ. Anis - Pimpinelle. Anis.*

*Gall. l'Anis.*

*Hab.* In Aegypto. Colitur in Brisingia am  
*Kaiserstuhl* prope *Altbreisach* in agris  
hortisque.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septem-  
bri matura. ☉

*Pharm. ANISI Semina.*

Aromatica, dulcescentia, suaveolentia, grata,  
carminativa, lactifera. Oleum ex seminibus destil-  
latum, citrinum, dulce, maxime anisatum, in fri-  
gore congelatur.

*Semina* rite mundata et matura, in vasis vitreis  
obturatoris servanda.

*Nota.* Planta in loco citato, ubi optime venit,  
et semina maturat, magis colenda et propa-  
ganda est.

## PENTANDRIA TRIGYNIA.

pag. 740. *SAMBUCUS nigra*.

*Nota.* Varietatem *Sambuci nigrae insignem*

maxime memorabilem monstrosam, in horto Carlsruhensi (ex horto Parisiensi) possidemus Ramis ramulisque monstrose coalitis implexis curvatis, compressis. Cymis multipartitis duplo triplove majoribus, Calycibus 10-15-20-25 partitis, Corollis majoribus copiosioribus 10-15-20-25 fidis. Staminibus 10-15-20-25. Stigmatibus 6-12-18-24. Baccis majoribus. Seminibus copiosioribus. Folia majora. Flores odorati ut in *S. nigra*. Ex seminibus terrae commissis obtinuimus *S. nigram* non monstrosam.

## PENTANDRIA TRIGYNIA.

pag. 744. ante STAPHYLEAM.

## CLV. \* RHUS.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 502.*

*Calyx* quinquepartitus, inferus, erectus, persistens. *Corolla Petala* quinque ovata, erecto-patentia. *Germen* superum, subrotundum. *Stigmata* tria, cordata, parva. *Bacca* subrotunda, unilocularis. *Semen* unicum, subrotundum, osseum.

474. \* *RHUS Cotinus* foliis simplicibus obovatis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 583.*

*Rhus* racemis plumosis, foliis ovatis. *Hall. helv. n. 827.*

*Cotinus coriaria. Dod. Pempt. 780. Du Ham. arb. 1.*

*Cocconilea s. Coggygia. Bauh. pin 415. Clus. hist. rar. p. 16. Icon.*

*Coccygia Plinii et Cotinus Plinii. Tabernæmont. p. 1458 et 1459. Icones.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 210. Du Ham. arb. 1. tab. 78. — Pfleger arb. et frut.*

*Germ. Perucken-Baum. Perucken-Sumach. Gelbholz. Viset. Visetholz.*

*Gall. Fustet.*

*Hab.* In Carniolia, Helvetia, Austria et Sibiria. Hospitatur in hortis præsertim anglicis *Carlsruhe, Ettlingen, Schwetzingen, Favorite, Baden, Rothenfels, Lahr, Zell am Hammersbach* et passim in hortis rusticorum. In ditione Basileensi prope *Arlesheim*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. h

*Frutex* quandoque arbuscula. *Rami* erecti, alterni. *Folia* alterna petiolata, simplicia, obovata, integra, firma, venosa, glabra, læte viridia. *Flores* terminales racemoso-paniculati. *Panicula* pulcherrima, plumosa, pallide purpurascens.

Hyemes apud nos optime fert.

*Folia* digitis trita suaveolentia. *Cortex* et lignum præsertim radicis præbent colorem flavum et rubellum, in arte tinctoria ab antiquissimis temporibus notum. Hinc Plinius: In Appennino frutex, qui vocatur *Cotinus*, ad linamenta modo Conchylii coloris insignis. Libr. 16. Cap. 18.

Magis omnino in regionibus colliculosis apricis colenda et propaganda.

pag. 748. *CORRIGIOLA littoralis.*

*Hab.* Porro in Brisgovia prope *Tryberg*, ubi eam vidi 1814.

pag. 753. *STATICE Armeria*.

*var. β. alpina* capitulis majoribus purpureis.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen am Wildkirchlein, Gamor et Kasten* ubi eam vidi 1818.

*Nota.* Vix specie diversa, à *St. Armeria*. In horto Carlsruhensi culta, tertio jam anno in omnibus partibus simillima *Armeriae*.

479.\* *STATICE plantaginea* scapo tereti scabriusculo, calycis communis foliolis exterioribus oblongo-ovatis acutis, interioribus oblongis obtusis, foliis lanceolatis planis acutis trinerviis. *Willd. Enum. pl. p. 334. (sub Armeria plantaginea.)*

*Germ.* *Wegerichblättriges Nägeleingras*.

*Gall.* *Armerie à févilles de Plantain*.

*Hab.* In Palatinatu transrhenano prope *Kaiserslautern* in sabulosis apricis siccis sterilibus *t. D. Kochio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* praelonga, fibrosa. *Scapi* plurimi, sesquipedales, erecti, teretes vel compressiusculi, scabriusculi, tenues. *Folia* radicalia cæspitosa, lanceolata, acuta, plana, basi attenuata, trinervia, firma, margine membranacea, glauco-viridia. *Capitulum* subrotundum magnitudine *St. Armeriae* et subminus. *Calycis* communis foliola tria exteriora, ovato-oblonga, cuspidata, interiora oblonga, obtusa, longitudine exteriorum. *Petala* dilute rosea.



Minime confundenda cum *St. cephalotes* seu *St. Armeria majori* Jacqu Hort. Vind. tab. 42 a qua differt: Scapis tenuioribus, foliis minoribus multo angustioribus. Capitulo triplo semper minore.

In horto Carlsruhensi per plures annos, cum *St. Armeria majori* Jacqu. culta, constantissima.

pag. 760. *LINUM Radiola.*

*Hab.* Prope *Waldulm* inter *Achern* et *Oberkirch* in ericetis sabulosis sterilibus ubi legit *Alexander Braun*, abunde. Prope *Wertheim* ad mœnum in pratis arenosis an der *Bildeiche*. t. D. *Wibelio*.

pag. 762. *DROSERA rotundifolia.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 867.

pag. 764. *DROSERA longifolia.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 868.

Post *DROSERAM longifoliam.*

486. \* *DROSERA anglica* foliis oblongis obtusis radicalibus, floribus octogynis, capsulis quadrivalvibus. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 347. — *Huds. Fl. Angl.* 1. p. 135.

*Rorella longifolia maxima.* *Raj. Syn.* 356.

*Ros Solis major, longiore folio et erectiore.*

*Moris. Hist. Sect.* 15. tab. 4. fig. 1.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 869. *Flor. Dan.* tab. 1093. (*sub. longifolia.*)

*Germ.* *Englischer Sonnenthau.*

*Gall.* *Rosée du Soleil d'Angletaire.*

*Hab.* In monte *Feldberg* Brisgoviae cum *Scheuchzeria palustri* et *Carice limosa*, ubi eam vidi 1805 et sequ.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri Octobri maturat 2

Differt ab affini *C. longifolia*: *Scapis* duplo longioribus. *Foliis* radicalibus longius petiolatis, angustioribus, lineari-obovatis, longioribus. *Stylis* octo. *Stigmatibus* clavatis.

Ad rariore omnino Florae cives pertinet.

*Nota.* Omnia hucusque ab amicis mihi sub D. anglica missa specimina, ad *D. longifoliam* Linn. pertinent.

pag. 767. Post CRASSULAM.

### CLXIII. \* SIBBALDIA.

*Linn. Gen. Plant. ed. Schreb. n. 536.*

*Calyx* monophyllus semidecemfidus: *laciniis* semilanceolatis, æqualibus, patentibus, alternis angustioribus, persistentibus. *Corolla* *Petalata* quinque, ovata, calyci inserta. *Germina* quinque, ovata, brevissima. *Styli* a medio latere germinum, longitudine staminum. *Stigmata* capitata. *Capsula* nulla. *Calyx* connivens in sinu *Semina* quinque, oblongiuscula condens.

487.\* *SIBBALDIA procumbens* foliis ternatis, foliolis cuneiformibus retusis, apice tridentatis.

*S. procumbens* procumbens foliis tridentatis.  
*Linn. Sp. pl. 1. p. 406.*

*Fragaria* foliis ternatis retusis tridentatis, flore calyci æquali, pentastemone. *Hall. hist. n.* 1116.

*Pentaphylloides* fruticosum minimum procumbens, flore luteo. *Pluckenet Alm.* 284. *tab.* 212. *fig.* 3.

*Icon. Oed. Fl. Dan. tab.* 32. *Sow. Engl. Bot. tab.* 897.

*Germ. Liegende Sibbaldie.*

*Gall. Sibbaldia couché.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, apud Abbatiscellenses, *auf dem Hohen-Sentis* in rupibus calcareis, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturatione. ♀

*Radix* multiceps, lignosa, extus fusco-nigra. *Gauliculi* biunciales, digitales et longiores, procumbentes, ramosuli. *Rami* alterni, erectiusculi. *Folia* alterna, petiolata, ternata. *Foliola* subpedicellata, cuneiformia, retusa, apice tridentata, pilosula. *Stipulæ* binæ, petiolo adnatæ, lanceolatæ, membranaceæ, margine albidæ. *Flores* terminales, subcorymbosi. *Calyces* persistentes, pilosi. *Corollæ* petala obovata, parvula, lutea, integra, longitudine calycis. *Styli* quinque, perraro decem.

---

---

# SUPPLEMENTUM

AD

## FLORAM BADENSEM

ALSATICAM ET CONFINIUM REGIONUM

CIS ET TRANSRHENANAM.

Tom. II.

---

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

---

\*\* *Fl. Spathacei s. Glumacei.*

pag. 1. post LEVCOJUM.

CLXV.\* GALANTHUS. *Cor.* supera sexpetala:  
petalis tribus interioribus brevioribus emarginatis.

\*\*\* *Fl. nudi.*

pag. 1. ante CONVALLARIAM.

CLXXIV.\* HEMEROCALLIS. *Cor.* infera sexpartita. *Stam.* declinata.

pag. 4. post LILIUM.

CLXVIII.\* UVULARIA. *Cor.* infera sexpetala erecta, basi fovea nectarifera.  
*Filamenta* brevissima.



CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

---

pag. 7. *LEUCOJUM vernum.*

*Ha b.* In pratis montosis prope *Rothenfels* copiose, ubi legit meritissimus *Hartweg* hor-  
torum magni Ducis Badensis Inspector. *Ann.*  
1818. in Marggraviatu superiori prope *Opfin-*  
*gen* in pratis. Circa *Wertheim* in sylvis ad  
montem *Triesenstein* t. *D. Wibelio.*

pag. 7. post *LEUCOJUM vernum.*

CLXV.\* *GALANTHUS.*

*Linn. Gen. Pl. ed Schreb. n. 547.*

*Spatha* oblonga, obtusa, compressa, latere  
plano dehiscens, marcescens. *Corolla Petala*  
tria oblonga, obtusa, concava, laxa, patula,  
æqualia. *Nectarium* cylindraceum, triphyllum,  
petalis dimidio brevius: *foliolis* petaloideis pa-  
rallelis, emarginatis obtusis. *Antheræ* in setam  
desinentes, conniventes. *Capsula* ovali-globosa,  
obtuse trigona, trilocularis, trivalvis. *Semina*  
plura, globosa.

489.\* *GALANTHUS nivalis* *Linn. Sp.*  
*pl. 1. p. 413. Roth. Fl. Germ. 2. p. 378. —*  
*Hoffm. Fl. Germ. p. 114.*

*G. uniflorus*, petalis alternis cordatis. *Hall. hist. n.* 1254.

*Leucojum bulbosum præcox*, minus. *Clus. hist. p.* 181 182.

*Icon. Redouté liliac.* 200. *Flor. Dan. tab.* 1741. *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 330. — *Sow. Engl. Bot. tab.* 19. — *Schkuhr. bot Handb. tab.* 89.

*Germ. Kleines Schneeglöckchen.*

*Gall. Galanthe.*

*Hab.* In *Brisgoviaë* montosis gramineis. Prope *St. Blasie* infrequens, ubi legit *D. Stætzle* med. studiosus. *Ann.* 1820. In montosis gramineis retro *dem Wildbad*, non infrequens. In ditione *Basilensi* circa arcem *Voxburg* prope *Delmont et Lenzburg* copiose *t. D. Hagenbachio.*

*Flor.* Primo vere. *Semina* Julio, Augusto matura. 4

*Radix* bulbosa, ovata. *Folia* 2 - 3, carinata, obtusa. *Scapus* teretiusculus, subcarinatus, subuniflorus. *Corolla* nutans, nivea. *Petalata* tria exteriora elliptica, patentia, majora; tria interiora (seu *Nectaria Linn.*) erecta, duplo minora, supra medium macula cordiformi viridi picta.

Plantula elegans, in hortis passim cum *Leucojo* verno notissima, ad rariores *Florae* cives pertinet.

In hortis saepe floribus impletis.

pag. 8. *NARCISSUS pæticus.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab.* 275.

pag. 9. NARCISSUS *Pseudonarcissus*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 17.

pag. 10. ALLIUM *Ampeloprasum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1657.

pag. 16. ALLIUM *Scorodoprasum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2441. *Flor. Dan.*  
*tab.* 1455.

pag. 17. ALLIUM *arenarium*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1358.

pag. 19. ALLIUM *carinatum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1658.

pag. 22. ALLIUM *vineale*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 1974.

pag. 23. ALLIUM *oleraceum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 488. *Flor. Dan.*  
*tab.* 1456.

pag. 27. ALLIUM *ursinum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 122.

pag. 31. ante LILIUM *bulbiferum*.

508.\* LILIUM *candidum* foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris.  
*Linn. Sp. pl.* 1. p. 433. *Hall. helv. n.*  
1231.

*Lilium album* flore erecto vulgare. *Bauh. pin.* 76.

*Lilium album. Tabernæmont. p. 1026. Icon.*

*Icon. Redouté liliac. t. 199. Curtis Mugaz. tab. 298. Blackw. tab. 11.*

*Germ. Weisse Lilien.*

*Gall. Lis blanc.*

*Hab.* In Palæstina, Syria. Hospitatur in multis hortis, præsertim rusticorum in convallibus, rarius passim in vinctis *im Bühlerthal* et in Brisgovia *am Kaiserstuhl* prope *Breisach et Küchlinsbergen*, ubi vidi 1812.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ♀

Planta notissima. *Corollæ* speciosæ, niveæ, suaveolentes, fragrantés.

*Pharm. LILII s. LILII ALBI Radix, Flores, Antheræ.*

Radices recentes mucilaginosæ, contusæ aut cum lacte coctæ, externe a monticolis aliisque passim ad tumores et ad maturandos abscessus, ambustaque præcipue adhibentur.

Goderus Elisabethæ Reginae Chirurgus, referente Gerardo et ex eodem Rajo, multos hydropè laborantes, sanavit radicis succo cum farina hordeacea mixto, pane scilicet ex istiusmodi massa confecto, aegro per mensem aut sex hebdomadas continuas exhibito, quo solo et non alio pane, per totum id tempus vesceretur.

Ex floribus recentibus parant mulierculæ rusticae aliaque infusionem in oleo nucum juglandium frigide presso, aut in oleo olivarum, panaceam anodynam domesticam, contra ambusta, lentigines, jctus insectorum. In Ischuria, regioni pubis inungitur sæpe maximo cum dolorum levamine, sed sit mite, non rancidum! Aqua Liliorum alborum ex floribus de-



stillata, tanquam insigniter Cosmetica ad nitorem faciei praesertim conciliandum usurpatur.

Pollen antherarum, seu Crocus Liliorum alborum (das Gelbe von weissen Lilien) ad pellendum foetum et accelerandum partum, nec non ad menstrua cienda, commendabatur. Juxta Crationem Joelem tantae potentiae est in expellendis mensibus, ut citra abortus periculum, gravidis adhiberi non possit.

Obs. Oleum Liliorum alborum in officinis pharmaceuticis saepe quammaxime rancidum, removi.

pag. 35. ante TULIPAM.

### CLXVIII. \* UVULARIA.

*Linn. Gen. Plant. ed. Schreb. n. 560.*

*Calyx* nullus. *Corolla* Petala sex, oblongo-lanceolata, acuta, erecta, longissima. *Nectarium*: fovea oblonga basi singuli petali insculpta. *Stamina Filamenta* sex brevissima, latiuscula. *Antheræ* longæ erectæ, corolla dimidio breviores. *Germen* subrotundum. *Stylus* semitrifidus filiformis staminibus longior. *Stigmata* simplicia, reflexa. *Capsula* ovato-oblonga, triangularis, trilocularis, acuta. *Semina* plura, subrotunda, compressa.

510.\* *UVULARIA amplexifolia* foliis amplexicaulibus cauleque glabris. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 93. — Waldst. et Kitaibl. pl. hung. 2. p. 182.*

*Uvularia* foliis amplexicaulibus. *Linn. Sp. pl.*

*pl.* 1 *p.* 436. — *Hall. hist.* 2. *n.* 1234.  
*Hoffm. Fl. Germ.* *p.* 118.

*Streptopus distortus* glaber : foliis amplexi-  
caulibus, pedicellis solitariis, medio di-  
storto - geniculatis. *Mich. fl. Amer.* 1.  
*p.* 200. — *Pursh. fl. Amer.* 1. *p.* 231.

*Streptopus amplexifolius.* *Decand. Fl. Franc.*  
*III.* *p.* 174. *Redouté liliac.*

*Smilax perfoliata ramosa*, flore albo. *Barr.*  
*Ic. rar.* 58. *tab.* 720.

*Polygonatum latifolium ramosum.* *Bauh.*  
*pin.* 303.

*Polygonatum latifolium quartum ramosum.*  
*Clus. hist.* 1. *p.* 276. *Ic.*

*Polygonatum tertium latifolium.* *Tabernæ-*  
*mont.* *p.* 1137. *Ic.*

*Icon.* *Redouté liliac.* 259. *Flor. Dan. tab.*  
1515. *Sturm. Deutschl. Flor.* 1. *Fasc.* 41.  
*Waldst. et Kit. l. c. t.* 107. *Schkuhr.*  
*Bot. Handb. tab.* 93.

*Germ.* *Stengelumfassendes Zäpfchenkraut.*

*Gall.* *Uvulaire embrassante.* *Sceau de Sa-*  
*lomon rameux.* *Laurier Alexandrin des*  
*alpes.*

*Hab.* In *Brisgoviae monte Feldberg am See-*  
*bug*, ubi eam vidi *Ann* 1812. In *Voge-*  
*sis* nec non in montis *Juræ* subalpinis um-  
brosis passim. In vicinia *Principatus su-*  
*perioris* prope *St. Gallen* legi *Ann.* 1818.

*Flor.* *Junio, Julio.* *Semina* *Augusto Septem-*  
*bri* *matura.* ♀

*Radix* ramoso - fibrosa. *Caulis* sesquipedalis, cubitalis, erectus, teres, glaber ramosus. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, distantia, integerrima, glabra, læte viridia. *Flores* pedunculati, sub foliis producti. *Pedunculi* medio geniculati, infracti, uniflori, nudi. *Flos* pendulus. *Corollæ* petala sex, ex lutescente - albida, interiora angustiora, exteriora basi gibba. *Capsula* (baccam referens) matura rubra, trilocularis, ovato - triquetra.

Nota. Ad rariores Florae cives pertinet.

pag. 36. *TULIPA sylvestris*.

*Icon.* Socv. *Engl. bot. tab.* 63. *Redouté liliac.* 163. *Sturm. Deutschl. Fl.* 1. *Fasc.* 29.

*Hab.* Prope *Neckarbischoffsheim* ubi eam vidi 1815 in palatinatu trans rhenum circa *Heidesheim* et prope *Grünstadt* copiose t. *Zeyhero*. In ditione basileensi in vineis montis Muteti, circa *Mænchenstein et Wyl.* t. *Cl. Hagenbachio*.

pag. 37. Sub *ORNITHOGALO luteo* nostro militant duæ diversæ species, nempe *O. luteum* et *sylvaticum*, quarum characteres hic stabiliendæ sunt.

512. *ORNITHOGALUM luteum* radice tribulbosa, scapo compresso tetragono nudo aut subunifolio, folio radicali sub solitario lineari-canaliculato; floralibus solitariis, binis, ternisve, pedunculis 1, 2, 3, simplicibus glabris subumbellatis, petalis lanceolatis obtusiusculis, glabris.

*O. luteum* folio radicali lineari solitario pla-

no, floralibus imis oppositis, pedunculis simplicibus subumbellatis, petalis obtusis glabris, bulbo aggregato. *Willd. Enum. p. 367.*

*O. luteum* (pratense) *Pers. Synops. p. 363.*  
*Usteri ann. XI. p. 8. tab. 2. fig. 1.*

*Germ. Gelbe Vogelmilch. Gelber Stern.*

*Gall. Ornithogale jaune.*

*Hab.* In agris, arvis, vineis, sepibus, passim frequens. Circa *Carlsruhe, Mühlburg, Durlach, Grötzingen* et alibi. (Perraro in pratis seu gramineis.)

*Flor.* Martio, Aprili. *Semina* Majo, Junio matura. 4

*Radix* tribulbosa. *Bulbi* subrotundo ovati, albidi. *Scapus* digitalis, palmaris et altior, compresso - tetragonus, glabriusculus, erectus, nudus. *Folium* radicale sæpissime unicum, lineare, canaliculatum, integrum, glabrum, lineam ad duas lineas latum, scapum superans. *Folia* floralia solitaria, sæpe bina, ternave, inæqualia, linearia, acuminata, apice subinflexa, e viridi-flavescentia, glabriuscula. *Flores* terminales, umbellati. *Pedunculi* 1-2-3 perraro 4, erecti, binas ad tres uncias longi, simplices, subtriquetri, glabri, uniflori. *Corollæ* patulæ, intus luteæ, extus viridescentes, margine albidæ. *Petalata* sex, lanceolata, obtusiuscula, septem ad novem lineas longa, lineam vix lata.

*Nota.* Bulbis nunquam solitariis, sæpissime tribus, perraro quatuor ad quinque facile distinguitur a sequente specie.

*Obs.* Plantulae juniores nondum florentes, ad bulbos tres, bulbulis numerosis pyramidatim aggregatis, instructae sunt.



Flores ante meridiem ab hora undecima, usque ad quartam post meridiem apertos observavit meritissimus *Mertinus*.

# 512. \* *ORNITHOGALUM sylvaticum*

bulbo solitario, scapo erecto, acutangulo, basi vaginato, folio radicali solitario, lineari-lanceolato, plano, glabro, floralibus binis ternisve, pedunculis 4-7-9, simplicibus umbellatis, petalis obtusis glabris.

*O. sylvaticum* folio radicali lineari-lanceolato solitario plano, floralibus imis oppositis, pedunculis simplicibus subumbellatis, petalis obtusis glabris, bulbo solitario. *Willd. Enum. p. 368.*

*O. luteum* (*sylvaticum*) *Pers. Synops. 1. p. 363.*

*O. luteum. Smith. Fl. Brit. 1. p. 362.*

*O. majus primum. Tabernæmont. p. 1021. Icon.*

Bulbus sylvestris. *Fuchs. hist. p. 169. Icon bona.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 21. (bona) (sub O. luteo.)*

*Germ. Gelbe Waldvogelmilch. Waldstern.*

*Gall. Ornithogale des bois.*

*Hab.* In sepibus, pomariis, pratis, gramineis passim non infrequens. Circa *Carlsruhe, Durlach, Grötzingen, Berghausen* et alibi, rarius in sylvis, vix in agris et vineis.

*Flor.* Martio, Aprili. *Semina* Majo, Junio matura. 4

Species omnino à præcedenti distincta : *Bulbo* solitario majori. *Scapo* crassiori, firmiori, acutangulo. *Folio* radicali scapum sæpissime basi vaginante, latiori, 4-5 lineas lato, apice subcanaliculato. *Pedunculis* copiosioribus, 4 7 9. *Foliis* floralibus sæpissime duobus, margine sæpe villosis. *Flores* ut in præcedenti specie.

Obs. Flores die nocteque apertos vidit Martinus.

Nota. Hanc speciem Linnaeus aliique sub *O. luteo* comprehendebant.

513. *ORNITHOGALUM minimum* radice bulbosa, bulbis binis, altero minimo, foliis radicalibus duobus rarius solitariis, linearibus angustis, laxis, scapo hirsuto longioribus, floralibus, 2-3-5 latioribus lanceolatis, pedunculis subramosis petalisque hirsutis, acutis.

*O. villosum* foliis radicalibus geminis: floralibus imis oppositis, pedunculis ramosis corymbosis petalisque hirsutis. *Marsch. v. Bieberst. Fl. Taur. Caucas.* 1. p. 274.

*O. minimum* (arvense) scapo angulato diphylo, pedunculis pubescentibus umbellatis ramosis. *Pers. Synops.* 1. p. 363.

*Germ.* Feinhaarige gelbe Vogelmilch.

*Gall.* Ornithogale hérissée.

Synonyma ulteriora ad *O. minimum*. *Flor. Badensis* allegata sunt.

*Radix* bulbosa, bulbulis binis albis ovatis,

altero minimo. *Scapus* uncialis, sesquiuncialis, digitalis et altior, angulatus, albide hirsutus. *Folia* radicalia sæpissime bina, (rarius unicum) linearia, angusta, lineam dimidiam lata, scapo longiora, laxa, striata. *Floralia* 2-3-5 interdum plura, inæqualia, lanceolata, latiora, apice curvata, hirsuta. *Pedunculi* subumbellati, subtrigoni, albide-hirsuti, subramosi. *Corollæ* patentes, luteæ. *Petala* lanceolata, 5-6 lineas longa, ultra lineam dimidiam lata, acutiuscula hirsuta.

*Variat.* In locis minus sabulosis, arvis, scapo, foliis radicalibus et floralibus minus hirsutis quandoque glabriusculis.

*Variat.* Bulbulis numerosis e scapo prodeuntibus.

*Obs.* Flores die nocteque aperti. *Mertinus.*

Amat loca sterilia sabulosa, hortorumque areas, ubi sæpe abundat.

pag. 41. *ORNITHOGALUM pyrenaicum.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 499. *Redouté liliac.* 254.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mœskirch* ad *Werrewag* in dumetis rarius, ubi vidi 1816.

pag. 42. *ORNITHOGALUM nutans.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1997. *Redouté liliac.* 253.

pag. 44. *SCILLA bifolia.*

*Hab.* In *Brisgovia* pratis prope *Gindlingen*

*et Merchingen, prope Heidelberg circa Schlierbach et Ziegelhausen t. D. Dierbachio. In ditione Basileensi prope Liestal in prato, prope Augustam, inter Sis-sach et Diegten. t. D. Hagenbachio.*

pag. 46. post *SCILLAM bifoliam*.

517.\* *SCILLA verna* radice solida, corymbo hemispærico paucifloro, bracteis lonceolatis obtusis, foliis linearibus canaliculatis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 364. — *Huds. Fl. Angl.* 1. p. 142.

*S. verna* bulbo tunicato, racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis, foliis linearibus canaliculatis radicalibus pluribus. *Ait. Hort. Kew.* 1. p. 445. — *Willd. Sp. pl.* 2. p. 129.

*Ornithogalum hispanicum minus. Clus. hist.* p. 188.

*Icon. Propria. Sow. Engl. Bot. tab.* 25.

*Germ. Frühlings Hyacinth.*

*Gall. Scille printanniere.*

*Hab.* In Principatu superiori prope *Kleinlausenburg* in agris arvisque sabulosis abunde, ubi eam detexit *Alexander Braun* 1820.

*Flor.* Martio, Aprili. *Semina* Majo matura. 4

Differt a *Scilla bifolia*. *Foliis* radicalibus numerosis, 5-7-8, angustioribus, linearibus, 5-8 uncias longis, lineam latis. *Corymbo* racemoso, pyramidali, 7-8-13 floro. *Corollis* minoribus. *Bracteis* longitudine pedicellorum. (*Corollæ* cœruleæ.)

*Nota.* Planta pulchella, pro *Flora Germanica nova*.



pag. 46. ante *ANTHERICUM ramosum*.

518.\* *ANTHERICUM serotinum* foliis planiusculis, scapo unifloro. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 444.

*A. serotinum* foliis semicylindricis, caulinis basi dilatatis, caule subunifloro. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 367.

*Phalangium serotinum. Redouté liliac.*

*Phalangium* foliis crassulis, scapo unifloro. *Hall. hist. n.* 1209.

*Bulbocodium alpinum juncifolium*, flore unico intus albo, extus squalide rubente. *Raj.* 3 p. 374. *tab.* 17. *fig.* 1.

Pseudo - *Narcissus* gramineo folio. *Bauh. pin.* 51. — *Prodr.* 27. — *Rudb. Elys.* 2. p. 64. *fig.* 9.

*Icon. Jacqu. Austr.* 5. *app. tab.* 38. — *Sow. Engl. Bot. tab.* 793. *Redouté l. c.* 270.

*Germ. Späte Lilienzaunblume.*

*Gall. Antheric serotine.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* in rupibus præaltis calcareis prope *Werrewag*, a me observatum *Ann.* 1816. In vicina helvetia, in agro Abbatis cellensi: *auf dem Hohen-Sentis*, ubi eam vidi 1818. *auf dem Hohen-Mesmer et Sattel t. J. Gesnero.*

*Flor.* Junio. *Semina* Septembri matura. 4

*Bulbus* oblongus. *Scapus* digitalis, palmaris, erectus, teres glaber, subuniflorus. *Folia* radicalia scapo langiora, semicylindrica, fili-

formia, glabra. *Flos* terminalis. *Corollæ* petala elliptica, æqualia, basi attenuata, intus alba, extus rubicunda.

In alpinis continuo nivis defluxum sequitur.

pag. 49. post *ANTHERICUM Liliago*.

**520.\*** *ANTHERICUM Liliastrum* foliis planis, scapo simplicissimo, corollis campanulatis, staminibus declinatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 445.

Hemerocallis *Liliastrum* scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis. *Linn. Hort. Cliff.* 138.

Hemerocallis floribus patulis secundis. *Hall. hist. n.* 1230.

Phalangium *Liliastrum*. *Redouté liliac.*

Phalangium magno flore. *Bauh. pin.* 29.

*Icon.* *Redouté liliac.* 255.

*Germ.* Lilienartige Zaunblume.

*Gall.* *Antheric à fleurs de Lise.*

*Hab.* In Principatus superioris vicina helvetia auf dem Hohen-Kasten t. Hallero.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. 24

*Scapus* simplex, pedalis, sesquipedalis erectus. *Folia radicalia* linearia, glabra, læte viridia longa. *Flores* terminales, spicato-racemosi, subsecundi. *Corollæ* ultra unciales, niveæ, campanulatæ, patulæ, subodoratæ, speciosæ.

Planta speciosa, in horto culta, mutationem non passa est.

pag. 59. post CONVALLARIAM.

# CLXXIV.\* H E M E R O C A L L I S.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 585.*

*Calyx* nullus. *Corolla* sexpartita infundibuliformi - campanulata. *Tubus* brevis. *Limbus* patens superne magis reflexus. *Filamenta* declinata. *Germen* subrotundum, sulcatum superum. *Stylus* filiformis longitudine staminum. *Stigma* obtuse trigonum, assurgens. *Capsula* ovato - triloba, trigona, trilocularis, trivalvis. *Semina* plurima, subrotunda.

527.\* *HEMEROCALLIS flava* corollis flavis, *Linn. Sp. pl. 1. p. 462. Hoffm. Fl. Germ. p. 125.*

*H. flava* foliis linearibus carinatis, petalis planis acutis, nervis petalorum indivisis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 197.*

*Asphodelus liliaceus luteus* I. *Tabernæmont. p. 1042. Icon. (bona.)*

*Lilio-Asphodelus luteo flore.* *Clus. hist I. p. 137.*

*Icon. Jacqu. hort. Vind. tab. 159. Redouté Liliacées. tab. 15. Schkuhr. bot. Handb. tab. 98. Sturm Deutschl. Fl. Fasc. 7.*

*Germ. Gelbe Affodill-Lilie.*

*Gall. Hemerocallis à fleurs jaunes.*

**Hab.** In Siberiæ et Hungariæ pratis udis. Colitur in hortis cumprimis rusticorum, ex quibus passim in prata adjacentia et pomaria emigrat.

**Flor.** Junio, Julio. **Semina** Augusto Septembri matura.  $\mathcal{N}$

Planta speciosa, floribus luteis facile dignoscenda, vix ullibi in germania et helvetia spontanea.

**Pharm.** *LILIO ASPHODELI Flores.*

Flores odorati.

Hodie exoleti. Olim ad emolientia, anodyna, resolventia, detergentia et aperitiva numerabantur.

527.\*\* **HEMEROCALLIS** *fulva* corollis fulvis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 462.

**H.** *fulva* foliis linearibus carinatis, petalis tribus interioribus obtusis undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramosis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 197.

Hemerocallis foliis ensiformibus, scapo paucifloro petalis lineatis undulatis. *Hall. helv. in addend.* p. 188. (excluso *Linnaei synon.*)

Lilio-Asphodelus puniceus. *Clus. hist.* 1. p. 137.

Asphodelus liliaceus rubens II. *Tabernæmont. p.* 1042. *Icon. (bona.)*

*Icon.* Redouté *Liliacées* 16. *Curtis Mag.* 64.

*Germ.* Braunrothe Affodill-Lilie.

**Hab.** In China. Hospitatur in hortis compri-



mis rusticorum ex quibus rarius in pomaria prataque adjacentia migrat.

*Flor.* Junio. *Semina* Julio, Augusto maturata. 4

Planta speciosa, facile floribus fulvis dignoscenda. Vix ullibi in helvetia spontanea, sed ex hortis migrata.

*Nota.* Halleri synonymon, Cl. Willdenow ad *H. flavam* citat, sed omnino ad *H. fulvam* pertinet.

Planta in horto Carlsruhensi ex seminibus culta, constantissima.

pag. 62. *HYACINTHUS racemosus.*

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 1391.

*Hab.* Prope *Weingarten* in vineis, rarius; in apricis gramineis ad Nicari ripas prope *Neuenheim et Neuburg* rarius t. *D. Dierbachio.* Prope *Wertheim* in pomariis vineisque t. *D. Wibelio.*

pag. 63.

529.\* *HYACINTHUS botryoides* corollis globosis uniformibus foliis canaliculato-cylindricis strictis. *Linn. Mant. p.* 366. — *Hoffm. Fl. Germ. p.* 123. *Roth. Fl. Germ. 2. p.* 391.

*Muscari botryoides* corollis globosis uniformibus, inferioribus remotioribus, foliis strictis, linearibus basi angustatis, canaliculatis. *Willd. Enum. p.* 575.

*Hyacinthus* foliis gramineis, spica ovata, flo-

ribus globosis fecundis. *Hall. hist. n.*  
1246.

*H. botryoides cœruleus amœnus. Lob. Icon.*  
108.

*Icon. Curtis. Bot. Magaz. tab. 157.*

*Germ. Steifblättriger Trauben - Hyacinth.*

*Gall. Jacinthe à fêvilles étroits.*

*Hab.* In Pineto prope *Schwetzingen*, ubi vi-  
di 1815. In *Brisgovia* montosis gramineis  
prope *St. Blasie*; Prope *Wertheim* in pra-  
tis auf dem *Wirt t. D. Wibelio*.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Julio matura. 2

Differt ab affini *H. racemoso*. *Foliis* non  
laxis, sed strictis, canaliculatis, latioribus, 3 li-  
neas latis. *Racemo* tenuiori. *Corollis* submi-  
noribus, globosis, subinodoris.

Ad rariores omnino *Florae* cives pertinet.

pag. 65. *IUNCUS conglomeratus.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 835.*

pag. 66. *IUNCUS effusus.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 836. Flor. Dan.*  
*tab. 1096.*

pag. 67. *IUNCUS glaucus.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 665.*

pag. 69. *IUNCUS filiformis.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1175. Flor. Dan.*  
*tab. 1207.*

pag. 70. *IUNCUS trifidus*.

*Icon. Flor. Dan. tab. 1691. Sow. Engl. Bot. tab. 1482.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris *auf dem Gamor et Kasten* ubi vidi 1818. et deleatur in Alsatia prope Argentinam.

pag. 71. *IUNCUS squarrosus*.

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 953.*

pag. 72. *IUNCUS ericetorum*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2174. (sub J. gracili.)*

*Var.* Petalis calycinis capsula duplo longioribus. Staminiibus tribus.

*Hab.* Circa *Wertheim am Sporkert* in agris et fossis sabulosis *t. Mertino*.

pag. 74. *IUNCUS articulatus*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2144. (sub J. obtusifloro.)*

γ. Panicula supradecomposita, divaricata, bracteis albicantibus.

*Iuncus divergens. Koch et Ziz. Cat. Plant. Palat.*

*Hab. γ.* In Palatinatu prope *Niederingelsheim t. D. Kochio*.

*Culmus* bi-tripedalis, erectus. *Folia* teretia, subcompressa, articulato - nodosa. *Panicula* supradecomposita, divaricata, ante anthesin ob bracteas insigniter albicantes, colore suo albido primo intuitu ab affinibus dignoscenda.

*Rami* subumbellati, ramuli umbellarum partialium angulo recto vel obtuso egredientes, valde divaricati, sæpius reflexi. *Petala* margine latomembranacea, albide cincta, æqualia, omnia obtusa. *Capsula* ovata, trigona, acuminata. Sic *Cl. Kochius*.

**Nota.** Vix pro peculiari specie, sed pro memorabili varietate *I. articulatis, obtusiflori* Ehrh. habenda.

pag. 76. *IUNCUS sylvaticus*.

Pro diverso loco natali udo, uliginoso campestri, demissiori, montoso, plus minusque aquoso, quammaxime variat. Principales mihi varietates, sequentes sunt.

α. foliis tereti - compressiusculis articulatis foliolis calycinis lanceolatis acutis capsula spadiceo - fusca acuminata brevioribus.

*I. acutiflorus.* Ehrh. Hoffm. *Fl. Germ. Hagenb. Fl. Basil.* 1. p. 329. *Schlectend. Fl. Berol.* 1. p. 199.

*I. spadiceus.* Heller. *Fl. Wirceb. suppl.* 29.

*Icon. Sow. Engl. bot. tab.* 238. (sub *I. acutifloro.* *Flor. Dan. tab.* 1097. (sub. *articulato.*)

**Nota.** Hanc et sequentem varietatem sub *I. sylvatico* cum *Cl. Willdenowio* comprehend.

β. foliis teretiusculis, articulatis paniculæ ramis divaricatis brevioribus, foliolis calycinis lanceolato - mucronatis, capsulam acutam subfuscam subæquantibus.



*I. sylvaticus.* Roth. *Fl. Germ.* 2. p. 405.  
Hagenb. *Fl. Basil.* 1. p. 328.

*I. nemorosus.* Sibth. *oxon.* 114.

*I. articulatus*  $\beta$ . Smith. *Fl. Brit.* 1. p. 379.

*Hab.* Promiscue cum *var.*  $\alpha$ . in quam sæpe abit.

$\gamma$ . culmis adscendentibus foliis compressis articulatis, panicula erecta, elongata, foliolis calycinis lanceolatis acutis, capsula acuta fusca subduplo brevioribus.

*I. lambocarpus.* Ehrh. *gr. n.* 126. Schlechtenthal. *Fl. Berol.* 1. p. 198.

*I. articulatus*,  $\alpha$ . Linn. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 211. Smith. *Fl. Brit.* 1. p. 379. (excl. Sow. *Engl. bot. tab.* 238.)

*I. compressus.* Relh. *Fl. Cantabr.* p. 142.  
Huds. *Fl. Angl.* 1. p. 149.

*I. aquaticus.* Roth. *Fl. Germ.* II. p. 403 ?  
*videtur.*

*I. adscendens.* Host. *gram.* III. p. 58.

*I. acutiflorus.*  $\beta$ . Gaud. *Agrost.* II. p. 223.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 2143. (bona sub *I. lambocarpo*.)

*Hab.* Cum  $\alpha$  et  $\beta$  in pratis udis paludosis inundatis cis et transrhénanis nec non ad lacum Bodamicum.

Sæpissime culmi basi decumbentes, adscendentes.

$\delta$ . Culmis erectis tenuibus, foliis articulatis tereti-compressiusculis, panicula erecta, foliolis calycinis ovali-oblongis acutis capsula

psula oblonga obtusa mucronulata, fusco-  
atra subbrevioribus.

*I. fusco-ater. Hagenb. Fl. Basil. 1. p. 277.  
Heller. Fl. Wirceb. suppl. p. 29. Schlech-  
tend. Fl. Berol. 1. p. 197.*

*I. acutiflorus α. Gaud. Agrost. II. p. 222.*

*Hab.* Passim in iisdem cum præcedentibus locis,  
minus frequens. Circa *Carlsruhe* prope  
*Neureuth* in pratis udis non infrequens.

Medium quasi tenet inter varietatem  $\gamma$  et Iun-  
cum articulatum nostrum seu obtusiflo-  
rum. Ehrh.

$\epsilon$ . Culmis erectis, foliis teretiusculis articulatis,  
calycinis foliolis oblongo-lanceolatis acumi-  
natis fusco-nigricantibus, capsulam nigri-  
cantem ovato-subtriquetram rostratam  
superantibus.

*I. nigricans. Schweigger et Körte. Fl. Er-  
lang. 149.*

*Hab.* In uliginosis pascuis pratisque inunda-  
tis cis et transrhenanis cum  $\delta$ . nec non ad  
lacum Bodamicum.

Inter  $\delta$  et  $\epsilon$  varietas intermedia passim oc-  
currit.

*Nota.* Vix ac ne vix pro peculiaribus speciebus  
habendae sunt. Conveniunt Culmis omnibus  
foliatis articulatis, panicula supradecomposita,  
foliolis calycinis acutis, cum *I. sylvatico*.

pag. 77. *IUNCUS subverticillatus.*

*I. uliginosus* foliis setaceis subnodoso-arti-  
culatis, capitulis trifloris subproliferis,

culmo bulboso - radicante. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 580.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 801. (sub. *I. uliginoso*.)

β. Culmis fluitantibus.

*I. fluitans. Lamarck Encycl. III. p.* 270.

*I. articulatus β. fluitans. Wahlenb. Fl. Lapp.*

*Icon. Fl. Dan. tab.* 817.

γ. Culmis foliisque brevioribus erectis.

*I. supinus* culmo dichotomo, foliis canaliculatis filiformibus, capitulo triphylo. *Mœnch. Hass. n.* 296. *tab.* 5. *Roth. Fl. Germ. 2. p.* 409. *Hoffm. Fl. Germ. p.* 166.

*I. affinis. Gaud. Agrost. II. p.* 224.

*Hab.* Porro in palatinatu trans rhenum cum varietate γ. *t. D. Kochio et Ziz. var. β.* circa *Wertheim* prope *der Carthause Grænau* t. acutissimo *Mertino*. In Principatu superiori in aquosis turfosis circa *Constanz et Bohlingen* cum degeneratione floribus proliferis in foliorum fasciculos ex-crescentibus, ubi vidi *Ann.* 1816.

*Var. γ. Culmi* plures ex una radice, cæspiticii, unciales, digitales, erecti, foliosi, subdichotomi. *Folia* radicalia cæspiticia, erecta, caulina breviora, omnia filiformia, canaliculata, subulata, subarticulata. *Capitula* lateralialia, terminaliaque, e floribus, 2-5-5 sessilibus composita, *Bracteis* membranaceis, albidis, obtusis, obvallata. *Calycina* foliola lanceo-

lata, acuta, *Capsula* ovata subtriquetra, submucronata, subbreviora.

Folia saepe 2-3-5 tenuissima, inaequalia, ex florum capitulis terminalibus conspicua.

Vix ac ne vix pro peculiari specie declaranda, dum varietates intermediae inter hanc et I. subverticillatum prostant.

Non confundenda cum I. capitato Weigel. qui ad varietatem I. ericetorum pertinet, ad quem Flor. Dan. tab. 1099 melius, quam ad I. supinum (Moenchii) ibi citatum quadrat.

pag. 78. IUNCUS *Tenageja*.

*Icon. Flor. Dan. tab. 1160.*

*Hab.* In locis udis prope *Michelselden* dit. Basileensis t. *Lachenalio* nec non in vicina helvetia inter *Rorschach* et *St. Gallen*, vidi 1816.

**Nota.** Planta annua, facillime capsula semper subglobosa dignoscenda. Variat passim in uno eodemque individuo: Floribus sessilibus et brevissime pedunculatis. Calycinis petalis capsulam aequantibus et capsula sublongioribus.

pag. 79. IUNCUS *bulbosus*.

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 934.*

β. capsula longitudine calycis, stylo germinis longitudine.

I. *consanguineus* culmo compresso indiviso, foliis linearibus, canaliculatis, corymbo terminali, calycis foliolis obtusis capsulam ovatam trigonam obtusissimam subaequantibus, stylo longitudine germinis. *Koch et Ziz. Cat. plant Palat.*



*Hab.* In pascuis udis prope *Dirkheim t. D.*  
*Kochio et Ziz.*

*Calycis* foliola castanea. *Stylus* longitudine germinis. *Stigmata* intense carnea. *Capsula* calycis longitudine vel parum tantum longior.

*Nota.* Vix pro peculiari specie, sed varietate levidensi Iunci bulbosi habenda. Individua hujus, mihi benevole missa, nimis affinia Iuncobulboso. Characteres specifici specierum Iunci a colore florum stigmatumque et a longitudine quammaxime variabili styli desumpti, incerti sunt.

Non confundenda cum *I. Bottnico*. *Wahlenb. Fl. Lapp. p. 82. tab. 5.* a quo differt Culmo non tereti sed compresso, Foliolis calycinis obtusis, nec acutis, Capsula obtusissima, nec acuta.

pag. 81. *IUNCUS bufonius.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 862.*

pag. 83. *IUNCUS vernalis.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 736. (sub I. piloso.)*

pag. 83. post *IUNCUM vernalem.*

544.\* *IUNCUS Forsteri* foliis planis pilosis, panicula cymosa erecta, floribus solitariis in pedunculis erectis; capsulis acutis.

*I. Forsteri* foliis planis pilosis panicula cymosa erecta, floribus solitariis, capsulis acutis. *Smith. Fl. Brit. 3. p. 1395.*

*Luzula Forsteri*. Decand. Fl. Franc. VI.  
p. 304. — Gaud. Agr. 2. p. 238. Ha-  
genb. Fl. Basil. p. 334.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 1293. Decand.  
*Icon. Gall. rar.* 1. tab. 2.

*Germ.* Forstersche Binse.

*Gall.* Ionc de Mr. Forster.

*Hab.* In montosis nemorosis. In vicina helve-  
tia prope *dem Weisbad* in adscensu mon-  
tis *Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818,  
nec non in *Iusasso* circa *Delmont t. D.*  
*Hagenbachio*.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Junio matura. 2

Primo intuitu affinis *I. vernali*, a quo dif-  
fert: *Foliis* duplo vel triplo angustioribus. *Pa-*  
*niculae* ramis omnibus erectis, subpatentibus, nun-  
quam divaricatis vel refractis. *Calycinis* laciniis  
longius acuminatis. *Capsula* ovata, acuta, mu-  
cronulata, nec obtusa.

Species certe nova et distinctissima, in horto  
immutata manet. Smith, l. c.

pag. 84. *IUNCUS latifolius*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 737. (sub *I. syl-*  
*vatico*.)

pag. 85. post *IUNCUM latifolium*.

545.\* *IUNCUS spadiceus* foliis pla-  
nis glabris, vaginis pilosis, corymbo de-  
composito divaricato, pedunculis subqua-  
drifloris, calycinis foliolis mucronatis ca-  
psula acuta brevioribus. Willd. Linn. Sp.

*pl. 2. p. 218. Allion. Fl. Pedem. n. 2085.*  
*Villars. Fl. Delph. 2. 235. tab. 6.*

*Iuncus pilosus* β. *Linn. Sp. pl. 468.*

*Iuncus foliis gramineis panicula laxa, petalis mollibus breviter aristatis. Hall. helv. n. 1326.*

*Luzula spadicea. Decand. Fl. Franc. 3. p. 159.*

*Gramen hirsutum nemorosum angustifolium alpinum paniculis obscure rufescentibus. Scheuchz. Agrost. p. 312. Prodr. tab. VI. (bona.)*

*Icon. Host. Gram. III. tab. 96. (sub. I. intermedio.)*

*Germ. Braunblütige Bergbinse.*

*Gall. Ionc marron.*

*Hab. In subalpinis humidiusculis montis Feldberg, ubi vidi 1818. In Alsatiæ monte Ballon nuper legit D. Griesselich.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto Septembri matura. 2*

*Radix* fibrosa, nigricans. *Culmus* sesquipedalis, bipedalis, erectus, teres, foliatus. *Folia* lineari-lanceolata, plana, duas lineas lata, glabra, læte viridia. *Vaginæ* margine raris pilis instructæ. *Flores* paniculato-corymbosi. *Pedunculi* tenues, elongati, patente-divaricati, subtrichotomi. *Pedicelli* 3-4, uniflori. *Bracteæ* lanceolatæ, fimbriatæ, membranaceæ. *Calycina petala* lanceolata, setaceo-mucronata, fusco-spadicea, capsula acutiuscula subbreviora.

pag. 86. *IUNCUS angustifolius*.

β. Panicula sessili radicata.

*Hab.* Prope *Wertheim* in sylva *Spessart* ubi legit *Mertinus*.

pag. 89. *IUNCUS campestris*.

β. Spicis omnibus subsessilibus.

*Iuncus congestus*. *Thuil. Fl. Paris.* 179.

*Luzula congesta*. *Decand. Fl. Franc. VI.*  
p. 303.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 1692.

γ. Foliis angustioribus longioribus minus pilosis; Spicis omnibus pedunculatis oblongis albidis.

I. *multiflorus*. *Hoffm. Fl. Germ.* 1. p. 169.

I. *intermedius*. *Thuill. Fl. Paris.* p. 179.

*Luzula multiflora*. *Hagenb. Fl. Basil.* 1. p. 337.

*Icon. Fl. Dan. tab.* 1333.

Amat montosa sylvatica paludosa, in monte *Blauen*, *Feldberg* et passim alibi.

β. Amat montosa pascua sicciora, et subalpina, in monte *Belchen* et *Feldberg*, nec non in demissioribus passim non infrequens. *Spiculæ* sæpissime tres, interdum binæ, subpedunculatæ, congestæ, atro-fuscæ.

*Nota.* Vix ac ne vix pro peculiaribus speciebus habendæ.



pag. 90.

548.\* *JUNCUS spicatus* foliis planis, spica racemosa nutante. *Linn Sp. pl.* 1. p. 469. — *Fl. Lapp.* 125.

I. *spicatus* foliis planiusculis, spica racemosa nutante, spiculis sessilibus bracteatis. *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 88.

I. *spicatus* foliis planis spica racemosa nutante basi composita, capsulis acutis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 386.

*Juncus alpinus latifolius* panicula racemosa nigricante pendula. *Till. Pis.* p. 91.

*Luzula spicata.* *Decand. Fl. Franc.* III. p. 161.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 270. *Linn. Fl. Lapp. tab.* 10. *fig.* 4. *Sow. Engl. Bot. tab.* 1176.

*Germ.* Aehrentragende - Binse.

*Gall.* Junc en épi.

*Hab.* In pascuis alpinis. In vicinia Principatus superioris helvetia retro dem *Weisbad am Wildkirchlein, Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 2

*Radix* fibrosa. *Culmus* pedalis, erectus, tenuis, foliatus. *Folia* radicalia linearia, planiuscula, subrecurva, margine pilosula. *Culmea* convoluta, minora, ad vaginæ apicem magis pilosa. *Spica* racemosa, terminalis, ovato-oblonga, obtusa, nutans, nigro-ferruginea. *Spiculæ* paucifloræ, subsessiles. *Bracteæ* sub spiculis infi-

mis, ciliato-laceræ. *Calycina* foliola lanceolata, acuminata. *Capsula* ovata, acuta, fusco-nigra.

HEXANDRIA TRIGYNIA.

pag. 94. RUMEX *Patientia*. Linn.

R. *Patientia* floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis, unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 249.

pag. 96. RUMEX *sanguineus*. Linn.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1553.

pag. 97. RUMEX *crispus*. Linn.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1998.

pag. 99. RUMEX *maximus* (mihi.)

R. *Britannica*. *Schkuhr. bot. Handb.* 1. p. 511. (omnino.)

Deleatur R. *palustris* (a me citatus.) *Smith. Fl. Brit.* qui peculiarem speciem sistit.

*Radix* crassa, ramosa, fibrosa, extus e luteo-fusca, intus albide lutescens. *Caulis* 5-6-7 pedalis, erectus, firmus, crassiusculus, sulcatus, ramosus. *Folia* versus radicem maxima, cum petiolis 4-6 pedes longa, omnia lanceolata, utrinque acuta, 8-10 uncias lata. *Verticilli* foliacei. *Flores* hemaphroditi. *Valvulæ* integræ ovato-deltoidæ, graniferæ: *Granula* longiuscula, acuta.

Nota. Distinctissima omnino a R. aquatico. Linn. foliis inferioribus non cordatis sed

semper exacte lanceolatis longioribus. Cl. Sowerby R. aquaticus in Engl. Bot. tab. 2104. ob folia lanceolata, non ad R. aquaticum Linn. sed ad nostrum R. maximum pertinet.

Secundum Cl. Hagenbachium in Fl. Basil. 1. p. 340. Lapathum aquaticum folio cubitali C. Bauhini. p. 116. quod Linnaeus aliique ad R. aquaticum citant ad R. maximum pertinet.

pag. 100. *RUMEX maritimus*. Linn.

R. *maritimus* valvulis deltoideis setaceo-dentatis graniferis, foliis linearibus, verticillis confertis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 393.

Deleatur *Icon Curtisii. Fl. Lond.* allegata a Cl. Smithio ad R. *palustrem* citata.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 725.

*Hab.* Porro prope *Gottsau*, ubi nuper vidi.

pag. 101. post *RUMICEM maritimum*.

556. \* *RUMEX palustris* valvulis lanceolatis graniferis basi dentatis, foliis linearibus - lanceolatis, verticillis distantibus. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 394.

R. *maritimus*. *Huds. Fl. Angl.* 1. p. 155. β.

Hydrolapathum minus. *Lob. Ic.* p. 286. (optima.)

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1932. — *Curt. Fl. Lond. tab.* 163. (sub R. *maritimo*.)

*Germ.* Sumpf-Grindwurz

*Call.* Rumex des marais.

*Hab.* In paludosis, fossis. Circa *Dachsland an der Federbach*. In ruderatis prope *Ebersteinburg* raro: ubi legit *A. Braun*. In Palatinatu transrhenano circa *Lautern t. D. Kochio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 24

Differt ab affini *R. maritimo*. *Caulibus* brevioribus. *Foliis* radicalibus submajoribus. *Verticillis* magis remotis, non arcte confertis. *Valvulis* lanceolatis (nec deltoideis) basi utrinque tridentatis, dentibus setaceis multo brevioribus.

Secundum *Cl. Kochii* sententiam, sub *R. acuto* comprehendebat *Ill. Pollichius*.

Individua in ruderatis obvenientia, omnibus in partibus minora sunt.

pag. 102. *RUMEX acutus. Linn.*

*R. acutus* valvulis oblongis subdentatis omnibus graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis, racemis foliosis. *Smith. Fl. Brit. 1. p. 391.*

*R. paludosus. With. p. 354.* ex descriptione (secundum *Cl. Smith.*)

*Lapathum acutum s. Oxylapathum. Joh. Bauh. hist. 2 p. 983.* ab ipso *Linnaeo in ejus Materia medica* ad *R. acutum* citatum. *Icon.*

*Lapathum sylvestre sive oxylapathum s. Οξύλα-παθον*, latinis *Rumex acutus in officinis Lapathum acutum. Dodon. Pempt. V. Libr. 1. p. 657. Icon.*



Oxylapathum officinis Lapathum acutum.  
*Fuchs. hist. 470. Icon.*

Lapathum acutum. *Lobel. p. 284. Icon. Ray.  
 Syn. 142.*

Lapathum s. Rumex: Lapathum acutum officinis. *Camerar. Epit. p. 228. Icon.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 724. (deleatur R. acutus. Curtis. Fl. Lond. Icon. qui ad R. nemorosum pertinet.)*

*Valvulae* lanceolato-oblongae, subinde dentatae, omnes granulo maximo gibboso rubro onustae. *Semen* exiguum. *Smith. l. c.*

Maxime affinis *R. Nemolapatho*, a quo differt valvulis non integerrimis sed subinde dentatis.

**Nota.** Sub Rumice acuto in herbario *Linnaei*, a *Smithio* descriptam et à *Sowerbeo* depictam plantam conspicuam esse, affirmat *Sowerby l. c.*

Sub *Lapatho acuto* in officinis pharmaceuticis promiscue saepe Radices praecipue Rumicis nemorosi, *R. Nemolapathi*, et *R. palustris*, nec non *R. crispus* et *R. obtusifolius*; foliis obtusis et acutiusculis prostant.

pag. 193.

**557.\* RUMEX nemorosus** floribus hermaphroditis, valvulis oblongis obtusiusculis integerrimis, unica granifera, foliis inferioribus petiolatis cordato-lanceolatis acutis, superioribus sessilibus lanceolatis, margine subundulatis.

*R. nemorosus* floribus hermaphroditis, val-

vulis oblongis obtusis integerrimis, unica granifera, foliis lanceolatis. *Schrad. Cat. H. Gött. Willd. Enum. p. 397.*

*R. acutus. Curtis. Fl. Lond. (exclus. Linn. Synonymo.)*

*R. sanguineus. β. viridis. Smith. Fl. Brit. 1. p. 391.*

*Lapathum viride. Dill. in Ray. Syn. 141.*

*Icon. Curtis. l. c. tab. 181. (optima.)*

*Ger m. Waldgrind-Wurz. Spitzblättrige Grindwurz.*

*Gall. Rumex des forets.*

*Hab. In sylvaticis et nemoribus humidis, inundatis præsertim rhenanis passim frequens. Circa Carlsruhe ad fossarum et viarum marginalia in sylva Auacker et alibi copiose.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto Septembri matura. 4*

*Radix* ramosa, flavo-fusca, intus pallide flavida. *Caulis* 2-3 pedalis, erectus, superne flexuosus, teres, striatus, rubellus, crassitie pennæ anserinæ, ramosus. *Rami* alterni, erectiusculi, inferne foliosi. *Folia* inferiora petiolata, cordato-lanceolata, acuta, plana, 5-6 uncias longa, 2 circiter uncias lata, subtus venis minutis reticulata, læte viridia, superiora sessilia, ex ovato-lanceolata, margine undulata, acutiora et angustiora, suprema lanceolata. *Flores* semiverticillati, pedicellati, numerosi, penduli. *Valvulæ* minutæ, oblongæ, obtusiusculæ, integerrimæ, unica semper granifera, reliquis plerumque nudis.

Differt a *R. Nemolapatho* affini: Caulibus altioribus. Ramis magis erectis. Foliis inferioribus majoribus magis venuloso-reticulatis. Verticillis minus remotis. Valvulis demum minoribus, unica saltem granifera.

**Obs.** Planta ex seminibus in horto Carlsruhensi culta, constans, non pro varietate *Rumicis sanguinei* Linn. habenda.

Mulierculi rhizotomi, in regionibus rhenanis, saepissime hujus plantae radicem, sub radice *Lapathi acuti* colligunt. In praestantissima officina pharmaceutica Cl. Reinboldi Spielmanni, professoris et praeceptoris in me amicissimi, Argentorati, sub annis 1778 - 1782 radices ex hac specie vidi.

pag. 183. *RUMEX obtusifolius*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1999.

pag. 104. *RUMEX pulcher*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 1576.

pag. 109. *RUMEX digynus*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 910.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthale* in rupibus calcareis abunde, ubi vidi 1818.

pag. 110. *RUMEX alpinus*.

*Hab.* Porro retro *dem Weisbad* ad casas pastoritias montis *Sentis et Kasten* abunde, ubi vidi 1818.

**Nota.** Plantam in pyrenaeis, alpinis helvetiae et in monte patrio *Feldberg*, magna in abundantia et semper ad stabula alpina vidi.

Radix bene siccata, vera panacaea domestica, in multifariis hominum et pecorum morbis, cumpri-  
nis in obstructionibus alvi, et contra vermes, apud  
alpicolas.

In officinis pharmaceuticis radicem certo effi-  
cacem, pro dolor, persaepe vermibus corruptam, re-  
movi.

pag. 112. RUMEX *hispanica*.

Rumex *arifolius*. Allion. Fl. Pedemont.  
n. 2040. (omnino) non Linnæi filii.

*Hab.* Porro in Alsatiae monte *Ballon* ubi nu-  
per legit *D. Griesselich*.

*Nota.* Sub. R. *hispanica* omnino comprehendi  
R. *arifolium* Allionii ut ex adjecto  
Halleri et Bocconi synonymo patet.

In hortis oleraceis praecipue varietatem ma-  
jorem Rumicis *Acetosae* passim, sub R.  
*hispanica* colunt.

gag. 116. SCHEUCHZERIA *palustris*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 1801.

*Hab.* In Brisgovia ad montem *Feldberg* infra  
*dem Feldbergsee* in udis copiose, ubi eam  
legi *Ann.* 1807.

## HEXANDRIA POLYGYNIA.

pag. 125. ALISMA *Plantago*.

*Nota.* Pro diverso loco natali plus minusve aquoso,  
udo, et sicciore, quammaxime polymorpha.  
Folia subcordata, ovata, ovato-lanceolata,  
exacte lanceolata, majora et minora, longiora,  
et breviora, interdum natantia, magis elon-  
gata.



Varietatem minorem false cum *Pollichio*, sub *A. natante* Linnaei allegavi. *Alisma natans* Linn. ex Flora nostra delenda erit.

*Alisma lanceolata*. (With.) Koch et Ziz. Cat. Plant. Fl. Palat. neutiquam pro peculiari specie, sed pro varietate minori, foliis lanceolatis, *A. Plantaginis* habenda est.

pag. 126. post *ALISMAM Plantago*.

574.\* *ALISMA graminea* foliis linearibus angustis praelongis erectis radicalibus, sessilibus, scapo teretiusculo glabro erecto nudo, superne verticillatim ramoso. (mihi.)

*A. Plantago* γ. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 401.

*Plantago aquatica leptomacrophyllos. Loes. Fl. Pruss.* p. 199.

*Icon. Loes. l. c. tab.* 62. (bona.)

*Germ. Grasblättriger Wasserwegerich.*

*Gall. Plantaine à fêvilles de Gramen.*

*Hab. Prope Dachslund in medio stagno cum Schweikerta nymphoide, Yttnera minore et Marsilea quadrifolia non infrequens.*

*Flor. Augusto. Semina Septembri matura.* 24

*Radix* fibrosa densa, extus nigra. *Scapus* erectus, sesquipedalis, cubitalis et altior, teretiusculus, glaber, nudus, superne verticillatim ramosus. *Folia* radicalia, numerosa, sessilia, omnia linearia, integra, glabra, læte viridia, erecta, scapo longiora, 2 - 5 pedalia, lineam ad sesquilineam lata. *Stipulae Pedunculi. Corollae et Capsulae* ut in *A. Plantagine*.

Plantam

Plantam pro Flora nostra novam ex medio stagno indicato, in nostra, dilectissimi Maercklini et Hartwegii, magni Ducis hortorum inspectoris meritissimi praesentia, apportavit juvenis optimus, Alexander Braun, d. 8. Septembris 1820. In hortum Carlsruhensem omni cautela transplantata, periit. An vera species, an demum varietas maxime memorabilis *A. Plantaginis*? cultura in horto docebit.

---

CLASSIS VII.  
 HEPTANDRIA  
 MONOGYNIA.

---

pag. 129. ante AESCULUM.

CLXXXVI. \* TRIENTALIS.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 626.*

*Calyx* heptaphyllus : *foliolis* lanceolatis, acuminatis, patentibus, persistentibus. *Corolla* stellata plana, monopetala, æqualis, septempartita : laciniis ovato - lanceolatis. *Filamenta* capillaria unguibus corollæ inserta. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis longitudine staminum. *Stigma* capitatum. *Bacca* capsularis, exsucca, globosa, unilocularis, crusta tenuissima, suturis variis dehiscens. *Semina* nonnulla, angulata.

Obs. Numerus saepe est septenarius in hac planta, licet interdum sex et quinarium.

577. \* TRIENTALIS *europaea* foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 488.

*Alsinanthemos. Ray. Syn.* 286.

*Herba Trientalis. Bauh. hist.* 3. p. 536.

*Pyrola alsines flore europæa. Moris. hist. pl. Sect. XII. tab.* 10. *fig.* 6.

*Pyrola alsines flore major.* *Bauh. Prodr. p.*  
100. *Icon.*

*Icon.* *Oeder. Fl. Dan. tab. 84.* *Sow. Engl.*  
*Bot. tab. 15.* *Schkuhr. Bot. Handb. tab.*  
105.

*Germ. Europäische Trientalis.*

*Gall. Trientale d'Europe.*

*Hab.* In monte *Feldberg* Brisgoviae in ericetis  
turfosis, ubi legit acutissimus *Spenner et*  
*A. Braun* 1822.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto ma-  
tura. 24

*Radix* repens subtuberosa, fibrosa. *Caulis*  
digitalis, spithamæus, simplex, erectus, inferne  
nudus, superne foliosus. *Folia* subverticillata,  
4-5, breviter petiolata, late-lanceolata, paten-  
tia, integerrima, læte viridia, venulosa, glabra,  
unciam ad sesquiunciam longa, 7-9 lineas lata.  
*Pedunculi* terminales, sæpe solitarii, quando-  
que bini, terni, filiformes, tenues, uniflori, ere-  
ctiusculi. *Corolla* stellata, patens, nivea, amœna.

Planta pulchella, omnino ad rariores Florae ci-  
ves pertinet. In Alsatie Vogesis hucusque nondum  
lecta est.

pag. 130. post *AESCULUM Hippocastanum.*

577.\*\* *AESCULUS carnea* foliis quina-  
tis septenatisque, floribus heptandris, ca-  
lycibus intense rubris quinquefidis obtu-  
sis, corollis tetrapetalis patulis amœne  
carneis, capsulis muricatis. *mihi.*

*A. carnea.* *Catal. Horti Carlsruhens. Ann.*  
1811.



*A. rubicunda.* Decand. herb. des amat.

*Germ.* Fleischfarbige Rosskastanie.

*Gall.* Maronier d'Inde à fleurs incarnates.

*Hab.* . . . . . Hospitatur in horto aulico Carlsruhensi, Schwetzingensi, Heidelbergenſi, in hortis anglicis *auf der Favorite*, prope *Ettlingen*, *Rothenfels*, *Baden*, *Lahr* et alibi; ad ambulacra versus *dem Mühlburger-Thor*, prope *Heidelberg* et alibi.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri maturatione. h

Arbor florens pulcherrima, mediocris. *Rami* alterni, erecto-patentes. *Folia* alterna, petiolata, quinata septenataque. *Foliola* late lanceolata, versus basin attenuata, inæqualiter dentato-serrata, costata, læte viridia, sublucida. *Flores* laxe corymboso-racemosi, patuli. *Calyces* quinquefidi, obtusi, glabri, intense rubri. *Corollæ* tetrapetalæ, amœne carneæ. *Filamenta* septem, declinata, albide-rubella. *Antheræ* rubellæ, demum fuscae. *Capsula* coriacea, subrotunda, trilocularis, trivalvis, muricata. *Fructus* castanei, splendentes.

Ex seminibus in horto Carlsruhensi et Schwetzingensi in abundantia culta, constantissima. Evulgata in magno Ducatu Badensi ab Anno 1804, per divum Carolum Friedericum.

Differt ab *Aesculo Pavia*: Corollis non clausis, non coccineis sed incarnatis, patulis, Staminibus non octo, sed septem.

Fructuum usus ut in *A. Hippocastano*.

---

CLASSIS VIII.  
OCTANDRIA  
MONOGYNIA

---

pag. 133. ante OENOTHERAM.

CLXXXVII.\* TROPÆOLUM.

*Linn. Gen. Pl. ed Schreb. n. 634.*

*Calyx* monophyllus, quinquefidus, erecto-  
patulus, acutus, coloratus, deciduus: *laciniis*  
duabus inferioribus angustioribus, postice cor-  
nutus, *Nectario* subulato, recto longiore. *Corolla*  
Petala quinque, subrotunda, calycis divisuris in-  
serta: *duo superiora* sessilia, *reliqua inferiora*  
unguibus oblongis ciliatis. *Filamenta* declinata,  
inæqualia. *Stylus* erectus, longitudine stami-  
num. *Stigma* trifidum, acutum. *Baccæ* soli-  
diusculæ, tres, hinc convæxæ, sulcato - striatæ,  
inde angulatæ. *Semina* tria, hinc gibba, inde  
angulata, subrotunda, sulcato - striata.

578.\* TROPÆOLUM *majus* foliis pelta-  
tis subquinquelobis, petalis obtusis. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1, p. 490.

**T.** foliis peltatis orbiculatis. *Linn. Hort. Cliff.* 143.

**Cardamindum** ampliori folio et majori flore.  
*Few. peruv.* 3. p. 14. tab. 8.

**Acriviola** maxima odorata. *Bærh. Lugdb.*  
1. p. 244.

**Nasturtium indicum.** *Lobel. Icon.* 616.

*Icon. Regn. bot. Curtis Magaz.* 23.

*Germ. Capucinerchen. Capuciner - Kresse.*  
*Indianische Kresse.*

*Gall. Capucin. La grande Capucine.*

**Hab.** In Peru. Colitur passim in hortis rusticorum et aliorum e quibus rarius exulat in ruderata ad pagos et urbes.

**Flor.** Julio, Augusto, Septembri. *Semina*  
Septembri, Octobri matura. ☉

Pulchra omnino et vulgata hodie apud nos planta. In europam venit 1684 cura *Beweringii*.

Flores ante crepusculum fulminant, observante *E. C. Linnæa*.

**Pharm. NASTURTII** *indici Flores, Fructus.*

Tota planta recens, cumprimis flores et fructus odore et sapore nasturcino imbuti sunt. Flores a nostratibus passim acetariis adduntur ad linguam stimulandam, simulque disco ornamentum conciliandum. Nondum expansi flores et cumprimis fructus immaturi, saepe aceto vini et sale condiuntur et

loco Capparidum embammatibus piscium et carniū admiscuntur. Fructus maturi et aridi alvum purgant dejectionibus fere aquosis et absque torminibus. Ita tribus vel quatuor baccis in milite robusto alvus sexies valide mota; duabus in virgine viginti sex annorum quinquies; tribus in viro succoso pariter quinquies. Arnold. Obs. phys. med. p. 70.

pag. 154. post *OENOTHERA biennem.*

578.\*\* *OENOTHERA parviflora* foliis ovato-lanceolatis planis, caule lævi subvillosa. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 492.

*O. foliis lanceolatis dentatis. Mill.*

*O. foliis lanceolatis, capsulis ventricosis-conicis. Zinn. Gætt.* 199.

*Icon. Mill. Icon.* 189. *fig.* 1.

*Germ. Kleinblüthige Nachtkerze.*

*Gall. Onagre parviflore.*

*Hab.* In America septentrionali. Prope *Freiburg* ad fluvium *Treysam* in arenosis abunde, testibus *Spennero et Alexandr. Braunio*. Sine dubio ex horto botanico emigrata est.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Julio, Augusto matura. ♂

Differt ab *O. bienni*. *Corollis* semper duplo minoribus. *Caulis* sæpe rubellus, læviusculus, subvillosus. *Folia* alterna, subsessilia, lanceolata, obsolete sinuato-dentata, plana, 2-3 uncias longa, semiunciam lata, suprema minora.

Flores apibus accepti.



pag. 137. *EPILOBIUM rosmarinifolium*.

*Hab.* In Principatu superiori prope *Waldshuth* nec non circa *Zurzach* ad rhenum frequens, ubi eam legi 1814.

pag. 140. post *EPILOBIUM parvisflorum*.

582. \* *EPILOBIUM roseum* foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis, glabris. *Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 147.* — *Roth. Fl. Germ. 2. p. 458.* — *Hoffm. Fl. Germ. p. 133.*

*E. roseum* foliis petiolatis ovatis dentatis, caule subtetragono, stigmate indiviso. *Smith. Flor. Brit. 1. p. 411.*

*Icon.* *Sow. Engl. bot. tab. 693.*

*Germ.* *Rosenrother Weiderich.*

*Gall.* *Epilobe rosée.*

*Hab.* Utrunque in pascuis pratisque humidis ad fossas aquaticas passim frequens. Circa *Carlsruhe, Mühlburg, Dachslund* et alibi.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. 2

*Caulis* erectus, pedalis, sesquipedalis, teretiusculus, ramosus, glaber, superne villosus-incanus. *Folia* inferiora opposita, reliqua utplurimum alterna, petiolata, ovato-lanceolata, acuta glabriuscula, inæqualiter dentato-serrata. *Corollæ* parvæ, rosæ aut albicantes, venis saturatioribus pictæ. *Stigma* clavatum, indivisum.

A concursu petiolorum ubi oppositi sunt, linea tenera deorsum ad proximum internodium extenditur,

unde caulis ibidem anceps; alternorum bases duplici linea simili decurrunt: optime Cl. Schreberus l. c. annotat.

Cl. Willd. in Sp. Plant. sub varietate *E. montani* comprehendit, a qua autem distincta, stigmate semper indiviso, nec profunde quadrifido.

Medium tenet inter *E. montanum* et *E. tetragonum*.

pag. 142. post *EPILOBIUM montanum*.

583.\* *EPILOBIUM collinum* caule erecto, tereti, foliis alternis, subsessilibus, ovato-lanceolatis obtusis dentatis, stigmate quadrifido. *mihi*.

*Germ. Hügelweiderich.*

*Gall. Epilobe des collines.*

*Hab.* Prope *Baden* in collibus siccis lapideis asperis apricis cum *Aira canescente* non infrequens, ubi eam legit *Alexander Braun Ann.* 1821.

*Flor.* Julio. *Semina* Augusto matura. 24

*Radix* ramoso-fibrosa, fusco-rubella. *Caulis* pedalis, subsesquipedalis, erectus, teres, rubellus, glabriusculus, ramosus, foliosus. *Folia* caulina omnia alterna, subsessilia, ovato-lanceolata, obtusa, denticulata, pallide viridia, glabriuscula, 3 ad 4 lineas lata, unciam vix longa, superiora sensim minora. *Flores* axillares terminalesque, breviter pedunculati, solitarii. *Corolla* parva, violaceo-rubella. *Petala* calyce longiora, bifida. *Stigma* quadrifidum, pubescens.

Differt ab *E. montano*. Foliis caulinis omni-

bus alternis, multo copiosioribus minoribus, et angustioribus. Loco natali collino, sicco, aprico.

Plantam vix hucusque descriptam, frustra apud auctores quaesivi.

pag. 143. *EPILOBIUM palustre*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 316.*

pag. 144. post *EPILOBIUM palustre*.

585.\* *EPILOBIUM alpinum* foliis oppositis elliptico-lanceolatis subintegerri-  
mis, caule basi decumbente paucifloro.  
*Smith. Fl. Brit. 1. 413.*

*E. alpinum* foliis oppositis ovato-lanceola-  
tis integerrimis, siliquis sessilibus, caule  
repente. *Linn. Sp. pl. 1. p. 495.*

*E. foliis ovatis glabris. Hall. hist. n. 999.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 2001. Lightfoot.*  
*Fl. Scot. tab. 10. fig. 1. — Fl. Dan. tab.*  
*352.*

*Germ. Alpen Weiderich.*

*Gall. Épilobe des alpes.*

*Hab. In Principatu superiori retro Mæskirch*  
*am Donauthal in rupibus calcareis mon-*  
*tosis ad rivulos, nec non in vicina helve-*  
*tia, auf dem hohen Gamor et Kasten*  
*eam vidi 1814.*

*Flor. Aprili, Majo. Semina Julio matura. 2*

*Radix repens, fibrosa. Caules digitales,*  
*palmares et sublongiores, basi plus minusve de-*  
*cumbentes, simpliciusculi, subtetragoni, glabri-*

usculi, subbiflori. *Folia* opposita, subpetiolata, ovali-elliptica, obtusa, obsolete denticulata, glabra, summa alterna, læte viridia. *Corollæ* parvæ, rosco-rubellæ.

pag. 160. *DAPHNE Cneorum*.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi in collibus calcareis prope *Donaueschingen*, inter *Engen et Griechenthal*, et alibi passim abunde, ubi eam vidi 1808.

## OCTANDRIA DIGYNIA.

pag. 164. *MOEHRINGIA muscosa*.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* in rupibus calcareis roridis, nec non in vicina helvetia retro *St. Gallen* prope *dem Weisbad* ubi eam vidi 1818.

## OCTANDRIA TRIGYNIA.

pag. 165. *POLYGONUM Bistorta*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 509.

pag. 167. *POLYGONUM viviparum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 669.

*Hab.* In vicina helvetia retro *St. Gallen* prope *dem Weisbad et dem Wildkirchlein* a me ibi lectum *Ann.* 1818.

pag. 169. *POLYGONUM amphibium*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 436.



pag. 170.

## 600. POLYGONUM *lapathifolium* L.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 1382.

Quo ad folia quammaxime ludit, quæ ovata vel oblonga, obtusiuscula, acuta vel acuminata, quandoque lanceolata, ovato - et oblongo - lanceolata, plus minusque acuminata sunt.

γ. *viride* foliis ovato - lanceolatis, spicis oblongis erectis, pedunculis petiolisque minus scabris, seminibus majoribus. *Caulis* et *Folia* omnino viridia. *Flores* ex albido - virescentes.

δ. *incanum* foliis subtus incanis tomentosis.

*Persicaria maculosa* procumbens, foliis subtus incanis. *Dill. in Raii. Syn.* 146.

## 601. POLYGONUM *Persicaria*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 756.

β. Foliis subtus incanis.

*Polygonum* foliis ovato - lanceolatis subtus tomentosis, spicis ovatis, vaginis ciliatis. *Hall. Stirp. helv. n.* 1556.

*Hab.* Hinc inde promiscue cum *P. Persicaria*.

*Obs.* Specie non differt a *P. Persicaria*, ut cultura in horto nos docet.

601.\* *POLYGONUM Braunii* foliis lanceolatis acutis glabriusculis, stipulis arcte

vaginantibus adpresse setosis ciliatis, floralibus ciliato-barbatis, spicis erectiusculis filiformibus incrassatis interruptis terminalibus axillaribusque, floribus hexandris semidigynis et semitrigynis, styli partibus erectis, calycibus eglandulosis enerviis, seminibus compressis utraque parte gibbis et triquetris. *mihi.*

*Polygonum dubium. A. Braun.*

*Germ. Braunisches Flöhkraut.*

*Gall. Renouée de Mr. Braun.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* et alibi in paludibus, uliginosis, fossis aquaticis et exsiccatis ad vias publicas, in sylvis humidis, ad ripas rivulorum, in ruderatis et cultis, abunde.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri Octobri maturat. ☉

Primo intuitu maxime affine cum *P. Persicaria*, a qua differt: *Foliis* obscurius viridibus. *Stipulis* magis arcte vaginantibus, longius ciliatis. *Spicis* gracilioribus, filiformibus, interruptis. *Styli* partibus erectis, nec distantibus. *Calycibus* enerviis, nec nervosis. *Seminibus* compressis utraque parte, nec altera parte gibbis et triquetris.

Debemus plantae adumbrationem acutissimo *A. Braunio*.

Variat floribus rubellis, purpurascentibus et albidis.

*Nota.* Ex hac specie et *P. Persicaria* ortam plantam hybridam, legit *A. Braun* in fossis prope *Mühlburg*, in consortio *Polygoni Braunii* et *Persicariae*, quam sub *Polygono dubio-Persicaria* allegavit,

602. POLYGONUM *Hydropiper*.*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 989.*

- α. Spicis viridi-rubellis et viridi-albis.*
- β. densiflorum* elatum, spica terminali cylindrica densiflora, floribus axillaribus confertis.
- γ. obtusifolium* humile, caule e basi repente, ramoso, foliis parvis, obovatis, subcuneiformibus obtusis, spica terminali brevi pauciflora, floribusque per caulem axillaribus.
- δ. angustifolium* pusillum, caule depresso basi repente, foliis parvis lineari-lanceolatis, spicis paucifloris.

*Hab. β. Circa Carlsruhe et Durlach in sylva Hauacker. γ in sylvis ad vias et in inundatis passim. δ loco inundato arenoso prope Carlsruhe ante portam Etlingensem, ubi legit A. Braun.*

603. POLYGONUM *minus*.*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 1943.*

- β. incanescens* pygmaeum foliis subtus incanis. *Wallroth. Sched. critic.*
- γ. latifolium* elatum, foliis lancolatis, floribus pallidis.

*Hab. β. in uliginosis et turfosis. γ. in sylvis paludosis legit A. Braun, in sylva Hauacker circa Carlsruhe.*

*Variat porro Foliis plus minusque falcatis.*

**Nota.** Species ex *P. minori* et *P. Persicaria* orta hybrida: Caule elongato adscendente ramosissimo, foliis lineari-lanceolatis acutis, glabriusculis, spiculis arcte vaginantibus, adpresse-setulosis, ciliatis, spicis cylindricis incrassatis, interruptis, floribus hexandris semidigynis et semitrigynis, styli partibus distantibus, calycibus eglandulosis subnerviis. In agris umbrosis ad marginem sylvae prope Neureith inter *P. minus* et *P. Persicariam* legit acutissimus A. Braun, quam sub *Polygono minore-Persicaria* adumbravit. Semina dicit proferre nulla aut imperfecta. Sed Caules, Folia et Flores luxuriant.

pag. 178. *POLYGONUM aviculare.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1252.*

pag. 181. *POLYGONUM Fagopyrum.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 1044.*

pag. 182. *POLYGONUM Convolvulus.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 941.*

## OCTANDRIA TETRAGYNIA.

pag. 186. *ADOXA Moschatellina.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 453.*

**Hab.** In dumetosis circa *Weinheim* frequens ubi cum amicissimo *Heinse* artis veterano vidi *Ann. 1811.* Circa *Wertheim* in dumetis prope *Urphar t. D. Wibelio.* In Margraviatu superiori in dumetis ad novam domum et *Wiesam* in nemore *Wylensi, t. D. Hagenbachio.*



pag. 189. post *ELATINEM triandram*.

**613.\*** *ELATINE hexandra* foliis oppositis, floribus alternis pedunculatis, triphyllis, hexandris, trigynis.

*E. hexandra. Decand. Fl. Franc. VI. p. 609. — Loisel. Fl. Gall. Suppl. p. 63.*

*Birolia paludosa. Bellardi Mem. acad. Tur. 1808.*

*Alsinastrum serpillifolium* flore roseo tripetalo. *Vaill. Bot. Paris. p. 5.*

*Icon. Vaill. l. c. tab. II. fig. I. (optima) — Decand. Ic. rar. Fasc I. tab. 43. fig. 1.*

*Germ. Sechsfädige Elatine.*

*Gall. Elatine à six étamines.*

*Hab. In inundatis prope Scheibenhart cum E. triandra copiose. In Palatinatu transrheno prope Kaiserslautern. t. D. Kochio.*

*Flor. Augusto, Septembri. Semina Septembri, Octobri matura. ☉*

Affinis *E. triandræ*, a qua differt, statura minori: *Floribus* alternis, pedunculatis, hexandris.

*Nota.* Deleatur hinc Synonymon Vaillantii apud *E. triandram* allegatum, quod omnino ad *E. hexandram* pertinet.

pag. 190. *ELATINE Alsinastrum*.

*Hab. In Margraviatu superiori prope Hugstetten in paludosis. Prope Langendenzlingen copiose, nec non prope Kork, ubi vidit A. Braun et Hartmann pharmacopæus instructissimus.*

CLASSIS IX.  
ENNEANDRIA  
TRIGYNIA.

---

pag. 191.

CXCIX. \* RHEUM.

*Linn. Gen. Plant. ed. Schreb. n. 692.*

*Calyx* nullus. *Corolla* monopetala basi angustata, impervia, *limbo* sexfida: *laciniis* obtusis: alternis minoribus marcescens. *Antheræ* didymæ, oblongæ, obtusæ. *Germen* breve triquetrum. *Styli* vix ulli. *Stigmata* tria, reflexa, obtusa. *Semen* unicum, magnum, triquetrum, acutum, marginibus membranaceis.

615.\* **RHEUM** *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis subsulcatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 531. *Mat. med.* p. 109.

R. *Rhaponticum* foliis obtusis glabris, venis subtus pilosiusculis sinu baseos dilatato, petiolis supra sulcatis margine rotundatis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 488.

R. foliis cordatis, spicis obtusis. *Mill. Dict.* n. 1.

*Rhaponticum.* *Alp. Rhapont.* 1.

*Rhaponticum* folio *Lapathi* majoris glabro. *Bauh. pin.* 116.

*Icon.* Regnault Bot.

*Germ.* Stumpfblättrige Rhabarber. Rha-  
pontic. Rapuncia.

*Gall.* Rapontic.

*Hab.* In Thracia, Scythia. Colitur circa *Carlsruhe*, *Wiesloch*, *Heidelberg* et alibi passim in agris hortisque.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturantur. 24

*Radix* crassa, carnosa, ramosa, extus fusco-brunnea, intus ex rubello-lutescens, variegata. *Caulis* 3-4 pedalis, erectus, teres, glaber, crassiusculus, substriatus, simplex. *Folia* alterna, petiolata, lato-cordata, obtusa, concava, integra, pedem ad sesquipedem longa et fere lata, quincostata, venulosa, supra glabra, saturate viridia, subtus glaucescentia, costis venisque pilosula, margine utrinque minutim ciliata, scabra: squamulis exiguis rigidis. *Petoli* longitudine fere foliorum, crassi, supra plano-concaviusculi, læves, subtus convexi, undique sulcati. *Stipulae* vaginacæ subtubulosæ, membranacæ, siccæ, albidæ, caulem amplexantes, rugulosæ, acutæ. *Flores* terminales, corymbosi. *Corymbus* speciosus, compositus racemis plurimis subverticillatis, patentibus. *Corollæ* numerosissimæ, albæ. *Filamenta* 9 subulata, alba, corolla paullo longiora. *Antheræ* incumbentes. *Styli* 3 patentissimi, albi. *Stigmata* reniformia, carnosa, alba. *Semen* maturum triquetrum, splendens, castaneum.

*Pharm.* RHAPONTICI Radix.

Radix siccata intus luteo-rubella, amaricans, stiptica, subrhabarbarina; masticata linguam et fauces tingit colore croceo tanquam Rheum verum.

Vires habet tonicas, stomachicas, adstringentes, leniter alvum laxantes. Radix Rhapontici saepe a rusticis praesertim in montosis et convallibus tanquam domestica medicina in Diarrhoea nec non in obstructionibus pecorum ex officinis pharmaceuticis praescribitur sub Rhapontica seu Rhapuncia, Rabuncia. Perraro hodie a medicis praescribitur, quamquam tamen, egregium stomachale et deobstruens, nequaquam contemnendum est.

Obs. Inter annos 1790 ad 1818 in nonnullis pharmacis loco Radicis Rhei optimi seu moscovitici, Radicem Rhapontici saepe non rite selectam, siccata et asservata mucore destructa, tanquam caput mortuum, pro dolor vidi et removi. Vid. Libr. tit. Ueber die Apotheker-Visitationen und Revisionen im Großherzogthum Baden und deren Erfolg etc. von C. C. Gmelin Dr. Manuscript. 1819. Mit dem Motto: Veritas via sua quaeritur. Auf 200 Folio Seiten.

Sub Radice Rhapontici in pharmacis Badensibus et adjacentibus Radicem Rhei Monachorum vidi (quae a Rumice alpino sumenda est, nec non radicem Rumicis obtusifolii Linn. saepe vermibus et mucore destructa, interdum radices Thalictri flavi. Linn. In Gallia meridionali praesertim Radicem Rumicis alpini, quam rhizotomi in abundantia in pyrenaeis colligunt. In helvetia vidi sub Rad. Rhapontici, radices ex Rumice alpino et passim ex Centaurea Rhapontica Linnaei, seu ex Rhapontico folio Helenii incano. Casp. Bauh. pin. p. 117. In Catalonia et Aragonia nec non in Castiliis, Radices e Centaurea Centaurio Linn. seu Centaurium majus folio in lacinas plures diviso. Casp. Bauh. pin. 117. Rhapontica quae hodie Centaurea major. Trag. et Cord. et radices Rumicis alpini, (Castilianis Rapontico vulgar) sub Rapontica observavi.



**616.\*\* RHEUM *hybridum*** foliis supra glabris subtus pilosiusculis sublobatis acutis, sinu baseos angustato, petioli supra obsolete sulcatis margine rotundatis. *Ait. H. Kew. 2. p. 42. Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 490.*

**R.** foliis cordatis acuminatis planis, radicalibus utrinque bi-vel tridentatis, reliquis repandis. *Murr. in Comm. Gött. 1779. p. 7. et 1774. p. 50.*

**Icon.** *Murr. l. c. tab. 12.*

**Germ.** *Bastard-Rhabarber.*

**Gall.** *Rhabarbe batard.*

**Hab.** In Asia boreali. Colitur passim in hortis et agris, Circa *Carlsruhe, Wiesloch* et alibi.

**Flor.** Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* crassa, ramosa, intus marmorea, rubella, flavido-mixta. *Caulis* 4-5 pedalis, erectus, simplex. *Folia* inferiora longe petiolata, cordata, acuminata, plana, inciso-grosse bi-vel tri dentata, sesquipedem ad 2 pedes longa, superiora repanda, subtus costato-venosa, pilosiuscula. *Petioli* crassi, supra obsolete sulcati. *Flores* terminales longe corymbosi.

Sine dubio proles hybrida, ex *Rheo palmato* et *undulato*.

Radices ex plantis annosioribus, Radici *Rheimoscovitici* (quae ex *Rheo palmato* et *compacto* nec non ex *undulato*) saepe substituantur.

**Obs.** Radices ex plantis apud nos cultis, in pharmacis passim sub Rheo moscovitico vidi. Differt a Rheo chinensi s. moscovitico et sibirico, radicibus seu frustis longioribus multo tenuioribus, spongiosioribus, levioribus pallide rubellis, magis friabilibus, et adstringentibus, odore et sapore rhabarbarino remissiori. Sub masticatione tenax, indissolubile dum Rheum chinense seu moscoviticum et sibiricum selectum, masticatum, in ore solvitur

Radices apud nos cultae, hucusque pro dolor nimis cito et ante maturitatem effodiebantur. Hyemes nostras bene fert. Sed requiruntur 10-12 anni ad incrementum et maturitatem radicis. **Conf.** Pallas Reise durch verschied. Provinzen des Russischen Reichs. Tom. 3. p. 137.

Rheum palmatum producit Rhabarbarum in officinis Sibiricum appellatum; certe e seminibus e Bucharis et montosis Tibeti in Russiam apportatis et postea satis, hocce Rheum palmatum enatum est. Pallas. l. c. Rhabarbarum vero Chinense ex alia specie Rhei desumptum esse videtur. Ex observatione Cl. Joh. Gottl. Georgi in Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich. T. 1. p. 211. 212. annosior radix Rhei undulati simillima evadit Rhabarbaro Chinensi, facie, colore, fragrantia et vi purgante. Et vero credit Ill. Pallas l. c. p. 156. hocce Rheum undulatum, quod in montosis Sibiriae frigidis ac humidis ut plurimum laborat radicibus corruptis, in montibus regni Tibet siccioribus, apricis, magisque australibus, feliciter provenire, radicesque gerere excellentiores, quae forte Rhabarbarum Chinense eximium efficiunt.

Rhabarbarum Chinense occurrit in frustis oblongis seu subrotundis, hinc planis inde convexiusculis, palmaribus vel longioribus

previoribusque, subponderosis; parenchymate solido, minus friabili e rubicundo-luteo et albo-variegato; quod, recenter pulveratum abit in pulverem subcroceum, demum sensim rubescentem. Masticatum solvitur in ore, si bonum quemadmodum etiam Sibiricum, deterior autem varietas sub masticatione tenax et indissolubilisprehenditur. Sibiricum Rhabarbarum magis spongiosum, friabile, leve, pallidum seu albescenti-lutescens; Chinense vero magis solidum, ponderosum, durum et saturatius tinctum. Colitur hoc a Chinensibus praecipue in provincia Xensi sub nomine Taiboang. Hyeme effodiuntur radices atque in taleolas erassas dividuntur, succo viscoso distillante, quae taleolae in mensis mox reponuntur, in umbra, crebroque per diem revolvuntur, ut succus non defluat, sed sensim absorbeatur et concreascet, quo facto, transactis per illas funiculis, in aëre libero, itemque loco umbroso, suspenduntur. Ex radicis recentis libris septem, vix una alterave siccata obtinetur. Nievhov. Legat. Batav. 2. p. 81. Rheum Sibiricum in Sibiria non crescit, sed sat copiose in montosis Mongaliae. Optimum et selectissimum Rhabarbarum sponte crescit apud Mongalos orientales ad Soczi in vicinia Chinae. Recueil de Voyages au Nord. Tom. 10. p. 46. Amat humum profundam, laxam et coelum serenum, nec pluviosum. Radices annosas colligunt incolae et in frusta conscindunt, quae perforant, atque in parietibus tentoriorum, vel etiam in ipsis cornubus ovillis, ad siccandum suspendunt. D'Antermomy Voyages dans divers contrées de l'Asie etc. I. p. 223. sequ.

---

CLASSIS X.  
DECANDRIA.  
MONOGYNIA.

---

pag. 193. post ANDROMEDAM.

CCIV. \* RHODODENDRON. *Cor.* infundibuliformis. *Stamina* declinata.  
*Caps.* 5 - locularis.

pag. 197. DICTAMNUS *albus*.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi prope *Engen* in convallibus asperis calcareis *Griechenthal* copiose ubi vidi 1807. Circa *Wertheim* ad montem *Flæhberg* et *Calmuth* post *D. Wibelium* vidi.

*Obs.* Pars corticalis a medulla lignosa separata, glabra, alba, odorata, aromatica, amara, in pharmaciis in vasis bene obturatis servanda, omnino efficax in febribus tertianis. Radicem vermibus corruptam non rite siccata et asservatam saepe ex pharmaciis removi.

pag. 200. MONOTROPA *Hypopithys*.

*a. glabra* minor, racemo subnutante (paucifloro) floribus pubescentibus. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 462.

*M. hypophegea.* *Wallr. Sched. crit.* 1. p. 191.

*β. hirsuta* major, racemo erecto (multifloro) floribus majoribus, petalis interioribus



cum staminibus pistillo et capsula pilosissima. *Roth. l. c.*

*M. Hypopithys. Wallr. Sched. crit.*

*Icon. Sow. Engl. bot. tab. 69.*

*Nota.* Varietates inter  $\alpha$  et  $\beta$  mediae prostant, hinc vix specie diversae sunt.

pag. 205. post *ANDROMEDAM polifoliam.*

#### CCIV.\* RHODODENDRON.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 746.*

*Perianthium* quinquepartitum, persistens. *Corolla* monopetala, rotato - infundibuliformis: *Limbo* patente: laciniis rotundatis. *Staminum filamenta* declinata. *Germen* pentagonum retusum. *Stylus* filiformis longitudine corollae. *Stigma* obtusum. *Capsula* ovata, subangulata, quinquelocularis. *Semina* numerosa, minima.

620.\* *RHODODENDRON ferrugineum*  
foliis glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus. *Linn. Sp. pl. 1. p. 562.*

*Rhododendron* foliis ellipticis, glabris, subtus rubiginosis. *Hall. hist. n. 1015.*

*Ledum alpinum*, foliis ferrea rubedine nigricantibus. *Bauh. pin. 468.*

*Icon. Jacqu. Obs. 1. tab. 16. Flor. Austr. tab. 255.*

*Germ. Rostfarbiges Alpenröslein.*

*Gall. Rosage ferrugineux. Laurierrose des alpes.*

*Hab.* In Principatu superiori prope *Constanz* ad lacum, ubi detexit generosissimus *Yttner*; nec non in subalpinis retro *St. Gallen* prope *dem Weisbad am Gamor et Kasten* vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri Octobri matura ☿

*Fruticulus* semipedalis, pedalis et altior. *Folia* breviter petiolata, ovali-oblonga, glabra, duriuscula, integra, margine reflexa, superne læteviridia, inferne leproso-ferruginea. *Flores* terminales racemosi. *Corolla* subinæqualis, amœne rubra, basi punctis ferrugineis notata.

*Nota.* Planta alpina, sine dubio per alluvionem ex altioribus usque ad lacum Bodamicum migrata.

*Varietatem* raram *Floribus* albis vidi in alpinis altioribus *Helvetiae* nec non in *Pyrenaeis*.

*Pharm. RHODODENDRI ferruginei Folia.*

*Folia* substituuntur passim in nostris et *helvetiae* officinis foliis *Rhododendri chrysanthi*.

Pulcherrimus omnino frutex, in hortis difficile cicurandus.

620. \*\* *RHODODENDRON hirsutum* foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 562.

*R. hirsutum* foliis ellipticis acutiusculis ciliatis subtus punctatis, corollis infundibuliformibus. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 604.

R. foliis ovatis, ciliatis, subtus punctatis.  
*Hall. hist. n.* 1016.

*Ledum alpinum hirsutum.* *Bauh. pin. p.*  
 468.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 98.

*Germ. Gefranztes Alpenröslein.*

*Gall. Rosage hérissé.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris subalpina alpinaque prope *St. Gallen* retro *dem Weisbad*, *dem Gamor*, *Kasten et Sentis*, ubi eam vidi *Ann.* 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri matura. ‡

*Fruticulus* semipedalis, pedalis et altior, elegans. *Folia* breviter petiolata, ovata, ciliata subtus punctulata, læte viridia. *Flores* terminales, racemosi. *Corollæ* infundibuliformes, amœne rubræ.

*Var.* *Corollis* albis in altioribus alpinis helvetiae et in pyrenaeis vidi.

pag. 209. *PYROLA rotundifolia.*

*P. rotundifolia* calyce quinquepartito, corolla aperta, stylo corolla duplo longiore. *Radius de Pyrola Dissertatio. Lips.* 1821. p. 28. *Seringe Mus. helv.* 1. p. 35.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 213. (optima.)  
*Seringe l. c.*

622.\* *PYROLA media* calyce quinquefido, corolla campanulato-globosa, stylo

exserto. *Radius l. c. p. 21. Swartz Vet. Act. Hand. 1810. p. 191. Sow. Engl. Bot. Vol. 28.*

*P. rotundifolia. Fl. Dan. et passim aliorum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1945. Radius l. c. Fl. Dan. tab. 110.*

*Germ. Mittleres Wintergrün.*

*Gall. Pyrole intermediaire.*

*Hab. In nemoribus colliculosis umbrosis humidis. Inter Berghausen et Iöhlingen, inter Weingarten et Obergrombach in umbrosis fagineis humidis, prope dem Bad Langensteinbach rarius, ubi eam vidi 1809.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 4*

Planta pulchella, medium tenet inter *P. rotundifoliam* a *P. minorem*. Differt a priori *Corolla* non alba - subrubella aperta, sed campanulato - globosa, ex viridescente - alba, margine dilute rosea. *Stylo* breviori. *Staminibus* conniventibus; a *P. minori*: *Scapo* longiore. *Foliis* radicalibus majoribus. *Racemo* speciosiori. *Corolla* majori, campanulato - globosa, nec campanulato - patula.

pag. 210. *PYROLA minor.*

*P. minor* calyce quinquefido, corolla campanulato - patula, stylo majori. *Radius l. c. p. 12.*

*Icon. Radius. l. c. Sow. Engl. Bot. tab. 158.*



623.\* *PYROLA rosea* calyce quinquefido, corolla campanulato - globosa stylum æquante. *Radius l. c. p. 18. Sow. Engl. Bot. Vol. XXXVI.*

*Icon. Radius l. c. Sow. l. c. tab. 2543. (bona.)*

*Germ. Rosenfarbiges Immergrün.*

*Gall. Pyrole à fleurs couleur de rose.*

*Hab.* In iisdem passim regionibus eum *P. minori* rarius. Circa *Grünwettersbach, am Bad Steinbach* in umbrosis humidis fagineis; inter *Neuenbürg et dem Wildbad* in umbrosis vidi 1815.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturat. 4

Primo intuitu maxime affinis *P. minori*, cum qua sæpius confundebatur, a qua distinguitur. *Scapo* firmiori, longiori. *Racemo* longiori. *Corollis* majoribus campanulato-globosis, non campanulato-patulis, albide-roseis. *Stylo* recto, breviori.

*Conf. Cl. Radii Dissert. eximiam de Pyrolis.*

623.\*\* *PYROLA chlorantha* staminibus adscendentibus, pisillo declinato, calyciis laciniis adpressis, scapo subnudo, racemo multifloro. *Swartz. l. c. 1810. p. 190, Fl. Dan.*

*P. chlorantha* calyce quinquefido corolla campanulato-patula, stylo corolla semilongiori. *Seringe Mus. helv. p. 37.*

*P. chlorantha* filamentis circa germen curvatis, stylo ad latus deflexo, segmentis calycinis acutis. *Dierb. Fl. Heidelb. p. 112.*

*P. virens.* *Sweigg. et Korte. Fl. Erl. add. p. 154.*

*P. media.* *Hayne Arznei-Gew. IV. p. 22.*

*P. asarifolia.* *Radius l. c. p. 23.*

*Icon.* *Radius l. c. Seringe l. c. Flor. Dan. tab. 1693.*

*Germ.* Grüngelblühendes - Wintergrün.

*Gall.* *Pyrole à fleurs jaune verdâtre.*

*Hab.* In Pinetis umbrosis inter Bühl et dem Bühlerbad nec non prope Schwetzingen in Gemeinde - Wald frequens, ubi cum Zeyhero 1845 vidi, in palatinatu trans rhenum circa Kaiserslautern t. D. Kochio.

Medium quasi tenet inter *P. rotundifoliam* et *P. minorem*. Differt a *P. minori*: *Scapo* breviori, graciliori. *Corolla* semper viridi-flavescente. *Filamentis* circa germen curvatis. *Stylo* declinato, recurvo. Differt a *P. rotundifolia*: *Scapo* breviori, graciliori. *Corolla* minori, viridi-flavescente, nec albide-lutescenti seu albide-rubella. *Stylo* longiore.

pag. 211. *PYROLA secunda.*

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab. 517.*

pag. 211. *PYROLA umbellata.*

*Chimophila umbellata.* *Radius l. c. p. 33.*

**Hab.** Porro prope *Schwetzingen* in Pineto sabuloso *im Gemeinde Wald* ubi cum *Zeyhero* vidi 1815.

pag. 212. *PIROLA uniflora*.

**Icon.** *Sow. Engl. Bot. tab.* 146.

**Hab.** Porro in Principatus superioris pinetis circa *Mærsburg, Ueberlingen, Salem*, ubi eam vidi 1816, nec non in pineto retro *St. Gallen* helvetiæ.

## DECANDRIA DIGYNIA.

pag. 216. ante *SAXIFRAGAM Aizoon*.

629.\* *SAXIFRAGA Cotyledon* foliis radicalibus aggregatis lingulatis, cartilagineo-dentatis, caule paniculato, folioso, calycibus glanduloso-pilosis. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 638.

*S. Cotyledon* foliis radicalis aggregatis lingulatis, cartilagineo-serratis, caule paniculato. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 570.

*S. foliorum* ora cartilaginea serrata, petiolis paucifloris petalis punctatis. *Hall. hist.* n. 978. *var. a.*

**Germ.** *Nabelkrautartiger Steinbrech.*

**Gall.** *Saxifrage Cotyledon majeur.*

**Hab.** In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthale* in rupibus calcareis, nec non in vicina helvetia *am Gamor et Kasten* frequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 24

Planta maxime variabilis. *Folia* majora et minora, lingulata, ovalia, latiora et angustiora. *Caules* plus minusque paniculati. *Corollæ* petala majora et minora, plus minusve punctata. *Calyces* subglandulosi.

pag. 217. *SAXIFRAGA Aizoon.*

β. minor brevifolia, foliis retusis. *Sternb. Saxifr. tab. 3. fig. β.*

*Hab.* In rupibus calcareis *im Donauthal* retro *Mæskirch* in Principatu superiore, ubi vidi *Ann.* 1818.

pag. 218. post *SAXIFRAGAM Aizoon.*

629. \*\* *SAXIFRAGA mutata* foliis radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineis repandis, caule racemoso, folioso, calycibus glanduloso-pilosis, petalis linearilanceolatis. *Willd. Sp. pl. 2. p. 640. Sternb. Saxifr. p. 6. Don. Monogr. of the genus Saxifraga in Transact. of th. Linneen soc. Vol. XIII. p. 395.*

§. *mutata* foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-serratis, caule racemoso folioso. *Linn. Sp. pl. 1. p. 575.*

§. foliorum ora cartilaginea rarissime dentata, petalis maculosis. *Hall. hist. n. 979. tab. 16.*

*Geum alpinum* majus viscosum: foliis oblongo-rotundis, atro-rubentibus et croceis floribus. *Scheuchz. It. 2. p. 124.*



*Icon. Jacqu. Icon. rar. tab. 466.*

*Germ. Veränderter Steinbrech*

*Gall. Saxifrage mutué.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris in montosis et subalpinis prope *St. Gallen* non infrequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio. *Semina* Augusto matura. 4

*Radix* subsusiformis, oblique horizontalis, fibrosa, extus nigra. *Caulis* sesquipedalis, bipedalis et altior, erectus, crassiusculus, firmus, teres, villosus - viscidus, viridis, ex viridi - rubellus seu brunneus, a medio ad apicem pyramidato - paniculato - racemosus. *Racemi* alterni, axillares, longe pedunculati, apicem versus, 2 - 3 - 4 flori. *Folia radicalia* in rosulam congesta, sessilia, lingulata, 2 - 3 uncialia, obtuse rotundata, viridia, margine piloso - ciliata, albida; *caulina* alterna, sensim minora, radicalibus similia, sessilia, copiosa, oblongo - obovata. *Calyx* quinque-partitus, segmentis ovatis, obtusis, integris, viridibus, corolla multo brevioribus, villosus - viscidis. *Corolla* patentissima. *Petala* quinque, lineari - lanceolata, acuta, pallide luteo - aurantiaca, calyce triplo longiora.

Speciosa et pulcherrima omnino planta, in hortum transplantata, constans.

*Nota.* Halleri tab. 16. citata planta, recedit a nostra: Corollarum Petalis multo latioribus, brevioribus obtusiusculis. Foliis radicalibus minoribus minus lingulatis, acutiusculis nec obtusis.

pag. 219. *SAXIFRAGA autumnalis.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris prope *St. Gallen* frequens, ubi eam vidi *Ann.* 1818.

pag.

pag. 220. post *SAXIFRAGAM autumnalem* :

**631.\*** *SAXIFRAGA caesia* foliis linearibus perforato - punctatis aggregatis recurvis, caule multifloro. *Jacqu Fl. Austr.* 4. *Scop. Fl. Carn. n.* 495. *Sternb. l. c.* p. 34. *Don. l. c. p.* 402.

*S. recurvifolia* foliis linearibus aggregatis integris recurvis glaucis, caule subnudo; petalis patentibus unguiculatis. *La Peyr. Fl. Pyren. p.* 224.

*S.* foliis crassis duris recurvis, subtus sulcatis basi ciliatis. *Hall. Hist. n.* 982.

*S. alpina minima* foliis cæsiis deorsum incurvatis. *Sequ Veron.* 449. *tab.* 9. *fig.* 2.

*Sedum alpinum minimum*, foliis cinereis flore candido. *Scheuchz. lt. alp.* 341. *tab.* 21. *fig.* 1.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. IV. tab.* 374. — *Scop. l. c. tab.* 15.

*Germ.* Grau-blaulicher Steinbrech.

*Gall.* Saxifrage à sévilles grisâtre.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Moeskirch im Donauthal* in summis rupibus calcareis retro *Werrewag*, nec non in vicina helvetia retro *Weisbad* in ascensu montis *Gamor et Kasten*, eam vidi *Ann.* 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. *U*

*Radix* ramosa, renens, fusca. *Cæspites* densissimi. *Folia* radicalia numerosa, petiolata,

parvula, oblonga, acuta, integra, cæsio-glauca, deorsum apice reflexa, per medium sulcata, subius per lentem punctulata, ad petiolum ciliata, dura. *Caules* erecti, nudiusculi, 3 - 5 uncias longi, tenelli, 1 - 2 - 3 - 5 flori. *Corollæ* parvæ. *Petala* rotunda, lactea, aquose lineata.

631. \*\* *SAXIFRAGA bryoides* foliis lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis, caule nudiusculo paucifloro, calycibus obtusis. *Willd, Linn. Sp. pl.* 2. p. 643. *Don. l. c. p.* 581.

*S. bryoides* foliis ciliatis inflexis imbricatis, caule nudiusculo paucifloro. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 572. *Jacqu. Misc.* 2. p. 49. — *Scop. Fl. Carn. n.* 497.

*Saxifraga* foliis lanceolatis ciliatis compactis, caule unifloro. *Hall. Helv. n.* 969.

*Sedum muscosum*, *Joh. Bauh. hist.* 3. p. 695. *Scheuchz. alp.* 142.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 5. *fig.* 1. *Scop. l. c. tab.* 15. *Scheuchz. l. c. tab.* 21. *fig.* 2.

*Germ. Moosartiger Steinbrech.*

*Gall. Saxifrage bryoide.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia in agro Abbatis cellensi retro *dem Weisbad* in rupibus calcareis *am Gamor, Sentis et Kasten*, ubi eam vidi 1814.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* ramoso-fibrosa, repens, fusca. *Cæspites* rotundi, densi, canescentes. *Folia* radi-

calia numerosa, lineari-lanceolata, acutiuscula, supra plana, subtus convexiuscula, integra, margine molliter ciliata, *Caulina* sparsa, sessilia, linearia, angustissima, erecta, margine ciliata, lutescente-virentia. *Caulis* erectus, bi-triuncialis, teres, glaber. *Flos* terminalis, solitarius, mediocris, erectus. *Calyx* quinquepartitus, *foliolis* integris, erectis, concavis, nudis. *Corollæ* petala ovato-lanceolata, obtusiuscula, integra, patentia, ex lutescente-albida, supra basin aurantiaco-guttulata, calyce duplo longiora.

pag. 220 ante *SAXIFRAGAM rotundifoliam*.

632.\* *SAXIFRAGA oppositifolia* foliis confertis ovatis ciliatis oppositis, staminibus et pistillis corolla brevioribus, petalis subrotundis. *Lapeyr. Fl. des Pyren. p. 226. Sternb. l. c. p. 36. Don. l. c. p. 400.*

*S. oppositifolia. Linn. Sp. pl. 1. p. 575. Smith. Fl. Brit. 1. p. 450. Allion. Fl. Pedem. n. 1529. tab. 21. fig. 3. Wulf. in Jacqu. Collect. 2. p. 286.*

*S. caule repente, foliis quadrifariam imbricatis cartilagineis ciliatis. Hall. hist. n. 980.*

*Sedum alpinum ericoides cœruleum. Bauh. hist. 3. p. 694.*

*Icon. Lapeyr. pyren. Saxifr. tab. 16. Sow. Engl. Bot. tab. 9. Curtis. Fl. Lond. tab. 27. Flor. Dan. tab. 34. Linn. Fl. Lapp. tab. 2. fig. 1.*



*Germ.* Entgegengesetzt-blättriger Steinbrech.

*Gall.* Saxifrage à sévilles opposees.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris helvetia in rupibus calcareis auf dem Hohenmesner, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 4

*Cauliculi* prælongi, cæspitosi, prostrati, ramosi, foliosi. *Folia* opposita, quadrifariam imbricata, ovata, obtusa, ciliata. *Flores* terminales, solitarii. *Petala* obovata, purpurea, staminibus et pistillis longiora.

632. \*\* *SAXIFRAGA biflora* foliis obovatis oppositis distantibus ciliatis, corolla et pistillis calycem et stamina duplo superantibus, petalis linearibus. *Lapeyr. Fl. des Pyren. p. 227. Sternb. l. c. p. 37. Don. l. c. p. 412.*

*S. biflora* caulibus repentibus surculiferis, foliis omnibus oppositis obovatis ciliatis, surculorum rariter imbricatis punctatis, pedunculis subtrifloris, calycinis segmentis ovato-obtusis, petalis lanceolatis. *Hohenwarth et Reiner it. p. 158. — Allion. Fl. Ped. n. 1550. — Decand. Fl. Franc. 4. p. 565.*

*S. oppositifolia. β. biflora. Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 648.*

*Saxifraga* foliis imbricatis ovatis, caulibus reptantibus bifloris. *Hall. hist. n. 981.*

*Icon.* *Lapeyr. Fl. pyr. tab. 17. Hohenwarth l. c. tab. 2. fig. 2. Allion. l. c. tab. 21. fig. 1.*

*Germ.* Zweyblüthiger Steinbrech.

*Gall.* Saxifrage a deux fleurs.

*Hab.* In Principatu superiore am *Hornstaden* non infrequens, ubi detexit generosus *Yttner*. In vicina helvetia retro dem *Weisbad* ad montem *Gamor et Kasten*, eam vidi 1818. 4

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio. 4

*Cauliculi* numerosi, surculiferi, repentes, foliosi. *Folia* opposita, obovata, ciliata. *Pedunculi* biflori. *Petala* lanceolata. violaceo-cœrulea, calyce duplo longiora, erectiuscula.

Plantula elegans, pro Flora rarissima, sine dubio ex alpinis helvetiae in locum citatum migravit.

Planta cum praecedente in hortum transplantata, constans permansit.

Specimina in Pyrenaeis a me lecta, a nostratibus nullo modo recedunt.

pag. 221. *SAXIFRAGA rotundifolia.*

*Hab.* In Principatu superiore retro *Mæskirch im Donauthal* frequens, ubi eam vidi 1814 et sequ.

*Nota.* Planta alpina subalpina, sine dubio per alluviones, in regionem citatam migravit.

632. \*\*\* *SAXIFRAGA aspera* foliis caulinis lanceolatis alternis spinoso ciliatis, caule inferne procumbente. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 575. *La Peyr. Fl. Pyren.* p. 226. *Sternb. l. c. p.* 29. *Don. l. c. p.* 372.

*S. foliis duris ciliatis, caule ramoso - paucifloro. Hall. hist. n. 970.*

*Sedum alpinum hispidum fere spinosum, flore pallido. Bauh. hist. 3. p. 695.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. 5. app. tab. 31.*

*Germ. Scharfer Steinbrech.*

*Gall. Saxifrage scabre.*

*Hab. In vicinia Principatus superioris retro St. Gallen prope dem Weisbad auf dem Gamor, Kasten et Sentis in rupibus calcareis frequens, ubi eam vidi 1818.*

*Flor. Junio, Julio, Semina Augusto maturata. 4*

*Cæspites magni, densi, sarmentosi, prostrati. Cauliculi tenues, simplices, 3-4 unciales, basi procumbentes, dein erecti, teretes, graciles, subpubescentes, foliosi, versus apicem ramosi. Pedunculi axillares tres ad quinque, uniflori. Folia caulina sessilia, lineari-lanceolata, nuda, viridi-lutescentia, margine subspinuloso-ciliata: ciliis albidis rigidulis. Foliola calycina ovato-acuta, subvillosula, corolla duplo breviora, dilute viridia, margine albida. Corollæ petala rotundo-ovata, integra, alba, basi macula pallide flava notata. Capsula oblonga, bistrotris, polysperma.*

*Obs. Specimina in pyrenæis a me lecta et in horto Carlsruhensi culta, constantissima, nostratibus in omnibus partibus simillima.*

pag. 224. *SAXIFRAGA Sponhemica.*  
(*mihi.*)

*Icon. Propria.*

**Nota.** In Catalogo plantarum palatinarum scribit Cl. Koch. Saxifragam Sponhemiam meam nil aliud esse quam *S. condensatam* meam in Flor. Badensi descriptam. Ad haec moneo: differentiam specificam ambarum specierum scrupulose dedi, ambas species, cum aliis multifariis in horto botanico, et quidem in uno eodem loco colui, ubi hucusque constantissimae. A. Saxifraga decipiente (ante 40 jam annos in Franconia a me lecta et a meritissimo Ehrhardto accepta, in horto Carlsruhensi culta) nec non a *S. palmata* Smith. Fl. Brit. Sow. Engl. Bot. tab. 455. seu *S. caespitosa* Flor. Dan. tab. 71? quae vix pro eadem, cum *S. decipiente* Ehrh. habenda, omnino diversa est.

Nec confundenda cum Saxifraga palmata (Panzeri) seu *S. Sternbergii* foliis cuneiformibus palmato-quinquefidis ciliatis, petiolo lineari longioribus, caulibus sterilibus brevissimis cespitosis, floriferis adscendentibus simplicibus. Willd. Enum. p. 462. Sternb. Saxifr. p. 56. tab. 26 Saxifragam palmatam (Panzeri) ab amicissimo in me viro, in herbario possideo.

Misi perill. Schrebero *S. Sponhemiam* et *S. condensatam* meam, qui ambas pro diversis et novis speciebus declarabat.

pag. 227. post *SAXIFRAGAM condensatam*.

636. \* *SAXIFRAGA muscoides* foliis radicalibus aggregatis integris trifidisque oblongis obtusis, caule filiformi subbifloro, petalis vix calyce longioribus. Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 656. Don. l. c. p. 437.

*S. muscoides* foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, scapo gra-



cili suberecto paucifloro, floribus citrinis subsessilibus. *Wulfen. ap. Jacqu. Misc. 2. p. 123.*

*S. caespitosa* foliis carnosis enerviis; scapo filiformi subunifloro; petalis linearibus calycem æquantibus. *Lapeyr. pyren. Saxifr. p. 59. Sternb. Saxifr. p. 39.*

*Saxifraga* foliis integris et trifidis, caule subnudo, paucifloro. *Hall. Helv. n. 988.*

*Saxifraga pyrenaica*, foliis partim integris partim trifidis. *Hall. Opusc. p. 292. Seg. Plant. Veron. 1. p. 451*

*Icon. Lapeyr. l. c. tab. 34 et 35. Sternb. l. c. tab. 11. fig. 1.*

*Germ. Rasenartiger Steinbrech.*

*Gall. Saxifrage mousse.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia retro *dem Weisbad* in rupibus asperis calcareis, *am Wildkirchlein, Sentis, Kasten et Gamor* frequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4

*Radix* repens, multiceps. *Cæspites* magni, densi, læte virescentes *Folia* radicalia in rosulas densas digesta, simplicia, integra, bifidis sæpius trifidis intermixta, cuneiformi - linearia, glabra, parvula. *Scapus*, 1 - 2 uncialis, erectiusculus, tenuis, teres, subaphyllus, glaber, rarius subvillosus. *Flores* terminales, 1 - 2, sæpius 3. mediocres, brevissime pedicellati. *Calycis* quinquepartitus, foliolis ovatis integris, corolla brevioribus. *Corollæ* petala linearia, inte-

gra; lineata, ex viridi - luteola, calyce sublongiora, patentia.

Plantula cum sequente in horto Carlsruhensi culta constantissima.

**636.\*\*** *SAXIFRAGA moschata* foliis cuneatis hirtis sulcatis integris bi-trifidisque; petalis ellipticis carinatis calyce majoribus. *Lapeyr. Pl. Pyren. p. 235 Don. l. c. p. 436. Wulf. in Jacqu. Miscell. II. p. 128. Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 656. Don. l. c. p. 438.*

*S. caespitosa. Scop. Fl. Carn. n. 494. tab. 14.*

*S. muscoides. Sternb. Saxifr. p. 39. (excl. Smithii Fl. Brit. Synon.)*

Sedulum quod Moschatellina alpina lutea vocari potest. *Gesn. Fasc. 25. tab. 6. fig. 31.*

*Icon. Lapeyr. pyren. Saxifr. tab. 37. Wulf. l. c. tab. 21. fig. 2. Sternb. l. c. tab. 11. fig. 2.*

*Germ. Bisam - Steinbrech.*

*Gall. Saxifrage musqué.*

*Hab. In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses in rupibus calcareis retro dem Weisbad am Wildkirchlein, Gamor et Kasten, ubi eam vidi 1818.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto, Septembri maturat. 4*

Affinis *S. muscoidi* cum qua sæpius confundebatur, a qua tamen distinguitur: *Caulicu-*

*lis* foliisque non glabris sed subpubescentibus. *Corollæ* petalis non linearibus sed ellipticis, calyce longioribus. *Cæspitibus* laxioribus, demum odore moschatellino.

Variat foliis omnibus integris, linearibus, plus minusve pubescentibus. Quammaxime in alpinis rupestribus altioribus ludit, ut demum vix a *S. muscoide*, nisi petalis ellipticis, non linearibus, dignoscenda.

pag. 230. ante *GYPHOPHILAM muralem*.

639.\* *GYPHOPHILA repens* foliis lanceolatis, petalis emarginatis, staminibus pistillo brevioribus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 581. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 471. — *Hoffm. Fl. Germ.* p. 146.

*Saponaria* caule simplici, foliis subulatis, planis, ex alis ramulosa. *Linn. H. Cliff.* 166.

*Saponaria* radice lignosa maxima, foliis pulposis, petalis emarginatis. *Hall. helv.* n. 905.

*Caryophyllus saxatilis*, foliis gramineis, minor. *Bauh. pin.* p. 211.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr.* 5. tab. 407.

*Germ.* *Kriechendes Gypskraut.*

*Gall.* *Gypsophille rampante.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris in agro Abbatiscellensi prope *St. Gallen* et retro dem *Weisbad* in subalpinis alpinisque, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 24

*Radix* prælonga, lignosa, multiceps. *Caulis* ex radice plures, tenues, prostrati, duri. *Rami* erecti, simplices, 4-7 unciales superne subtrichotomi, ad genicula purpurascens. *Folia* lanceolato-linearia, acuta, glauca. crassiuscula. sessilia, opposita, subuncialia. *Calycina* foliola lanceolata, acuminata, concava, dorso linea atrovirente vel purpurascens notata, margine albida, membranacea. *Corolla* subcampanulata. *Petala* apice subemarginata, nivea, calycem duplo superantia.

pag. 232. post GYPSOPHILAM *Saxifragam*.

640. \* *GYPSOPHILA fastigiata* foliis lanceolato-linearibus, obsolete triquetris lævibus obtusis secundis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 582. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 146. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 471.

*Saponaria* foliis pulposis, linearibus, caule umbellato, erecto, petalis ovatis. *Hall. hist. n.* 906.

*Lychnis gypsophila.* *Gmel. Fl. Sib.* 4. p. 144. tab. 61. fig. 1.

*Caryophyllus saxatilis*, floribus gramineis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211.

*Polygonum majus erectum angustifolium*, floribus candidis. *Mentz. pug. rar. tab.* 2. fig. 2.

*Germ.* Flachstraussiges Gypskraut.

*Gall.* Gypsophille fastigié.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi in rupi-



bus apricis gypsaceis prope *Unadingen*, ubi eam vidi *Ann.* 1814. Prope *Mombach* circa *Mainz* in sabusosis *t. D. Kochio*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto maturatione. ♀

*Caules* ex una radice plures, pedales, ante florescentiam subprostrati, florentes erecti. *Folia* caulina opposita, subsecunda, lanceolato-lineararia, obsolete triquetra, lævia; *summa* minora, ovato-lanceolata, obtusa. *Flores* corymbosi, terminales: *Corymbus* fastigiatus, laxis. *Petala* obovata, integra, staminibus breviora, albida, aut ex albido-dilute rubella.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

pag. 234.

642.\* *SAPONARIA Ocymoides* calycibus cylindricis villosis, caulibus dichotomis procumbentibus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 585. *Hagenb. Fl. Basil.* 1. p. 395.

S. caulibus procumbentibus nodosis, foliis ovato-lanceolatis, calycibus tubulosis hirsutis. *Hall. helv. n.* 909.

*Lychnis* vel *Ocymoides repens montanum*. *Bauh. hist.* 3. p. 344.

*Ocymoides repens polygoni folio*. *Lob. Icon.* p. 341.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr.* 5. app. t. 23. *Cavan. Ic. rar.* 2. tab. 134.

*Germ.* *Niederliegendes Seifenkraut.*

*Gall.* *Saponaire Ocymoide.*

*Hab.* In ditione Basileensi supra *Ramstein* perraro t. *Lachenalio*. In rupibus prope *Roche* abunde t. *D. Hagenbachio*. In monte *Weissenstein* t. *D. Neesio*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matura. 24

*Radix* ramosa, crassa, extus fusco nigricans. *Caules* plures, decumbentes, diffusi, nodosi, pedales, sesquipedales, dichotomi, villosi, florentes breviores, erecti. *Folia* opposita, ovato-oblonga, integra, plana, subsessilia, villosula. *Flores* subcorymbosi, in caulium dichotomiis pedicellati, vel axillares solitarii. *Calyces* cylindrici, villosi-glutinosi, rubelli. *Corollæ petala* patentia, emarginata, rubella.

*Obs.* Planta elegans, ex seminibus in horto botanico Carlsruhensi culta, in omnibus partibus duplo triplove major evadit. Specimina in pyrenæis a me lecta, nostratibus similia sunt.

pag. 240. ante *DIANTHUM sylvestrem*.

648.\* *DIANTHUS Caryophyllus* floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 587.

*D. caryophyllus* floribus solitariis, squamis calycinis subrhombeis brevissimis, petalis crenatis imberbibus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 461.

α. *coronarius* flore simplici.

*Caryophyllus hortensis simplex. Bauh. pin.* 208.

*Caryophyllus simplex* flore minore pallide rubente. *Raj. Syn.* 336.

β. flore subimpleto et impleto.

*Icon.* α. *Sow. Engl. Bot. tab. 214.* β. *Curtis Magaz. 39.*

*Germ.* Gartennelke. Grasblume.

*Gall.* Oeillet des Jardins.

*Hab.* α. circa thermas Badenses in muris antiquis passim; in Brisgovia *am Kaiserstuhl* prope *Breysach et Kuchlinsbergen* in muris ubi eam *Ann. 1809* vidi. Hospitatur in hortis, multis sub varietatibus.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Augusto Septembri matura. 4

Planta in hortis vulgatissima, forsā ex his ad muros apud nos (ut in Anglia) emigrata. *Flores* in individuis circa thermas Badenses et in Brisgovia, mediocres, simplices, pallide rubelli albidique, suave odorati.

*Pharm.* TUNNICAE s. CARYOPHYLLI  
*rubri Flores.*

Hodie saltem in regionibus rhenanis et adjacentibus in medicina fere exoleti. Corollae bene siccatae, in vitris obturatis servandae, odoratae, subadstringentes, in regionibus calidioribus cumprimis in hispania ad balnea aromatica, stimulantia exhilarantia cordialia, adhuc in usu quotidiano sunt. Longe amplissimum et pulcherrimum hortum ad Aranchuez Castiliae Caryophyllis innumeris copiosissimis superbientem, Reginae dicatum, summa admiratione vidi.

pag. 243. post DIANTHUM *deltoidem.*

649.\* DIANTHUS *caesius* caulibus unifloris, squamis calycinis subrotundis bre-

vibus, petalis crenatis pubescentibus, foliis margine scabris. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 463.

*Dianthus virgineus*  $\beta$ . *Linn. Sp. pl.* p. 590.

*Dianthus glaucus*. *Huds. Fl. Angl.* 1. p. 185.

*Tunica rupestris* folio cæsius molli, flore carneo. *Dill. hort. Elth.* 401. tab. 298. fig. 385.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 62.

*Germ.* *Felsen-Nelke.*

*Gall.* *Oeillet des roches.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch am Donauthal* Prope *Werrewag* in summis rupibus calcareis apricis frequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri. 2

*Radix* dura cæspitosa, rupes cooperans. *Caules* e radice numerosi, subpedales, erecti, simpliciusculi, glabri, glaucescentes, uniflori, perraro subbiflori. *Folia* caulina lineari-lanceolata, obtusiuscula, glabra, molliuscula, margine scabriuscula. *Corollæ* mediocres, dilute carneæ. *Petala* duplicato-crenata, ore lineata et barbata, villis purpurascens. *Calyx* glaucus, squamis quaternis, tubo triplo brevioribus, ovato-subrotundis, obtuse mucronatis, striatis.

Flores grate odorati.

Ad raras et pulchras omnino Florae cives pertinet.



## DECANDRIA TRIGYNIA.

pag. 250. *LYCHNANTHUS scandens*.

*Hab.* Circa *Wertheim* in dumetis prope *Hassloch. t. D. Wibelio*.

ad pag. 255. post *SILENEM noctifloram*.

657.\* *SILENE linicola* caule dichotomo, erecto, scabro, angulato, foliis caulinis lanceolatis basi attenuatis, acutis, glabriusculis, rameis patentibus, lineari-lanceolatis, calycibus clavatis decemstriatoangulatis, hispidulis, dentibus tubum corollæ æquantibus, margine albidis, petalis emarginatis. *mihi*.

*Icon. Propria.*

*Germ.* *Lein-Silene. Flachs-Silene.*

*Gall.* *Carnillet des champs de Line.*

*Hab.* Prope *Wertheim* ad *mœnum* in agris inter *Linum usitatissimum* frequens.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. ☉

*Radix* subfusiformi-fibrosa, albida. *Caulis* pedalis, sesquipedalis et altior, erectus dichotomus, inferne teretiusculus, glabriusculus, superne angulatus, scabritie hispidulus. *Folia* caulina rameaque infima, opposita, sessilia, basi subconata, patienti-erecta, lanceolata, acuta, versus basin sensim attenuata, integra, læte viridia, glabriuscula, per lentem spectata, punctulato-scabriuscula, sesquiunciam ad binas uncias longa, 2-5 ad 4 lineas lata; *ramea* patientia, lineari-lanceo-

lanceolata, angustiora. *Flores* ex caulis dichotomia, terminalesque. *Pedunculi* ex dichotomia solitarii, erecti, uniflori, hispidulo-scabri, longitudine foliorum. *Calyx* semiunciam longus, clavatus, decemstriato-angulatus, setuloso-hispidulus, pallide ex incano-viridis, quinquefidus, dentibus erectis, obtusis, margine albidis, longitudine tubi corollæ. *Corolla* albida, aut ex albido dilute carnea. *Petala* obtusa, emarginata, ad faucem coronata.

Planta primo intuitu affinis *S. creticae* Linn. a qua differt: Caulibus, calycibusque non glabris sed setuloso hispidulis. Corollæ petalis non semibifidis, amoene purpureis; Foliis inferioribus non elliptico-spathulatis, aut Bellidifoliis similibus.

Non pro *S. stricta* Linn. habenda, a qua differt: Calycibus non glabris, acuminatis, pedunculo longioribus, cauleque non stricto

Plantam cum acutissimo de Flora Wertheimensi meritissimo D. Wibelio, l. c. Ann. 1813 legi. Eandem nuper misit optimus Becker Director horti Francofurtensis, ab ipso lectam in agris inter Linum in Principatu Hohenlohe. Varietatem caule simplici unifloro, prope Wertheim lectam, misit Martinus.

657. \*\* *SILENE Armeria* floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris, petalis integris. Linn. Sp. pl. p. 601. Roth. Germ. 2. p. 496. Hoffm. Germ. p. 151.

*S. Armeria* paniculis dichotomis fastigiatis multifloris, petalis emarginatis acutis coronatis, foliis superioribus cordatis glabris, Smith. Fl. Brit. 2. p. 471.

*Viscago* foliis glabris ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 916.

*Lychnis viscosa* purpurea latifolia lævis. *Bauh. pin. p.* 205.

*Viscaria sativa.* *Tabernæmont. p.* 680. *Icon.*

*Armerius flos quartus.* *Dodon. Pempt.* 176.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 559. *Sow. Engl. Bot. tab.* 1398.

*Germ. Garten - Silene.*

*Gall. Silene Armeria.*

*Hab.* Circa *Gundelsheim* in sylva, t. merittissimo Theologo *Längio*. In sylva *Odenwald* in arvis prope *Amorbach* 1813 vidi. Colitur passim in hortis rusticorum aliisque.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caulis* erectus, pedalis, sesquipedalis, teres, glaber, ramosus, subgeniculis viscidus. *Folia* amplexicaulia, ovata, viridi-glaucescencia, glabra, superiora cordata. *Paniculae* speciosae, terminales, dichotomae, fastigiatae, multiflorae. *Calyx* glaucus, lævis. *Corollae* amœne rubellae, rarius albidæ. *Petala* integra, rotundata, emarginata. *Capsula* pedicellata, elliptica.

Planta florens pulchella, apibus accepta.

658.\* *SILENE quadrifida* petalis quadrilobis, caule dichotomo, floribus pedunculatis, foliis glabris recurvis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 602. — *Jacqu. Fl. Austr.*

*Lychnis quadridentata* petalis quadridentatis, caule dichotomo, foliis glabris recurvis, *Linn. Syst. veg.* 362. *Hoffm. Fl. Germ.* 158. *Roth. Fl. Germ. II.* p. 515.

*Lychnis alpina*, foliis angustis reflexis, petalis quadripartitis. *Segu. Pl. Veron.* 3. p. 186. *tab.* 5. *fig.* 1.

*Viscago* foliis teneris recurvis, petalis quadrifidis. *Hall. hist. n.* 918.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 120.

*Germ.* *Vierzähnige Silene.*

*Gall.* *Carnillet à quatre dents.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris circa *St. Gallen* prope *dem Weishad auf dem Gamor et Sentis* non infrequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4

*Caules* digitales, erecti, tenelli, simpliciusculi, quandoque subramosi, glabri. *Folia* opposita, sessilia, sublinearia, integerrima, patula. *Petunculi* longi, erecti. *Calyx* subcampanulatus, subquinquangulus. *Corollæ* petala nivea, patentia, lanceolata, levissime quadridentata. *Capsula* subrotunda-ovata, obtusa.

658. \*\* *SILENE Saxifraga* caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis, foliis glabris, floribus hermaphroditis feminisque, petalis bifidis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 603.

*Lychnis minor saxifraga.* *Segu. pl. Veron.* 431.



*Lychnis floribus trigynis erectis, capsulis trilocularibus, foliis linearibus. Scop. Carn. 1. p. 503.*

*Caryophyllus saxifragus. Bauh. pin. 211.*

*Icon. Segu. l. c. tab. 6. fig. 1.*

*Germ. Steinbrechende Silene.*

*Gall. Silene Saxifrage.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses retro *dem Weisbad am Gammor* in rupibus calcareis ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

*Radix* cæspiticia dura, ramoso - fibrosa. *Caules* plures, digitales et altiores, tenues, assurgentes, glabri. *Folia* caulina opposita, linearia, acuta, angusta, glabra, pallide viridia. *Pedunculus* terminalis, tenuis, filiformis, prælongus, erectus, uniflorus, rarius alter lateralis. *Calyx* clavatus, glaber. *Petala* profunde bifida, albida, subtus rubella.

*Nota.* Plantula in horto Carlsruhensi ex seminibus in loco citato a me lectis culta, constans,

658.\*\*\* **SILENE** *acaulis* acaulis foliis linearibus basi ciliatis, pedunculis solitariis unifloris, petalis coronatis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 472.*

*S. acaulis* acaulis depressa, petalis emarginatis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 603. — Flor. Lapp. 184.*

*Viscago* foliis gramineis, caule brevissimo unifloro. *Hall. hist. n. 919.*

*Muscus alpinus lychnidis flore.* *Bauh. hist.*  
3. p. 767.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1081. — *Fl. Dan.*  
*tab.* 21. — *Allion. Fl. Pedem. tab.* 79.  
*fig.* 1.

*Germ.* *Stiellose Alpen-Silene.*

*Gall.* *Carnillet sans tige.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris subalpina alpinaque helvetiæ, retro *St. Gallen am Wildkirchlein, dem Gamor et Kasten*; ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 2

*Radix* multiceps, cæspitosa. *Folia* numerosa, in rosulas congesta, linearia, subearinata, subciliata. *Cauliculi* seu melius *pedunculi* numerosi, erecti, simplices, semiunciales, unciales, nudi, glabri, uniflori, post florescentiam subelongati. *Flores* parvi, amœnissimi, roseo-incarnati. *Petala* limbo patentia, subemarginata, fauce coronata. *Calyx* semiquinquefidus, glaber. *Capsula* calyce duplo longior, subcylindrica.

Caespites magnos subrotundos plantula florens amoenissima efformat, quae in alpinis altioribus fere acaulis, seu pedunculis, 2 - 3 - 4 lineas longis obvenit.

pag. 257. *STELLARIA nemorum.* Linn.

*S. nemorum* foliis inferioribus cordatis petiolatis; superioribus ovatis sessilibus, panicula dichotoma. *Smith. Fl. Brit.*  
2. p. 473.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 92.

β. *latifolia* foliis inferioribus petiolatis subcordatis, caulinis ovatis subsessilibus, caule simpliciter dichotomo, pedunculis fructiferis reflexis. *Pers. Synops.* 1. 501.

S. *dichotoma* foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 486. (excl. *Linnæi synonymo*) *Scopol. Fl. Carn. ed. 2. n. 533.* (except. *Linn. Syn.*)

S. *nemorum* β *latifolia* foliis ovatis inferioribus subcordatis, calyce glabro. *Haagenb. Fl. Basil.* 1. p. 405.

*Myosotis* foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis β. adultior, magis calva, foliis superioribus solis reliquis. *Hall. helv. n. 886.* (excl. *Linn. syn.*)

*Hab.* Cum α. in montosis sylvaticis humidis passim.

Tripedalis et altior. *Folia* cordata et ovato-lanceolata, ima petiolata, superiora sessilia, magis villosa-ciliata. *Calycina* foliola glabra. *Petala* ad basin fere bipartita, alba, calyce duplo longiora.

*Nota.* Vix ac ne vix pro peculiari specie, sed pro mera varietate levidensi S. *nemorum* Linn. habenda est. Sine dubio planta annosior, adultior, sola fere folia superiora sessilia, ovato-lanceolata, cum paucis inferioribus petiolatis, cordatis. Sic cum Ill. Hallero. sentio.

*Obs.* Semina hujus, prope Rippoldsau et Griesbach Ann. 1818 a me lecta, in horto Carlsruhensi culta, exhibuerunt specimina in omnibus partibus simillima S. *nemorum* Linn.

In uno eodemque individuo. Caules glabriusculi, et pilosuli. Folia glabriuscula, plus minusve pilosula. Panicula subdichotoma, glabriuscula, et subpubescens. Pedunculi floriferi erecti, glabriusculi et villosuli; fructiferi reflexi. Calyces basi villosuli, et glabri. Styli semper tres.

Nota. Minime pro *S. dichotoma* Linn. planta annua, in alpinis Sibiricis obveniente, habenda, quae faciem fere *Alsines mediae* Linn. habet. Petala emarginata, (nec profunde bipartita) longitudine calycis, (nec calyce duplo longiora) Conf. *Smith. Icon. ined.* 1. p. 14. tab. 14.

pag. 260. *STELLARIA palustris.*

St. *glauca* foliis lineari-lanceolatis integerrimis glaucis, pedunculis erectis, calyce trinervi petalis brevior. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 475.

Deleatur *Icon. Fl. Dan. tab.* 414.

*Icon. Sow. Engl. bot. tab.* 825.

*Folia glauca*, margine lævia.

pag. 261. *STELLARIA uliginosa.*

St. *uliginosa* foliis elliptico-lanceolatis integerrimis apice callosis, floribus subpaniculatis lateralibus, petalis calyce brevioribus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 476.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1074.

pag. 264. post *ARENARIAM trinerviam.*

664.\* *ARENARIA ciliata* foliis ovatis nervosis ciliatis, acutis. *Linn Sp. pl.* p. 608.



*A. ciliata* foliis oblongo-obovatis subpetiolatis ciliatis, corollis calyce majoribus, perianthii foliolis lanceolatis subnervosis.  
*Wulfen in Jacqu. Collect. 1. p. 245.*

*Alsine serpyllifolio, multicaulis et multiflora.*  
*Segu. Veron. 1. 421. tab. 5. fig. 2.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 16. fig. 2. Sow. Engl. Bot. tab. 1745.*

*Germ. Gefranztes Sandkraut.*

*Gall. Sabline cilié.*

*Hab. In vicinia Principatus superioris retro St. Gallen prope dem Weishad auf dem Gamor et Sentis frequens, ubi eam vidi Ann. 1818.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 4*

*Radix* caespiticia, gracilis, fibrillosa, repens, fusca. *Cauliculi* plurimi, basi decumbentes, erecti, teretiusculi, juniores pubescentes, demum nudiusculi, pedunculo tenuissimo - sæpius bifloro, terminali. *Folia* opposita, subsessilia, basi subconnata, oblongo-ovata, obtusiuscula, integra, margine ciliata, læte viridia, enervia, plana. *Calyx* pentaphyllus, foliolis oblongo-lanceolatis, læte viridibus, margine albescentibus, basi utrinque ciliatis, subnervosis. *Corolla* pentapetala, calyce duplo major. *Petala* oblongo-ovata, integerrima, alba. *Styli* tres, albi, divergentes. *Stigmata* simplicia, incurva. *Capsula* oblongo-ovata, unilocularis, apice in valvas quinque dehiscens. *Semina* numerosa, reniformia.

Maxime affinis sequenti, cum qua Hallerus conjunxit.

664. \*\* *ARENARIA multicaulis* foliis ovatis enerviis sessilibus acutis, corollis calyce majoribus. *Linn. Sp. pl. p. 605.*

*A. multicaulis* foliis pulposo - subcoriaceis ovato-lanceolatis sessilibus, ciliatis, corollis calyce majoribus, perianthii foliolis ovato-lanceolatis subenerviis. *Wulfen. in Jacqu. Collect. 1. p. 248.*

*Alsine* foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petalis calyce majoribus. *Hall. hist. n. 876. tab. 17.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 17. fig. 1.*

*Germ. Vielstieliges Sandkraut.*

*Gall. Sabline à plusieurs tiges.*

*Hab.* In iisdem cum præcedente locis frequens, ubi eam vidi *Ann. 1818.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

Differt a præcedenti: *colore* saturatius viridi. *Foliis* magis firmis, coriaceo-carnosis, ovato-lanceolatis, apice acutiusculis, margine laxius ciliatis. *Calycinis* foliolis minus elongate-acuminatis, subpulposo-coriaceis, saturatius viridibus, subenerviis.

664. \*\*\* *ARENARIA laricifolia* foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. *Linn. Sp. pl. p. 607. Jacqu. Fl. Austr. 3. p. 39.*

*Alsine* foliis linearibus angustissimis, calycibus tubulosis villosis. *Hall. hist. n. 869.*

*Stellaria laricifolia.* *Scop. Fl. Carn. n. 541. tab. 18.*

*Alsine saxatilis*, laricis folio, minor et minori flore. *Magnol. hort.* 11. tab. 11.

*Alsine alpina junceo folio.* *Bauh. pin.* 251. *Prodr.* 118.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 272.

*Germ.* *Lerchenbaumblättriges Sandkraut.*

*Gall.* *Sabline à févilles de Larix.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro dem *Weisbad am Sentisse*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 4

*Caules* prostrati, duri, digitales, semipedales et longiores, nodosi. *Cauliculi* erecti, simplices, teretes, 3-7 unciales, subvillosi. *Folia* opposita, sessilia, subulata, acuta, glabra, per lentem ciliata. *Corollæ* petala, alba, plana, calyce duplo longiora, obtusa, ramose-lineata.

664 \*\*\*\* *ARENARIA Gerardi* foliis linearis - subulatis trinerviis, floribus geminis terminalibus, calycinis foliolis acuminatis margine membranaceis trinerviis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 709. (excl. *Jacqu. A. liniflora.*) *Decand. Fl. Franc. IV.* p. 788.

A. foliis linearibus erectis subtus striatis, floribus fastigiatis inæqualiter pedunculatis. *Gerard. Fl. Gallopr.* p. 405.

*Icon.* *Gerard. l. c. tab.* 13. fig. 1. (bona.)

*Germ.* *Gerardisches Sandkraut.*

*Gall.* *Sabline de Mr. Gerard.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia retro dem *Weisbad am Gamor* in pascuis, ubi eam legit acutissimus A. Braun. 1821.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

*Radix* dura ramuloso-fibrosa. *Caules* plurimi, tri ad quinque unciales, erecti, tenues, simplices, pilis minimis rarioribus superne adspersi. *Folia radicalia* caespiticia, aggregata, setacea; *caulina* inferiora bina, erecta, linearisetacea, inæqualia, trinervia, margine revoluta; *superiora* sensim latiora et breviora. *Flores* terminales, pedunculati. *Pedunculi* bini sæpe terni, uniflori. *Calycina* foliola lanceolata, acuminata, striata, subvillosa. *Corollæ* petala obovata, alba, longitudine calycis. *Styli* tres, breves. *Capsula* oblonga.

*Nota.* Specimina ab A. Braunio lecta, in omnibus partibus simillima in Gallia et Hispania a me lectis, quae optime conveniunt cum individo a Gerardo depicto.

Minime pro varietate A. saxatilis seu A. vernae habenda.

664. \*\*\*\*\* *ARENARIA verna* foliis subulatis obtusiusculis, caule paniculato glabriusculo, petalis obovatis calyce longioribus, calycinis foliolis ovato-lanceolatis acutis trinerviis.

A. *verna* foliis subulatis obtusiusculis caule paniculato, petalis obovatis calyce longioribus, calyce trinervi; nervis remotis inæqualibus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 481. *Decand. Fl. Franc.* IV. p. 788.

A. *verna* foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycibus acuminatis striatis. *Linn. Mant.* 72. *Jacqu. Fl. Aust.* 5. p. 2.



*Alsine* glabra tenuissimis foliis, floribus albis. *Herm. Parad.* 12.

*Alsine* saxatilis et multiflora, capillaceo folio. *Vaill. Paris.* 7. (omnino.)

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 512. (bona) *Jacqu. Fl. Austr.* 5. tab. 404. *Vaill. l. c. tab.* 2. fig. 3. (bona) *Herm. l. c. tab.* 12.

*Germ.* Frühlings-Sandkraut.

*Gall.* *Sabline printanière.*

*Hab.* In Brisgovia in rupibus basalticis am *Kaiserstuhl* prope *Limburg*, ubi eam legit *Alex. Braun* 1822.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 4

Maxime omnino affinis *A. saxatili*, a qua differt: *Cauliculis* glabris. *Pedunculis* non pubescentibus, sed (in nostris individuis) glaberrimis. *Calycinis foliolis* ovato-lanceolatis acutis, (nec acuminatis.) *Corollæ* petalis (non ovatis acutiusculis sed) obovatis obtusis. *Capsula* ovalicylindrica, (nec ovata,) calycem superante (nec calycis longitudine.)

*Nota.* Nostra plantula recedit *A. verna* *Smithii* l. c. *Cauliculis*, *pedunculisque* glabris, nec pubescentibus.

An mera varietas *A. saxatilis* *Linn.* cum qua *Linnaeus* ut ex synonymis ejus allegatis patet, combinavit.

pag. 269. post *ARENARIAM tenuifoliam.*

668.\* *ARENARIA viscidula* viscoso-pubescent, caule paniculato, foliis subula-

tis, calycinis foliolis strictis lineari-lanceolatis, petala multo superantibus, capsulis erectis. *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 261.  
— *Thuil. Fl. Paris.* 219.

*A. tenuifolia* β. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 627.

*Alsine viscosa* caule paniculato foliisque pubescentibus, petalis capsulisque pubescente brevioribus. *Schreb. Spic. Fl. Lips.* p. 50.

*Icon.* *Oeder. Fl. Dan. tab.* 1754.

*Germ.* Klebrig-haariges Sandkraut.

*Gall.* Sabline visqueux.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* retro *Mühlburg* in campis apricis sterilibus sabulosis, et alibi passim.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Junio, Julio maturata. ☉

Maxime affinis *Arenariæ tenuifoliæ*, a qua differt: *Caulibus*, *Foliis* et *Calycibus* semper viscido-pilosis.

*Obs.* Plantula ex seminibus repetitis vicibus, in Horto Botanico culta, constans; hinc omnino peculiarem speciem sistit. In Flora nostra, sub varietate *A. tenuifoliæ* tetigi. Pro sociis saepe habet: *Saginem erectam*, *Veronicam vernam*, et *Airam praecocem*.

pag. 270. *ARENARIA fasciculata.*

*Hab.* In *Brisgovia am Kaiserstuhl* in ericetis prope *Oberbergen*, ubi *A. Braun* nuper eam legit; in palatinatu trans rhenum in collibus siccis sterilibus *t. D. Kochio*.

## DECANDRIA PENTAGYNIA.

pag. 275. *SEDUM dasyphyllum*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 656.

*Hab.* In Brisgoviae valli *Höllenthal* in rupibus graniticis passim, ubi eam vidi 1807.

pag. 276. *SEDUM reflexum*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 695.

β. *reflexum minus*. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 490.

*S. glaucum.* *Donn. Cant.* 112. Sow. *Engl. Bot. Vol.* 55.

*S. minus hæmatoides.* *Raj. Syn.* 269.

*Icon.* Sow. *l. c. tab.* 2477.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* versus *Mühlburg* in sabulosis *am Landgraben*, nec non prope *Grünwinkel* et *Dachsland* in arvis colliculosis sterilibus.

β. Differt a *S. reflexo*: *Statura minore.*  
*Foliis* glauco - viridibus.

*Nota.* Hic sine dubio pertinet *S. collinum* Willd. *Enum. pl. H. Berol. Suppl.* p. 25. *S. rupestre hortulanorum* et *S. Forsterianum.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1802.

pag. 277. post *SEDUM reflexum*.

673.\* *SEDUM rupestre* foliis subulatis quinquiesariam confertis basi solutis, floribus cymosis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 618. *Hoffm. Germ.* p. 156. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 501. *Wibel. Fl. Werth.* p. 249.

*Sedum rupestre repens* foliis compressis. *Dill.*  
*Hort. Elt.* 2. 343. *tab.* 256. *fig.* 333.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 170.

*Germ.* *Felsen-Sedum.*

*Gall.* *Orpin des roches.*

*Rab.* Circa *Wertheim* in muris, agris arenosis im *Sporkert* et alibi t. *D. Wibelio.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

Differt a *S. reflexo*. Statura minori. *Foliis* quinquefariam vel sexfariam dense imbricatis, omnibus erectis, subulatis, basi subcomplanatis, glaucis. *Flores* aurei sæpe sexfidi. *Calyces* glauci, rubicundi, obtusiusculi.

Neutiquam confundendum cum sequenti specie, a qua differt: Statura majori, *Foliis* subulatis acutis nec obtusis. *Floribus* majoribus.

673. \*\* *SEDUM saxatile* foliis sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 965. *Wiggers Prim. Fl. Holsat.* p. 965. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 500. *Hoffm. Germ.* 156. *Allion. Fl. Ped. n.* 1746.

*S. rupestre. Fl. Dan.*

*S. Oederi. Retz. Flor. Scand. Prodr.*

*S.* caule ramoso prostrato, foliis teretibus remotis, floribus longe sessilibus. *Hall. helv. n.* 964.

*Icon.* *Oeder. Fl. Dan. tab.* 39. *Allion. l. c. tab.* 65. *fig.* 6.

*Germ.* *Stein-Sedum.*



*Gall.* Orpin des pierres.

*Hab.* In monte *Belchen* Badensi t. D. Hofmeister; in rupibus calcareis præruptis altioribus in vicina helvetia retro dem *Weisbad am Wildkirchlein*, ubi eam vidi 1818. In apricis Vogesorum rupibus.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. ☉

*Cauliculi* decumbentes, diffusi, ramosi, brachiati. *Folia* alterna remotiuscula, tereti-planiuscula, basi subsoluta, carnosa, glabra, obtusa, virentia, submicantia. *Flores* subsessiles, sparsi. *Calycina* foliola obtusa, viridia. *Corollæ* luteæ.

pag. 279. *SEDUM sexangulare*.

*Icon.* Sow. *Engl. bot. tab.* 1946.

pag. 282. *SEDUM villosum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 394.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi prope *Donaueschingen* passim copiose.

pag. 284. *OXALIS corniculata*.

Deleatur *synon. Pollichii et Icon. Oeder. Fl. Dan. adde. Flor. Dan. tab.* 1753.

pag. 285. Deleatur *Obs. ad OXALIDEM corniculatam*.

680. \* *OXALIS stricta* radice perenni repente, caule erecto ramoso, ramis alternis erectis, pedunculis umbelliferis.

*O. stricta* caule ramoso erecto, pedunculis umbel-

umbelliferis. *Linn. Sp. pl. p. 624. Thunb. diss. p. 22. Wibel. Flor. Werthem. p. 247. (omnino.)*

*O. stricta* caule erecto, foliolis obverse cordatis, pedunculis umbelliferis, petalis integerrimis. *Jacqu. Oxal. p. 9 n. 9.*

*Oxys americana elatior. Tournef. inst. p. 88. Dill. hort. Elth. tab. 221. fig. 4.*

*Trifolium acetosum corniculatum rectum luteum majus indicum seu virginicum. Moris. hist. 2. p. 184. Sect. 2. tab. 17. fig. 3.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 4. optima. Flor. Dan. tab. 873. (sub. O. corniculata.)*

*Germ. Gelber aufrechtstehender Sauerklee. Gall. Oxalis droit.*

*Hab. Circa Wertheim in cultis arenosis prope Mondfeld et in dumetis prope Bestenhaid copiose. In Palatinatu circa Lautern in agris et hortis oleraceis t. Pollichio et Kochio.*

*Flor. Majo, Junio. Semina Julio matura. 2*

Distinguitur ab affini *O. corniculata*: Radice perenni repente. Caulibus Ramisque nunquam ad terram decumbentibus, sed semper erectis.

Omnino peculiaris species, distincta ab *O. corniculata*, cum qua saepius a germaniae floristis confundebatur. Cl. Pollich in Fl. Palat. et Cl. Roth. in Flor. Germ. 2. p. 517. sub *O. corniculata* sine dubio comprehendebant.

*OXALIS corniculata* radice annua non repente caulibus ad terram decumbentibus in decursu suo radiculatis, ramisque decumbentibus, floribus in

pedunculo, 2-3 umbellatis, ad vulgatissimas omnino plantas in agris, hortisque circa Carlsruhe et Argentoratum, obvenientes, pertinet. In urbe ipsa Carlsruhe, in omnibus fere hortis et praecipue in horto aulico et botanico, omni anno abundat usque in serum autumnum florens et fructificans.

pag. 288. *AGROSTEMA Coronaria*.

*Hab.* Prope *Gengenbach* in collibus herbosis dumetosis frequens, ubi eam vidi 1820. Circa *Wertheim* in dumetis ad montem *Wartenberg* et ad arcem *Breuberg* t. *D. Wibelio*.

pag. 294. *CERASTIUM vulgatum*. *Linn.*

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 789.

pag. 295. *CERASTIUM viscosum*. *Linn.*

*Icon.* *Sow. Engl. bot. tab.* 790.

*Nota.* *Cerastium* triviale et *C. viscidum* *Link. Enum.* 1. p. 432. ad nostram hanc plantam pertinent, minime pro peculiaribus speciebus a *C. viscoso* *Linnaei* seu nostro diversis declarandae.

Variat in uno eodemque individuo: *Petalis* saepissime calycem aequantibus, interdum superantibus, et calyce subbrevioribus.

pag. 296. post *CERASTIUM viscosum*.

688.\* *CERASTIUM brachypetalum*  
caule erecto tomentoso dichotomo, foliis ovatis, intimis rosaceis, floribus paniculatis, calyce villosa corolla longiore. *Pers. Syn.* 1. p. 520.

*C. viscosum.* *Poll. Fl. Palat. n.* 442.

*Germ.* *Kleinblumiges Ackerhornkraut.*

*Gall. Ceraiste à courts pétales.*

*Hab.* In locis apricis sterilibus sabulosis passim. Circa *Carlsruhe* versus *dem Pulverthurm*, auf dem *Hardthofe*, nec non prope *Eckenstein*, *Graben et Schwetzingen*. In Palatinatu transrhenano circa *Lautern*, prope *Steinbach et Ingweiler t. Pollichio*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. ☉

Omnino *C. viscoso* affine, a quo mere differre videtur. *Folius* caulibusque magis incanovillosis; *Calyce* longius villosus, corolla longiore.

pag. 299. post *CERASTIUM arvense*.

690.\* *CERASTIUM alpinum* foliis ovato-lanceolatis, caule diviso, capsulis oblongis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 628.

*C. alpinum* foliis ovato-lanceolatis, caule dichotomo subtrifloro, capsulis oblongis cylindraceo-incurvis, decemdenticulatis. *Wulfen. in Jacqu. Collect.* 3. p. 19.

*C.* foliis ovato-lanceolatis, corollis calyce majoribus. *Linn. Fl. Suec.* p. 380.

*Centunculus alpinus.* *Scop. Carn.* 2. n. 550.

*Myosotis* foliis ovato-lanceolatis subhirsutis, petalis calyce duplo longioribus. *Hall. hist.* n. 888.

*Icon. Fl. Dan. tab.* 6. *Sow. Engl. Bot. tab.* 472.

*Germ. Alpenhornkraut.*



*Gall. Ceraiste des alpes.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro  
*St. Gallen* prope *dem Weisbad*, auf dem  
*Gamor et Sentis* non infrequens, ubi eam  
vidi *Ann.* 1818.

*Flor.* Junio, Julio: *Semina* Augusto ma-  
tura. 4

*Radix* cæspiticia, tenuis, fibrosa, multi-  
ceps, repens. *Caules* basi subprocumbentes,  
erecti, spithamæi et altiores, teretes, villosi, tri-  
flori. *Folia* opposita, sessilia, ovato-lanceo-  
lata, obtusa, integra, utrinque dense villosa,  
incano-nivea. *Flores* longe pedunculati. *Ca-  
lycis foliola* lanceolata, erecto-patentia, albide  
villosa, margine albida, membranacea. *Corolla*  
calyce duplo major, nivea, erecto-patens. *Pe-  
tala* obcordata, striata. *Capsula* cylindracea,  
subincurva, apice decemdentata, polysperma.

pag. 299. ante *CERASTIUM aquaticum*.

691.\* *CERASTIUM strictum* foliis li-  
nearibus acuminatis glabris, pedunculis  
unifloris subtomentosis, capsulis globo-  
sis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 629. — *Jacqu.*  
*Collect.* 2. p. 65.

*Centunculus angustifolius.* *Scop. Carn. n.*  
551. *tab.* 19. *fig.* 1.

*Myosotis foliis linearibus glabris.* *Hall. hist.*  
*n.* 892.

*Caryophyllus holosteus alpinus foliis strictis-  
simis glabris acutis; flore magno.* *Burs.*  
*XI.* 119.

*Germ. Steifes Hornkraut.*

*Gall. Ceraiste stricte.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro  
*St. Gallen prope dem Weisbad, auf dem*  
*Gamor, Kasten et Sentis, ubi eam vidi*  
1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 24

*Radix* caespiticia, gracilis, ramosa, fibrillosa. *Caules* numerosi, diffusi, teretes, graciles, ramosi, palmares et longiores. *Rami* ascendentes, oppositi, superne pubescentes. *Folia* opposita, sessilia, basi connata, lineari-acuminata, læte viridia, glabra, aut subpubescentra, stricta, margine subciliata. *Flores* terminales. *Foliola calycina* erecta, lanceolata, acuta, viridi-incana, margine albida, scariosa. *Corollæ Petala* patentia, obovata, bifida, obtusa, calyce duplo majora, alba.

*Nota.* Planta in horto Carlsruhensi ex semiuibus  
cultâ constans, toto coelo diversa a *C. ar-*  
*vensi*. Linn.

pag. 299. *CERASTIUM aquaticum.* Linn.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 538.

*Obs.* In humidis Salicetis Alnetisque ad fossas aquaticas quandoque obvenit: Caulibus longioribus, subflexuoso - subscandentibus. Hic pertinet *C. scandens*. Lejeune *Flore des environs de Spaa*. 1. p. 211. minime pro peculiari specie habenda.

CLASSIS XI.  
DODECANDRIA  
DIGYNIA.

---

pag. 316. post AGRIMONIAM *Eupatorium*.

700.\* *AGRIMONIA odorata* fructibus hispidis, foliis pinnatis, foliolis oblongis inferioribus diminutis, petalis calyce duplo longioribus. *Ait. H. Kew.* 2. p. 130. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 875. *Decand. Fl. Franc.* IV. p. 451. *Loiseleur. Fl. Gallica.* I. p. 277.

*Agrimonia odorata.* *Camerar. hort.* 7.

*Eupatorium odoratum.* *Lob. advers.* p. 308.

*Germ.* Wohlriechender Odermennig. Großer Odermennig.

*Gall.* Agremoine odorante.

*Hab.* In montosis sylvaticis e Granite constructis, humidis. In *Sasbachwalden* ad casas rusticas non longe ab *Erlenbad* frequens, cum primis circa casam *Deckeri*, ubi eam nuper vidi. Retro *Lahr* prope *Selbach* im *Schutterthal* et im *Nordracherthal*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. 4

Differt a præcedenti specie: Statura multo majori. *Caule* 4-5 pedali, magis ramoso. *Foliis* longioribus oblongis, inferioribus diminu-

tis. *Spicis* longioribus. *Floribus* majoribus aureis.

*Pharm. AGRIMONIAE odoratae Folia*

Folia rite siccata, in vasis vitreis obturatis servenda.

Folia digitis trita, suave odorata. Flores numerosissimi, apibus accepti.

Planta ex seminibus in horto culta, constans. Ad novas Florae cives pertinet.

## DODECANDRIA TRIGYNIA.

pag. 330. *EUPHORBIA mollis (mihl.)*

*Hab.* In parte sylvatica horti aulici Carlsruhensis frequens.

*Nota.* Minime pro *E. Illirica*. Lamark Encycl. 2. p. 435. habenda, quae jam habitu longe alieno ab ea recedit et sine dubio ad levidensem varietatem *E. palustris* Linn. pertinet, pro qua Cl. Lamark l. c. pronunciavit.

Quo ad descriptionem multa communia habet cum *E. coralloides* Linn. a qua differt: Caulibus ex radice minus numerosis, non corallinis. Foliis latioribus, margine non rubris, sed laete viridibus. *E. coralloides*, nostras hyemes non fert, est planta mauritanica, africana, non europaea seu germanica.

pag. 336. post *EUPHORBIAM Cyparissias*.

*Nota.* *EUPHORBIA Esula umbella multifida*: bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. Linn. Sp. pl. 1. p. 660. Smith. Fl. Brit. 2. p. 518. Sow. Engl. Bot. tab. 1399. (bona.) — *Esula Rivin. tetrap. irr. tab.*



116. fig. 1. *Esula minor*. Dodon. Pempt.  
374. *Lithymalus pinea*. Lob. Icon. 367.

Haec est vera *E. Esula*. Linn. non *Decandolii*, *Kochii* et *Wibelii*.

**Obs.** Planta pro *E. Esula* inter Oppenheim et Mainz versus rhenum in arenosis, a Cl. Kochio et Ziz allegata et prope Wertheim ad muros vinearum am Romburg per D. Wibelium citata mihi benevole missa, et nuper a me loco citato inter Oppenheim et Mainz lecta, recedit omnino, toto coelo ab *E. Esula* Linnaei et Smithii: Caulibus saepe longioribus bipedalibus tripedalibus, Foliis lineari lanceolatis obtusiusculis, longioribus et duplo fere angustioribus ex lutescente pallide viridibus, copiosioribus, (non uniformibus) sed inferioribus et superioribus reliquis duplo brevioribus, (nec lineari-obovatis, laete viridibus.) Umbella 19-21-25 radiata, bifida, (nec 6-8 radiata. Involucro 19-25 phyllo, (nec 6-8 phyllo) Foliolis duplo brevioribus et angustioribus, ex viridi-lutescentibus, (nec laete viridibus) Involucellis diphyllis, deltoideis, obtusis, subnucronulatis, (nec cordatis acutis.) Capsulis verrucoso-scabriusculis, (nec laevibus.)

Descripsi plantam, quam multi hodierni botanici pro *E. Esula* Linnaei venditant. Sine dubio planta nostra rhenana, (moguntina) levidensis varietas *Euphorbiae Cyparissias* est. *E. Esula* Pallichii omnino ad *E. Gerardi* pertinet.

Sub *E. Esula* in regionibus-rhenanis, helveticis et in Suevia ab amicis lecta, et mihi benevole communicata, nunquam veram *E. Esulam* Linn. sed saepissime *E. Gerardi*, et levidensem varietatem *E. Cyparissias* obtinui.

*Euphorbia Esula*. Decand. Fl. Franc. VI. p. 361. Wibel Fl. Werth. p. 257. omnino ad *Kochii* nec ad *Linnaei* et *Smithii* plantam pertinet.

## DODECANDRIA DODECAGYNIA.

pag. 346. post *SEMPERVIVUM globiferum*.

721. \* *SEMPERVIVUM hirtum* foliis caule, petalorumque apicibus hirtis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 665. *Hoffm. Fl. Germ.* 168. Cotyledon altera montana. *Clus. hist.* 2. p. 63.

*Icon. Jaqu. Fl. Austr. tab.* 12. *Allion. Fl. Pedemont. tab.* 65. *fig.* 1.

*Germ. Rauhaarige Hauswurz.*

*Gall. Joubarbe vélue.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* in rupibus calcareis, ubi eam legi 1814, nec non in Palatinatu trans-rhenano teste *D. Kochio*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 4

*Propagines* globosæ. *Caulis* erectus, 6-8 uncialis, teres, foliosus, hirsutus. *Calycina* foliola erecta, oblonga, acuta, crassa, villosa. *Corollæ* petala calyce duplo majora, lanceolato-oblonga, acuta, erecta, ochroleuca, margine et dorso ciliata. *Germina* 6 ad 7, villosa.

721. \*\* *SEMPERVIVUM montanum* foliis ciliatis, propaginibus patulis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 665. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 169.

*Sedum* foliis semipatulis hirsutis, petalis novenis subhirsutis. *Hall. hist. n.* 951.

*Sedum alpinum rubro magno flore. Bauh.  
pin. 284.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. App. tab. 41.*

*Germ. Berg - Hauswurz.*

*Gall. Joubarbe des montaignes.*

*Hab.* In Principatu superiore retro *Mæskirch  
im Donauthal* in rupibus præaltis, apricis  
calcareis ubi eam legi 1814.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri ma-  
tura. 2

*Propagines* globosæ. *Caulis* palmaris et  
altior, erectus villosus, viridi fusco-rubens. *Fo-  
lia* sessilia, semicylindrica, dorso convexa, acu-  
minata, viridia, apice rubra, sæpe tota fusco-  
rubra. *Cyma* terminalis, trifida, patens, arcu-  
ata. *Corollæ* petala pallide rosea, patentia, li-  
neari-lanceolata, villosa, 12-24. *Filamenta*  
ultra 24 intense rubra, petalis breviora. *Ger-  
mina* tot quot petala.

---

CLASSIS XII.  
ICOSANDRIA.  
POLYGYNIA.

---

pag. 548. post TORMENTILLAM.

CCXLIII. \* DRYAS. *Cal.* 8-10 fidus. *Petala*  
5-8. *Sem.* caudata, plumosa.

Post COMARUM.

CCXLV. \* CALYCANTHUS. *Cal.* monophyllus  
urceolatus, squarrosus folio-  
lis coloratis. *Cor.* calycina.  
*Styli* plurimi, stigmatе glandu-  
loso.

---

ICOSANDRIA  
MONOGYNIA.

---

pag. 350. PRUNUS *Padus*.

β. *Drupis rubris*.

Nota. Non confundenda cum P. rubra.

pag. 352.

723. \* PRUNUS *rubra* floribus racemo-  
sis, racemis erectis, foliis deciduis lævi-  
bus, basi biglandulosis. *Ait. H. Kew.* 2.  
*p.* 162.



*P. virginiana* floribus racemosis, racemis rectis, foliis deciduis duplicato-dentatis lævibus, petiolis subquadriglandulosis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 985. Willd. arb. 258.*

*Icon. Willd. l. c. tab. 5. fig. 1. Pfleger. arb. et frut.*

*Germ. Rothe Traubenkirsche.*

*Gall. Prunier à grappe à fruits rouges.*

*Hab. In Virginia. Hospitatur in hortis anglicis aliisque. Circa Carlsruhe im Phasengarten, ante portam Durlacensem, auf der Favorite prope Rothenfels, Baden et alibi.*

*Flor. Majo. Drupa* Julio, Augusto matura. ♀

Arbor mediocris. *Flores* racemosi. *Racemi* firmi, erecti. *Folia* lævia, decidua, firma, basi biglandulosa. *Fructus* maturi rubri, multo majores quam in *P. Pado*.

Introducta per divum Carolum Friedericum in hortum aulicum Carlsruhensem.

Ex seminibus culta, nullam mutationem passa est.

pag. 356. *PRUNUS Armeniaca.*

Varietates principales, in hortis vineisque Badensibus et adjacentibus, passim hospitantes.

*a. Alberche-Abricose. Abricot alberge.*

*b. Rothe Abricose aus Angomois. Abricot d'Angomois. Gros Abricot.*

*c. Grofse weifse Abricose. Abricot blanc le gros.*

- d. *Gemeine Abricose. Abricot commun.*
- e. *Frühe - Muscateller - Abricose. Abricot hative musquée.*
- f. *Holländische - Abricose, Bredaische oder Anananas - Abricose. Abricot d'Hollande, ou de Breda.*
- g. *Nancyer - vulgo Pfirsich - Abricose. Abricot de Nanci. Abricot - Pêche.*
- h. *Schwarze - Abricose. Abricot noir, ou d'Alexandrie. (Prunus dasycarpa. Linn.)*
- i. *Bunte - Abricose. Abricot panaché.*
- k. *Portugiesische - Abricose. Abricot de Portugal.*
- l. *Große frühe Abricose. Abricot précoce le gros.*
- m. *Provencer - Abricose. Abricot de Provence.*
- n. *Tourser - Abricose. Abricot de Tours.*
- o. *Violette - Abricose. Abricot violet.*

**Nota.** Omnes varietates in magno horto aulico Ettlingensi Carlsruhensi et passim Durlacensi, cum optimis Persicis, Prunis, Cerasis, Pomis et Pyris etc. omni studio et cura sub immortali Carolo Friederico colebantur et in terris Badensibus multiplicabantur.

pag. 358. *PRUNUS Cerasus. Linn.*

Varietates principales in hortis, pomariis, pratis, agris et vineis Badensibus et adjacentibus sequentes hospitantur.

- a. *Rothe Amarelle. Gemeine Amarelle.*
- b. *Nord - Amarelle. Braune Brusselsche Amarelle. Amarelle du nord. Brune de Bruxelles.*
- c. *Ostheimer - Weichsel. Cerise d'Ostheim.*
- d. *Kleine frühe Sauerkirsche. Cerise-precoce la petite.*

- e. *Soissoner - Kirsche. Cerise de Soissons.*
- f. *Immerblühende - Kirsche. Allerheiligen-Kirsche. Cerise tardive, ou de la Tus-saint. (Prunus semperflorens. Willd.)*
- g. *Drey Kirschen auf einem Stiel. Cerise à bouquet.*
- h. *Aechte Englische Weichsel. Griotte d'Angletaire.*
- i. *Große Deutsche Pelz-Weichsel. Griotte d'Allemagne. Griotte de Chaux, ou Cerise de Mr. le Comte de St. Maure.*
- k. *Spanische-Weichsel. Griotte d'Espagne.*
- l. *Leopolds-Weichsel. Griotte de Leopold.*
- m. *Holländische späte-Weichsel. Holländische doppelte Weichsel. (Bodenius-Weichsel nostratibus.) Griotte tardive d'Hollande.*
- n. *Kleine holländische Weichsel.*
- o. *Kurzstielige - Montmorency. Englische-Weichsel. Montmorency à court queue, ou gros Gobet.*
- p. *Langstielige-Montmorency. Montmorency à longue queue.*

pag. 359. *PRUNUS avium. Linn.*

Varietates principales in hortis, pomariis, pratis agris et vineis Badensibus et adjacentibus sequentes hospitantur.

- a. *Frühe Englische-Kirsche. Merise d'Angletaire hative.*
- b. *Die schöne-Kirsche von Choisy. Merise belle de Choisy.*
- c. *Gefülltblühende-Vogelkirsche. Merise à fleurs doubles.*
- d. *Große weiße-Fleischkirsche. Cuigne blanche la grosse.*

- e. Scharlachkirsche. *Cuigne écarlate.*
- f. Gelbe-Fleischkirsche. *Cuigne jaune.*
- g. Prager - Muskateller - Kirsche. *Muscat de Prage.*
- h. Grofse gemeine Rocmonter Dauben Herzkirsche. *Bigarreau commun ou belle de Rocmond. Cœur de pigeon.*
- i. Frühe Basler - Herzkirsche. *Bigarreau hatif de Bâle.*
- k. May - Herzkirsche. *Bigarreau de May.*
- l. Lauermanns - Herzkirsche. *Napoleons-Herzkirsche. Bigarreau de Lauermann ou de Napoleon.*
- m. Grofse schwarze Herzkirsche. *Bigarreau noir le gros.*
- n. Schwarze späthe Herzkirsche. *Bigarreau noir tardif, ou de Lory.*
- o. Grofse rothe Marmor-Herzkirsche. *Bigarreau rouge le gros.*

pag. 361. *PRUNUS domestica.*

Varietates principales sequentes in hortis, vineis et pomariis Badensibus et adjacentibus coluntur.

- a. Weisse Abricosen - Pflaume. *L'Abricotée blanc.*
- b. Rothe Abricosen - Pflaume. *L'Abricotée rouge.*
- c. Gemeine Zwetschge. *Coueche. Prune d'Allemagne la commune.*
- d. Bremer - Zwetschge. *Coueche de Breme.*
- e. Grofse Zwetschge. *Grofse teutsche Pflaume. Coueche la grosse.*
- f. Italienische - Zwetschge. *Coueche d'Italie.*
- g. Grüne - Zwetschge. *Coueche verte.*



- h. Ballonartige-Damascener-Pflaume. Damas - Ballon.*
- i. Große weiße Damascener-Pflaume. Damas blanc le gros.*
- k. Spanische Damascener-Pflaume. Damas d'Espagne.*
- l. Italienische Damascener-Pflaume. Damas d'Italie.*
- m. Maugeroner Damascener-Pflaume. Damas de Maugeron.*
- n. Rote Damascener-Pflaume. Damas rouge.*
- o. Große Tourser-Pflaume. Damas de Tours.*
- p. Frühe grüne Damascener-Pflaume. Damas vert hatif.*
- q. Rote Diapre-Pflaume. Diaprée rouge.*
- r. Blaue Diapre-Pflaume. Diaprée bleu. Diaprée violette.*
- s. Goldpflaume, Metzer-Mirabelle. Drap d'or. Mirabelle double.*
- t. Gelbe Eierpflaume. Grosse luisante. Damas Aubert.*
- u. Hyacinthen-Pflaume. Jacinthe. Prune Jacinthe.*
- v. Frühe Catalonier-Pflaume. Jaune hatife ou Prune de Catalogne.*
- w. Violette Kaiserpflaume. Imperiale violette.*
- x. Grüne Savoyer-Pflaume. Isle vert ou Prune de Savoye.*
- y. Gelbe Mirabelle. Mirabelle jaune.*
- z. Rote Mirabelle. Mirabelle rouge.*
- a. a. Rote Perdrikon. Perdrigon rouge.*
- b. b. Weiße Perdrikon. Perdrigon blanc.*
- c. c. Kleine späthe Perdrikon. Perdrigon petit tardif.*

*d. d.*

- d. d. *Abricosen - Pflaume. Prune Abricot.*  
 e. e. *Ungarische - Pflaume. Dattelschwetschge.*  
*Prune d'Autriche ou Prune datte.*  
 f. f. *Briansoner - Pflaume. Prune de Bri-*  
*ançon.*  
 g. g. *Weisse Indianische Pflaume. Prune*  
*d'Inde blanche.*  
 h. h. *Herzogs - Pflaume. Prune de Mon-*  
*sieur.*  
 i. i. *Pfirschen - Pflaume. Prune pêche.*  
 k. k. *Holländische bunte Pflaume. Brune*  
*rayée d'Hollande.*  
 l. l. *Johannis - Pflaume. Prune St. Jean.*  
 m. m. *Steinlose Pflaume. Prune sans noyau.*  
 n. n. *Durchsichtige - Pflaume. Prune trans-*  
*parente.*  
 o. o. *Jungfern - Pflaume. Prune virginale.*  
 p p. *Große grüne Renne - Claude. Reine-*  
*Claude la grosse. Dauphiné ou Damas-*  
*verd.*  
 q. q. *Blaue oder Violette - Renne - Claude.*  
*Reine - Claude violette.*  
 r. r. *Königspflaume. Prune Royale.*  
 s. s. *Königspflaume aus Tours. Prune Royale*  
*de Tours.*

Nota. Multae et sapidissimae varietates, cum-  
 primis in Horto Durlacensi sub divo Carolo  
 Friederico, maxima cura nec non in Horto  
 Carlsruhensi et Ettlingensi colebantur et evul-  
 gabantur.

730.\* *PRUNUS cerasifera* ramis sub-  
 spinescentibus glaberrimis, foliis ellipticis  
 glabris convolutis, pedunculis solitariis  
 tenuissimis glaberrimis, calyce reflexo,  
 drupa subglobosa, (rubra) pendula. *Ehrh.*

Suppl. ad. Flor. Bad. Tom II.

Y

*Beytr.* 4. p. 17. *Willd. Linn. Sp. pl.*  
2. p. 997. *Arbor.* 250.

P. fructu majori rotundo rubro. *Tournef.*  
*inst.* 622.

*Icon. Psleger arb. et frut.*

*Germ. Kirschenpflaume. Türkenpflaume. Ro-*  
*the Pflaume.*

*Gall. Prune Cerisette. La Turquine.*

*Hab.* In America boreali. Hospitatur in hor-  
tis *Carlsruhe, Durlach, Ettlingen, Favo-*  
*rite, Baden etc.* nec non in hortis rustico-  
rum et passim in vineis.

*Flor.* Primo vere. *Fructus* Augusto maturat. †

Arbor mediocris, florifera pulcherrima. Dru-  
pa rotunda extus coccinea, intus aquosa minus  
sapida.

pag. 365. AMYGDALUS *Persica.*

Varietates principales in hortis, pomariis  
et passim in vineis Badensibus et adja-  
centibus cultæ, sequentes sunt.

a. *Wunderschöne Pfirsche. Pêche admirable*  
*ou belle de Vitri.*

b. *Safran - Pfirsche. Gelbe Alberg. Pêche*  
*Alberge jaune.*

c. *Gelbe Frühpfirsche. Avant - pêche jaune.*

d. *Rothe Frühpfirsche. Avant - pêche*  
*rouge.*

e. *Galante - Pfirsche. Bellegarde ou ga-*  
*lante.*

f. *Schöne Pfirsche von Tillemont. Belle de*  
*Tillemont.*

- g. Nackte Muskateller - Pfirsche die violette. Bruggnon violet musqué.*
- h. Burdiner Pfirsche. Burdine.*
- i. Frühe Peruvianerin. Chevreuse hâtive.*
- k. Frühe italienische. P. Chevreuse hâtive d'Italie.*
- l. Späte Peruvianerin. Chevreuse tardive.*
- m. Kleine Princesse - Pfirsche. Petite Mignon ou Double de Troyes.*
- n. Princess - Pfirsche. Grosse Mignon.*
- o. Edelpfirsche. Incomparable.*
- p. Weiße Magdalena - Pfirsche. Madelaine blanche.*
- q. Rothe Magdalena - Pfirsche. Madelaine rouge ou M. de Courson.*
- r. Späthe Magdalena - Pfirsche. Madelaine tardive.*
- s. Gröste - Pfirsche. La monstrueuse ou Pavie rouge de Pomponne. Pavie de Camus.*
- t. Doppelte Montagne. Montagne la grosse.*
- u. Frühe Montagne. Montagne précoce la grosse.*
- v. Gold - Nectarin, Montfrin - Pfirsche. Montfrin.*
- w. Weiße Härtling. Pavie blanc.*
- x. Weiße Newingtons - Härtling. Pavie de Newington.*
- y. Maltheser - Pfirsche. Pêche de Malthe.*
- z. Pauer - Pfirsche. Pêche de Pau.*
- a. a. Persic - Pfirsche. Pêche Persic. Persic.*
- b. b. Frühe großblumige Purpur Pfirsche. Pourprée hâtive à grandes fleurs.*
- c. c. Weinige Purpur - Pfirsche. Pourprée vineuse.*
- d. d. Späthe Purpur - Pfirsche. Pourprée tardive.*



*e. e. Rosanne. Rosanne.*

*f. f. Königs - Pfirsche. Pêche Royale.*

*g. g. Blut - Pfirsche. Sanguinole ou Bette-  
rare.*

*h. h. Blonde - Pfirsche. Blondine. Teint  
doux.*

*i. i. Venus - Pfirsche. Teton de Venus.*

*k. k. Kleine frühe violette Pfirsche. Vio-  
lette hative la petite.*

*l. l. Grosse frühe violette Pfirsche. Vio-  
lette hative la grosse.*

Nota Pulcherrima et completissima varietatum  
collectio, sub divo Carolo Friederico, in  
horto Ettlingensi et Carlsruhensi.

## ICOSANDRIA DIGYNIA.

pag. 371.

736.\* *CRATÆGUS coccinea* foliis cor-  
dato-ovatis inciso-angulatis glabris, (pe-  
tiolis calycibusque glandulosis floribus  
subpentagynis,) *Linn. Sp. pl. Willd.  
arb. 81.*

*Mespilus spii folio virginiana spinis horrida,  
fructu amplo coccineo. Pluk. Alm. 249,*

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Mill. Dict. tab.  
170. (sub Mespilo.)*

*Germ. Amerikanischer Weiszdorn mit gro-  
ssen rothen Früchten.*

*Gall. Aubepine à gros fruit rouge.*

*Hab. In Virginia, Canada. Hospitatur in parte  
sylvatica inter Carlsruhe et Beiertheim, in  
hortis anglicis aliisque Carlsruhe, Dur-*

*Iach, Schwetzingen, Favorite, Rothenfels, Baden et alibi.*

**Flor.** Aprili, Majo. **Fructus** Octobri maturat.  $\frac{1}{2}$

**Frutex**, sæpe arbor. **Corollæ** albæ. **Styli** persæpe quinque. **Fructus** coccinei, speciosi.

Flores mel apibus largiuntur. **Fructus** pulcherrimi, maturi dulcescentes, edules.

**Lignum** durum, tenax.

ICOSANDRIA PENTAGYNIA.

pag. 382. **MESPILUS** *germanica*. **Linn.**

$\beta$ . **Fructibus** majoribus.

**Germ.** *Holländischer - Mispelbaum.*

**Gall.** *Nefflier d'Hollande à gros fruit.*

$\gamma$ . **Fructibus** sine nucleis.

**Germ.** *Kernlose - Mispeln.*

**Gall.** *Nefflier sans pépin.*

$\beta$  et  $\gamma$ . In hortis et vineis passim hospitantur.

742.\* **MESPILUS** *Chamae - Mespilus*  
inermis, foliis ovalibus acute serratis glabris, floribus corymboso - capitatis. **Linn.**  
*Sp. pl.* 1. p. 685.

**Mespilus** foliis ovatis serratis glabris. **Hall.**  
*helv. n.* 1090.

**Cratægus** foliis ovalibus acute serratis glabris, caule inermi. **Jacqu. Fl. Austr.**

*Sorbus fruticosa*, foliis oblongo-ovatis serratis, fructu ovato biloculari. *Crantz. Austr. p. 84. tab. 1. fig. 5.*

*Cotoneaster folio oblongo serrato. Bauh. pin. 452.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 231. (sub Cratægo.)*

*Germ. Alpen-Mispel.*

*Gall. Nefflier des alpes.*

*Hab.* In summo jugo montis *Feldberg* Brisgoviae frequens, ubi prima vice legi 1807.

*Flor.* Junio, Julio. *Fructus* Septembri maturat.  $\bar{h}$

*Arbuscula* seu *Frutex*, 3-4-5 pedalis, erectus. *Folia* in summitate ramosum sparsa, alterna, breviter petiolata, ovalia, aut ovali-lanceolata, acuta, argute serrata, saturate viridia, glabra, nitida, dorso pallidiora,  $1\frac{1}{2}$  ad duas uncias longa. *Flores* terminales, cymosi. *Pedunculi* teretes, villosi, foliis breviores, densam cymam formantes, *Calyx* campanulatus, interne et ad marginem lanuginosus, quinquepartitus. *Corollæ* petala quinque, obovata, obtusa, rubella, calyce duplo langiora. *Filamenta* suboctodecim, subulata, inæqualia. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes, virides, demum fuscae. *Germen* subrotundum, lanuginosum. *Styli* duo, filiformes, erecti. *Stigma* simplex, obtusum, *Baccæ* subrotundo-ovatae, aurantio-rubentes, nitidissimæ, calyce marcido coronatae, subcarnosæ, acidulæ.

*Nota.* Rariorem Florae civem agnoscas.

pag. 484. *PYRUS communis*. Linn.

Sequentes principales varietates in hortis pomariis et vineis Badensibus et adjacentibus passim coluntur.

- a. *Liebesbirne*. *Gesegnete Birne*. *Poire d'amour*. *Poire Ah mon Dieu*.
- b. *Winter-Amber-Birne mit Dornen*. *Ambrette d'hiver avec épines*.
- c. *Dornlose Amber-Birne*. *Ambrette sans épines*.
- d. *St. Johannes-Birne*. *Amiré Joannet*, ou *Poire de St. Jean*.
- e. *Angelica aus Bordeaux*. *Angelique de Bordeaux*.
- f. *Angelica der Cartausen*. *Angelique des Chartreux*.
- g. *Angelique aus Rom*. *Angelique de Rome*.
- h. *Goldbirne*. *Poire Aurate*.
- i. *Schöne und gute Birne*. *Belle et bonne*.
- k. *Schönste Herbstbirne*. *Bellissime d'automne* ou *Vermillon d'automne*.
- l. *Schönste Sommerbirne*. *Bellissime d'été*, *Vermillon d'été*.
- m. *Englische Bergamotte*. *Bergamotte d'Angleteire*.
- n. *Herbstbergamotte*. *Bergamotte d'automne*.
- o. *Bussysche Bergamotte*. *Bergamotte de Bussy*.
- p. *Crasanne Bergamotte*. *Matles - Birne* (nostratibus.) *Bergamotte Crasanne*.
- q. *Sommer-Bergamotte*. *Bergamotte d'été*.
- r. *Winter-Bergamotte*. *Bergamotte d'hiver*.
- s. *Holländische Bergamotte*. *Bergamotte d'Hollande* ou *Bergamotte d'Alençon*.
- t. *Unvergleichliche Bergamotte*. *Bergamotte Nomporeille*.



- u. Oster - Bergamotte. Bergamotte de Paques.*
- v. Rothe - Bergamotte. Bergamotte rouge.*
- w. Schweitzer - Bergamotte. Bergamotte Suisse ou Bergamotte rayée.*
- x. Soulerische - Bergamotte. Bergamotte de Souleurs ou bonne de Souleurs.*
- y. Winterbutterbirne. Beurré d'hyver.*
- z. Kümmelbirne. Beurré d'Héry.*
- a. a. Englische Butterbirn. Beurré d'Angletaire.*
- b. b. Bollweiler - Butterbirne. Beurré de Bollviller.*
- c. c. Weisse Butterbirne. Beurré blanc. Doyenné ou St. Michel.*
- d. d. Goldbutterbirne. Wintergoldbutterbirne von Metz. Beurré doré d'hyver de Metz.*
- e. e. Graue Butterbirne. Beurré gris.*
- f. f. Römische Butterbirne. Beurré romain.*
- g. g. Langstielige Sommerbirne. Langstielige Perle. Blanquet à longue queue.*
- h. h. Grofse Sommerbirne. Blanquet le gros.*
- i. i. Kleine Perlbirne. Blanquet petit Poiré à la perle.*
- k. k. Christenbirne. Gestreifte Winter-Christenbirne aus Auch. Bonchretien panaché. Bonchretien d'Auch.*
- l. l. Spanische Christenbirne. Bonchretien d'Espagne.*
- m. m. Sommer - Christenbirne. Frankenbirne. Apothekerbirne (nostratibus.) Bonchretien d'été.*
- n. n. Winter - Christenbirne. Bonchretien d'hyver.*

- o. o. *Wespenbirne. Doppelte Hetschbirne. Bourdon musqué.*
- p. p. *Grüne Rettigbirne. Cassolette, Friolette ou Muscat verd.*
- q. q. *Gelbe Rettigbirne. Cassolette jaune.*
- r. r. *Gebrannte - Katze. Chat brûlé.*
- s. s. *Cheminetsbirne. Cheminette.*
- t. t. *Damenbirne. Chair à Dame. Chair Adame.*
- u. u. *Christus - Birne (vulgo) Christbirne. Chrétienne.*
- v. v. *Sierentzer - Citronenbirne. Citron de Sierenz.*
- w. w. *Frauenschenkel. Cuisse Madame.*
- x. x. *Dannegler. Dannegler.*
- y. y. *Graue Doyenne. Doyenne gris.*
- z. z. *Jagdbirne. Echassery ou Bezy de Chassery.*
- a. a. a. *Sparbirne. Storchenschnabel. Epargne. Beau présent. St. Samson.*
- b. b. b. *Sommerdorn, schmelzende Muskatellerbirne. Epine d'été ou Fondante musquée.*
- c. c. c. *Winterdorn. Epine d'hiver.*
- d. d. d. *Kannenbirne. Etrangle. Poire de fusée.*
- e. e. e. *Regelsbirne. Oberelsäfsische Kochbirne. Faux Bonchretien.*
- f. f. f. *Feingold. Fin-or.*
- g. g. g. *Franchipanne. Franchipanne.*
- h. h. h. *Großer - Mogul. Grande Monarque.*
- i. i. i. *Wintergnadenbirne. Gratirole d'hiver.*
- k. k. k. *Große Wintermuskatellerbirne. Muscat d'hiver.*
- l. l. l. *Grünbirne (nostratibus.)*

- m. m. m. Hennenbirne. (nostratibus.)*  
*n. n. n. Immenbirne. (nostratibus.)*  
*o. o. o. Kaiserbirne mit dem Eichenblatt. Impériale. Impériale à févilles de chêne.*  
*p. p. p. Schmelzende Brester-Birne Incon- nue, Chenau ou Fondante de Brest.*  
*q. q. q. Kronbirne. (nostratibus.)*  
*r. r. r. Gute Lovisen - Birne. Lovise bonne.*  
*s. s. s. Einsiedlerin. Mansuette ou Solitaire.*  
*t. t. t. Margarettenbirne. Grofse oder dop- pelte Heubirne. Marquerite la gosse Poire hative.*  
*u. u. u. Kleine Heubirne. Kleine Margaret- tenbirne. Marquerite la petite.*  
*v. v. v. Marggravenbirne. Marquise.*  
*w. w. w. Martinsbirne trockene. Martin Sec.*  
*x. x. x. Winterwunderbirne. Merveille d'hy- ver ou petit Oin.*  
*y. y. y. Junkerhansenbirne. Messire Jean.*  
*a. a. a. a. Kleine Muskatellerbirne. Muscat petit ou 7 en gueule.*  
*b. b. b. b. Deutsche Muskatellerbirne. Mus- cat allemand.*  
*c. c. c. c. Robertsmuskatellerbirne. Muscat Robert. Poire a la reine.*  
*d. d. d. d. Kleine Zwiebelbirne. Ognonet, Archiduc d'été. Amiré roux.*  
*e. e. e. e. Winter-Pomeranzenbirne. Orange d'hyver.*  
*f. f. f. f. Muskateller - Pomeranzenbirne. Orange musquée.*  
*g. g. g. g. Rothe Sommer-Pomeranzenbirne. Orange rouge d'été.*  
*h. h. h. h. Fliegenbirne. Orange tulipée. Poire aux mouches.*  
*i. i. i. i. Wohlriechende Augustbirne. Par- fum d'Aout.*

- h. h. h. h. Schäferbirne. Pastorale ou Missette d'automne.*
- l. l. l l. Admiralsbirne. Poire Admiral.*
- m. m. m. m. Speckbirne. (nostratibus.) Poire au lard.*
- n. n. n. n. Winterengelsbirne. Poire d'ange d'hiver.*
- o. o. o. o. Colmarerbirne. Mannabirne. Poire de Colmar, ou Poire manne.*
- p. p. p. p. Schollenbirne. Eisenbirne. Poire de fer.*
- q. q. q. q. Waldbirne. Poire de foret, ou Grise-bonne.*
- r. r. r. r. Lansackerbirne. Poire de Lansac ou Dauphiné.*
- s. s. s. s. Magdalena- oder Carmeliter- Citronenbirne. Poire de Madelaine, ou Citron de Carmes.*
- t. t. t. t. Malteserbirne. Poire de Malthe, ou Caillot rosat d'hiver.*
- u. u. u. u. Neaplerbirne. Poire de Naples.*
- v. v. v. v. Eyerbirne. Bestenbirne. Poire d'Oeuf, ou Colmar d'été.*
- w. w. w. w. Grofse Zwiebelbirne. Poire d'Oignon, Epine rose d'été.*
- x. x. x. x. Priesterbirne. Pfaffenbirne (nostratibus. Poire de Prêtre.*
- y. y. y. y. Petersbirne. Poire de St. Pierre.*
- z. z. z. z. Dünnhautige Birne. Poire sans peau. Fleur de Guigne.*
- a. a. a. a. a. Grofse Septemberbirne. Poire de Septembre la gros.*
- b. b. b. b. b. Jungfernbirne. Poire vierge.*
- c. c. c. c. c. Weinbergsbirne. Poire de vigne ou Demoiselle.*
- d. d. d. d. d. Vitryerbirne. Poire de Vitry.*



- e. e. e. e. e. Königsgeschenk aus Neapel. *Present royal de Naples.*
- f. f. f. f. f. Winterkönigin. *Reine d'hiver.*
- g. g. g. g. g. Sommerkönig. *Roi d'été.*
- h. h. h. h. h. Königswinterbirne. *Royal d'hiver.*
- i. i. i. i. i. Winterrousselet. *Rousselet d'hiver.*
- k. k. k. k. k. Rheimserrousselet. *Rousselet de Rheims.*
- l. l. l. l. l. Gallusbirne. Weinbirne. *St. Gal, Poire du Vin.*
- m. m. m. m. m. Hermannsbirne. *St. Germain.*
- n. n. n. n. n. Gelbe Hermannsbirne. *St. Germain jaune.*
- o. o. o. o. o. Bunte Hermannsbirne. *St. Germain panaché.*
- p. p. p. p. p. Salviatibirne. *Salviati.*
- q. q. q. q. q. Blutbirne. *Sanguinole.*
- r. r. r. r. r. Sarazinsbirne. *Sarazin. Poire Sarazin.*
- s. s. s. s. s. Duhamels Sarazinsbirne. *Poire Sarazin de Duhamel.*
- t. t. t. t. t. Sylransbirne. *Sylvange. Bergamotte Sylvange.*
- u. u. u. u. u. Winterzuckerbirne. *Sucré d'hiver.*
- v. v. v. v. v. Grüne Zuckerbirne. *Sucré verd.*
- w. w. w. w. w. Grofse Hoyerwerder - Zuckerbirne. *Sucré de Hoyerswerda.*
- x. x. x. x. x. Lange grüne Herbst-Saftbirne. *Verte longue d'Automne, ou Mouille bouche.*
- y. y. y. y. y. Lange grünbunte Herbst-Saftbirne. *Schweitzerhose. Verte panachée ou coulote Suisse.*
- z. z. z. z. z. Virgouleuse. *Virgouleuse.*

a. a. a. a. a. a. Zankersbirne. Wasserbirne.  
(nostratibus.)

**Nota.** Egregia et completissima varietatum Pyri sub divo Carolo Friederico in horto proprio Plantagegarten, collectio, ante viginti adhuc annos, oculos delectabat.

Collectio completissima, pulcherrima, Pyri Malorum, Cerasorum, Prunorum, Persicarum etc in Alsacia superiori, apud fratres Baumann a Bollviller, conspicua est. Vid. Catalogue des arbres fruitiers, arbrisseaux etc. qui se trouvent dans les pepinieres et jardins des Frères Baumann, cultivateurs pepinéristes à Bollviller, Département du haut Rhein,

pag. 388. PYRUS *Malus*. Linn.

Sequentes principales varietates in hortis, pomariis, agris et vineis Badensibus et adjacentibus passim coluntur.

- a. Agatapfel rother (nostratibus) Aagtje Appel rouge.
- b. Agatapfel weißer oder süsser. Aagtje blanc.
- c. Ananasapfel. Ananas, Pomme d'Ananas.
- d. Apiapfel kleiner. Api le petit.
- e. Benzlerapfel (nostratibus.)
- f. Winter-Borsdorfer. Borsdorfer. Reinette de Misnie. Reinette bâtarde.
- g. Großer böhmischer Borsdorfer. Borsdorfer le grand Bohemien.
- h. Schwarzer Borsdorfer. Borsdorfer noir.
- i. Zwiebel - Borsdorfer. Borsdorfer Ognoniforme.
- k. Rother Borsdorfer. Borsdorfer rouge.
- l. Englischer Kalwil. Calville d'Angletaire.

- m. Weisser Sommerkalwil. Calville blanche d'été.
- n. Weisser Winterkalwil. Calville blanche d'hiver.
- o. Gelber Kalwil. Osterapfel. Calville jaune.
- p. Rother Herbstkalwil. Calville rouge d'automne.
- q. Rother Sommerkalwil. Calville rouge d'été.
- r. Rother Winterkalwil. Calville rouge d'hiver.
- s. Rother Cardinalsapfel. Cardinal rouge.
- t. Weisser kurzstieliger Apfel. Courtipendu blanc.
- u. Großer grauer kurzstieliger Apfel. Courtipendu gris le gros ou Pomme de Berlin.
- v. Platter kurzstieliger Apfel. Courtipendu plat.
- w. Rother kurzstieliger Apfel. Courtipendu rouge.
- x. Grüner späther großer kurzstieliger Apfel. Courtipendu verd tartif le gros.
- y. Großer Faros oder Kaiserapfel. Faros le gros.
- z. Grauer Fenchelapfel. Anisapfel. Faros gris ou Pomme d'Anis.
- a. a. Großer grauer Fenchelapfel. Faros gris le gros.
- b. b. Sommer - Fleiner. Fleiner d'été.
- c. c. Grauchapfel: der süsse (nostratibus et helvetis) Grauch la dnce.
- d. d. Grauch: der saure (nostrat. et helvet.) Grauch aigre.
- e. e. Großer Api. Rosenapfel. Gros Api ou Pomme de Rose ou passe-Rose.
- f. f. Haidelocher (nostrat. et helvet.)
- g. g. Junkerapfel (in helvetia.)
- h. h. Rothe Mäucher. Mäucher rouge.

- i. i. Rother Herbstapfel. Passe-Pomme rouge d'automne.
- k. k. Englischer Silber-Peppin. Peppin argenté d'Angletaire.
- l. l. Sommer-Peppin. Peppin d'été.
- m. m. Französischer Peppin. Peppin franche.
- n. n. Edel-Peppin. Peppin noble.
- o. o. Goldpeppin. Peppin d'or ou Pomme d'or.
- p. p. Rother Taubenapfel. Pigeonnet rouge.
- q. q. Adams- und Evaapfel. Pomme d'Adam.
- r. r. Astrakanischer oder durchsichtiger Apfel. Pomme d'Astracan ou transparente.
- s. s. Muser, kurzer Muser. (nostratibus.)
- t. t. Aeugler, Breutiger oder Mäucherapfel. (nostratibus.)
- u. u. Frauenrothacher. (helvetis) chataigne du Léman.
- v. v. Doppelrother Paradiesapfel. Pomme double rouge du Paradies.
- w. w. Bollwillerer Süßapfel. Pomme douce de Bollwiller.
- x. x. Goldgestickter-Apfel. Pomme de drap-d'or. Vrai drap-dor.
- y. y. Feigenapfel, Pomme Figue. (Pyrus dioica. Willd. Pyrus apetala. Münchhausen.)
- z. z. Melonenapfel. Pomme Melonne.
- a. a. a. Oranienapfel. Pomme d'Orange.
- b. b. b. Buntgestreifter Papagayapfel. Pomme panachée.
- c. c. c. Großer Birnenapfel. Pomme poire la gros.
- d. d. d. Jacobsapfel. Pomme de St. Jacques.
- e. e. e. Niklausapfel. Pomme de St. Nicolas.
- f. f. f. Weißer Rosmarinapfel. Pomme Romarin blanche.



- g. g. g. Rother Rosmarinapfel. Pomme Romarin rouge.
- h. h. h. Gelber Stettinerapfel. Pomme jaune de Stettin.
- i. i. i. Violetterapfel. Pomme violette.
- k. k. k. Sommer - Postoph. Postoph d'été.
- l. l. l. Winter - Postoph. Postoph d'hyver.
- m. m. m. Probstapfel. (nostratibus et helvetis.)
- n. n. n. Pupicherapfel. Pupicher (nostratibus et helvetis.)
- o. o. o. Quittenapfel. Quince Appel.
- p. p. p. Herbstquittenapfel. Quince d'Automne.
- q. q. q. Sommer - Rambour. Rambour franc.
- r. r. r. Renette von Aizerna. Reinette d'Aizerna.
- s. s. s. Deutsche Renette. Reinette allemande.
- t. t. t. Grofse englische Renette. Reinette d'Angletaire le gros.
- u. u. u. Weifse Renette. Reinette blanche.
- v. v. v. Predaische Renette. Reinette de Preda.
- w. w. w. Bretagnische Renette. Renette de Bretagne.
- x. x. x. Gestreifte Renette. Reinette brodée ou filée.
- y. y. y. Goldrenette. Reinette dorée ou Reinette jaune tardive.
- z. z. z. Französische - Renette. Reinette franche.
- a. a. a. a. Champagner - Renette. Reinette gris de Champagne.
- b. b. b. b. Kleine graue Winter - Renette. Reinette gris d'hyver la petite.
- c. c. c. c. Graue Metzer Winter - Renette. Reinette gris d'hyver de Metz.
- d. d. d. d. Graue Goldrenette. Reinette gris d'orée.
- e. e. e. e. Graue Herbst - Renette. Reinette gris d'Automne.

f. f. f. f.

- f. f. f. f. Muscat - Renette. Reinette Musquée.  
 g. g. g. g. Unvergleichliche Renette. Reinette nonpareille.  
 h. h. h. h. Normänder - Renette. Reinette de Normandie.  
 i. i. i. i. Pockennarbig - Renette. Reinette picotée.  
 k. k. k. k. Gestochene - Renette. Reinette piquée.  
 l. l. l. l. Birnen - Renette. Reinette poire.  
 m. m. m. m. Roscheller - Renette. Reinette de Rochelle.  
 n. n. n. n. Rothe Renette. Reinette rouge.  
 o. o. o. o. Sicklersche rothe Renette. Reinette rouge de Mr. Sickler.  
 p. p. p. p. Feuerröthliche Renette. Reinette rousse.  
 q. q. q. q. Safran - Renette. Reinette - Safran.  
 r. r. r. r. Forellen - Renette. Reinette truite.  
 s. s. s. s. Uttinger - Renette. (Helvetis) Reinette d'Uttingen.  
 t. t. t. t. Grüne Renette. Reinette verte.  
 u. u. u. u. Windsorer - Renette. Englischer Königs - Apfel. Reinette de Windsor ou monstrueuse. Royale d'Angletaire.  
 v. v. v. v. Süfser - Rheinapfel. Gestreifter Winter - Süßapfel. (nostratibus.) Permain rayé d'hyver.  
 w. w. w. w. Sauer - Rheinapfel. (nostratibus.)  
 x. x. x. x. Rümmer - Krieslicher. (nostratibus.)  
 y. y. y. y. Rostocker oder rother - Stettiner. Großer rother Breitling. (nostratibus.) Stetting rouge.  
 z. z. z. z. Streifling. Strömling. (nostratibus.)  
 a. a. a. a. Süß - Malzcher. (nostratibus.)  
 b. b. b. b. Wachsapfel. Schmutziger. (nostratibus.)

- c. c. c. c. c. Wässerling. Wässerlinger (nostratibus.)  
 d. d. d. d. d. Breitzuger. (nostratibus et helvetis.)  
 e. e. e. e. e. Spitzzuger. (nostratibus et helvetis.)

**Nota.** In Brisgovia, cum primis ad montem Kaiserstuhl et in Principatu superiori ad lacum Bodanicum multae varietates sub propriis nominibus obveniunt, magis examinandae.

Completissimam Malorum collectionem in horto Plantagegarten Carlsruhe, sub divo Carolo Friederico, primario arborum cultori et pomologo, adhuc ante viginti annos vidi.

pag. 396.

751.\* *SPIRÆA crenata* foliis obovatis acutis apice dentatis trinerviis, corymbis confertis, pedunculatis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1058.*

*Icon. Pall. Fl. Ross. tab. 19. Pfleger arb. et frut. Bad.*

*Germ. Gekerbte Spierstaude.*

*Gall. Spirea à févilles crenélées.*

*Hab.* In Sibiria. Hospitatur in hortis anglicis aliisque Carlsruhe, Schwetzingen, Baden, Rothenfels, Favorite et alibi, ex quibus passim emigravit in sylvas adjacentes.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturantur. ‡

*Fruticulus* elegans. *Folia* apice crenata, seu

dentata, alia integerrima. *Corollæ* copiosissimæ niveæ.

751.\*\* *SPIRÆA chamaedrifolia* foliis ovatis inciso-serratis glabris, umbellis pedunculatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 701. (corymbis pedunculatis. *Willd.*)

*Icon.* *Pfleger arb. et frut. Bad.*

*Germ.* *Sibirische Spierstaude.*

*Gall.* *Spiræa de Sibérie.*

*Hab.* In Sibiria. Hospitatur in permultis hortis, ex quibus passim in sylvas adjacentes migravit.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri matura. h

*Frutex* elegans. *Folia* læte viridia. *Flores* numerosi albi.

751.\*\*\* *SPIRÆA opulifolia* foliis lobatis (trilobatis) serratis, corymbis terminalibus. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 702.

*Icon.* *Pfleger arb. et frut. Bad.*

*Germ.* *Schneeballenblättrige Spierstaude.*

*Gall.* *Spiræa à févilles d'Obier.*

*Hab.* In Virginia, Canada. Hospitatur in permultis hortis ex quibus passim in sylvas adjacentes migravit.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matura. h



751. \*\*\*\* *SPIRÆA sorbifolia* foliis  
pinnatis, foliolis uniformibus serratis, flo-  
ribus paniculatis. *Linn. Sp. pl.* 1, p. 702.

*Icon. Psleger arb. et frut. Bad. Pall. Fl.*  
*Ross.* 1. tab. 24.

*Germ.* Ebereschenblättrige Spierstaude.

*Gall.* *Spiræa à févilles pinnées.*

*Hab.* In Sibiria. Hospitatur in hortis angli-  
cis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Fa-*  
*vorite, Rothenfels, Baden* et alibi.

*Flor.* Augusto. *Semina* Octobri Novembri ma-  
tura. †

*Frutex* 2-3 pedalis, erectus. *Flores* pani-  
culati, copiosi, albi. *Flores* apibus mel præ-  
bent.

*Nota.* Planta apud nos nullibi spontanea, mihi  
ab amico pro nova cive Badensi, nuper missa  
est, sine dubio ex horto quodam emigrata et  
nunc cum aliis indigena.

## ICOSANDRIA POLYGYNIA.

pag. 403.

754. \* *ROSA lutea.*

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi, inter *Ra-*  
*dolfzell et Engen* ad viam publicam in se-  
pibus passim, ubi eam vidi 1807. Prope  
*Wertheim* in sepibus circa *Niclashausen*  
et *Werbach* post *D. Wibelum* vidi.

754. \*\* *ROSA francofurtana.*

*Hab.* Circa *Wertheim* in sepibus prope *Græ-*

*venrieth et Hochfeld*, ubi legi cum amicissimo *Wibelio* 1813.

*Caules Ramique* in Planta spontanea subinermes.

754. \*\*\* *ROSA gallica*. Linn.

*Rosa austriaca*. *Poll. Fl. Palat. n. 404.* (omnino.)

Flore simpliaci purpureo.

**Hab.** In Palatinatus ericetis arenosis inter *Speier et Oggersheim t. Pollichio*. Prope *Boxberg, Sindolsheim, Mergentheim et Wertheim* in asperis lapidosis calcareis non infrequens, ubi eam vidi 1813.

Descriptionem vide apud *Rosam austriacam Pollichii. p. 421.*

pag. 405. *ROSA rubiginosa*.

**Icon.** *Sow. Engl. Bot. tab. 991.*

pag. 409. *ROSA mollissima*.

*Rosa dubia. Wibel. Fl. Werth. p. 263.*

*Rosa mollis. Sow. Engl. Bot. Vol. 35.*

**Icon.** *Sow. Engl. Bot. tab. 2459.*

pag. 410. *ROSA pomifera*.

**Icon.** *Sow. Engl. bot. tab. 583.* (sub *R. villosa*.)

pag. 414. *ROSA spinosissima*.

**Icon.** *Sow. Engl. Bot. tab. 187.*

*Hab.* Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut*, in dumetis prope *Homburg* ad viam versus *Bettingen* post *Wibelium* vidi.

pag. 416. post *R. spinosissimam*.

758.\* *Rosa mitissima* germinibus globosis, pedunculisque glabris, petiolis minutissime subaculeolatis, caule ramisque inermibus. *mihi*.

*Germ.* *Dornlose Rose*.

*Gall.* *Rosier sans épines*.

*Hab.* Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut*, ubi legit acutissimus *Mertinus* 1821.

*Flor.* Majo, Junio. *Baccas* Septembri maturat. *h*

Simillima omnino *R. spinosissimæ*, a qua differt: *Caule*, *Ramis*, *Pedunculisque* inermibus, semper mitissimis. *Petioli* rariter et minutissime aculeolati. *Foliola* 5-7 opposita, sessilia, ovalia, obtusiuscula, sæpe ovali-lanceolata, acuta, argute serrata, læte viridia, glabra, parva. *Flores* in ramis terminales, pedunculati, solitarii. *Corolla* parva alba.

Pulchella, inter omnes rosas facile mitissima. An varietas *R. spinosissimæ*?

pag. 416. *ROSA agrestis (mihi.)*

*Nota.* Neutiquam confundenda aut pro eadem habenda, cum *R. sepium*. *Thuill. Fl. Paris.* i. p. 252. *R. canina*  $\beta$ . *sepium*. *Decand. Fl. Franc.* IV. p. 447. quae mera varietas *R. caninae* est.

758. \*\* *ROSA parviflora* germinibus depresso-globosis pedunculisque hispidis, petiolis pubescentibus subaculeatis, caule glabro, aculeis stipularibus rectis, foliolis ellipticis, floribus subgeminatis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1078. — Ehrh. Beitr. 4. p. 21.*

*R. carolina* calycibus subintegris petalis longioribus, germinibus globosis pedunculisque subhispidis, caule aculeis rectis stipularibus, petiolis glabris, foliis ovatis serratis glabris. *Du Roi Harbk. 2. p. 355.*

*R. pensylvanica.* *Wangenh. amer. p. 113.*

*Icon. Pfleger arb. et frut. Bad.*

*Germ. Kleinblumige Rose.*

*Gall. Rosier à petites fleurs.*

*Hab.* In America boreali. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Favorite, Baden* et alibi, ex quibus passim jam emigravit in sylvas adjacentes.

*Flor.* Junio. *Semina* Septembri, Octobri maturata. †

*Fruticulus* elegans, 2-3-4 pedalis. *Flores* subgeminati, parvi, impleti. *Corollæ* rubellæ. *Calyces* petalis corollinis longiores.

758. \*\*\* *ROSA carolina* germinibus globosis pedunculisque subhispidis, petiolis pilosis subaculeatis, caule glabro, aculeis stipularibus subuncinatis, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus corymbosis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1069.*



*R. carolina.* Linn. *Sp. pl.* p. 703. *Wangenh. amer.* 112.

*R. corymbosa.* Ehrh. *Beitr.* 4. p. 21.

*R. virginiana.* Du Roi *Harbk.* 2. p. 353.

*Icon.* *Wangenh.* l. c. tab. 31. fig. 71. *Pfleger. arb. et frut.* Bad.

*Germ.* *Carolinsche Rose.*

*Gall.* *Rosier de Caroline.*

*Hab.* In America septentrionali. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe*, *Schwetzingen*, *Rothenfels*. *Baden*, et alibi, ex quibus passim in sylvas adjacentes jam emigravit.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Octobri, Novembri matura. h

*Frutex* 5-6 pedalis. *Foliola* ovali-lanceolata, glabra, subtus pallidiora. *Flores* in corymbis multifloris. *Corollæ* petala obcordata, rubicunda.

pag. 418.

760. *ROSA repens* germinibus subglobosis glabris, pedunculis hispidis, caulis plerisque stoloniferis repentibus, aculeis recurvis, floribus subsolitariis, stylis elongatis basi in columnam coalitis.

*R. serpens.* *Wibel. Fl. Werth.* p. 264. (omnino.)

β. Floribus in cymam digestis.

*Rosa arvensis* germinibus globosis peduncu-

lisque glabris, caule petiolisque aculeatis, floribus cymosis. *Linn. Mant.* 245. (exclus. *Fl. Dan. Ic.*)

**R.** *arvensis* fructibus globosis pedunculisque inermibus, aculeis caulinis petiolorumque aduncis, floribus subcymosis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 538. *Decand. Fl. Franc. IV.* p. 458.

**R.** *stylosa*. *Merat. Fl. Paris.* 192. *Decand. Fl. Franc. VI.* p. 536. an? videtur.

**Icon.** *Sow. Engl. Bot. tab.* 188. (bona.)

**Hab. et Flor.** Passim in iisdem cum *R. repente* regionibus. Circa *Wertheim Tauberbischoffsheim*, *Boxberg*, *Mergentheim* eam vidi 1813 et sequ.

β. Differt a *R. repente* nostra seu *R. sylvestri* *Pollichii*, *Rothii*, *Hermanni*: *Floribus* terminalibus non solitariis, sed 3-5 in cymam digestis. *Flores* albi. *Rami* longe repentes, arcuati, implexi, sæpe rubicundi. *Aculei* sparsi adunci. *Foliola* 5-7 ovata, acuta, glabra, subtus glaucescentia. *Pedunculi* inermes glanduloso-scabri. *Bacca* matura subglobosa, glabra, fusco-rubella ut in *R. repente*. *Styli* glabriusculi, basi in columnam simplicem coaliti.

**Nota.** Neutiquam confundenda cum *R. corymbifera* nostra.

pag. 421. post *ROSAM alpinam*.

761.\* *ROSA rubrifolia* germinibus ovatis pedunculisque glabris glaucescentibus, petiolis aculeatis, caule aculeis sparsis uncinatis, foliolis oblongis argute serratis gla-

bris, floribus subcorymbosis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1075.*

**R.** *rubrifolia* petiolis spinosis, foliolis 7-9 glabris acutis, germinibus umbellatis glabris, calyceibus foliaceis. *Vill. Fl. Delph. 3. p. 549. Decand. Fl. Franc. IV. p. 445.*

**Germ.** Rothblättrige Rose.

**Gall.** Rosier à févilles rougeâtres.

**Hab.** In montosis calcareis retrò *Arlesheim* in ditioe Basileensi, nec non in Vogesis ad montem *Ballon* et in monte *Jusasso*, ubi eam ~~vidi~~ 1810.

**Flor.** Junio, Julio. *Baccæ* Septembri, Octobri maturæ. †

Statura fere *Rosæ* alpinæ. *Foliola* glauca, subtus rubella.

**Obs.** In horto *Carlsruhensi* culta, hucusque constantissima permansit.

pag. 421. *ROSA austriaca Pollichii* est *ROSA gallica. Linn.* flore simplici.

**762.** *ROSA collina* germinibus ovatis subglabris, pedunculis petiolisque glanduloso-hirsutis, caule aculeolato. *Jacqu. Flor. Austr. — Host. Synops. 280. Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1078.*

**Icon.** *Jacqu. l. c. tab. 197.*

**Germ.** Hügel-Rose.

**Gall.** Rosier des collines.

**Hab.** In collibus præsertim calcareis saxosis prope *Boxberg*, *Mergentheim*, *Tauberbischoffsheim*, nec non prope *Wertheim* et *Milttenberg*, ubi eam vidi *Ann.* 1815, cum *Rosa canina*.

**Flor.** Majo, Junio. *Baccæ* Septembri maturæ.  $\bar{h}$

*Frutex* 2-3-4 pedalis, glaber, aculeis recurvis validis, nitidis, fuscescentibus præditus. *Folia* alterna, petiolata, impari-pinnata. *Foliola* quina, rarius septena, brevissime pedicellata, ovata, sæpe subrotunda, acuta, argute serrata, atrovirentia, glabra, dorso ex viridi-subincana, venis et ad marginem villosa: *serrulis* apice per lentem cartilagineis, fusco-rubentibus. *Foliolorum costæ* aculeis et pilis brevibus albidis glandulisque rarioribus pedicellatis rufis præditæ. *Stipulæ* acutæ, glabræ, ad marginem villo albido glandulisque ciliatæ. *Pedunculi* 2-3 teretes, glandulis longius pedicellatis hispidi. *Germen* ovatum, glaberrimum, quandoque inferne glandulis nonnullis donatum. *Calycina* foliola interne et ad marginem villosa, in dorso et laciniarum marginibus foliaceis glandulosa. *Foliola* duo vel tria, pinnato-laciniata, reliqua integerrima. *Corollæ* petala quinque, obcordata, pallide carnea, odorata. *Antheræ* luteæ. *Stigmata* villosa. *Bacca* matura ovata, nitidissima, glabra, rubra, intus aurantiaca.

Habitus *R. caninae*.

Non confundenda cum *R. collina* Sow. Engl. Bot. tab. 1895. quæ ad *R. brevistylam*. Decand. Fl. Franc. VI. p. 537. pertinet.



pag. 421.

762. \* *Rosa pumila* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, petiolis cauleque aculeato, foliis subtus glaucis, serraturis glandulosis, fructibus pyriformibus *Ait. hort. Kew. 2. p. 206.* — *Willd. Sp. pl. 2. p. 1072.*

*R. pumila* germinibus ovatis, petiolis pedunculisque hispidis, caule superne aculeatissimo. *Linn. Suppl. 262.* — *Jacqu. Fl. Austr. 2. p. 59.* *Allion. Fl. Pedum n. 1802.*

*Rosa sylvestris pumila rubens.* *Bauh. pin. 483.*

*Rosa VI. pumila.* *Clus. hist. 1. p. 117.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 198.*

*Germ. Niedrige Rose.*

*Gall. Rosier naine.*

*Hab.* In collibus præsertim calcareis saxosis apricis prope *Boxberg, Mergentheim, Wertheim, Miltenberg* passim non infrequens, ubi eam vidi 1813.

*Flor.* Junio, Julio. *Baccæ* Septembri, Octobri maturæ. †

*Frutex* semipedalis, sesquipedalis, erectus, simpliciusculus, ramis paucis brevioribus, inferne inermis, superne aculeis subulatis, rectis, subrecurvisque numerosis præditus. *Folia* alterna, petiolata, imparipinnata. *Foliola* subquina, subovata, quandoque obovata vel magis subrotunda obtusa, vel acuta, venosa, sæpe conni-

ventia et reclinata, argute duplicato - serrata, glabra, virentia, dorso pallidiora et villosa, margine et costa dorsali media, glandulis minutis subrotundis, ferrugineis, subpedicellatis obpressa. *Petiolis et Stipulae* pedicellato - glandulosae. *Flores* pedunculati, terminales, pauci, saepe unicus, maxime suaveolentes. *Pedunculi* glandulis pedicellatis praediti. *Germen* ovatum, hispidum, glandulosum. *Calycina* foliola longe acuminata, margine minutim sub pedicellato - glandulosa, duo integerrima, duo utrinque pinnato-laciniata, quintum hisce simile, etiam utrinque aut ex altero dumtaxat latere pinnatum. *Corollae* petala quinque, obcordata, pallide rubella, mediocria. *Styli* villis albidis hirsuti. *Bacca* matura ovato - subrotunda, hispida, modo nuda, nitida, rubra vel subaurantiaca, intus crocea.

**Nota.** Individua nostra cum illis a Jacquino depictis, in omnibus partibus optime conveniunt. Neutiquam confundenda aut pro varietate R. gallicae habenda.

762. \*\* *Rosa montana* germinibus oblongis pedunculisque hispidis, petiolis aculeatis, caule aculeis stipularibus uncinatis, foliolis glabris obovatis, glanduloso - serratis. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1076.*

*R. montana* petiolis aculeatis, foliis septenis subrotundis, germinibus hispidis, calycibus pistilisque persistentibus villosis. *Vill. Fl. Dauph. 3. p. 547.*

*Germ. Bergrose.*

*Gall. Rosier des montagnes.*

*Hab.* In Principatu superiore in montosis saxosis calcareis prope *Eugen, Stockach*, re-

tro *Mæskirch im Donauthal*, nec non prope *Boxberg, Mergentheim Wertheim et Miltenberg* cum amicissimo *D. Wibelio* eam vidi 1813.

*Flor.* Junio, Julio. *Baccæ* Septembri, Octobri maturæ. ♀

*Frutex* 1 - 2 pedalis et altior, aculeis præsertim ad ramos, copiosis, inæqualibus, patentibus, patienti - reflexiusculis, tenuibus, acutissimis, fuscis, setisque glanduliferis præditus. *Folia* alterna, petiolata, imparipinnata. *Foliola* sæpissime quina, rarius septena, subsessilia, ovata, obtusa, inæqualiter serrata, glabra, superne læte viridia, subtus pallidiora. *Serraturæ* et foliorum venæ glandulosæ, fuscae. *Petioluli* hispido-glandulosi, subtus aculeolis tenuibus curvatis, paucis, præditi. *Stipulæ* sagittatæ, unciam fere longæ, margine glandulis stipitatis numerosis fuscis obsessæ. *Flores* terminales, subsolitarii, sæpissime bini, rarius terni, pedunculati. *Pedunculi* uniflori, subæquales, erecti, setis numerosis patentibus glanduliferis fuscis hispidi. *Germen* oblongum, setuloso-glanduliferum. *Calycinae* laciniae binæ foliaceæ, pinnatifidæ, setuloso-glanduliferæ, reliquæ tres angustiores apicem versus inciso-serratæ, ibique et in dorso setuloso-glanduliferæ, longitudine fere corollæ. *Corolla* petala quinque, obcordata, pallide rubella, interdum albida, unque flavescencia, unciam circiter longa et lata, suaveolentia. *Styli* distincti, basi villosuli. *Bacca* ovalis, phœniceo-rubra, hispida.

**Nota.** Prope Wertheim ad montem Flöhberg cum Cl. Wibelio vidi promiscue cum hac obvenientia specimina, in omnibus parti-

bus simillima: Corollis duplo fere majoribus, rubro - purpurascentibus instructa. Anproles hybrida R. montanae et R. gallicae.

Regio prope Wertheim, Miltenberg, Mergentheim, Boxberg et Sindolsheim ob multas species Rosarum ibi obvenientium, maxime memorabilis.

762. \*\*\* *ROSA Axmanni* germinibus ovatis glanduloso hispidis, pedunculis subsolitariis dense aculeatis glandulosisque, petiolis pubescentibus glanduloso-aculeatis, caule aculeis recurvis glandulisque stipitatis, foliolis subtus glaucescentibus, ovatis acutis simpliciter serratis, serraturis glandulosis, stylis in columnam coactis, longitudine staminum. *mihi*.

*Germ.* *Axmannsche Rose.*

*Gall.* *Rosier de Mr. Axmann.*

*Hab.* Prope *Wertheim* in collibus sylvaticis lapidosis ubi detexit *Cl. Dr. Axmann Ann.* 1820.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri, Octobri matura.  $\frac{1}{2}$

*Frutex* 1-3 pedalis, erectus. *Rami* glaucovirides, aculeis recurvis, glandulisque stipitatis instructi. *Ramuli* floriferi patentes, inflexi, aculeis sparsis inferne recurvis superne suberectis inæqualibus atropurpureis muniti. *Petoli* pube rarissima inspersi, aculeato-glandulosi. *Stipulae* coalitæ, superne in lobos duos lanceolatos acuminatos divisæ, glanduloso-denticulatæ, utrinque glabræ. *Foliola* quina, rarius septena, summa terna, 7-8 lineas longa, 5-6 lineas lata,



ovata, acuta, æqualiter serrata: serraturis, 2-3 glandulosis, supra saturate viridia, subnitida, subtus glaucescentia, ad costam venasque villosula, rigidiuscula. *Foliolorum* jugum infimum fere proximo sequenti, duplo minus. *Pedunculi* solitarii, rarius subcorymbose, glandulis aculeisque dense obsessi, bracteati: *Bracteis* solitariis aut geminis, ovato-lanceolatis, acuminatis, deciduis, pilis glandulisque ciliatis suffulti. *Calycis* tubus oviformis, glanduloso-hispidus, laciniatus: *Lociniae* ovato-lanceolatae, mucronatae, intus et margine albo-tomentosae, tres glanduloso-hispidiusculae, appendiculatae, appendicibus lineari-lanceolatis, glanduloso-denticulatis, duæ reliquæ nudæ, vel tantum ad basin glandulis aliquot obsessæ. *Corollæ* Petala quinque, albida, obcordata, ultra unciam longa et lata, unque flavescentia, calyce multo majora. *Styli* in columnam simplicem, stamina æquantem coaliti, stylum unicum mentientes. *Raccæ* maturæ parvæ, ovatae, atropurpureæ, glanduloso-hispidæ.

Odor florum suavis.

Debemus hanc speciem, sine dubio, hucusque vix descriptam, meritissimo medico D. Axmanno, qui mihi benevole misit specimina desiccata, cum adumbratione optima.

Omnino diversa a *R. brevistyla*. Decand. Fl. Franc. VI. p. 537.

762. \*\*\*\* *ROSA tomentosa* germibus ovatis pedunculisque hispidis glanduliferis, aculeis ramis subapproximatis binis, subaduncis, petiolis pubescente-tomentosis incanis, rariter aculeolatis, foliolis ovalibus, acutis, serratis, utrinque subtomentosis.

R.

*R. tomentosa* fructibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis caulinis aduncis, foliolis ovatis utrinque tomentosis. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 559.

*Rosa sylvestris alba* cum aliquo rubore, folio hirsuto. *Bauh. hist.* 2. p. 44. *Icon.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 990.

*Germ. Filzige Rose.*

*Gall. Rosier à févilles cotonneuses.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* prope *dem Köhlisfeld* ad viam versus *Wohlfartsweyher* copiose, ubi eam legit *A. Braun* 1821. Prope *Wertheim*, in dumetis ad vias passim, ubi eam vidi 1815. Prope *Boxberg*, *Mergentheim*, *Sindolsheim* in sepibus non infrequens.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri matura. ♀

*Frutex* 4-5 pedalis et altior, erectus, glaber, aculeatus, aculeis validis rectiusculis. *Folia* alterna, petiolata, pinnata: *Foliola* septem, quinque, subsessilia, ovalia, acuta, argute duplicato-serrata, utrinque pallide viridia, tomentoso-sericea, uncialia et sublongiora, quinque ad septem lineas lata, serraturis manifeste pilosotomentosis, eglandulosis. *Petioli* costæque foliolorum incano-tomentosi, priores rariter aculeolati. *Stipulæ* sublineares, acutæ, margine piloso-subglandulosæ. *Flores* caulem ramosque terminantes, subsolitarii, bini, terni, quaterni, subquini, pedunculati. *Pedunculi* erecti, unciales, sesquiunciales, hispidi, pedicellato-glandulosi, basi *Bracteis* 3-4 lanceolatis, acutis, margine ciliato-fimbriatis per lentem glandu-

liferis suffulti. *Germen* ovatum, glanduloso-hispidum. *Calycis* laciniae glanduloso-hispidae, margine sericeo - pilosae. *Corolla* quinquepetala. *Petala* obcordata, 6-7 lineas longa, alba, cum aliquo rubore saepe superfusa. *Styli* breves. *Baccæ* maturæ ovatae, coccineae, hispidæ.

Affinis *R. molissimæ* a qua differt: *Geminibus* non glabris, non subglobosis, sed semper glanduloso-hispidis, ovatis. *Floribus* saepissime, 3-4. *Foliis* attactui non mollissimis. *Petiolis* *Foliolorum* costis venisque et serraturis piloso-incanis, tomentosis.

*Foliola* digitis subtrita, suaveolentia.

pag. 423. *ROSA canina.*

**Nota.** Canino more, pro diverso loco natali calcareo, siliceo, argillaceo, altiore et humiliore aprico, umbroso, et cumprimis pro statu juniore et annosiori, variat. *Foliola* majora et minora. *Flores* majores et minores, dilute aut incarnato-rosei, quandoque albidii, solitarii, bini, terni, quini, subsessiles, breve seu longius pedunculati. *Baccæ* minores, et majores. *Character* mihi optimus est in *Geminibus* ovatis glabris, *Pedunculis* glaberrimis, *Calycinis* laciniiis villosotomentosis, glandulosis!

Hic pertinet *Rosa aciphylla* *R. affinis* et *R. platyphylla* *Rau.* *R. sepium* *Decand. Fl. Franc. VI. p. 538.* seu *R. myrtifolia* *Hall. fil. seu R. agrestis* *Savi. Fl. Pisan.* *R. stipularis-biserata* et *macrocarpa* *Merat. Fl. Paris. Confer. Desv. Journ. Bot. 1813.*

Ex sola *R. canina*, hodierno more, facile ultra triginta species, quarum differentiae specificae partim nullae, partim nimis minutiosae et quammaxime mancae, apud auctores, nactae sunt. *Conf. Cl. Steudelii. No-*

mencl. Bot. summo studio et labore, elaboratum.

pag. 424. *ROSA corymbifera*.

Deleatur *Rosa arvensis*. Linn.

*R. dumetorum*. (Borrer.) *Decand. Fl. Franc. VI. p. 534*.

*R. arvensis*. *Wib. Fl. Werth. p. 263*. (omnino.)

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2579*. (sub. *R. dumetorum*.)

*Hab.* In dumetis in der Eichelstaig, et alibi circa *Wertheim*. Prope *Sindolsheim*, *Boxberg*, *Mergentheim Ann. 1815* vidi.

pag. 425. *ROSA umbellata*.

*Rosa sempervirens*. *Wibel. Fl. Werth. add. p. 350*.

*Hab.* Circa *Wertheim* in dumosis ad montem *Flöhberg* cum amicissimo *Wibelio* legi 1813.

*Nota.* Distincta a *R. canina*. Linn. In horto Carlsruhensi culta, constantissima, non cum *R. arvensi* Linn. multo minus cum *R. collina*. *Jacquini* confundenda.

pag. 427.

765.\* *ROSA alba*.

Flore simplici albo.



*Hab.* Circa *Wiesloch* in dumetis ubi eam legit amicissimus *Märklinus*.

*Nota.* Ad rariores Florae cives omnino pertinet. In horto Carlsruhensi culta, constans.

pag. 429.

## 765.\*\* *Rosa provincialis*

β. *R. centifolia*. *Linn.*

*Var.* Flore simplici rubicundo.

*Rosa germanica*. *Märklin.*

*Hab.* Prope *Wiesloch* in dumetis ubi eam legit acutissimus *Märklinus*.

*Rami* subflexuosi hispidi. *Pedunculi* solitarii, terminales, uniflori, hispidi. *Petioles* subhispidi, rariter et obsolete aculeolati. *Foliola* quina, ovata, dentato-serrata, serraturis subglandulosis, subtus villosa. *Germen* ovatum, hispidulum.

*Nota.* Ad rarissimas Florae cives pertinet. In horto Carlsruhensi culta, constans.

*Nota.* Summam semper in excursionibus botanicis, ultra 40 annos hucusque curam, Rosarum speciebus impendi. Rosas in diversis magni Ducatus et adjacentibus regionibus, non sine molestia, tempore inflorescentiae et maturationis baccarum probe contuli, descripsi, maximae ex parte in hortum Carlsruhensem transplantavi, mutationesque quas cultura patiebantur observavi. Ob summam apud Rosas praesertim ex hoc tempore apud auctores, floristasque germaniae et galliae, nec non praecipue in Monographiis de Rosa confusionem, omnia synonyma incerta, quae mire confusionem adaugent, studio omisi. Pruri-

tus multorum, in speciebus novis creandis, amoenissimam certamque scientiam, in barbariem ruit.

Caveant autem quam sanctissime omnes sani Botanici unquam proponere nomen triviale sine sufficiente differentia specifica, ne ruat in pristinam barbariem scientia. mutatio horum, licet in melius, plus nocet, quam proderit! Omnis vera cognitio, cognitione specifica innititur. Sic summus et hucusque in stabiliendis et definiendis generibus et speciebus plantarum felicissimus Linnaeus.

pag. 433. RUBUS *Idæus*.

β. fructu albo.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* retro *Wohlfartsweyher* in sylvaticis montosis copiose.

pag. 434. RUBUS *argenteus*.

*Icon.* Willdenow et Hayné *Abbildung der deutschen Holzarten.* tab. 98.

*Hab.* Inter *Hohenwettersbach* et *Durlach* in montosis sylvaticis non infrequens. Prope *Wertheim* in asperis im *Walzenberg* et alibi t. *Wibelio*.

Non pro peculiari specie a *R. fruticoso* diversa, habenda est.

*Nota.* Nuper in uno eodemque individuo *R. fruticosi*, folia quinata ternataque subtus argenteo-tomentosa, aliaque utrinque viridia observavi.

pag. 435. post RUBUM *argenteum*.

767.\* RUBUS *corylifolius* caule quinquangulo aculeato, foliis inferioribus qui-

natis, superioribus ternatis, supremis simplicibus utrinque hirsutis, calycibus glabriusculis inflexis.

*R. corylifolius* foliis subquinatis subtus pilosis: lateralibus sessilibus, aculeis rectiusculis, calycibus fructus inflexis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 542.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 827. Willd. et Haynè, l. c. tab. 102.*

*Germ. Haselnussblättrige Brombeer-Staude. Gall. Ronce à févilles de Noisetier.*

*Hab.* In sylvaticis umbrosis passim frequens. Circa *Carlsruhe im Auacker* et alibi.

*Flor.* Junio, Julio. *Baccæ* Septembri, Octobri maturæ. †

*Caules* frutescentes flagelliformes, adscendentes, quinquanguli, glabriusculi, aculeati, aculeis recurvis mediocribus. *Folia* inferiora quinata, lateralibus subsessilibus, superiora ternata, suprema simplicia utrinque hirsuta. *Foliola* subcordato-ovata, acuta, dentata. *Petioli* pilosuli, aculeolati. *Flores* paniculati. *Calyces* patentes, glabriusculi, demum maturescente fructu inflexi. *Corollæ petala* obovata, integra, dilute roseo-incarnata. *Baccæ* maturæ parvæ, nigræ.

*Nota.* An varietas *R. fruticosi* Linn. Varietates intermediae prostant. Certissime nil nisi varietas *R. fruticosi*! Koch in Cat. Plant. pal. cum annotatione verissima.

pag. 436. *RUBUS fruticosus. Linn.*

*Nota.* Planta pro diversa aetate, pro loco natali umbroso, humido, demissiori, nemoroso, syl-

vatico, colliculoso, montoso, abrupto, aprico, opaco, calcareo, calcareo-argillaceo, gypsaceo, argillaceo, siliceo-arenaceo, basaltico porphyrico et granitico, canino more ludit. In regionibus sylvae nigrae aliisque saepe per ambustionem fruticum: Rubi, Ericarum et aliarum, submutatis, quammaxime polymorpha. Ex uno eodem individuo facile 5 et plures varietates conspicuae, quae pro dolor a nonnullis hodiernis pro speciebus diversis enunciantur. Sic Celeb. D. Weihe et Nees ab Esenbek Rubi germanici descriptionibus et iconibus adumbrati, in sola regione Mindensi, jamjam ultra 60 species, creatae sunt. Unicum et optimum pro instabilitate harum specierum criterium est earum sana et multifaria in diversis regionibus contemplatio et earum cultura in horto ex seminibus. In R. fruticoso Linn. Caules, Sarmenta, Rami et Ramuli, erecti, curvati, declinati, adscendentes, plus minusve saepe decumbentes, teretiusculi, sulcati, saepissime angulati, glabriusculi, pruinosi, villosi, pilosuli, subglanduliferi, aculeolati: aculeis majoribus et minoribus, rectiusculis, saepissime incurvis, aut aduncis, rarius subrecurvis aequalibus et inaequalibus, conformibus et maxime difformibus, paucioribus et numerosioribus. Folia in caulibus sarmentisque primariis secundariisque saepissime quinata, subquinata, digitata, in ramis ramulisque subquinata, ternata, simpliciaque. Foliola polymorpha, petiolata, subpetiolata, cordata, cordato-ovata suborbiculata, ovato-cordata, obtusa, acuta, acuminata et cuspidata, longiora et breviora, latiora et angustiora, simpliciter et duplicato-serrata aut serrato-dentata, quandoque sublobata, grossequ inaequaliter dentata, plana, saepe plus minusque undulata, supra saturate pallideque viridia, subtus pubescentia, villosula, pilosula, velutina, tomentosa, albidula, passim pallide virescentia. Flores paniculati, paniculato-racemosi, corymboso-pa-



niculati, corymboso - racemosi, racemosique, densius et laxius dispositi, multiflori et pauciflori. Calyces plus minusve reflexi, rarius patentiusculi, pubescentes, villosuli, glabriusculi, basi nudiusculi aculeolatique. Corollae majores et minores. Petala subrotunda et obovata, integra subcrenulataque, alba, albide dilute rosea vel dilute purpurascencia. Baccae majores et minores, plus minusve sapidae, atrae, altro - violaceae, dulcescentes. Omnes allegatae mutationes, seorsim lectae et in herbario spectatae, omnino primo intuitu differre videntur, sed diligentius in natura ipsa in locis natalibus visae, individuis intermediis ita confluent, ut limites nulli reperiantur. Conf. cum hisce meis et b. Schweikerti, magni Ducis Badensis horti Inspectoris observationibus, Cl. Kochii fidissimas observationes in Cat. pl. palat. p. 22.

768.\* *RUBUS glandulosus* foliis ternatis, foliolis subrotundo - ovatis acuminatis mucronato - serratis, caule, petiolis pedunculis calycibusque aculeatis et glanduloso - hispidis. *Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. p. 548. — Bellard Act. Turin. 3. p. 230.*

R. *hybridus* foliis quinatis ternatis simplicibusque, caulium spinis rubro villo permixtis, fructibus cymosis hirsutis. *Vill. Fl. Delph. 3. p. 559.*

*Icon. Willd. et Hayné l. c. tab. 99. Flor. Dan. tab. 1696.*

*Germ. Drüsentrager Brombeerstrauch.*

*Gall. Ronce glanduleuse.*

*Hab. In montosis sylvaticis passim infrequens.*

Circa *Carlsruhe* inter *Wohlfartsweyer* et *Grünwettersbach*, ubi eam legit *Alexander Braun* 1819.

*Flor.* Junio, Julio. *Baccæ* Septembri, Octobri maturæ. ‡

*Caules* frutescentes repentes, angulati, aculeati, hispido-glandulosi. *Aculei* recti, tenues. *Folia* ternata, suprema simplicia, superne nudiuscula, inferne cumprimis ad costas pilifera. *Foliola* petiolata, cordato-ovata, longius acuminata, inæqualiter argute dentata. *Flores* racemoso-paniculati. *Pedunculi et Calyces* hirsuti spinulosique, glandulosi. *Corollarum Petala* obovata, integra, subcrenataque, alba, vel dilute rubella. *Baccæ* nigræ.

Varietas *levidensis* corollarum petalis crenatis roseis in *Flora Dan.* tab. 1697 sub R. *Sprengelii*. (*Weihe*) depicta est.

*Nota.* Mera varietas *Rubi fruticosi* Linn. Varietates intermediae omnino prostant.

768.\*\* *RUBUS nemorosus* foliis ternatis, foliolis pedicellatis ovatis acutis argute serratis, villosis, caule tereti aculeato villoso, floribus racemosis, calycibus pilosis glandulosis.

*Icon.* *Willd. et Haynè. l. c. tab.* 101.

*Germ.* Trauben-Brombeer.

*Gall.* Ronce en grappe.

*Hab.* In sylvaticis umbrosis passim frequens. Circa *Carlsruhe* prope *Bulach*, *Scheibhardt* et alibi.

*Flor.* Junio, Julio. *Baccæ* Septembri, Octobri maturæ. ‡

*Caules* fruticosi adscendentes, teretes, villosi, aculeati. *Aculei* tenues, rectiusculi. *Folia* petiolata, ternata, in viminibus sterilibus semper quinata, villosa. *Foliola* pedicellata, ovata, acuta, argute serrata. *Flores* racemosi. *Calyces* pilosi, glandulosi. *Petala* obovata, integra, albida. *Baccæ* fusco nigrae, dulcissimæ.

*Nota.* Mera sine dubio varietas *Rubi fruticosi* Linn. Varietates intermediae omnino prostant.

pag. 436.

768.\*\*\* *RUBUS odoratus* foliis simplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro. Linn. *Sp. pl.*

*Icon.* *Pfleger. arb. et frut. Bad. Mill. Dict. Icon. tab.* 223.

*Germ.* Wohlriechender Himberstrauch.

*Gall.* Framboisier odorant.

*Hab.* In Canada. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Durlach, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden* et alibi, ex quibus passim jam emigravit in sylvas adjacentes.

*Flor.* Junio, Julio. *Fructus* Augusto maturat. ‡

*Frutex* elegans. *Folia* simplicia speciosa. *Flores* speciosi rubri. *Calyces* colorati pilosoglandulosi, odoratissimi.

*Flores* apibus ceram et mel præbent.

pag. 439. *RUBUS saxatilis*.

*Hab.* Porro in Principatu Fürstenbergensi prope *Unadingen* non infrequens, ubi vidi 1810 in montosis saxosis inter *Weinheim* et *Birkenau* t. *D. Dierbachio*.

pag. 439. *FRAGARIA vesca* calyce fructus reflexo, pubescentia petiolorum patentissima, pedunculorum adpressa. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1090.*

771.\* *FRAGARIA collina* calyce fructus erecto, pubescentia pedunculorum erecta, petiolorum patentissima, foliis utrinque pubescentibus. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1093.*

*F. collina* calyce fructu erecto, foliis acute serratis, utrinque pubescentibus. *Ehrh. Beitr. 7. p. 26. Wibel. Fl. Wertheim. p. 269.*

*F. fructu majori candicante oblongiusculo. Volkam. Norimb. p. 172.*

*F. foliis hispidis. Bauh. pin. p. 327. Mapp. Fl. Als. p. 110.*

*Germ. Harte Erdbeeren. (Steinerdbeeren. Steinbeeren. Pflasterbeeren. Steinknöpf, in Alstia.)*

*Gall. Fraisieur des collines.*

*Hab.* In collibus aridis, siccis, apricis asperis passim frequens, prope *Durlach* in monte *Thurnberg* ad vineas, in Alsatia prope *Blinschweiler* juxta vias et semitas, prope *Buchsweiler* in vineis copiose t. *Mappo. Circa Wertheim* in collibus calcareis frequens.



*Flor.* Majo, Junio. *Fructus* Augusto, Septembris matura. 2

Differt ab affini *F. vesca*, sub qua in Flora nostra comprehendi: characteribus datis. Floret tardius. *Folia* magis hispida, utrinque cinerea, magis rotunda et minora. *Fructus* magis dulcis, suavissimi saporis, difficulter ex calyce integer avelli potest, rubet ex una tantum parte. *Calyx* in plures et longiores lacinias divisus est, ut optime *Mappus* annotat.

*Obs.* Planta in horto botanico Carlsruhensi culta, constantissima.

771. \*\* *FRAGARIA elatior* calyce fructus reflexo, pubescentia pedunculorum et petiolorum patentissima. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 1091. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 23.

*F. vesca*  $\beta$ . *pratensis*. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 709.

*F. scabra* flore foemineo, fructu purpureo moschato. *Du Ham. arb.* 1. p. 185. *tab.* 8.

*Fragaria* et *Fraga*. *Lob. Ic. tab.* 697.

*Fraga* fructu magno. *Besl. hort. Eyst. tab.* 8. *fig.* 5.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 2197.

*Germ.* *Grofse Erbeeren.* *Gartenerdbeeren.* *Wiesenerdbeeren.*

*Gall.* *Fraisier des Jardins.* *Fraisier élevé.*

*Hab.* In collibus petrosis gramineis nec non in partis montosis sylvaticis circa Carbonariorum areas passim frequens.

*Flor.* Aprili, Majo. *Fructus* Junio, Julio, Augusto maturat. 2

Differt a *Fragaria vesca communi*: *Caulibus* semper multo longioribus strictioribus. *Foliis* magis pubescentibus. *Petiolis Pedunculisque* patentissime pubescentibus, longioribus et copiosioribus. *Fructibus* duplo triplove semper majoribus, saturate rubris sapidissimis maxime dulcibus et aromaticis. *Seminibus* majoribus.

*Nota.* Saepissime in hortis rusticorum et aliorum colitur. Fructus spontanei in pratensibus apricis colliculosis magis aromatici et dulces quam in hortis culti.

Pro Syrupo Fragorum praesertim medicis et pharmaceutis non satis commendandi.

*Obs.* Persaepe ex officinis pharmaceuticis Syrupum Fragorum corruptum mucore tectum, removi.

771. \* \* \* *FRAGARIA grandiflora*  
calyce fructus erecto, pubescentia pedunculorum et petiolorum erecta, foliis supra glabriusculis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. 1092. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 25.

*F. vesca E. ananas. Ait. hort. Kew.* 2. p. 212.

*F. foliis ovatis crenatis nervosis calycibus maximis. Mill. Dict.* 192.

*F. flore amplissimo, fructu ananæ saporem et odorem referente. Du Ham. arb.* 1. p. 183. *tab.* 6.

*Icon. Mill. l. c. tab.* 288.

*Germ. Ananas Erdbeere.*

*Gall. Fraisier Ananas.*

*Hab.* In Surinamo. Colitur in hortis passim rusticorum aliorumque.

*Flor.* Aprili, Majo. *Fructus* Junio, Julio maturat. 24

*Calyces* præmagni, *Fructus* maximi, albide seu flavo-rubelli, succulenti, sapidi, odoris ananæ.

*Nota.* Fructus citissime mollescent, mucorem contrahunt et odorem deponunt.

pag. 441. ante *POTENTILLAM Anserinam.*

772. \* *POTENTILLA fruticosa* foliis pinnatis, caule fruticoso. *Linn. Sp. pl.* p. 709. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 547.

*P. fruticosa* caule fruticoso, foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis, petalis calyce longioribus. *Lehm. l. c.* p. 31. *Nestl. l. c.* p. 30.

*Icon.* *Psleger arb. et frut.* Sow. *Engl. Bot.* tab. 88.

*Germ.* Strauchartige Potentille.

*Gall.* *Pentaphylloide an arbuste.*

*Hab.* In Anglia, Pyrenæis, Sibiria, Armenia. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden* et alibi, ex quibus passim jam emigravit in dumeta. In dumetis Alsatiæ prope *Colmar* nuper vidit *D. Griesselich.*

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Augusto matura. 5

*Fruticulus* 3 - 4 pedalis, elegans, erectus,

ramosissimus. *Folia* alterna, petiolata, imparipinnata, 2-3 juga superiora ternata. *Foliola* integra, oblongo-lanceolata, margine subrevoluta, subtus incano-pilosa. *Stipulae* lanceolatae, membranaceae, superne pilosae. *Flores* terminales, solitarii, pedunculati. *Petala* corollina obcordata, aurea, patentissima, calycem subsuperantia. *Receptaculum* villosum.

pag. 446. *POTENTILLA recta*.

Deleatur *Jacqu. Icon.* cit. ad *P. canescentem* pertinet.

*Hab.* Prope *Ihringen am Kaiserstuhl*. Circa *Wertheim* in arcis ruderalis. *t. Wibelio*.

pag. 447. post *POTENTILLAM rectam*.

775.\* *POTENTILLA canescens* caule recto multifloro, foliis quinatis, foliolis oblongo-cuneiformibus profunde serratis, supra adpresso-pilosis subtus canescentibus tomentosis, petalis obcordatis calyce aequalibus. *Lehmann. Monogr. p. 92.* — *Nestl. Monogr. p. 47.* (*excl. Spreng. syn.*) — *Decand. Flor. Franc. VI. p. 541.* — *Besser Pr. Fl. Gall. Austr. utriusq. 1. p. 330.*

*P. parviflora. Gaud.*

β. *adscendens* foliis quinatis adpresso-pilosis, ramis ternatis, foliolis oblongo-cuneatis profunde dentatis, caule adscendente. *Willd. Enum. Plant. p. 554.*

*P. inclinata. Willd. Sp. pl. 2. p. 1102.* — *Decand. Fl. Fr. n. 3746. Vill. Fl. Delph. 3. p. 567.*



*P. intermedia.* Wahlenb. *Fl. Carpat.* (excl. *Synon.*)

*Icon.* Jacqu. *Fl. Austr.* 4. tab. 583. (sub *P. recta.*)

*Germ.* Grauliches Fingerkraut.

*Gall.* Potentille blanchatre.

*Hab.* In Alsatia ad muros antiquos circa Argentoratum frequens, ubi eam post *Cl. Nestlerum* vidi. In locis apricis ad agrorum versuras inter *Ostheim et Rappolsweiler* nuper legit *D. Griesselich.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 24

*Radix* ramosa, fibrosa, dura, extus fusconigricans. *Caules* plures, adscendentes, erecti, simpliciusculi, teretes, pedales, sesquipedales, superne ramosi, tomentosi, incani. *Folia* radicalia caulinaque superiora petiolata, quinata, summa sessilia, ternata. *Foliola* sessilia, oblongo-cuneiformia, profunde a basi fere ad apicem serrata, superne viridia, pilis incumbentibus adspersa, infra tomento densissimo adpresso, canescentia, margine pilis exsertis ciliata. *Stipulae* ovato-lanceolatae, integrae, interdum incisae, subtus tomento-canescens. *Flores* terminales, paniculato-corymbosi. *Pedicelli* filiformes. *Calices* maxime pilosi, basi canescentes. *Corollae* parvae, luteae. *Petala* quinque obcordata, longitudine calycis.

Nomen *P. parviflorae* placet. *Corollae* vix magnitudine *P. vernae*.

*Nota.* Planta in horto Carlsruhensi culta, 2-3 pedalis. *Folia* majora. *Corollae* item parvae.

Variat.

**Variat.** Caulibus erectis, adscendentibus, et basi subdeclinatis.

Planta cum *P. argentea* non confundenda.

pag. 448. post *POTENTILLAM argenteam*.

**776.\*** *POTENTILLA aurea* caule adscendente, foliis radicalibus quinatis, foliolis oblongo - cuneiformibus, intermediis petiolatis, superne dentato - serratis subsericeis, margine sericeo - ciliatis, petalis obcordatis calyce fere duplo longioribus. *Lehmann. Monogr. p. 116.*

*P. aurea* foliis radicalibus quinatis, foliolis cuneiformibus ciliatis, apice quinque dentatis, caulinis ternatis subsesilibus, petalis obcordatis calyce majoribus, caule adscendente. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1105.*

*P. aurea* foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato. *Linn. Sp. pl. 1. p. 712. — Nestler. Monogr. p. 57.*

*Fragaria* caule reclinato, foliis quinatis, serratis, oris sericeis. *Hall. hist. n. 1122.*

*Quinquefolium alpinum* splendens aureo flore. *Bauh. hist. 2. p. 398.*

*Icon. Haller. l. c. tab. 22. (bona.) Sturm. Deutschl. Flor. Fasc. 17. (bona.)*

*Germ. Gold - Fingerkraut.*

*Gall. Potentille à fleurs dorées.*

*Hab.* In Brisgoviae montis *Feldberg* summo jugo, nuper lecta, et mihi benigne missa, ab amicissimo *Sales Bosch*, med. candidato.

In vicinia Principatus superioris in montosis subalpinis prope *St. Gallen* et alibi eam vidi 1818.

*Caules* digitales, palmares, flexuoso - ascendentes, interdum declinati, tenues, subsericei. *Folia radicalia* petiolata, quinata. *Foliola* sessilia, cuneiformia, 4-5 lineas longa, 3 lineas circiter lata, pallide viridia, reticulata, superne 5-7-9 serrata: serraturis, margineque sericeis. *Caulina* alterna, subsessilia, ternata, *foliolis* angustioribus, apice 3-4 serratis. *Stipulae* ovato-lanceolatae, integrae, margine sericeae. *Calycis foliola*, margine sericea, Corolla breviora. *Corollae Petala* obcordata, aurea, 2 lineas longa.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet. Neutiquam confundenda, cum *P. aurea* Smith. Fl. Brit. 2. p. 549. Sow. Engl. Bot. tab. 561 quae ad varietatem  $\beta$ . *Potentillae croceae*. Lehmann. l. c. p. 111. pertinet.

776. \*\* *POTENTILLA opaca* caule decumbente filiformi, foliis infimis septenatis quinatisque, foliis lanceolato - cuneiformibus profunde serratis utrinque prolixepilosis, petalis obcordatis calycem æquantibus. *Lehmann. Monogr. p. 105.* — *Nestl. Monogr. p. 54. Linn. Sp. pl. 1. p. 713. Amœn. acad. 4. p. 274. — Jacqu. Collect. 1. p. 33.*

*P. opaca* foliis radicalibus septenatis quinatisque lineari-cuneiformibus dentatis, petalis retusis calycis longitudine, caulibus filiformibus decumbentibus hirtis. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1103. (excluso Pollichii*

*syn.*) *Wibel. Fl. Werth. p. 268. (videtur.)*

*Fragaria rubens* foliis quinatis angustis, cuneiformibus et cuneiformiter serratis pilosis, caulibus filiformibus rubentibus. *Crantz. Austr. p. 75. n. 7.*

*Fragaria* caule suberecto, foliis quinis septenis serratis obtusis. *Hall. hist. n. 1120.*

*Icon. Jacqu. Ic. rar. 1. tab. 91. — Sturm. Deutschl. Fl. Fasc. 17.*

*Germ. Rothbraunes Fingerkraut.*

*Gall. Potentille opaque.*

*Hab.* In Palatinatu transrhenano in collibus sterilibus inter *Calstadt et Neustadt t. D. Kochio.* Prope *Wertheim* ad muros prope molam suburbanam.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio, Augusto matura. 24

*Radix* ramosa, dura, fusco-rubella. *Caulis* digitales, semipedales, numerosi, decumbenti-adscendentes, teretes, filiformes, superne dichotomi, fusco-purpurei, sæpe rubentes, pilosi. *Folia radicalia* longe petiolata, septenata, quinataque. *Caulina* inferiora brevius petiolata, quinata, summa opposita, sessilia, ternata, simpliciaque. *Foliola* sessilia, cuneiformi-lanceolata, serrata, opaco-viridia, pilis mollibus patentibus prælongis utrinque instructa. *Stipulae* binæ, oblongo-lanceolatae, integræ, pilosæ. *Flores* terminales corymbosi. *Pedicelli* filiformes purpureo-rubentes, pilosi. *Corolla* parva, aurea. *Petala* quinque obcordata, basi macula fulva notata, calycem subæquantia.



**Nota.** Saepe confusa est cum *P. verna*, a qua tamen facile distinguitur habitu multo graciliori, colore omnium partium opaco, foliis radicalibus longissime petiolatis. Floribus multo minoribus *Lehmann, l. c.*

pag. 448. *POTENTILLA verna.*

Deleatur *var. β. incana*, quæ est *P. cinerea* et lege *Sowerby Engl. Bot. tab. 37. loco 89.* et adde *Icon. Sturm. Deutschl. Fl. Fasc. 17. (bona.)*

pag. 450. Deleantur *Nota et Observationes.* *Potentilla* scilicet illa foliis *Fragariæ* similibus sed minoribus, omnibus ternatis, utrinque argenteo-sericeis, corollis albis in Gallia meridionali et Hispania copiose a me, Ann. 1789 observata, in Horto Carlsruhensi culta, ab hoc tempore sub *P. micrantha* descripta est.

pag. 450. post *POTENTILLAM vernam.*

777.\* *POTENTILLA cinerea* caulibus decumbentibus, foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis, foliolis cuneiformi-obovatis obtusis, serrato-crenatis, utrinque incanis villosa-sericeis, petalis obcordatis calyce longioribus.

*P. cinerea.* *Chaix ap. Vill. Flor. Delph. 3. p. 567.* — *Decand. Fl. Franc. 6. p. 543.* — *Nestl. Monogr. p. 54.* — *Pers. Synops. Pl. 2. p. 55.* — *Dierbach. Fl. Heidelb. 2. p. 148.*

*P. incana.* *Wetterauische Flora. 2. p. 248.*

*Potentilla collina. Wibel. Fl. Werth. p. 267.*

*P. opaca. Poll. Fl. Pal. n. 498. (excl. Syn.)*

*P. subacaulis. Lehmann. Monogr. p. 120. Willd. Sp. pl. 2. p. 1111. (excl. Synon. Villars. Gerard et Garid.) Wahlenb. Fl. Carpat. n. 510. Wulfen. ap. Jacqu. Coll. 2. p. 145. — Heller. Fl. Würzeb. Suppl. p. 48.*

*Icon. Jacqu. Icon. rar. 3. tab. 491.*

*Germ. Aschgraues Fingerkraut.*

*Gall. Potentille cendrée.*

*Hab. In collibus sterilibus apricis. Retro Durlach, Grötzingen; inter Schwetzingen et Mannheim in sabulosis siccis. In Brisgoviae pascuis excelsis am Kaiserstuhl auf den Schellinger-Wiesen cum Globularia vulgari abunde. Prope Wertheim ad colles circa molam suburbanam t. Wibelio. In Palatinatu transrhenano in siccissimis arenosis pascuis ac ericetis retro Dürckheim et dem Holzhof. t. Pollichio.*

*Flor. Junio, Julio. Semin Angusto matura. 24*

*Radix* lignosa, ramoso-fibrosa, fusco-nigricans. *Caules* ex radice numerosi, decumbenti-ascendentes, unciales, digitales, palmares, teretes, ramosi, pubescentes, uti tota planta cinereo-glaucescens. *Folia radicalia* numerosa, longe petiolata, quinata, superiora ternata, summa simplicia, trifida. *Foliola* sessilia, cuneiformi-obovata, obtusa, serrato-crenulata, serraturis, 7-9 subæqualibus, supra glaucescente-viridia, subtus pilis adpressis, stellatis, glaucescente-cinerea, venulosa, 5-7 lineas longa, 3-4

lineas lata. *Stipulae* lanceolatae, pilosae. *Flores* caulem terminantes, pedicellati. *Corolla* flava. *Petala* quinque, obcordata, foliolis calycinis duplo fere longiora, parum ultra duas lineas longa, duasque lineas lata.

Obs. Planta ex seminibus in Horto Carlsruhensi culta, constantissima permansit, hinc omnino peculiarem et a *P. verna* distinctam speciem sistit. Sub *P. subacauli* foliis ternatis dentatis utrinque tomentosis, saepe decumbente. Linn. Sp. pl. 1. p. 715. sine dubio non nostram plantam, sed magis *P. velutinam* Lehmann. Monogr. p. 170. *P. subacaulis*. Decand. Fl. Franc. n. 3749. (excl. syn. plurib.) comprehendebat, quae in Galloprovinciae montibus lapidosis crescit, et foliis semper ternatis, foliolis longioribus, uncialibus, apice obtuse dentatis. Floribus longius pedicellatis, 1-2 tantum, multo majoribus (*Corolla* maxima dicit Linnaeus) instructa est.

777. \*\* *POTENTILLA crocea* caule adscendente, foliis infimis quinatis, foliolis oblongo-cuneatis rotundato-obtusis subhirsutis, superne inciso-dentatis, dentibus obtusis, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Lehmann. Monogr. p. 111.* — *Seringe Herb. port. Cent. 2. n. 169.* — *Hall. filius.*

*P. Salisburgensis* foliis hirsutis, radicalibus quinatis inciso-serratis obtusis, caulinis ternatis, caule adscendente debili compresso paucifloro, foliis calycinis subdentatis. *Hænke in Jacqu. Collect. 2. p. 68.*

*P. filiformis.* *Decand. Fl. Franc. VI. p. 542.* — *Vill. Fl. Delph. 3. p. 564.*

*P. heterophylla.* Lapeyr. *Fl. Pyren.* p. 289. — Nestl. *Monogr.* p. 56.

*P. verna.* Wahlenb. *Fl. Carpat.* n. 509.

*P. verna.* var.  $\beta$ . Willd. *Sp. pl.* 2. p. 1104.  
— Pers. *Synops. pl.* 2. p. 55.

$\beta$ . *P. Sabauda.* Poir. *Encycl. bot. Suppl.* 4.  
p. 539. Decand. *Fl. Franc.* VI. p. 541.

*P. rubens.* Pers. *Synops. plant.* 2. p. 55.

*P. Juratensis.* Seringe, *Cent. pl. exsicc.*

*P. aurea.* Smith. *Fl. Brit.* 2. p. 549. (excl. Hall. syn.)

*P. verna.* var.  $\beta$ . Nestl. *Monogr.* p. 52. —  
Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 146.

*P. verna.* var.  $\gamma$ . Willd. *Sp. pl.* 2. p. 1124.

*Fragaria villosa.* Crantz. *Stirp. Austr.* 2.  
p. 75.

*Fragaria.* Hall. *hist. n.* 1119. var.  $\beta$ .

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 561. (sub *P. aurea*) *bona.* — Crantz. *l. c. tab.* 1. fig. 2. (minus *bona.*)

*Germ.* Rothgelbbliühendes Fingerkraut.

*Gall.* Potentille à fleurs rouge-jaunes.

*Hab.* In Principatus superioris vicinia in rupibus calcareis am Sentis et Gamor ubi eam vidi *Ann.* 1818. In Alsatiæ Vögesis t. D. Nestlero et Mougeot; et in monte Jurasso.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto. 24

Affinis omnino *P. vernæ*, a qua differt: *Caulibus* simplicioribus adscendentibus, semipedali-



bus et longioribus, valde compressis. *Corollis* semper majoribus ex lutescente-croceis. *Petalis* sæpe basi macula saturatiore notatis. Demum loco natali alpino.

pag. 450. *POTENTILLA alba*.

*Hab.* Prope *Ostersheim*, circa *Schwetzingen* in sylvis. Circa *Wertheim* in sylvis passim cum *D. Wibelio* 1815 vidi.

pag. 451. post *POTENTILLAM albam*.

778.\* *POTENTILLA caulescens* caule adscendente debili multifloro, foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, foliolis obovatis subcuneatis superne conniventi-serratis margine pilosis, petalis obovato-cuneiformibus vix emarginatis calycem æquantibus. *Lehm. l. c. p. 130.*

*P. caulescens* foliis quinatis apice conniventi-serratis, caulibus multifloris erectis, receptaculis hirsutis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 114. — Amœn. acad. 4. p. 317. — Nestl. Monogr. p. 59.*

*P. caulescens* foliis quinatis apice conniventi-serratis, caulibus multifloris decumbentibus, receptaculis hirsutis, petalis ovatis. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1106.*

*Fragaria* foliis ovatis apice serratis, oris sericeis, pappo placentæ longissimo. *Hall. hist. n. 1123.*

Quinquefolium album majus. *Bauh. prodr. 139. caulescens. Bauh. pin. 325.*

Quinquefolium 2 minus albo flore. *Clus. hist.* 2. p. 105.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 220. — *Sturm. Deutsch. Fl. fasc.* 1.

*Germ. Vielstieliges Fingerkraut.*

*Gall. Potentille ascendante.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro dem *Weishad* prope dem *Wild-Kirchlein* in rupibus calcareis, post *Hallerum* vidi 1818. In *Vogesis* prope *Bussang*.

*Flor.* Junio. *Semina* Julio, Augusto matura. 24

*Radix* multiceps, lignosa, tortuosa. *Caul-les* plures, adscendentes, teretes, digitales, palmares, et longiores filiformes, simplices, pilosi. *Folia* radicalia longe petiolata, quinata, caulina ternata, summa subsessilia. *Foliola* subcuneiformi - obovata, superne conniventi - serrata, utrinque læte viridia, margine albide pilosa. *Stipulæ* ovali-lanceolatae, superiores sensim latiores. *Flores* terminales, pedunculati. *Pedunculi* subdivisi, cum *Calycibus* dense piloso-canescens. *Corollæ* albæ. *Petala* quinque obovato - cuneiformia, angustata, subemarginata, longitudine calycis, vel sublongiora. *Filamenta* dense villosa. *Receptaculum* hirsutum albicans.

*Nota.* Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

pag. 454. *TORMENTILLA erecta. Linn.*

*T. officinalis* caule erectiusculo ramoso, foliis sessilibus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 552.

*Potentilla Tormentilla* caule adscendente dichotomo, foliis ternatis, caulinis sessilibus,

foliolis lanceolato-ovalibus inciso-serratis, pedicellis solitariis dichotomalibus lateralibusque, corollis subtetrapetalis, petalis obcordatis. *Lehm. Monogr. p. 149.*  
*Nestl. Monogr. p. 65.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 863.*

781.\* *TORMENTILLA reptans* caule repente, foliis petiolatis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 716.* *Hoffm. Fl. Germ. p. 180.*  
*Roth. Fl. Germ. 2. p. 567.*

*T. reptans* caule prostrato simplici, foliis petiolatis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 553.*

*Potentilla nemoralis* caule prostrato filiformi, foliis quinatis ternatisque subpedatis, foliolis obovatis basi cuneatis superne inciso-serratis subtus adpresso-pilosis, pedicellis axillaribus solitariis elongatis, floribus subtetrapetalis, petalis obcordatis. *Lehm. l. c. p. 147.* — *Nestl. l. c. p. 65.*

*Pentaphyllum reptans alatum*, foliis profundius serratis. *Plot. Oxf. tab. 9. fig. 5. (mala.)*

Plots Tormentil. *Pet. H. Brit. tab. 41. fig. 10. (mala.)*

*Icon. Lehm. l. c. tab. XIII. (optima) Sow. Engl. Bot. tab. 864.*

*Germ. Liegende Tormentill.*

*Gall. Tormentille couchée.*

*Hab.* In umbrosis nemorosis ad sepes et agrorum margines. Circa *Carlsruhe* in sylva *Auacker am Kühlsfeld* ad marginalia syl-

vatica et alibi ad agrorum margines passim rarius.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septempri maturantur. 4

*Radix* ramoso-fibrosa, extus fusca. *Caulis* pedales, sesquipedales et longiores, prostrati, simpliciusculi, pubescentes, tenues, foliati. *Folia* longe petiolata, erecta, *inferiora* quinata, subpedata, *superiora* ternata: *Foliola* subsessilia, cuneiformi-obovata, superne inciso-serata, exteriora multo minora, pallide viridia, subtus pilosa: pilis incumbentibus. *Stipulae* lanceolatae indivisae, quandoque sublobatae. *Pedunculi* oppositifolii, solitarii, capillares, foliis longiores, pilosi. *Calyx* pilosus. *Corolla* aurea. *Petala* quatuor, perraro quinque, obcordata, calyce longiora.

**Nota.** Planta omnino specie diversa a *T. erectae* Linn. varietate procumbenti multo frequentiori, a qua facile distinguitur foliis subpedatis, foliolorum forma, aliisque notis. Conf. Cl. Lehmanni Monogr. p. 148.

pag. 456. ante GEUM.

CCXLIII.\* D R Y A S.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 868.*

*Calyx* monophyllus, octopartitus: laciniis patentibus, linearibus, obtusis, æqualibus, corolla paullo brevioribus. *Corolla Petala* octo, oblonga, emarginata, patentia, calyci inserta. *Germina* multa conferta, parva. *Styli* capillares, lateri germinis inserti. *Stigmata* simplicia.



*Semina* numerosa, subrotunda. *Stylis* longissimis lanigeris instructa.

*Obs.* *Calyx* variat laciniis 6-8-10. *Petala* tot quot laciniæ calycis.

781.\* *DRYAS octopetala* octopetala, foliis simplicibus. *Linn. Sp. pl. p.* 717.

*D. octopetala* octopetala, foliis simplicibus serratis. *Smith. Fl. Brit. II. p.* 555.

*Dryas* floribus octopetalis, foliis ovatis, subtus albissimis. *Hall. hist. n.* 1133.

*Geum chamaedrifolium* flore erecto octopetalo, fructu oblongo, aristis lanigeris. *Crantz. Austr. p.* 70.

*Chamaëdris* 3. s. montana. *Clus. hist. 2. p.* 351.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 451. *Oeder. Fl. Dan. tab.* 51.

*Germ.* Achtblättrige Dryade. *Alpen-Dryade.*

*Gall.* *Dryade à huit pétales.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen*, in subalpinis alpinisque calcareis retro *dem Weisbad auf dem Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. *Fruticulus.*

*Cauliculi* e radice plures, lignosi diffusi, decumbentes, digitales, palmares et longiores,

ramosi, foliati. *Folia* alterna, petiolata, ovalia serrato-crenulata, firma, superne lacte viridia, nitida, subtus nivea, tomentosa. *Flores* longe pedunculati solitarii octopetali, sat speciosi. *Petal*a patentia, alba. *Calyx* octofidus, glanduloso-pilosus.

pag. 461. *GEUM montanum*.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen*, auf dem Gamor et Kasten in pascuis, ubi eam vidi 1818.

pag. 464. post *COMARUM palustre*.

### CCXLV.\* CALYCANTHUS.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 870.*

*Calyx* monophyllus urceolatus squamosus laciniatus laciniis coloratis, lanceolatis: superioribus sensim majoribus, petala mentientibus. *Corolla* nulla, præter calycina foliola petala mentientia. *Antheræ* oblongæ sulcatæ, filamentorum apice adnatæ. *Germina* plurima, desinentia in *Stylos* subulatos compressos longitudine staminum. *Stigmata* glandulosa. *Semina* plurima, caudata.

786.\* *CALYCANTHUS floridus* laciniis calycinis interioribus lanceolatis. *Willd.*  
*Linn. Spl. pl. 2. p. 1119.*

*C. floridus* petalis interioribus longioribus.  
*Linn. Sp. pl. 1. p. 718.*

*Buttneria anemones flore. Du Ham. arb. 1. p. 114.*

*Basteria* foliis ovatis oppositis, floribus lateralibus, caule fruticoso ramoso. *Mill. Dict.*

*Beuteria* petalis coriaceis oblongis, calycis foliolis reflexis. *Ehret. Pl. pict.*

*Frutex* corni foliis, floribus instar anemones stellatae, petalis crassis rigidis colore sordide rubente, cortice aromatico. *Catesb. Carol. 1. p. 46.*

*Icon. Psleger arb. et frut. Mill. l. c. tab. 60. Ehret. l. c. tab. 13. Catesby. l. c. tab. 46. Du Ham. l. c. tab. 45.*

*Germ. Gewürzstrauch. Carolinische Kelchblume.*

*Gall. Calycanthus de Caroline.*

*Hab.* In Carolina. Hospitatur fere in omnibus hortis circa *Carlsruhe* nec non in hortis rusticorum prope *Beiertheim*, *Mühlburg*, *Rintheim*, *Grötzingen*, in hortis anglicis *Carlsruhe*, *Schwetzingen*, *Weinheim*, *Heidelberg*, *Ettlingen*, *Favorite*, *Baden*, *Rothensfels*, *Lahr*, *Zell am Hamersbach* et alibi frequens.

*Flor.* Junio, Julio. †

*Frutex* 3-4-12 pedalis. *Rami* oppositi, patentes, teretes. *Folia* opposita, breviter petiolata, oblonga seu subrotundo-ovata, integra. *Flores* laterales, pedunculati, fusco-rubentes, maxime suaveolentes. *Stigmata* imperfecta, aut nulla. *Semina* apud nos nulla fert.

Introducta in Europa per *Catesbaeum*, in horto aulico *Carlsruhensi* Ann. 1770 per divum *Carolus Friedericum*, et in horto maxime mul-

tiplicata et evulgata, per Schweykertum et de-  
mum per meritissimum Hardtwey hortorum mag-  
ni Ducis inspectorem.

Radix et cortex maxime camphoratus. Flores sua-  
vissime odorati.

Aqua ex radice et cortice destillata, maxime aro-  
matica, camphorata, brevi tempore camphorae par-  
tem in fundo vasorum deponit. Cortex radiceis cau-  
lium et ramorum maxime aromaticus, camphoratus,  
in febribus malignis, putridis, nervosis aliisque mor-  
bis, ubi camphora et cortex Chinae praescribuntur,  
egregium medicamentum, medicis non satis commen-  
dandum. Aqua destillata efficax.

Cortex in vasis vitreis bene obturatis in offici-  
nis pharmaceuticis servandus. Vide C. C. Gmelin  
über den Einfluss der Naturwissenschaft  
auf das gesammte Staatswohl. Carlsruhe  
bey Chr. Fr. Müller. 1809. pag. 331 — 337.

In horto Carlsruhensi adhuc hospitantur: Ca-  
lycantus fertilis. Walter. s. C. glaucus.  
Willd. Enum. pl. h. Berol. p. 559. C. ferax.  
Michaux. fl. Amer. 1. p. 305 et C. praecox,  
ex Japonia; introductae sub divo Carolo Ludovico  
magno Duci Badensi, post Carolum Friederic-  
cum, magno horti, post longum bellum, restauratori.



CLASSIS XIII.  
POLYANDRIA.  
MONOGYNIA.

---

pag. 474. CHELIDONIUM *Glaucium*.

790.\* CHELIDONIUM *corniculatum*  
pedunculis unifloris, foliis sessilibus pin-  
natifidis, caule hispido. *Linn. Sp. pl.* 1.  
*p.* 724.

*Glaucium phæniceum* caule hispido, foliis  
caulinis pinnatifidis incisis, siliqua setosa.  
*Smith. Fl. Brit.* 2. *p.* 564.

*Glaucium phæniceum* caule hispido, sili-  
quis cornutis, erectis. *Crantz Austr.*  
*p.* 141.

*Papaver corniculatum phæniceum hirsutum.*  
*Bauh. pin.* 171.

*Papaver corniculatum* II. *Tabernæmont. p.*  
*967. Icon.*

*Icon. Curt. Fl. Lond. tab.* 32. *Sow. Engl.*  
*Bot. tab.* 1433. (sub *Glaucio phæniceo*.)

*Germ. Rothblühendes Schœllkraut. Rother*  
*gehörnter Mohn.*

*Gall. Pavot rouge cornu.*

*Hab.* In sabulosis aridis apricis circa *Ecken-*  
*stein et Schwetzingen* rarius, ubi eam vidi  
*Ann.* 1817. In Palatinatu transrhenano  
in

in arvis sabulosis sterilibus apricis *t. D. Kochio.*

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Augusto, Septembri matura. ☉

*Radix* fusiformi-cylindrica. *Caulis* pedalis et altior, teres, simpliciusculus, piloso-hispidus. *Folia* alterna; *radicalia* lyrato-pinnatifida; *caulina* pinnatifida, amplexicaulia, inciso-dentata, glauca, hispida. *Corollæ* petala quatuor, phœnicea, fugacia, mediocria. *Siliqua* praelonga, corniculata, setis adpressis hispida. *Semina* excavato-punctata.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

*Chelidonium hybridum* pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule laevi siliquis trivalvibus. Linn Sp. pl. 1. p. 724. seu *Gracium violaceum*. Smith. Fl. Brit. 2. p. 564. Sow. Engl. Bot. tab. 201. frustra hucusque in terris badensibus quaesivi.

pag. 481. post *NYMPHÆAM luteam*.

796. \* *NYMPHÆA minima* foliis cordatis integerrimis petiolis basi semiterebibus, superne ancipitibus, calyce petalis majore pentaphyllo, stigmate decedentato. (*mihi*)

*N. pumila* foliis oblongo-cordatis integerrimis punctatis subpubescentibus, calyce pentaphyllo petalis majore, stigmate lobato decemradiato. *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 151.

*N. lutea* β. *pumila*. *Timm. in Mag. für Nat. Meklenb.* 3. p. 256.

*N. lutea*  $\beta$ . *minima*. Willd. Linn. Sp. pl.  
2. p. 1151.

*Nuphar minima*. Sowerb. Engl. Bot.

*Icon.* Sow. l. c. tab. 2292.

*Germ.* Kleine gelbe Seeblumen. Kleine gelbe  
Seenymphe.

*Gall.* *Nenuphar jaune petite*.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi retro *Neustadt im Didisee* ubi vidi 1814. In monte *Feldberg im See* copiose t. D. *Spennero et A. Braunio*. In Alsatiæ monte *Ballon im schwarzen-See* legit nuper acutissimus D. *Griesselich*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 4

Differt ab affini *N. lutea*: *Petiolis* basi semiteretibus, superne ancipitibus. *Foliis* minoribus. *Floribus* multo semper minoribus, magnitudine *Trollii europæi*. *Stigmate* decemradiato, margine decemdentato, multo minori.

pag. 483. *TILIA europæa*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 610.

pag. 485. *TILIA parviflora*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 1705.

pag. 487. *TILIA alba*.

*T. alba* foliis cordatis basi inæqualibus subtus albo-tomentosis, floribus nectario instructis. Willd. Enum. pl. H. Berol. p. 566.

*T. hungarica.* *Waldst. et Kit. Fl. Hung.*

*T. rotundifolia.* *Venten. in mem. de l'Institut. sc. phys. 4. p. 12.*

*Icon.* *Jacqu. Hort. Schænbr. 3. tab. 283.*  
*Vent. l. c. tab. 4. Pfleger arb. et frut.*

*Hab.* In Hungaria, Vollinia, Gallicia (non in America.)

pag. 488. *CISTUS Helianthemum.*

Varietas floribus pulchre plenis. Legit  
*Alexander Braun* ad montem *Kaiser-  
stuhl* Brisgoviae prope *Hohenlimburg.*  
*Ann. 1819.*

pag. 489. post *CISTUM Helianthemum.*

800.\* *CISTUS piliferus* suffruticosus,  
stipulatus, erectiusculus incanus, foliis li-  
nearibus, subtus bisulcatis incanis, caly-  
cibus costatis hispidis, stipulis apice longe  
piliferis. *mihi.*

*Germ.* *Haartragendes Cistenröslein.*

*Gall.* *Ciste poilu.*

*Hab.* In collibus aridis asperis circa *Wert-  
heim* ad *Mœnum* et *Würtzburg*, ubi cum  
amicissimo *D. Wibelio* vidi 1813.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ‡

*Suffrutex.* *Radix* descendens, ramosa,  
fibrosa, tenuis, lignosa, extus nigra. *Cauliculi*  
basi decumbentes, erecti, tenues, teretes, vil-  
loso-incani, digitales, semipedales. *Folia* op-  
posita, subpetiolata, linearia, obtusa, subtus bi-  
sulca, incana, villosa-pilosula, 5-7 lineas longa,



semilineam lata, patentia, firma. *Stipulae* quaternae, lineari-lanceolatae, incanae, apice longe piliferae, erectae. *Flores* terminales, laxe racemosi. *Racemi* subtriflori. *Calycina* foliola ovata, venoso-costata, hispido-villosula, membranacea. *Corolla* petala 5, subrotunda, obtusa, subemarginata, patentia, lutea, calyce longiora, 3-4 lineas longa. *Stamina* numerosa, flava.

Ad raras omnino et novas Florae cives pertinet.

Differt a *C. piloso* Linn. Statura multo minori. *Foliis* minoribus angustioribus. *Stipulis* apice longe piliferis. *Racemis* laxioribus, non multifloris sed trifloris. *Calycibus* non laevibus. *Corollis* non albis, sed semper luteis.

Plantulam frustra apud Floristas hucusque quaevisi. In Helvetia, Gallia, et Hispania eam non vidi.

pag. 491. post *CISTUM Oelandicum*.

801. \* *CISTUS Fumana* suffruticosus, procumbens exstipulatus, foliis alternis linearibus margine scabris, pedunculis unifloris. Linn. *Sp. pl.* 1. p. 740. — Roth *Fl. Germ.* 2. p. 584. — Hoffm. *Fl. Germ.* p. 185.

*Cistus* foliis duris, linearibus, confertis, petiolis unifloris, calycibus glabris. Hall. *Hist. n.* 1032.

*Chamaecistus* ericae folio, luteus humilior. Bauh. *pin.* 466.

*Chamaecistus* 6 Clus. *hist.* 1. p. 75. *Icon.*

*Helianthemum tenuifolium* glabrum luteo flore,

per humum sparsum. *Joh. Bauh. hist. 2: pag. 18. Icon.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 252.*

*Germ. Dünnes Cistenröslein.*

*Gall. Ciste Fumane.*

*Hab.* In Palatinatu Badensi prope *Schwetzingen an der Eisgrube* in sabulosis apricis sterilibus, ubi eam vidi 1808.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura.  $\frac{1}{2}$

*Fruticulus* subprocumbens. *Caulis* digitalis, palmaris, ramosus. *Rami* teretes, graciles, patentes, glabriusculi, læte virides, foliosi. *Folia* sparsa, alterna, erecto-patentia, lineari-subulata, semiunciam longa, lineam dimidiam vix lata, glabriuscula, glauco viridia, superiora tenuiora, et breviora, infima brevissima, fasciculata. *Flores* ex axillis foliorum superiorum, solitarii, pedunculati; *Pedunculi* solitarii uniflori, 4-5 lineas longi, filiformes, nutantes. *Calycina* foliola duo exteriora minuta, obtusa, tria interiora sulcata, ovata, acuta, conniventia. *Corolla* petala quinque, ovali-subrotunda, fugacia, lutea, patentia, calyce sublongiora. *Capsula* subrotunda, trilocularis, trivalvis, calyce tecta.

*Nota.* Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

In variis hispaniae regionibus *Cistum*, quem in horto Madritensi sub *C. Fumanae* varietate erecta, vidi, qui differt a nostrate. *Caulibus* erectis pedalibus et longioribus, tenuioribus, ramosis, foliis ex axillis, imbricatis, confertis, lineari-setaceis, glauco-viridibus, brevioribus. *Corollis* multo minoribus. Speciem hanc omni jure separavit et sub *C. ericoide*. *Cl. Cavanilles in Icon.*

2. p. 56. tab. 172. evulgavit. Cl. Desfontaines sub varietate A. *Cisti Fumanae* descripsit in Flor. Atlant. 1. p. 414. tab. 105.

802.\* *CISTUS vinealis* suffruticosus, procumbens exstipulatus, foliis petiolatis oblongis obtusis, subtus incano tomentosis, floribus racemosis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 2. p. 1193. *Sprengel. Fl. Halens.*

*C. canus. Jacqu. Fl. Austr.*

*C. marifolius. Sow. Engl. Bot. Vol. VI.*

*Cistus* caulibus duris procumbentibus, foliis ellipticis hirsutis, inferne tomentosis, petiolis confertis unifloris, calycibus tomentosis. *Hall. Hist. n.* 1035.

*Helianthemum alpinum*, folio *Pilosellæ* minoris *Fuchsii*. *Raj. Syn.* 342.

*Helianthemum serpylli* folio incano, flore minore luteo inodoro. *Dill. Hort. Eltham.* 1. tab. 145. fig. 173.

*Icon. Sprengel. l. c. tab. 5. (optima.) Jacqu. l. c. tab. 277. (bona.) Sow. l. c. tab. 396.*

*Germ. Weinbergs - Cistenröslein.*

*Gall. Ciste des vignes.*

*Hab.* In collibus calcareis, calcareo-argillaceis asperis apricis, prope *Boxberg, Märgentheim, Sindolsheim* frequens, ubi eam vidi *Ann.* 1817.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. *Suffrutex.*

*Radix* lignosa, dura, ramosa, fibrosa, extus fusco - nigricans. *Caules* ex radice plures, decumbentes, suffruticosi, ramosi, teretes, ciliato-villosi, canescentes. *Rami* erecti, digitales, palmares, et sublongiores. *Folia* opposita, subpetiolata, oblonga, obtusa, interdum acutiuscula, superne et præsertim ad marginem pilosula, subtus incano-tomentosa, semiunciam ad septem lineas longa, 1-2 lineas lata. *Flores* terminales, umbellato-racemosi. *Racemi* 2-3, rarius 4 flori. *Calyx* triphyllus, albide pilosus. *Corollæ Petala* ovali-subrotunda, integra, aurea, 2 lineas vix longa.

**Nota.** Apud Linnaeum sine dubio sub *C. marifolio* militabat. *Cistus marifolius* Cavan. Icon. 2. p. 34. tab. 147. quem in Castilia vidi, differt a nostra planta: Caulibus divaricatis, foliis duplo latioribus, ovatis, acutis, nunquam obtusis, racemis semper 7-9 floris.

## POLYANDRIA DIGYNIA:

pag. 491. *PÆONIA officinalis*.

**Obs.** *PÆONIAE Radices* pro dolor saepe in pharmacis non rite siccatas, mundatas et asservatas, mucore destructas, removi.

*Paeonia Moutan*. Sims. bot. Magaz. t. 1154. seu *P. arborea*, *P. suffruticosa*. Andr. bot. rep. tab. 373. t. 448. planta pulcherrima pretiosissima e China et Japonia in Europam introducta 1789 per Jos. Banks, sub divo Carolo Ludovico in Hortum Carlsruhensem Ann. 1811 introducta est.



## POLYANDRIA TRIGYNIA.

pag. 499. post *ACONITUM Napellus*.

**806. \*** *ACONITUM neomontanum*  
 cuculli calcare adunco obtuso, labio lanceolato revoluta bifido, galca convexa, foliis nitidis digitato-quinquepartitis, laciniiis lato-lanceolatis, brevissime dentatis, pedunculis glabris. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1236. Kœlle Aconit. 16.*

*A. neomontanum* caule elongato, spica racemoso-ramosa, galca humili breviter rostrata, foliis palmato-quinquepartitis, segmentis profunde incisissimis latioribus. *Hoffm. Fl. Germ. 187.*

*A. Napellus. Jacqu. Fl. Austr. 4. p. 42.*

*Aconitum Lycoctonum V. Neubergense. Clus. hist. pl. 2. p. 96.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 381. Stærck. Libell. de Stramonio, Hyoscyamo et Aconito. Icon. (sub Aconito Napello.) Flor. Dan. tab. 1698.*

*Germ. Neubergischer Eisenhuth.*

*Gall. Aconit de Neuberg.*

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi in montosis sylvaticis calcareis prope *Donaueschingen am Hohenlupfen* et retro *Mæskirch* in montosis præruptis sylvaticis calcareis *am Donauthale* ubi eam vidi 1812. In ditioe Basileensi in monte *Vogelberg*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri matura. 24

Planta speciosa. *Radix* fusiformis fibrosa, fusca. *Caulis* 4-5-9 pedalis, firmus, erectus, subangulatus, simpliciusculus, laxe foliosus. *Folia* alterna, longe petiolata, ampla, superne saturate viridia, subtus pallida, utrinque nuda, nitentia, profunde palmato-quinquepartita, segmentis latescentibus, profunde inciso-laciniatis: laciniis lato-lanceolatis, dentatis: dentibus brevioribus, acutis, latiusculis. *Flores* terminales, laxe racemoso-ramosi. *Pedunculi* uniflori. *Corollæ* saturate cœruleo-violaceæ. *Galea* fornicata, humilis, antrorsum breviter rostrata.

**Nota.** Amat aspera prærupta sylvatica montosa calcarea. Omnino pulcherrima speciosa. In horto botanico culta, 9-12 pedalis, constans.

*Pharm. ACONITI s. NAPELLI Herba.*

806. \* \* **ACONITUM** *Cammarum*  
 cuculli calcare adunco obtuso, labio lanceolato recto acute emarginato, galea conica elongata, foliis opacis quinquepartitis, laciniis oblongo-cuneiformibus trifidis dentatis. *Willd. Linn. Sp. pl. p. 1255.*

**A.** *Cammarum* floribus subpentagynis, foliorum laciniis cuneiformibus incisissimis acutis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 751. Kælle Aconit. 17. Jacqu. Fl. Austr. 5. p. 11. Hoffm. Fl. Germ. 188.*

**A.** *paniculatum.* *Lamarck. Encycl. 1. p. 33. Decand. Fl. Franc. 4. p. 918.*

*Aconitum* caule ramoso paniculato, petiolis multifloris, cassidis mucrone longo. *Hall. Helv. n. 1198.*

*Aconitum cœruleo-purpureum* flore maximo  
s. *Napellus* 4. *Bauh. Pin.* 185.

*Aconitum Lycoctonum* IX. *Judenbergense.*  
*Clus. hist.* 2. p. 97.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 424.

*Germ.* *Langhelmiger Eisenhuth.*

*Gall.* *Aconit paniculé.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia,  
in agro Abbatiscellensi retro *dem Weisbad*  
in asperis calcareis *am Gamor et Sentis*  
ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septem-  
bri matura. 4

*Radix* fusiformis, fibrosa. *Caulis* 3-4 pe-  
dalis quandoque altior, erectus, teretiusculus,  
ramosus. *Rami* alterni, remotiusculi, patenti-  
erecti. *Folia* alterna, inferiora petiolata, ramea  
subsessilia, ampla, supra saturate viridia, inferne  
pallidiora, utrinque nuda, glabra, palmato-quin-  
quepartita, segmentis latescentibus profunde in-  
ciso-laciniatis: laciniis cuneiformibus, trifidis,  
dentatis. *Flores* caulem ramosque terminantes,  
laxe paniculato-racemosi. *Pedunculi* uniflori.  
*Corollæ* magnæ, violaceo-cœruleæ. *Galea* elon-  
gata, conica, antrorsum longe rostrata. *Capsulæ*  
3-5.

*Nota.* Variat omnino in alpinis et hortis pedicel-  
lis glabris et pubescentibus, capsulis 3-5 gla-  
bris perraro villosiusculis. Galea semper valde  
convexa, conica, antrorsum longe rostrata.  
Hic me iudice omnino pertinet *A. inter-*  
*medium*. *A. paniculatum*. *A. rostra-*  
*tum* et *A. hebegynum*. *Decand. regn.*

veg. syst. nat. I. p. 374 - 376. vix ac ne  
vix pro speciebus diversis habendae.

*Pharm. ACONITIS. NAPELLI Herba.*

Proprietates Aconiti Napelli Linn. habet.

**Obs.** Persaepe in officinis pharmaceuticis Herbam  
Napelli non bene lectam, siccata et asser-  
vatam, removi. In vasis vitreis bene obturatis  
servanda est.

## POLYANDRIA POLYGYNIA.

pag. 510. post ANEMONEM *Pulsatillam*.

**813.\* ANEMONE *pratensis*** pedunculo  
involucrato, petalis apice reflexis, foliis  
bipinnatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 760. —  
*Hoffm. Fl. Germ.* 190. — *Roth. Fl.*  
*Germ.* 2. p. 604.

**A.** caule involucrato, flore pendulo limbo re-  
flexo. *Crantz. Austr.* p. 123. n. 7.

*Pulsatilla* flore minore nigricante. *Bauh.*  
*Pin.* 177. *Helw. Puls.* 64. tab. 11.

*Pulsatilla* caerulea minor. *Tabernæmont.* p.  
81. (*Icon. bona.*)

**Icon.** *Oeder. Fl. Dan. tab.* 611. — *Schkuhr.*  
*bot. Handb. tab.* 150. *Stærck. Libell. tab.* 1.

**Germ.** Schwarze Küchenschelle.

**Gall.** *Pulsatille noire.*

**Hab.** In pascuis graminosis aridis montis *Bal-*  
*lon* Alsatiæ, teste acutissimo *Baumanno*.

**Flor.** Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 4



*Radix* subfusiformis, ramosa, fibrosa. *Caulis* e radice sæpius plures, digitales, et sublongiores, erecti, simplices, subnudi, striati, villosi. *Folia radicalia* petiolata, bipinnata, multifida: *foliolis* linearibus, angustis, acuminatis, villosis. *Involucrum* foliaceum, polyphyllum, villosum, ante anthesin florem involvens. sub anthesi flori approximatum, post florescentiam a fructu remotum. *Flos* terminalis, solitarius, semper nutans. *Corolla* petala 6-7 sordide ex violacco - nigricantia, apice reflexa.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

*Pharm. PULSATILLÆ nigricantis Herba. Extractum.*

Herba odoris vix ulli, saporis maxime acris, inhaerentis. Masticata fauces et linguam corrodit.

De efficacia in variis morbis, cumprimis oculorum, vide Ill. Stoerck Libell. de Pulsatilla nigricante.

In nostris regionibus Pulsatillae nigricanti substituunt Anemonem Pulsatillam minus acrem.

pag. 511. ANEMONE *alpina*.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen am Weisbad* in montibus *Gamor et Sentis*, ubi eam vidi 1818.

pag. 513. post ANEMONEM *hortensem*.

815. \* ANEMONE *coronaria* foliis radicalibus ternato-decompositis, involucro folioso. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 790.

A. *coronaria* foliis radicalibus ternato-de-

compositis, dentibus mucronatis, involu-  
cro folioso, seminibus caudatis. *Willd.*  
*Linn. Sp. pl. 2. p. 1276.*

*Anemone tenuifolia simplici flore. Bauh.*  
*pin. 174. n. 2 - 12.*

*Anemone chalcedonica. Tabernæmont. pag.*  
*75. Icon.*

ß. Floribus impletis.

*Germ. Anemone. Gartenanemone.*

*Gall. Anemone de Levante.*

*Hab.* In oriente. Hospitatur sub multis et ele-  
gantissimis varietatibus in hortis passim.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Junio, Julio ma-  
tura. 4

Vulgatissima in hortis, flore simplici semi-  
impleto et inpleto, rubro, violaceo, cœruleo,  
lutescente, luteo, flavo, viridi, purpureo. al-  
bido, varioque. Innumeris fere varietatibus ludit.

pag. 516. ANEMONE *nemorosa*.

**Nota.** Febres tertianæ vernaes sæpe curantur  
ex epispastico parato ex foliis seu floribus re-  
centibus hujus plantae contusis et brachio im-  
posito. Si debito tempore supra cutem rema-  
net, rubescit cutis et convexusculus fit lo-  
cus impositus ex affluentibus humoribus. Tum  
epispasticum removendum, alias adeo inflam-  
matur cutis, ut post diem unum alterumve  
in vesicam elevetur, unde ulcus manans, do-  
lorificum, tardissimæ sanationis. Sed si opem  
ferant hæc epispastica, debent ita dirigi, ut  
agant dum frigus febrile inceperit. *Berg.*  
*Mat. med. p. 492.*

pag. 516. post *ANEMONEM nemorosam*.

817.\* *ANEMONE narcissiflora* floribus umbellatis involucratis, foliis radicalibus palmatis inciso - dentatis. *Willd. Sp. pl. 2. p. 1283.*

*A. narcissiflora* floribus umbellatis, seminibus depresso ovalibus nudis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 763. — Hoffm. Fl. Germ. 191*

*A. seminibus nudis rotundis planis, foliis septifidis imbricatis hirsutis, floribus umbellatis. Hall. hist. n. 1155.*

*Ranunculus montanus hirsutus albus altior — et humilior narcissi flore. Bauh. pin. 182. 183.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 159.*

*Germ. Narcissenblütige Anemone.*

*Gall. Anemone à fleurs de Narcisse.*

*Hab. In Principatu Fürstenbergensi, prope Engen in valle Griechenthal in pratis colliculosis non infrequens, ubi eam legi 1807.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Septembri maturata. 24*

*Radix* ramosa, multiceps, nigra. *Folia* radicalia longe petiolata, ternata. *Foliola* incisa, profunde triloba, saturate viridia, dorso dilutiora, margine brevissime albide ciliata. *Caulis* palmaris, pedalis et altior, erectus, firmus, striato-angulatus, aphyllus, pilosulus, inferne sæpe ex viridi-fusco-rubellus, superne *Involucro* foliaceo tri- aut tetraphyllo, in lacinias lanceolatas acuminatas inciso, instructus. *Pedunculi* ter-

minales, in umbellam congesti, 3-5-9 et plures, erecti, striati, villosi, singuli uniflori, involucrum superantes. *Corollæ* petala 5-6-7, ovata, acutiuscula, plana, patentia, nivea, dorso stria purpurascente sæpe notata. *Antheræ* erectæ, flavæ. *Semina* obovata, compresso-plana, obtusa, mucronata, glabra, fuscescentia.

**Nota.** Pulchra omnino planta, in horto culta, constans.

pag. 518. *CLEMATIS Vitalba*. Linn.

β. *integrata* segmentis paucissimis dentatis integerrimisve. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* 1. p. 139.

C. *sylvestris latifolia* foliis non incis. *Tourn. Inst.* p. 293. *Mapp. Alsat.* p. 77.

C. *Flammula*. *Borkhausen Forstbotanik* p. 337. (omnino.)

*Clematis latifolia integra*. *Joh. Bauh. hist.* 2. p. 125.

*Clematis tertia*. *Camerar. Epit.* p. 697. *Icon.*

*Clematis* s. *Viorna vulgi Lobelii*. *Besl. Hort. Eyst. æst. ord.* 6. fol. 5. fig. 3.

*Vitis nigra*. *Fuchs. hist.* p. 97. *Icon.*

**Hab.** Promiscue in sylvis rhenanis nec non in aliis inter *Heidelberg*, *Weinheim*, *Benzheim*, *Auerbach*, *Eberbach* et alibi in sylva *Odenwald* et in sylva nigra, ubi sæpius dumeta arboresque longe lateque scandit. *Floret et Semina* ut *C. Vitalba* maturat.



Minime pro peculiari specie habenda est. Mere differre videtur a *C. Vitalba* cum qua *Linnaeus Hallerus* aliique combinaverunt. *Caulibus* crassioribus. (*Foliola* latiora ovata, cordata, sæpe integra, interdum incisa, crenataque.) *Panicula* laxiori, et breviori. *Corollæ et Semina* ut in *C. Vitalba*. *Stipulæ* in uno eodemque individuo, lineari-lanceolatæ et ovato-acuminatæ.

Minime cum *C. Flammula* confundenda, a qua differt: *Caulibus* ramisque multo crassioribus; *Foliis Foliolisque* semper multo majoribus. *Floribus* majoribus ex luteo-albidis, villosis non suave odoratis, albis,

pag. 519.

819.\* **CLEMATIS** *Viticella* foliis compositis decompositisque: foliolis ovatis integerrimis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 765.*

*C. Viticella* foliis compositis decompositisque, foliolis sublobatis integerrimis, petalis obovatis patentibus. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1288.*

*Clematis cœrulea* vel *purpurea repens*. *Bauh. pin. 300.*

*Clematis altera*. *Clus. hist. 1. p. 122. Icon. Camerar. Epit. 695.*

*Clematis peregrina cœrulea*. *Tabernæmont. l. c. p. 1271. Icon.*

*Icon. Pfleger. arb. et frut.*

*Germ. Italienische-Spanische-Waldrebe.*

*Gall. Clematite bleu,*

*Hab.*

**Hab.** In Italia, Hispania. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schwetzingen, Heidelberg, Rohrbach, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden, Lahr*, et alibi, ex quibus rarius in regiones adjacentes emigrat.

**Flor.** Julio, Augusto. *Semina* Septembri Octobri matura.  $\frac{1}{2}$

*Frutex* elegans cum primis tempore inflorescentiæ. Longe lateque cooperit muros, domunculasque hortenses. *Foliola* infima cordata, media triloba, biloba; floralia ovata. *Pedunculi* solitarii elongati, uniflori. *Flores* patentes, tetrapetali, rarius quandoque quinquepetali, cœruleo - purpurascentes. *Petala* decidua, obtusissima, subdeltoidea, lateribus longe tenuiora. Variat floribus simplicibus, semiimpletis et impletis.

Verum hortorum ornamentum. Qualitates præcedentis speciei habet.

Vix ullibi in Germania spontanea. Hyemes fortiores aegre fert. Pulcherrima individua in regno Valentino et Murciano numerosissimis floribus superbientia, vidi.

819. \*\* *CLEMATIS Flammula* foliis inferioribus pinnatis scandentibus laciniatis, summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 766.

C. *Flammula* caule scandente, foliis pinnatisectis, segmentis glabris integris trilobisque, orbiculatis ovalibus oblongis sublinearibusve, acutiusculis. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* 1. p. 154.

C. caule scandente, foliis pinnatis trilobatis. *Hall. helv. n.* 1143.

*C. foliis pinnatis: foliolis alternis, caulinis flexuosis scandentibus. Ger. Fl. Gallopr. p. 382.*

*Clematis s. Flammula scandens tenuifolia alba. Bauh. hist. 2. p. 127.*

*Clematis urens. I. II. Tabernæmont. pag. 1273. Icones.*

*Flammula. Dod. Pempt. 404. Icon.*

*Icon. Psleger arb. et frut.*

*Germ. Scharfe Waldrebe. Brennende Waldrebe. Wohlriechende Waldrebe.*

*Gall. Clematite odorante.*

*Hab. In Galliæ meridionalis (et Rhætiae?) sepibus. Hospitatur in hortis anglicis Carlsruhe, Schwetzingen, Heidelberg, Baden et alibi.*

*Flor. Augusto, Septembri. Semina Octobri, Novembri matura. h*

*Frutex elegans, scandens. Rami copiosi, tenues, tenaces. Folia inferiora pinnata, laciniata. Foliola ovali-oblonga, integra, subtrilobaque, glabra, summa simplicia lanceolata, quandoque ovali-lanceolata, integra; floralia angusta, parva, linearia, obtusa. Flores axillares, terminalesque, racemoso-paniculati, numerosi, albi, mediocres, fragrantés, suaveolentes. Petala lanceolata, obtusa, venulosa.*

Pulchra praesertim tempore inflorescentiae planta, in serum autumnum oculos oblectans. Flores apibus mel praebent.

Herba Clematidibus aliis Europaeanis mitior, sicca ab animalibus, aqua cocta ab hominibus ipsis

hinc inde innocue sumpta. Decand. l. c. Desfont. Arb. et Arbrisseaux. pag. 370.

Nota. Vix ullibi in Helvetia et in Germania spontanea est. Nostras hyemes aegre fert. Specimina spontanea in Gallia meridionali et in Hispania vidi. Individua ab amico in sylvaticis inter Weinheim et Darmstadt an der Bergstrafse lecta, sub C. Flammula mihi missa, ad varietatem  $\beta$ . C. Vitalbae pertinent.

819. \*\*\* *CLEMATIS erecta* foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. Linn. Sp. pl. 1. p. 767. Roth. Fl. Germ. 2. p. 596. Hoffm. Fl. Germ. p. 191.

Clematis caule erecto, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis. Hall. hist. n. 1144.

Flammula. Camerar. Epit. p. 698. Icon. (bona.)

Flammula recta. Bauh. pin. 300.

Flamma Jovis. Tabernæmont. p. 1274. Icon. (bona.)

Icon. Jacqu. Flor. Austr. tab. 291. Schkuhr. bot. Handb. tab. 151.

Germ. Aufrechtstehendes Brennkraut.

Gall. Clematite d'roite.

Hab. Prope Wertheim am Tännig in arenosis teste D. Wibelio.

Flor. Majo, Junio. Semina Septembri, Octobri matura. 2

Radix ramosa, fibrosa. Caules e radice plures, erecti, 2-3-4 pedales, teretes, striati,



glabri, superne ramosi. *Folia* opposita, petiolata, pinnata: *foliolis* oppositis, ovato-lanceolatis, acutis, integerrimis, supra glabris, læte viridibus, subtus nervoso-reticulatis. *Flores* terminales, umbellati. *Umbellæ* subfastigiatae. *Corollæ* 4-5 petalæ. *Petala* patentia, linearicuneiformia, obtusa, nervoso-venosa, alba.

*Pharm. FLAMMULÆ JOVIS Herba, Flores.*

Folia recentia masticata, fauces linguamque ro-  
dunt, et inflammant. Laudat ill. a Störck in li-  
bello de Flammula Jovis etc. folia externe in ul-  
ceribus sordidis, ichorosis, fungosis, cancrrosis, hy-  
persarcosi, carie ossium; interne in cephalaea, do-  
loribus ossium nocturnis, lue venerea, scabie, me-  
lancholia.

pag. 520. ante THALICTRUM *majus*.

820.\* THALICTRUM *foetidum* caule  
paniculato filiformi ramosissimo folioso.  
*Linn. Sp. pl.* 1. p. 768.

Thalictrum foliis patulis pubescentibus trilo-  
batis, floribus nutantibus, petalis subhir-  
sutis. *Hall. helv. n.* 1140.

Thalictrum minimum foetidissimum. *Bauh.*  
*Pin.* 337. *Prodr.* 147. *Joh. Bauh. hist.*  
3. p. 488. *Moris. hist.* 325. *Pluk. Alm.*  
337.

*Icon. Pluken. l. c. tab.* 65. *fig.* 4. *Moris.*  
*l. c. Sect. 9. tab.* 20. *fig.* 13.

*Germ. Stinkende Alpenraute.*

*Gall. Pigamon fœtide.*

*Hab.* In Brisgovix rupibus vallis Hællenthal,

nec non in vicina Principatus superioris helvetia, retro *dem Weisbad* in rupibus asperis calcareis *auf dem Kasten, Sentis et Gamor*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 4

*Caulis* digitalis, subpedalis, erectus teres, ramoso - paniculatus, glabriusculus, cinerascens viridis, foliosus. *Folia* alterna, petiolata, parva, patula, 3-5 lobata, cinereo - viridia, subpubescentia. *Petioles* marginati. *Panicula* terminalis. *Flores* subnutantes, albide - lutescentes. *Stamina* 18 - 20 - 21. Odor plantæ quammaxime foetidus, peculiaris.

pag. 520. *THALICTRUM majus*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 611.

*Hab.* In Principatu trans rhenum.

pag. 521. *THALICTRUM minus*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 11.

*Hab.* Porro in Brisgovia *am Kaiserstuhl* prope *Oberbergen et auf den Schellinger-Wiesen* frequens. Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut*, ubi eam post D. *Wibelium* vidi.

Variat in uno eodemque loco caule glauco et non glauco.

*Nota.* Hinc *Thalictrum saxatile*. Decand. Fl. Franc. 5. p. 533. caule polline destituto, vix pro peculiari specie habendum est.

pag. 522. *THALICTRUM angustifolium*. Linn.

*Thalictrum galioides*. (Nestler.) caule tereti

subsulcato - stricto, radice repente, panicula stricta, floribus nutantibus, foliorum segmentis linearibus angustissimis integerrimis margine revolutis, ultimo subsessili. *Decand. Regn. Veg. Syst. naturale Vol. I. p. 180.*

*Thalictrum angustifolium*  $\beta$ . *galioides*. *Decand. Flor. Franc. 4. p. 877.*

*Radix* repens.

**Nota.** Linnaeus omnino sub *Th. angustifolio* nostram plantam comprehendebat, ut optime ex definitione ejus et synonymis adjectis patet. Misi plantam Schrebero, qui eam pro vera Linnaei specie declaravit.

Planta in horto Carlsruhensi culta, constantissima.

*Thalictrum angustifolium* Jacqu. Hort. Vind. 3. tab. 43. differt a *T. angustifolio* Linn. Caule multo crassiori, non stricto. Foliis multoties majoribus. Foliolis multo latioribus. Panicula multo majori non stricta, sed ampla densa maxime multiflora.

822. \* *THALICTRUM Morisoni* radice fibrosa, caule sulcato erecto, panicula patenti - erecta, foliis bipinnatis, foliolis lineari-lanceolatis angustis integris, terminalibus lateralibusque nonnullis cuneiformi-lanceolatis profunde trifidis, rugulosis. *mihi.*

*Thalictrum* tertium. *Moris. hist pl. 3. p. 324. Species minor.*

*Germ. Morisons - Wiesenraute.*

*Gall. Pigamon de Mr. Morison.*

*Hab.* In ditione Basileensi in prato dumetoso humido prope *Arlesheim*, ubi vidi cum generoso *ab Andlau* 1810.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caulis* erectus, sulcatus, glaber, rubellus, fistulosus, crassitie calami mediocris, 3-4 pedalis, superne ramosus. *Rami* alterni oppositique, patenti-erecti, subflexuosi, tenues, paniculati, multiflori. *Folia* alterna, subsessilia, erecta, duplicato-pinnata. *Foliola* subsessilia, lineari-lanceolata, integra, terminalia lateraliaque nonnulla, cuneiformi-lanceolata, ad medium fere trifida, bifidaque, omnia angusta, unciam ad tredecim lineas longa, semilineam ad lineam lata, margine revoluta, venoso-rugosula, supra saturate viridia. *Stipulae* membranaceae, fuscae. *Flores* in panicula erecto-patenti, numerosi. *Corolla* petala quatuor, ovata, concava, obtusa, pallide lutea, staminibus breviora. *Stamina* 16-19-29, pallide lutea. *Germina* quinque ad decem. *Semina* subovata.

Affine *T. flavo* seu *nigricanti* *Jacqu.* a quo differt: *Caule* graciliori. *Foliolis* duplo triplove angustioribus, magis rugulosis. *Panicula* minus densa.

Sub *Th. angustifolio* *Jacquini* ex horto quodam botanico mihi missum in horto Carlsruhensi cultum, hucusque constantissimum. Longe differt a *Jacquini* planta: . *Caule* multo graciliori *Foliolis* non omnibus lineari-lanceolatis, angustioribus. Denominavi in *Morisoni* memoriam, qui primus, à *Th. flavo* *Linn.* distinxit: dum inquit l. c. p. 224. hujus datur minor species, foliis multo angusti-



oribus, pariter asperis rugosis trifidis et in multo minores mucrones desinentibus.

pag. 523. *THALICTRUM flavum.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 367.

*Hab.* Porro prope *Wertheim* ad ripas *Moeni* inter *Kreutzwertheim* et *Hasloch*, ubi eam post *D. Wibelium* vidi.

*Folia* bipinnata, rarius tripinnata.

pag. 526. *THALICTRUM aquilegifolium.*

*Hab.* Porro in Principatu Fürstenbergensi prope *Unadingen*. Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut* t. *D. Wibelio*.

pag. 532. *RANUNCULUS Flammula.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 387.

pag. 535. *RANUNCULUS Lingua.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 100.

pag. 537. post *RANUNCULUM Ficariam.*

832.\* *RANUNCULUS Thora* foliis reniformibus subtrilobis crenatis: caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbifloro. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 775. — *Hoffm. Fl. Germ.* p. 194.

*R.* foliis duris, venosis, reniformibus, rotunde crenatis, convexitate retusa acute serrata, *Hall. hist. n.* 1178.

*Aconitum pardalianches* 1. seu *Thora major.* *Bauh. Pin.* 184.

*Pithora valdensium.* *Lob. Ic.* 604. *Clus. hist.* 1. p. 259.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 442.

*Germ.* *Thora - Hahnenfuss.*

*Gall.* *Renoncule Thora.*

*Hab.* In Vogesorum monte *Rocheberg* teste *Buch.*

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 4

*Caulis* erectus, palmaris et longior, unifolius, bifoliusque, sæpe uniflorus, interdum biflorus. *Folia* firma, glauca. *Calyx* reflexus, flavide coloratus. *Corolla* quinquepetala, aurea, splendens.

Planta recens in omnibus partibus maxime acris et venenata,

*Nota.* *Ranunculus hybridus.* *Decand.* minime pro peculiari specie, sed pro levidensi varietate *R. Thora* habenda.

pag. 558. *RANUNCULUS auricomus.* *Linn.*

*Nota.* Varietas sic dicta apetalâ vix pro varietate declaranda est. Dum in *R. auricomus* Corollae petala primo vere sæpe nulla, quandoque minutissima hinc duo tria imperfecta, aetate adultiora, quinque perfecta! vid. *Fl. Bad.*

*Ranunculus cassubicus.* *Reichenb. pl. rar. Cent. II. t. 139.* et passim aliarum floristarum a *R. cassubico* *Linn.* diversus est et ad levidensem varietatem *R. auricomi* pertinet.

*R. cassubicus* *Linn.* differt a *R. auricomus* et ejus varietatibus: Foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis, (nec reni-

formibus crenatis incis) multo majoribus, crassioribus, coriaceis, caulinis digitatis linearibus dentatis, (nec digitatis linearibus integris.) Verum *R. cassubicum* Linn. ante oculos habeo, dum id scribo.

pag. 543. post *RANUNCULUM platanifolium*.

836.\* *RANUNCULUS montanus* foliis quinquelobis dentatis, caulino sessili digitato, laciniis lineari-lanceolatis integerrimis, caule unifloro. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 1321.

*R. nivalis* foliis radicalibus quinquepartitis orbiculatis multifidis, caulinis palmatis integris sessilibus, caule unifloro. *Vill. Fl. Delph.* 3. p. 742.

*R. uniflorus*, foliis glabris reniformibus semiquinquelobis. *Hall. hist. n.* 1168.

*R. minimus* alpinis luteus. *Bauh. hist.* 3. p. 861. (*fig. interior.*)

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 325. (*sub. R. nivali.*)

*Germ. Bergranunkel. Berghahnenfuss.*

*Gall. Renoncule des montaignes.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris, retro *St. Gallen*, prope *dem Weisbad*, *dem Gamor*, *Kasten et Sentis*, ubi eam vidi *Ann.* 1818. In *Iurasso t. Hallero.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. 4.

*Radix* horizontalis, longe fibrosa, sordide

albida. *Caulis* digitalis, palmaris, pedalis, erectus, solitarius, teres, subuniflorus. *Folia* radicalia petiolata, subhirsuta, quinqueloba, lobis superne latioribus incis. *Petiol*i ad basin vaginantes, membranacei, hirsuti. *Caulina* superiora alterna, sessilia, quinquepartita, lanceolata, suprema subtripartita. *Calyx* patens, foliola quinque, lanceolata, concava, corolla duplo fere breviora, intus flava, extus villosa. *Corollæ* petala quinque obovata, obtusa, subemarginata, lutea, ungue macula aurantiaca notata.

836.\*\* **RANUNCULUS** *alpestris* foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis, lobis trilobatis: caulino lanceolato integerrimo, caule subunifloro. *Linn. Sp. pl.* p. 778.

R. uniflorus, foliis lævibus semitrilobis, rotundo serratis, caulinis lingulatis. *Hall. hist. n.* 1167.

R. foliis subrotundis splendentibus, semitridis, petalis cordatis albis. *Crantz. Austr.* p. 115.

R. alpinus humilis albus folio subrotundo. *Sequ. Pl. Veron.* 1. p. 489. *tab.* 12. *fig.* 1.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr.* *tab.* 110.

*Germ.* *Alpen-Hahnenfuss.*

*Gall.* *Rénoncule des Alpes.*

*Hab.* In iisdem cum præcedenti locis passim frequens.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 24



Tota glabra. *Radix* oblonga, longe fibrosa, sordide albida. *Caulis* subsolitariis 2-3-5 uncialis, erectus, uniflorus, perraro subbiflorus, teretiusculus, sulcatus, folio ad medium instructus subsesili oblongo, obtuso, simplici, quandoque ternato. *Folia* radicalia petiolata, numerosa, profunde trilobata, subcordata, rotundata, lobis incisus obtusis, medio subtrifido. *Calycina* foliola ovata, obtusa, concava, pallide ex viridi-flavescentia, margine membranacea albida. *Corollæ* petala patentia, nivea, obcordata, ungue puncto fusco notata, calycem paulo superantia. *Semina* parva, ovato-subrotunda, glabra, mucronata.

### 836. \*\*\* RANUNCULUS *rutaefolius*

foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifolio unifloro, radice tuberosa.

*Linn. Sp. pl.* 1. p. 777. *Allion. Fl. Ped.* n. 1451.

R. caule unifloro, foliis imbricatis pinnatis, pinnis lobatis obtuse palmatis. *Hall. helv.* n. 1165.

R. rutaceo folio flore suave rubente. *Bauh. pin.* 181. *Moris. hist.* 2. p. 448. S. 4. tab. 31. fig. 54.

R. folio rutaceo. *Bauh. hist.* 3. p. 414.

*Icon. Wulfen in Jacqu. Coll.* 1. tab. 6. *Allion. l. c.* tab. 67. fig. 1.

*Germ. Rautenblättriger Hahnenfuss.*

*Gall. Renoncule à févilles de Rue.*

*Hab. In montibus Ballon et Rotabac Vogesi t. Buch.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 2

*Radix* fusiformis, recta, fibris funiformibus dependentibus munita, albida. *Caulis* spithameus et longior, erectus, simplex, teres, lævis, uniflorus. *Folia radicalia* petiolata, glabra, lacte ex viridi-subglauescentia, bipinnata, pinnis sessilibus, subcuneiformibus, multipartitis, imbricatis, lobis 3-5-fidis. *Caulina* 1-2 minora, radicalibus similia. *Flos* terminalis, majusculus, solitarius. *Calyx* quinquephyllus, deciduus, ex viridi-rubellus. *Corolla* subocto ad novempetala. *Petala* obovata, integra, striata, primo extus rubella, tum alba, in basi macula obovata, aurantiaco-rubra, nectarifera prædita.

Ad rarissimas omnino Florae cives pertinet.

836\*\*\*\* **RANUNCULUS** *asiaticus* foliis ternatis biternatisque: foliolis trifidis incis, caule inferne ramoso. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 777.

R. foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. *Linn. Hort. Cliff.* 250.

*Ranunculus grumosa* radice ramosus. *Bauh. pin.* 181.

*Ranunculus asiaticus polyclonos* s. *grumosa* radice. *Clus. hist.* 1. p. 241.

*Ranunculus Turcicus.* *Tabernæmont. p.* 110. *Icon.*

*Icon.* *Mill. Dict. tab.* 216.

*Germ. Garten-Ranunkel. Arunkel* (nostratibus.)

*Gall. Renoncule des Jardins.*

*Hab.* In Asia et Mauritania. Hospitatur sub multis varietatibus in hortis.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto matura. 2

Corolla subglobosa, plus minusve impleta, nivea, rubra, sanguinea, phoenicea, miniata, flava, lutea, varia.

pag. 543. *RANUNCULUS hirsutus.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1504.

*Hab.* Circa *Wertheim* in sylva *Spessart* inter *Rohrbrunn* et *Esselbach* in lacustribus t. *D. Wibelio* qui in *Fl. Wertheimiensi* sub *R. Sardoo* adduxit.

pag. 547. *RANUNCULUS polyanthemus.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1700.

Variat Foliorum segmentis angustioribus et latioribus.

*Nota.* *Ranunculus nemorosus.* Decand. regn. veg. syst. nat. I. p. 280. minime pro peculiari specie a *R. polyanthemo* Linn. diversa, habenda est.

pag. 549. *RANUNCULUS lanuginosus.*

*Hab.* Circa *Wertheim* in sylvis prope *Reicholzheim* et *Gronau* post *D. Wibelium* vidi.

pag. 552. *RANUNCULUS parviflorus.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 120.

pag. 553. *RANUNCULUS hederaceus.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2003.

pag. 554. *RANUNCULUS aquatilis*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 101.*

pag. 561. ante *HELLEBORUM nigrum*.

850.\* *HELLEBORUS hyemalis* flore folio insidente. *Linn. Sp. pl. 1. p. 783. Hall. hist. n. 1191. Hoffm. Fl. Germ. 1. p. 198.*

*Helleborus ranunculoides præcox tuberosus flore luteo. Moris. hist. 3. p. 459. S. 12. tab. 2. fig. 4.*

*Eranthis hyemalis. Decand. regn. veg. syst. nat.*

*Aconitum unifolium bulbosum. Bauh. pin. 185.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 202. Blackw. tab. 576.*

*Germ. Winter - Christwurz.*

*Gall. Hellebore hyemale.*

*Hab. In Alsatiæ Vogesis t. Buch.*

*Flor. Januario, Febuario. Semina Aprili, Majo matura. 24*

*Radix tuberosa multiceps. Caules ex radice numerosi, digitales, simplices, erecti, uniflori. Flores lutei, involucri insidentes.*

*Pharm. ACONITI hyemalis Radix.*

*Radix maxime drastica.*

---



CLASSIS XIV.  
DIDYNAMIA  
ANGIOSPERMA.

---

pag. 570. post ERINUM,

CCCI. \* LINNAEA. *Bacca* trilocularis sicca,  
*Cor.* campanulata. *Cal.* superus!

---

DIDYNAMIA  
GYMNOSPERMA.

---

pag. 579. TEUCRIUM *Scordium*. Linn.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* in prato sylvatico humido *am Auacker*. Circa *Bruchsal* et *Ubstadt* in pratis aquaticis. Circa *Wertheim* in pratis humidioribus prope *Heubach*. t. *D. Wibelio*.

*Nota.* Herba in umbra siccata, in vitris bene obturatis servanda. Dum spartam visitatoris officinarum pharmaceuticarum in magno Ducatu Badensi sub divo Carolo Friederico et Carolo Ludovico habui, saepissime Herbam *Scordii* non bene siccata, totam nigram, corruptam, inodoram, ut caput mortuum, ex officinis removi. Saepe *Scordii* loco, herbam *Scorodoniae* ex T. *Scorodonia* Linn. et herbam *Tertianariae*

ex

ex *Scutellaria galericulata* vidi et removi.

pag. 582. *TEUCRIUM montanum*. Linn.

*Hab.* Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut* ubi post *D. Wibelium* vidi.

pag. 588. *NEPETA Cataria*. Linn.

*Hab.* Circa *Wertheim* in ruderatis prope *Kreutzwertheim*, *Hafsloch* et alibi frequens, t. *D. Wibelio*.

pag. 592. *MENTHA sylvestris*. Linn.

*M. sylvestris* specieis villosis subcontinuis, foliis dentato-serratis subtus præcipue tomentosis bracteis subulatis. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 609.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 686. *Sole Menth. tab.* 1. (sub. *M. villosa prima*) et *tab.* 2. (sub *M. villosa secunda*.)

β. Foliis oblongis subcordatis æqualiter serratis, subtus tomentoso-canis.

*Mentha nemorosa*. Willd. *Enum.* p. 607.

*Hab.* β. Promiscue cum *M. sylvestri* prope *Durlach*, *Carlsruhe*, *Mühlburg* et alibi.

β. Neutiquam pro peculiari specie declaranda a *M. sylvestri* diversa, quæ sæpe uno eodemque loco, foliis lanceolatis, ellipticis, oblongis, ovato-oblongis et subcordato-oblongis, subtus plus minusque tomentosis, incanisque, inæqualiter et æqualiter serratis, differt.

*Mentha rotundifolia* *Sole Menth.* 9. *tab.* 4.

non ad *M. rotundifoliam* Linn. sed ad varietatem foliis ellipticis latis obtusis *M. sylvestris* Linn. pertinet. *Conf. Smith. l. c.*

pag. 595. *MENTHA viridis*. Linn.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2424. Sole Menth. tab. 5.*

pag. 596. *MENTHA rotundifolia*. Linn.

*M. rotundifolia* spicis subhirsutis interruptis, foliis ellipticis rugosis crenatis subtus villosis, bracteis lanceolatis. *Smith. l. c. p. 611.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 446. Sole l. c. tab. 3. (sub. M. sylvestri.)*

pag. 598. *MENTHA aquatica*. Linn.

**Nota.** Nostra semper verticillato-capitata, nunquam verticillata est, sic etiam *M. hirsuta*. Cl. Smith. in Fl. Brit. 2. p. 616. ad *Mentham hirsutam*, *M. aquaticam* Linn. sub varietate et *M. sativam* Linn. *M. Piperitam* Linn. et *Mentham aquaticam* verticillatam glabram rotundiore folio Dill. nec non *M. verticillatam* minimam, odore fragrantissimo citat. *Mentha sativa* Linn. non pro varietate *M. hirsutae* seu *aquaticae*, ob flores semper verticillatos, nunquam capitatos, habenda est. Sic omnes reliquae *Menthae* verticillatae, neutiquam pro varietatibus *M. hirsutae* et *aquaticae* habendae sunt.

pag. 600. post *MENTHAM aquaticam*.

874.\* *MENTHA citrata* foliis ovatis petiolatis serratis glabris, capitulis retusis, staminibus corolla brevioribus. *Ehrh. Beitr. 7. p. 150.*

*M. citrata* spicis capitatis obtusissimis, foliis ovatis petiolatis serratis glabris, pedunculis calycibusque glaberrimis. *Willd. Enum. pl. H Berol. p. 610. Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 79.*

*M. odorata* spicis capitatis obtusissimis, foliis petiolatis cordatis utrinque nudis, calyce pedicellisque undique glaberrimis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 615. Sole Menth. 21.*

*M. adpersa.* *Mœnch. Method. 379.*

*Mentha rotundifolia rubra, aurantii odore.*  
*Moris. hist. 3. p. 369. Sect. 11. tab. 6. fig. 3. glabra.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1026. Sole l. c. tab. 9.*

*Germ. Citronen-Münze. Bergamot-Münze.*

*Gall. Menthe Bergamotte.*

*Hab.* Cum *M. aquatica* circa *Dachsland et Gnielingen* in subaquosis udis passim rarius, nec non in Principatu superiori ad lacum Bodamicum, ubi eam vidi Ann. 1816.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 4

In omnibus sane partibus statura et habitu simillima *M. aquaticæ*, a qua mere differre videtur: Odore aurantiaco suavissimo, fere *Monnardæ didymæ*. Stamina corolla brevioribus.

*Nota.* Tetigi in Flora Badensi, sub varietate *M. aquaticæ*, a qua vix specie diversa est. Folia plus minusve cordato-ovata, saepe ovata, acutiuscula et obtusa, glabra, inaequaliter serrata, plana, patentia, saepe rubedine suffusa, ut in *M. aquatica* *Linnaei*.



pag. 600. *MENTHA hirsuta*. Linn.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 447. *Sole l. c. tab.* 10. 11. (*sub M. aquatica majori et minori.*)

pag. 601. post *MENTHAM hirsutam*. Linn.

875.\* *MENTHA piperita* floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. Linn. *Sp. pl.* 2. p. 805. Linn. *Mat. med. ed. Schreb.* 317.

*M. piperita* spicis obtusis inferne interruptis, foliis petiolatis subovatis glabriusculis, calyce basi glaberrimo. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 613.

α. Foliis ovato-lanceolatis, spicis elongatis. *Smith. l. c.*

*M. piperita* officinalis. *Sole Menth.* 15.

*M. aquatica nigricans*, fervido sapore. *Herb. Buddl.*

*M. piperitis*, herba. *Pharm. Lond. secundum Cl. Smith. l. c.*

Eales Pepper-mint seu *M. piperata acuta*. *Pet. H. Brit. tab.* 31. *fig.* 10.

β. Foliis ovatis, spicis abbreviatis, fere capitatis. *Smith. l. c.*

*M. piperita vulgaris*. *Sole Menth.* 19.

*M. spicis brevioribus et habitioribus foliis menthæ fuscae*, sapore fervido *Piperis*. *Raii. Syn. ed.* 2. 124. *ed.* 3. 234. *tab.* 10. *fig.* 2. *M. piperitis herba*, Anglis

secundum *Raiium*, *Schërardum* *Linnaëum* aliosque.

*M. fervida* nigricans, brevior folio et spica.  
*Herb. Scherard.*

*M. piperata* obtusa. *Petiv. Herb. Brit. tab.*  
*13. fig. 11.*

*Icon. α. Sow. Engl. Bot. tab. 687. Sole l.*  
*c. tab. 7. Knigge de Mentha Piperitide.*  
*Icon bona. β. Sole l. c. tab. 8.*

*Germ. Pfeffermünze.*

*Gall. Menthe poivrée.*

*Hab.* In Angliæ aquis. Colitur *α* et *β* copiose in hortis agrisque pharmacopæorum et passim aliorum.

*Flor.* Julio, Augusto, Septembri. *Semina*  
Septembri, Octobri matura. 4

*Radix* ramosa, fibrosa, repens. *Caulis* 1-2-2½ pedalis, erectus, tetragonus, geniculatus, subhirtus, superne ramosus. *Folia* opposita, omnia petiolata, ovata, acutiuscula, acute serrata, supra glabriuscula, subtus hirsutiora et pallidiora, in *α* subangustiora, acutiora, in *β* latiora, breviora. *Spicæ* terminales, solitariae, obtusiusculæ, inferne interruptæ, in *α* elongatæ, in *β* subcapitatæ, multo breviores. *Pedicelli* glabriusculi, vel superne subhirsuti. *Calyx* sulcatus, glanduloso-punctatus, basi glaberrimus, dentibus fusco-purpureis, ciliatis. *Corolla* violaceo-purpurea. *Stamina* corolla breviora, inclusa. *Stylus* filiformis, corolla longior, erectus.

Linnaeus sub *M. piperita*, minime varietatem *M. hirsutae* sed veram *M. piperitam*,

et quidem varietatem  $\beta$  ut ex allegato Raii synonymo patet, comprehendebat.

*Pharm. MENTHÆ PIPERITÆ Herba.*

Planta maxime fragrans, fervida, aromatica, in laevitate intestinorum etc. summo cum fructu propinaturae vid. Knigge l. c. camphorata, inter omnes Menthae species fortissima; masticata, linguam et fauces valde calefacit, subsequenti sensu frigidiusculo. Apua destillata subopalescens, fragrans, camphorata, calida. Oleum destillatum viride-lutescens sub aqua natans, odore forti Menthae piperitae, sapore acerrimo, fervidissimo. Secundum meas aliasque in permultis aegrotis institutas observationes, virtutes egregias discutientes, resolventes, incidentes, antisepticas, antispasmodicas, nervinas, stomachicas, roborantes et tonicas possidet. Hinc in spasticis affectibus, in morbis convulsivis, in hysteria, cardialgia, in febribus intermittentibus, cachexia, ad tumores frigidos discutiendos in indigestione a debilitate primarum viarum.

**Obs.** In pharmacopoeorum et aliorum passim hortis nec non in officinis pharmaceuticis sub *M. piperita* persaepe *M. viridem* Linn, cujus vero folia semper sessilia, odor et sapor multo imbecillior est, observavi.

Herba seu melius folia, bene siccata, in vasis probe obturatis, in pharmacopaeis servanda sunt.

Quoad odorem et saporem inter varietatem  $\alpha$  et  $\beta$  vix ulla differentia. Varietatem  $\alpha$  et  $\beta$  seu veram *M. piperitam* Linnaei in horto proprio, Tubingae, Ann. 1782 et sequ. abundanter coluit, meritissimus et in me amicissimus Dr. Gmelin, medicus, chemicus, pharmacopoeus et botanicus instructissimus, qui ex ea, magna in quantitate, Oleum fragrantissimum optimumque eliciebat.

pag. 601. *MENTHA sativa*. Linn.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 448.

γ. Caule altiore rubicundo floribus rubellis.  
(*M. sativa rubra*.)

*Mentha rubra* floribus verticillatis, foliis ovatis, caule erecto flexuoso, pedicellis calycibusque glaberrimis, dentibus hirsutis.  
*Smith. Fl. Brit.* 2. p. 520.

*Icon.* γ. Sow. *Engl. Bot. tab.* 1413. (*sub M. rubra*.) *Sole l. c. tab.* 24. (*sub M. sativa*.)

*Hab.* γ. In fossis aquaticis, ad stagna et paludes in rheni vicinia, circa *Dachsland*, *Gnielingen*, *Schreck*, *Linkenheim* et alibi passim cum *M. sativa*.

Linnaeus omnino ut facile ex Synonymis alatis patet, sub *M. sativa* *M. rubram* Smith. comprehendebat, a qua vix specie diversa est. Individua Caulibus saepe 3-4-5 pedalibus, decumbenti-erectis, totis rubris, foliisque rubris, lucidis, floribus rubellis et quandoque violaceo-coerulescentibus vidi post aquarum defluxum, in inundatis rhenanis. Menthae fere omnes post aquarum defluxum plus minusve rubentes, saepe ruberrimae.

Planta in hortum botanicum Carlsruhensem a me transplantata, altero jam anno, rubedinem exuebat. Odor fragrans, gratissimus ut in *M. sativa*.

pag. 602. *MENTHA gentilis*. Linn.

*M. gentilis* floribus verticillatis, foliis ovatis, caule ramosissimo patulo, calycibus basi pedicellisque glabris. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 621.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2118. *Sole Menth.* 41. *tab.* 18. (*sub M. rubra*.) *tab.* 20. (*sub*



*M. rivali* α.) et tab. 19. (sub. *M. variegata*) tab. 15. (sub. *M. gentili*.)

β. Foliis subangustioribus, lanceolatis.

*Mentha gracilis* floribus verticillatis, foliis lanceolatis subsessilibus, caule ramosissimo erecto, calycibus basi pedicellisque glaberrimis. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 622.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot.* tab. 449. (sub. *M. gentili gracili*.) *Sole l. c.* tab. 16. (sub *M. gracili*.) tab. 17. (sub *M. pratensi*.)

*Hab.* β. Promiscue cum *M. gentili* prope *Dachsland* in agris humidiusculis.

Vix ac ne vix specie diversa a *M. gentili* *Linn.* Folia sæpe in uno eodem individuo lanceolata, ovali-lanceolata, subangustiora et latiora. Odor saltem in nostris individuis omnibus suavissimus Basilici et Melissæ officinalis. *Stamina* sæpissime corolla breviora ut in *M. gentili*.

pag. 605. *MENTHA arvensis.* *Linn.*

*M. arvensis* floribus verticillatis, foliis ovatis, caule ramosissimo, calycibus campanulatis undique hirsutis pilis horizontalibus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 623.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot.* tab. 2119. (*M. arvensis*) et tab. 2120. (*M. agrestis*) *Sole l. c.* tab. 12 et tab. 13. (sub. *M. præcoci* et tab. 14. (sub *M. agresti*.)

pag. 608. *MENTHA Pulegium.* *Linn.*

*Icon.* *Flor. Dan.* tab. 1755. Sow. *Engl. Bot.* tab. 1026. *Sole l. c.* tab. 23.

pag. 612. *LAMIUM maculatum*. Linn.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2550. *Flor. Dan. tab.* 1649.

pag. 616. *LAMIUM amplexicaule*.

β. *Lamium intermedium* foliis inferioribus petiolatis orbiculato-cordatis inciso-crenatis, floralibus sessilibus amplexicaulibus reniformi-incisis. *Fries. novit. Fl. Suec.* 3.

*Icon.* *Flor. Dan. tab.* 1701.

*Hab.* β. in iisdem locis rarius. Retro *Mühlburg* in sabulosis *am Landgraben*.

*Nota.* Hic pertinet *L. incisum* Willd. *L. hybridum*. Vill. *Fl. Delph. Decand. Fl. Franc.* 3. p. 541.

pag. 618. *GALEOBDOLOON luteum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 787.

pag. 619. *GALEOPSIS Ladanum*. Linn.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 884. *Flor. Dan. tab.* 1757.

pag. 620. *GALEOPSIS villosa*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2553. *Flor. Dan. tab.* 1650. (*sub. ochroleuca.*)

pag. 623. *GALEOPSIS cannabina*.

*Galeopsis versicolor* caule hispido internodiis superne incrassatis, corolla calyce triplo longiore: galea ventricosa. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 630.

*Icon.* *Curtis. Fl. Lond.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 667.

pag. 637. *MARRUBIUM vulgare.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 410.*

*Hab.* Porro inter *Carlsruhe* et *Beiertheim* prope *Bulach*, in sterilibus sabulosis *am Hardthof*, prope *Schwetzingen*, *Waghäusel*, *Mannheim* et alibi passim abunde.

*Obs.* Saepe herbam apud nos vulgarissimam, conspurcatam, non rite lectam siccata et asservata, ex pharmacis removi. Herba mundata, in umbra siccata, in vasis bene obturatis servanda est. Saepe in officinis pharmaceuticis loco *Herbae Marrubii albi*, longe aliam: *Stachydem germanicam* nec non *Ballotam nigram* observavi et removi.

pag. 639. post *LEONURUM Cardiacam.*

903.\* *LEONURUS Marrubiastrum*  
foliis ovatis lanceolatisque serratis, calycibus sessilibus spinosis. *Linn. Sp. pl.*  
2. p. 817 *Hoffm. Fl. Germ.* 211.  
*Roth. Fl. Germ.* 2. p. 3.

*Sideritis* foliis ovatis lanceolatis inciso - serratis. *Linn. Hort. Cliff.* 215.

*Marrubiastrum* foliis *Cardiacæ*. *Bocc. Mus.*  
2. p. 120. t. 98.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 405.*

*Germ. Andornartiger Wolfstrapp.*

*Gall. Agripaume faux marrube.*

*Hab.* In *Alsatia* circa *Colmar* ad viam publicam prope *Ostheim* non infrequens, ubi nuper legit *D. Griesselich*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri matura. 24

*Radix* ramosa, fibrosa. *Caulis* pipedalis, erectus, tetragonus, simpliciusculus, quandoque ramosus, subtomentosus, incanus. *Folia* opposita, petiolata, inferiora ovata, superiora lanceolata, omnia serrata, pallide viridia, subtus subincana. *Flores* verticillati. *Verticilli*, densi, multiflori, sessiles. *Bractæ* sub singulo verticillo setacæ, rigida, pungentes. *Corollæ* calyce vix longiores, albidæ. *Galea* integra. *Anthæræ* nudiusculæ.

Ad rariores Floræ cives pertinet.

Flores apibus mel concedunt.

pag. 644. *THYMUS Serpyllum*. Deleatur *var. IV.* quæ omnino peculiarem speciem format.

906\* *THYMUS citriodorus* caule erectiusculo, floribus verticillatis, foliis ovatis planis basi subciliatis. *mihi*.

*Serpyllum* foliis citri odore. *Bauh. hist.* 3. p. 270. *Mapp. Fl. Als.* p. 286.

*Serpyllum* citratum. *Tabernæmont. Kräuterb.* p. 747. (*Icon bona*.)

*Germ. Citronen-Thymian. Citronen-Quendel.*

*Gall. Serpolet à l'odeur de Citrone.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* in sabulosis im *Hardtwald*, ad sylvarum marginalia versus dem *Kühlsfeld*. In collibus calcareo.-argillaceis siccissimis retro dem *Thurnberg*, et auf dem *St. Michelsberg* prope *Bruchsal*, et alibi passim. In *Alsatia* ad viarum margi-



nalìa excavata versus *St. Ottilien* pòst *Map-  
pum* cam vidi. In monte *Dornach* t. *Joh.  
Bauhino*.

*Flor.* Julio, Augusto, Septembri. *Seminà*  
Septembri, Octobri matura. ‡

Differt a *Thymo Serpyllo*. *Caulibus* ere-  
ctis, 1. 2-3 pedaliibus, ramisque erectis. *Fo-  
liis* majoribus ovatis acutiusculis, glabriusculis ad  
basin subciliatis. *Floribus* in verticillis semper  
remotioribus, albidis, albide-purpurascensibus.  
Odore longe alio, suavissimo, Citri.

Planta per plures annos in horto botanico ex  
seminibus culta, ibi constantissima, odoratissima, pro  
condimento omnino accepta. In collibus praeruptis  
et in montosis calcareis ad viarum latera excavata  
magis propaganda. Herba in vitris obturatis servanda,  
gratissima et efficax in balneis aromaticis.

pag. 648. post *THYMUM Acinos*.

908.\* *THYMUS alpinus* verticillis sex-  
floris, foliis obtusiusculis concavis sub-  
serratis. *Linn. Sp. pl. p. 826*.

*T. alpinus* verticillis sexfloris, foliis subrotun-  
dis obtusiusculis concavis serratis, corol-  
lis inflatis. *Willd. Sp. pl. 3. p. 142*.

*Clinopodium* foliis ovatis acutis serratis, flore  
folio majori. *Hall. hist. n. 238*.

*Clinopodium montanum*. *Bauh. pin. 225*.  
*Bocc. Mus. 2. p. 50. tab. 45*.

Acini pulchra species. *Rauh. hist. 3. p. 620*.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 97*.

*Germ. Alpen-Thymian*.

*Gall. Thyme des alpes.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* in montosis rupestribus calcareis ad *Werrewag*, nec non in vicina helvetia prope *Weisbad am Wildkirchlein* et alibi, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. ♀

*Radix* fibrosa, fusca. *Caules* ex radice plures, semipedales, sæpe ad basin ramosissimi, adscendentes, tetragoni, villosi, fusco-purpurascens. *Folia* opposita, petiolata, subovata, basi attenuata, acuta vel obtusa, margine subvillosa, supra medium obsolete denticulata. *Flores* verticillati, breviter pedunculati, infimi utrinque solitarii, bini, superiores terni, foliis sublongiores. *Bractæ* minutæ. *Calyx* incurvatus, striatus, villosus, superne fusco-purpurascens, intus villis albis obductus fauce conniventibus. *Corollæ* violacæ, tubo externe villosa calycem superante. *Semina* oblongo ovata.

*Obs.* Planta in horto culta constans.

pag. 652. *MELISSA Calamintha. Linn.*

*Thymus Calamintha* verticillis pedunculatis multifloris dichotomis, foliis subserratis, villis calycinis inclusis. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 641.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 1676.

*Nota.* Sæpe in officinis pharmaceuticis sub *Herba Calaminthæ*, herbam corruptam *Clinopodii vulgaris* vidi. Herba siccata, in vitris bene obturatis servanda, omnino aromatica, efficax.

pag. 653. *MELISSA Nepeta*. Linn.

*Thymus Nepeta* verticillis pedunculatis multifloris dichotomis folio longioribus, foliis serratis, villis calycinis prominentibus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 642.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1414.

**Nota.** Persaepe tota corrupta, inodora, in officinis pharmaceuticis est. Planta efficax, in vasis vitreis obturatis servanda.

pag. 659. post *SCUTELLARIAM galericulatam*.

915.\* *SCUTELLARIA hastifolia* foliis integerrimis inferioribus hastatis superioribus sagittatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 855. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 37. *Hoffm. Fl. Germ.* 1. p. 213. *Spreng. Fl. Hal.* p. 175.

*Scutellaria* folio non serrato. *Buxb. Fl. Hal.* p. 299. *Rupp. Fl. Jen.* p. 223. *Rivin. Monop. tab.* 77.

*Cassida hastifolia.* *Scop. Fl. Carn. ed.* 2. n. 742.

*Germ.* Spiesblättriges Helmkraut.

*Gall.* Scutellaire à fêvilles en Sponton.

*Hab.* Inter *Dachsland* et *Gnielingen* cum præcedenti passim rarius, nec non in palatinatu trans rhenum in pascuis aquosis inter *Weissenheim* et *Laubenheim* t. D. Kochio.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura, 24

Maxime affinis præcedenti specie, a qua differt Foliis integris hastatis.

Nota. Planta in horto botanico, per plures annos culta, mutationem non passa est.

pag. 660. SCUTELLARIA minor.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 524.

Hab. Porro in humidis turfosis montosis, prope Sasbachwalden versus dem Brigittenberg nec non auf den Hornisgründen am Mummelsee, ubi eam vidi 1825.

# DIDYNAMIA ANGIOSPERMA.

pag. 671. EUPHRASIA officinalis. Linn.

β. Foliis subrotundis, floribus in summa planta congestis flavis majoribus. Hall. helv. n. 305. β.

γ. Floribus minoribus albis, purpureis et lutescentibus. Hall. l. c. γ.

δ. Floribus minoribus, barba tota flava, galea purpurea aut flava. Hall. l. c.

E. minima. Schleich. Decand. Fl. Franc. 3. p. 373.

E. officinalis β. Lamarck. Encycl. 2. p. 400.

E. lutea alpina minima subrotundo folio nigricante. Boccon. Mus. di piant. p. 64. tab. 60.

E. Helveticorum parva luteis floribus. Scheuchz. It. alp. 1. p. 36.

Bartsia humilis. Lapeyr. Fl. Pyren. p. 344. (omnino.)



λ. Foliis angustioribus, profundius argute setaceo - dentatis. *Hall. l. c. δ.*

*E. tricuspidata. Allion. Flor. Pedemont. n. 214. (excl. Linnæi synonymo.)*

*E. tenuissime dissecto angusto folio. Boccone l. c. p. 54. tab. 60.*

*Hab. β. in subalpinis alpinisque pascuis humidis γ. in pascuis pratisque siccis et humidioribus passim δ. in pascuis subalpinis alpinisque montis Bælchen et Feldberg; in vicina helvetia retro dem Weisbad auf dem Gamor, Kasten et Sentis nec non in Jurasso cum varietate λ. ubi eas vidi 1814 et sequ. ☉*

**Nota.** Planta pro diverso loco natali demissiori, aquoso, sicco, montoso, subalpino et alpino maxime variabilis.

*Euphrasia alpina* caule humillimo foliis ovatis argute dentatis: supremis majoribus sublaciniatis, labii inferioris lobis emarginatis, (floribus majoribus totis purpureo - coeruleis.) *Lamarck. Encycl. 2. p. 400. Illustrat. tab. 618. fig. 2.* minime pro peculiari specie ab *E. officinali* diversa habenda est. *Euphrasia Salisburgensis* foliis lanceolatis setaceo - dentatis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. *Willd. Sp. pl. 3. p. 193. Hoppé Taschenb. 1794. p. 190.* ad levidensem omnino varietatem *E. officinalis* pertinet, quae in subalpinis aliisque locis foliis oppositis et subalternis, subrotundis, ovatis, ovato - lanceolatis et lanceolatis, semper acute dentatis: dentibus plus minusve argutis aristatis obvenit. *E. alpina* et *E. Salisburgensis* a *Cl. Decandolle, Lapeyrouse* aliisque passim botanicis, tanquam synonyma allegata, sunt diversae varietates.

Obs.

Obs. Prostant omnino varietates inter E. officinalem, alpinam, Salisburgensem et varietatem β. γ. δ. λ. Hinc secundum botanices principia, non pro diversis speciebus habendae sunt.

Nullibi copiosiores varietates E. officinalis, quam in alpinis helveticis in Jurasso, alpihus Sentis, Gamor, Rigi, Pilato, Mont-Blanc nec non in pyrenaeis galliae et hispaniae vidi.

pag. 675. MELAMPYRUM *cristatum*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 41.*

pag. 676. MELAMPYRUM *arvense*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 58.*

pag. 679. MELAMPYRUM *pratense*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 113.*

pag. 680. MELAMPYRUM *sylvaticum*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 804.*

pag. 687. post. PEDICULAREM *sylvaticam*.

935.\* PEDICULARIS *foliosa* caule simplici, foliis caulinis profunde pinnatifidis, pinnis lanceolatis acuminatis pinnatifidis, dentatis, spica foliosa, calycibus quinque-dentatis, dente superiore maximo, corollae galea obtusissima. *Willd. Sp. pl. 3. p. 211.*

P. *foliosa* caule simplici, spica foliosa, corollis galea obtusissima integra, calycibus quinque-dentatis. *Linn. Mant. 86. — Gouan. Illustr. 37. — Allion. Fl. Ped. n. 230.*

P. spica foliosa. *Hall. hist. n. 317. tab. 9. fig. 3.*

*P. filicis folio alpina major.* *Bauh. pin.* 163.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 139.

*Germ. Blättervolles Läusekraut.*

*Gall. Pediculaire à épi févillé.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro  
*St. Gallen*, prope *dem Weisbad* in pas-  
cuis subalpinis alpinisque *auf dem Kasten*,  
*Gamor et Sentis*, ubi eam vidi Ann. 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri ma-  
tura. 24

*Radix* teres, subramosa, fibrosa, pallide  
fusca. *Caulis* erectus, simplex, pedalis et altior,  
teres, glabriusculus. *Folia* radicalia longe pe-  
tiolata, subbina, subpipinnata, *pinnulis* basi con-  
fluentibus. *Caulina* alterna. *Floralia* pinnata,  
*summa* pinnatifida longiora. *Spica* speciosa,  
densa. *Calyx* pentagonus, ventricosus, angulis  
hirsutis. *Corolla* uncialis, ochroleuca. *Galea*  
oblonga, obtusa, integra, extus hirsuta. *Fila-*  
*menta* superne hirsuta. *Semina* angulata.

935. \*\* *PEDICULARIS verticillata*  
caule simplici, foliis caulinis pinnatifidis  
quaternis, pinnis oblongis obtusis denta-  
tis, spica capitata, calycibus hirsutis quin-  
quedentatis, corollæ galea obtusissima.  
*Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 214.

*p. verticillata* caule simplici, foliis quater-  
nis. *Sp. pl.* p. 846.

*P.* foliis pinnatis quaternis, floribus spicatis.  
*Hall. hist. n.* 318. *tab.* 9. *fig.* 1.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 206.

*Germ.* Vierblättriges Läusekraut.

*Gall.* Pediculaire verticillé.

*Hab.* In iisdem cum præcedenti regionibus in pascuis humidis, ubi eam vidi 1818. 4

*Radix* longe fibrosa, fibræ subfusiformes. *Caules* ex radice plures, unciales, digitales, palmares et altiores, erecti, simplices, subangulati. *Folia* petiolata, pinnata, glabriuscula, *Radicalia* plura, *Caulina* quaterna, terna, opposita, suprema subsessilia. *Foliola* sessilia, alterna oppositave, distincta, vel confluentia, oblonga, vel subrotunda, parva, inæqualiter et acute serrata, viridia. *Spica* densa, constans floribus axillaribus brevissime pedunculatis, foliisque sessilibus simplicibus, dentatis, parvis. *Calyx* subrotundo-ovatus, inflatus, pellacidus, albidus, decemangulus, membranaceus, angulis virentibus pilisque violaceis longis præditus. *Corollæ* purpurascens. *Galea* erecta, compressa.

935.\*\*\* PEDICULARIS *flammea* caule simplici, foliis pinnatis, pinnis imbricatis ovatis obtusis duplicato-dentatis, calycibus quinquedentatis, corollæ galea obtusa. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 215.

P. *flammea* caule simplici, foliis pinnatis retro imbricatis. *Linn. Sp. pl.* p. 846. — *Fl. Lapp.* 244. *tab.* 4. *fig.* 2. *Jacqu. Collect.* 2. p. 70.

P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis dentatis, denticulis retroversis. *Hall. hist.* n. 315. *tab.* 8. *fig.* 3.

*Germ.* Feuerfarbenes Läusekraut.



*Gall. Pediculaire tachée de feu.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro dem *Weisbad* ad montem *Gamor et Sentis* passim, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 24

*Radix* subfusiformis, subramosa, longe fibrosa, albide-rubella. *Caulis* simplex, erectus, subtortuosus, 3-6 uncias longus, fistulosus, teres, striatus, glabriusculus, basi bulbosus et squamis auctus. *Folia* radicalia numerosa, petiolata, pinnata: *pinnis* alternis oppositisve, retroversis, incumbentibus, ovatis, obtusis, margine crenatis aut subserrulatis, læte viridia, dorso pallidiora. *Caulina* alterna, erecta, sensim breviora, radicalibus similia. *Spica* terminalis, erecta, ovato-oblonga, obtusa. *Flores* basi *bractea* lanceolato-oblonga, obtusa, crenata hirsuta, suffulti. *Calyx* tubulosus, oblongus, breviter quinquefidus, hirsutus, striis purpurascens pictus. *Corolla* speciosa, citrina aut flavo-fulva. *Tubus* albus, longitudine calycis, cylindricus, erectus. *Galea* obtusa, nigro-purpurascens.

pag. 693. ANTIRRHINUM *arvense*.

940.\* ANTIRRHINUM *alpinum* foliis quaternis lineari-lanceolatis glaucis, caule diffuso, floribus racemosis calcare recto. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 856.

A. caule procumbente rariter spicato, foliis verticillatis. *Hall. hist. n.* 338.

*Linaria cœrulea repens.* *Bauh. pin.* p. 213.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 58.

*Germ.* *Alpen-Löwenmaul.*

*Gall.* *Mousslier des alpes.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro dem *Weisbad* in alpinis inter saxa calcarea mobilia ad rivulos *am Gamor et Sentis*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matura. ♂

Planta florens pulcherrima! *Cauliculi* tenues, digitales, palmares, et longiores, ramosi, decumbentes. *Folia* remotiuscule verticillata, quaterna, interdum quina, ternaque, lineari-lanceolata, quandoque ovali-elliptica, glauca. *Flores* terminales, spicato-racemosi, pulcherrimi, speciosi, violacei, purpurei, rictu concolori, aut aureo. *Calcar* praelongum, incurvum.

*Variat:* *Galca* alba, lineis purpureis striata, apice miniata.

940.\*\* *ANTIRRHINUM genistaefolium* foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata, flexuosa. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 858. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 63.

A. foliis linearibus adscendentibus confertim spicatis, calcare flore longiori. *Hall. helv. n.* 337.

*Linaria genistæ folio* glauco flore luteo. *Herm. Parad. app.* 9. *Dill. hort. Elth.* 202.

*Linaria pannonica.* *Clus. hist.* 1. p. 321.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 244.

*Germ.* *Günsterblättriges Löwenmaul.*

*Gall. Mouflier à févilles de genet.*

*Hab.* In Vogesis, Alsatiæ montosis,

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri mat-  
tura. 4

*Caules* ex radice plures, erectiusculi, 3 - 4  
pedales, teretes, glabri, paniculato - racemosi.  
*Racemi* elongati, flexuosi, tenues. *Folia* al-  
terna, inferiora latiora, lanceolata, glabra, glau-  
co-viridia, ramea angustiora, (foliis *Genistæ*  
*tinctoriæ* subsimilia.) *Flores* numerosi, lutes-  
centes, magnitudine fere *A. Linariæ*.

Mappus plantam citat circa Argentoratum  
auf der Metzgerau et auf der Gansau, ubi  
frustra eam quaesivi.

Planta ex seminibus in horto culta, constantis-  
sima.

pag. 694. ANTIRRHINUM *Linaria* var. 6.  
*Peloria anectaria mihi.*

*Icon. Propria.*

Plantam loco citato deperditam, post tria de-  
cennia alio loco et quidem inter Wohlfartswei-  
her et Ettlingen ad viam publicam detexi. Pauca  
saltem ibi individua Floribus omnibus regularibus,  
quinquefidis, pentandris, nectariis corniculatis plane  
nullis. Recedit a *Peloria anectaria* in Flora de-  
picta: Corollarum tubo breviori, magis inflato. La-  
ciniis corollæ quinque, aequalibus, longioribus.

pag. 705. post DIGITALEM *purpuream*.

948.\* DIGITALIS *purpurascens* ca-  
lycinis foliolis lanceolatis inæqualibus,  
corollis glabris, galea obtuse emarginata,  
labii inferioris lacinia intermedia oblonga,

obtusissima, foliis subtus pubescentibus.

*Roth. Catalect. Bot. Fasc. 2. p. 62.*

*Germ. Blasspurpurfarbiger Fingerhut.*

*Gall. Digitale a fleurs pourprée.*

*Hab.* In Marggraviatu superiore ad montem *Blauen*, ubi eam legi 1810 nec non in Palatinatu transrhenano prope *Ramelsbach* in montosis lapidosis asperis, teste *D. Kochio*.

*Flor.* Majo, Junio, Julio. *Semina* Septembris matura. ♂

Distinguitur a *D. ambigua*: *Foliis* lanceolatis, supra glabris, nec utrinque pubescentibus. *Calycis Foliolis* lanceolatis, glabris, majoribus, nec lineari-lanceolatis utrinque pubescentibus. *Corollis* parum ventricosis, longe angustioribus, pallide purpurascentibus, extus glaberrimis, nec amplis, ventricosis, luteis, extus pubescentibus.

A *Digitali lutea* diversa: *Caule* subpubescente, nec glaberrimo. *Foliis* subtus pubescentibus, nec utrinque glabris. *Corollis* duplo majoribus, pallide purpurascentibus. *Labio Corollæ superiori* obtuse emarginato, nec acuto, bifido.

Forsan planta hybrida, ex *Digitali* purpurea patri, et *D. lutea*, matri orta.

pag. 706. post DIGITALEM *ambiguam*.

949.\* *DIGITALIS media* calycinis foliolis lanceolatis æqualibus, corollis læviter pubescentibus: galea emarginata-bi-



fida, foliis basi et margine pubescentibus.  
*Roth. Catalect. bot. Fasc. 2. p. 60.*

*Digitalis* flore minore subluteo, angustiore folio. *Joh. Bauh. hist. 2. p. 814.*

*Germ. Mittlerer Fingerhut.*

*Gall. Digitale intermediaire.*

*Hab.* In montosis calcareis in Principatu Fürstenbergensi retro *Mæskirch im Donauthal*, ubi eam legi 1814. nec non in Palatinatu transrhenano in montosis lapidosis prope *Niederthalben* teste *D. Kochio*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Augusto, Septembri matura. ♂

*Caulis* simplex, erectus, subangulosus, glaber. *Folia* semiamplexicaulia, *inferiora* lanceolata, *superiora* ovato-lanceolata, acuminata, serrata, utrinque glabra, margine et basi pubescentia. *Calycina foliola* lanceolata, angusta, acuta, æqualia, glabra, margine et apice pubescentia. *Corollæ* pallide sulphuræ, ventricosæ, subpubescentes, intus maculis pallidis ferrugineis, reticulatis pictæ. *Labium superius* obtuse bifidum: *inferioris lacineæ laterales* acutæ, recurviusculæ, *intermedia* late triangula, obtusiuscula, erecta.

Medium inter *D. ambiquam* et *luteam* tenet. Forsan planta hybrida ex *D. ambigua* patri, et *D. lutea*, matri, orta.

pag. 708. *LINDERNIA pyxidaria.*

*Hab.* Prope *Beiertheim* in locis excavatis aquosis frequens, ubi eam legi 1818 et *sequ.* prope *Kehl et Kork t. Hardtmanno.*

pag. 710. *ERINUS alpinus*.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro  
dem *Weisbad* ad montem *Gamor et Ka-*  
*sten*, ubi vidi 1818.

pag. 711. post *ERINUM*.

# CCXCVII. \* LINNAEA.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 1037.*

*Perianthium* duplex: *P. Fructus* inferum  
tetraphyllum: *foliolis duobus* oppositis, mini-  
mis, acutis; *reliquis duobus* ellipticis, concavis,  
erectis, hispidis, germen amplexantibus, conni-  
ventibus, persistentibus. *P. Floris* superum, mo-  
nophyllum, quinquepartitum, erectum, angu-  
stum, acutum, æquale. *Corolla* monopetala,  
campanulata, semiquinquesida, obtusa, subæqua-  
lis, calyce floris duplo major. *Germen* subro-  
tundum, inferum. *Stylus* filiformis, rectus,  
longitudine corollæ, declinatus. *Stigma* globo-  
sum. *Bacca* exsucca, ovata, trilocularis, tecta  
perianthio fructus hispido, glutinoso, decidua.  
*Semina* bina, subrotunda.

952. \* *LINNAEA borealis* floribus ge-  
minatis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 880. — Fl.*  
*Lapp. 250. tab. 12. fig. 4. Flor. Suec.*  
*tab. 1. — Hall. hist. n. 299. Hoffm.*  
*Fl. Germ. p. 221. — Roth. Fl. Germ.*  
*Valerianella nemorosa repens. Amm. Ruth.*  
*n. 27.*

*Serpillifolia. Buxb. act. 2. p. 346. tab. 21.*

Campanulata serpillifolia. *Bauh. Pin.* 95.  
*Prodr.* 35.

*Icon. Fl. Dan. tab.* 3. — *Sowerby. Engl. Bot. tab.* 433.

*Germ. Nordische Linnæa.*

*Gall. Linnæa boreale.*

*Hab.* In sylvis montosis umbrosis Alsatiæ in Vogesis.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matuta. ‡

*Fruticulus.* *Caules* repentes, prostrati, lignosi, teretes, tenues, subramosi, sesquipedales et longiores, juniores pilosuli. *Folia* opposita, petiolata, ovata, vel subrotunda, venosa, antice subcrenulata, læte viridia, supra pilosula, subtus nuda. *Rami* floriferi erecti, digitales, palmares, biflori. *Flores* nutantes, extus albi, intus subincarnati, villosuli.

Plantam omnino pulchellam, quam in Vogesis citat Ill. Decandolle in Fl. Franc. ubi hucusque frustra quaesivi.

*Pharm. LINNÆÆ Herba.*

Amariuscula, subadstringens, in Rheumatismo et Scabie præstans. *Linn. Mat. med. ed. Schreb.* p. 180.

pag. 718. *OROBANCHE major.*

*Orobanche major* bracteis solitariis, caule simplici, corolla inflata; labii laciniis acutis æqualibus, staminibus glabris, stylo pubescente. *Smith. Fl. Brit* 2. p. 669. — *Sutton. Tr. of Linn. Soc.* 4. p. 175.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 421.

pag. 715. post *OROBANCHEN majorem.*

954.\* *OROBANCHE elatior* bracteis solitariis, caule simplici, corolla tubulosa:

labii laciniis acutis æqualibus, staminibus pubescentibus, stylo glabro. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 669. Sutton. Tr. of Linn. Soc. 4. p. 178. tab. 17.*

*O. amethystea. Thuill. Flor. Paris. 317. Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 568.*

*Germ. Erhabene Sommerwurz.*

*Gall. Orobanche à fleurs couleur roses.*

*Hab. In agris et ad eorum margines passim, cumprimis ad radices Trifolii pratensis et Centaureæ Scabiosæ passim.*

*Flor. Julio, Augusto. Semina Septembri matuta. ☉*

Differt ab *O. majori*, cum qua h. *Linnaeus* sine dubio combinavit: *Scapo* elatiori. *Floribus* copiosioribus, densius congestis. *Corolla* minus ventricosa, pallide rosea. *Limbo* fimbriato, crispato. *Staminibus* intus ad medium usque pubescentibus, apice glabris. *Stylo* glaberrimo.

954.\*\* *OROBANCHE caryophyllacea*  
caule simplici, corolla inflata fimbriato-crispa, labio inferiore laciniis obtusis æqualibus, staminibus intus basi hirsutis. *Smith. Act. Soc. Linn. Lond. 4. p. 169.*

*O. vulgaris. Lamarck. Encycl. 4. p. 621.*

*O. caryophyllum olens. Bauh. Pin 87.*

*Germ. Nelkenduftende Sommerwurz.*

*Gall. Orobanché caryophyllacé.*

*Hab. In agris et collibus passim. In Brisgoviae monte Kaiserstuhl prope Rothweil ad montem Büchsenberg vidi Ann. 1816.*



*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. ☉

Maxime affinis *O. majori* qua combinavit b. *Linné*, *Pollichius* aliique, a qua differt: *Lacinii* tribus labii inferioris obtusis et magis fimbriatis ac crispis. *Germine* glabro. *Stylo* minus pubescente. *Filamentis* basi intus valde villosis, quæ glabra, in *O. majori*. *Stigmate* fusco vel purpureo, nec flavo ut in *O. majori*.

954. \*\*\* *OROBANCHE minor* bracteis solitariis, caule simplici, corolla tubulosa: labii lacinia media lobata, staminibus ciliatis, stylo glabro. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 670.* — *Sutton. Tr. of. Linn. Soc. 4. p. 179.*

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab. 422.*

*Germ.* *Kleine Sommerwurz.*

*Gall.* *Orobanche mineur.*

*Hab.* In agris siccis arenoso - argillaceis cum primis ad radices *Trifolii pratensis* passim.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. ☉

Differt a præcedentibus. *Scapo* breviori, magis manifeste flexuoso. *Floribus* paucioribus, pallide luteolis. *Corollis* non ventricosis, labio superiore subcrenato, inferiore undulato, trifido, lacinia media majori, sæpe triloba. *Staminibus* ciliatis. *Stylo* glabro.

*Variat.* *Scapo* floribusque piloso - viscosis: *O. epithymum.* *Decand. Fl. Franc. n. 2456.*

---

SUPPLEMENTUM  
AD  
FLORAM BADENSEM  
ALSATICAM ET CONFINIUM REGIONUM  
CIS ET TRANSRHENANAM.

Tom. III.

---

CLASSIS XV.  
TETRADYNAMIA  
SILICULOSA.

---

pag. 3. post ISATIN.

CCCV.\* SUBULARIA. *Silicul.* valvulis semio-  
vatis. *Stylus* brevior silicula.

pag. 3. post ALYSSUM.

CCCX.\* PELTARIA. *Silicul.* orbiculata com-  
presso-plana, non dehiscens.

pag. 5. MYAGRUM *rugorum*.

*Cakile rugosa* articulo superiore subgloboso rugoso stylo brevior, foliis obtusis dentatis, radicalibus sublyratis. *Ait Hort. Kew. ed. 2. Vol. 4. p. 71.*

*Rapistrum rugosum. Allion. Fl. Pedem. 1. p. 257. Decand. regn. veg. Syst. nat. II. p. 432.*

*Icon. Allion. l. c. tab. 78. Schkuhr. Bot. Handb. tab. 178.*

pag. 7. MYAGRUM *Bauhini. (mihi.)*

*Camelina dentata* siliculis subgloboso-pyriformibus 4 costatis stylo longiusculo superatis, foliis repando-dentatis. *Decand. Regn. Veget. Syst. nat. II. p. 516.*

pag. 9. MYAGRUM *sativum. Linn.*

*Camelina sativa. Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 515.*

pag. 10. MYAGRUM *paniculatum. Linn.*

*Neslia paniculata. Decand. l. c. p. 520. Desv. Journ. Bot. 3. p. 162.*

*Bunias paniculata. Decand. Fl. Franc. 4. p. 721.*

*Vogelia paniculata. Hornem. Hort. Hafn. 2. p. 594.*

pag. 11. MYAGRUM *saxatile. Linn.*

*Cochlearia saxatilis* siliculis lentiformibus laevibus, foliis radicalibus oblongis denta-

tis pilosis, caulinis lineari-oblongis. *Decand. l. c. p. 359. Lamark. Fl. Franc. 2. p. 471. Ait. Hort. Kew. Vol. IV. p. 90.*

**Hab.** Porro in rupibus calcareis præaltis Principatus superioris *am Donauthal* prope *Werrewag* et retro *Stetten am Kalten-Markt*, nec non in vicina helvetia retro *St. Gallen et dem Weisbad*, ubi vidi 1814 et sequ.

pag. 14. post *ISATIN tinctoriam*.

### CCC♦. \* SUBULARIA.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1073.*

*Calyx* tetraphyllus: foliolis ovatis concavis, patentiusculis, deciduis. *Corolla* tetrapetala, cruciformis. *Petala* obovata, integra, calyce paulo majora. *Stigma* obtusum. *Silicula* ovata, subcompressa, integra, stylo instructa brevissimo, bilocularis; *dissepimento* valvulis contrario; *valvulis* ovatis, concavis. *Semina* parva, pauca, subrotunda.

963.\* *SUBULARIA aquatica* foliis radicalibus subulatis glabris, scapo brevioribus.

*Subularia aquatica. Linn. Sp. pl. 2. p. 896. Huds. Fl. Angl. 277. Hoffm. Fl. Germ. p. 224. Roth. Fl. Germ. 2. p. 79. Smith. Fl. Brit. 2. p. 676.*

*Subularia erecta junci* foliis acutis mollibus. *Raj. Syn. 307.*



*Draba subularia*. Lamark. *ill. tab.* 556 *fig.* 3. *Decand. Fl. Franc. Suppl.* 595.

*Graminifolia aquatica*, *Thlaspeos capitulis*, septo medio siliculam dirimente. *Pluk. Phyt. tab.* 188. *fig.* 5.

*Gramen junceum Hibernicum Thlaspeos capitulis Scherardi*. *Moris. hist. Sect.* 8. *tab.* 10. *fig.* 29.

**Icon.** *Schkuhr. bot. Handb. tab.* 180. *Sow. Engl. Bot. tab.* 732. *Flor. Dan. tab.* 35. *Sturm. Deutschl. Fl.*

**Germ.** *Wasserpfrieme.*

**Gall.** *Subulaire d'eau.*

**Hab.** In ditione Basileensi in fundo Piscinæ *Kleinriechnn* prope Basileam *t. Lachenalio*. In lacubus in Alsatiæ Vogesis, *t. D. Nestlero*.

**Flor.** Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. ☉

*Radix* fibrosa, albida. *Folia* radicalia subulata, glabra, erectiuscula, apice subincurvata, semiunciam ad unciam longa, ex lutescente viridia. *Scapus* erectus, foliis duplo longior, racemosus. *Flores* pedicellati. *Corollæ* exiguæ, albæ. *Petala* conniventia. *Stylus* vix ullus. *Stigma* orbiculatum, obtusum. *Semina* fusca.

**Nota.** Ad rariores Florae cives pertinet. Sine dubio in lacubus montosis Badensibus adhuc reperitur.

Tota planta cum floribus aquae immersa.

pag. 15. *DRABA aizoides*. Linn.

β. *major* foliis brevioribus, silicula glabra.

*D. ciliaris*. *Decand. Fl. Franc.* 4. p. 697.

*γ. diffusa* caulibus elongatis diffusis.

*D. ciliaris.* Linn. Mant. 91. Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 425.

*D. caule diffuso ramoso folioso, foliis linearibus ciliatis.* Gerard. Fl. Gallop. 344. tab. 13. fig. 1.

*Hab.* β et γ passim in iisdem locis, nec non in principatu superiori ad castellum *Hohentwiel*, in rupibus calcareis *am Donauthal* ad *Werrewag* et *Stetten am KaltenMarkt*, in vicina helvetia retro *St. Gallen* et *dem Weisbad*, ubi eam vidi 1814.

*Obs.* Variat staminibus petala subaequantibus, et vix aequantibus, Stylo longiori et breviori. *Draba brachystemon.* Decand. l. c. p. 334. et *D. aizoon* Wahlenberg. Fl. Carp. p. 193. vix specie diversae sunt a *D. Aizoide*.

pag. 16. *DRABA verna.*

β. siliculis oblongo-ellipticis seu suborbiculatis.

*D. verna var. Marsch à Bieberst. Suppl. Fl. Tauric-Caucas. p. 228.*

*D. verna* β. *Bærhaavii. Van. Hall. Syn. Gram. appendix.*

*D. praecox* foliis lanceolatis dentatis hirsutis, siliculis orbiculatis. *Steven. in Mem. soc. nat. cur. Mosqu. 3. p. 269.*

*Erophila praecox. Decand. regn. veget. syst. nat. 2. p. 357.*

*Hab.* In muris arcis *Hohen-Geroldseck* cum *Draba verna*, ubi eam vidi *Ann. 1822. In*

*Suppl. ad. Flor. Bad, Tom III. G g*

Brisgovia *am Kaiserstuhl*, nec non in vicina *helvetia* prope *Schaffhausen* in muris vallis *Mühlenthal*, ubi eam legit pharmacopæus *Beier*.

Vix pro peculiari specie habenda; a *D. verna* mere differt, siliculis brevioribus, elliptico-suborbiculatis.

Nota. Inter *D. vernam* et hanc, omnino varietates intermediae prostant.

pag. 17. post *DRABAM vernam*.

965.\* *DRABA stellata* foliis hirtis integerrimis dentatisque, scapo subunifolio, siliculis oblongis erectis. *Jacqu. Vind.* 113. *Obs. n.* 54.

*D. stellata* scapis monophyllis pubescentibus, foliis ovali-oblongis pube stellata breviter tomentosis, pedicellis puberulis, siliquis oblongis. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* II. p. 346.

*D. stellata* foliis oblongis obtusiusculis canis pubescentibus integerrimis dentatisve, scapo subunifolio erecto. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 427.

*D. hirta.* *Vill. Fl. Delph.* 3. 282. *Jacqu. Fl. Austr.*

*D. austriaca.* *Crantz. Austr. p.* 12.

*Draba* cauliculis subnudis, foliis ovatis tomentosis. *Hall. Helv. n.* 497.

Bursa pastoris alpina hirsuta. *Bauh. Pin.* 108. *Prodr. p.* 51. *Icon.*

*Icon. Jacqu. Flor. Austr. tab. 432. Obs. tab. 4. fig. 3. Crantz. l. c. tab. 1. fig. 4.*

*Germ. Sternartiges Hungerblümchen.*

*Gall. Drave stellulaire.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, in agro Abbatis cellensi in fissuris rupium editissimis *auf dem Hohen-Kasten* rarius, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturantur. 2.

*Radix* fibrosa. *Scapus* erectus, subdigitalis, teres, subbifolius, setulosus. *Folia* radicalia in orbem congesta, oblonga, obtusiuscula, incano-tomentosa, integra subdentatave, pubescentia dense tecta, 2-3 lineas longa, caulina remota 1-2 sessilia, oblonga, integriuscula, minus tomentosa. *Flores* racemosi, terminales, 5-7. *Calyx* setulosus. *Petala* calyce triplo longiora, obtusa, submarginata, alba. *Siliculæ* oblongæ, compressæ, 4 lineas longæ, lineam latæ, apiculatæ, glabriusculæ, quandoque pubescentes.

Neutiquam cum *Draba stellata* Oed. Fl. Dan. tab. 142. confundenda, quæ ad *Drabam nivalem* pertinet.

965.\*\* *DRABA tomentosa* scapo 1-2 phyllo velutino, foliis ovati-oblongis, pubescentibus, pedicellis pubescentibus, siliculis ovalibus ciliatis. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 345.*

*D. tomentosa* caule subnudo filiformi, foliis



ovalibus integerrimis tomentosis, siliculis ciliatis ovali-ellipticis, longitudine pedicelli. *Wahlenb. helv. n. 672.* — *Carpat. p. 193. n. 635.*

*D. dubia.* *Suter. Fl. helv. 2. p. 46. (vide-  
tur.)*

*Icon.* *Wahlenb. helv. tab. 13.*

*Germ.* *Filziges Hungerblümchen.*

*Gall.* *Drave vélue.*

*Hab.* Promiscue in iisdem cum præcedenti rupinum fissuris editissimis.

*Flor.* Iunio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. 4

Nimis affinis omnino præcedenti, cum qua *Hallerus* combinavit, a qua differt: *Foliis* radicalibus magis dense albido-tomentosis, integerrimis. *Siliculis* latioribus, margine ciliatis.

pag. 19. ante *LEPIDIUM sativum.*

967.\* *LEPIDIUM petraeum* foliis pinatifidis integerrimis, petalis calyce brevioribus, siliculis elliptico-oblongis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 681.*

*L. petraeum* foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus. *Linn. Sp. pl. 2. p. 899. Hoffm. Fl. Germ. p. 226.*

*L. Linnæi* petalis calyce vix majoribus, silicula stylo carente. *Crantz. Austr. p. 7. tab. 2. fig. 4. 5.*

*Hutchinsia petraea* *Ait. Hort. Kew. ed. 2.*

*Vol. 4. p. 82. Decand. Regn. Veg. Syst. nat. 2. p. 589.*

*Nasturtium foliis pinnatis, radicalibus ovatis lanceolatis, caulinis linearibus. Hall. hist. n. 515.*

*Cardamine pusilla saxatilis montana, discoides. Column. Ecphr. 274. tab. 275.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 131. — Sow. Engl. Bot. 2. tab. 111.*

*Germ. Felsenkresse. Kleine Steinkresse.*

*Gall. Cresson des roches.*

*Hab. In vicinia Principatus superioris, in rupibus calcareis alpium Hohensentis, Kastën et Gamor, ubi eam vidi Ann. 1818. In Palatinatu transrhenano t. D. Kochio.*

*Flor. Aprili, Majo, Junio. Semina Junio, Julio matura. ♂ ⊙*

*Radix* tenuis, parvula, subfibrosa. *Cauliculi* 2-3-5 unciales, erectiusculi, tenues, teretes, læte virides, subpubescentes, ramosi. *Rami* alterni, patuli. *Folia* alterna, profunde ad costam mediam pinnatifida, (sic fere pinnata) cum impari, glabra, pulchella, *laciniis* oppositis, lineari-ellipticis, integerrimis. *Ramea* minora. *Flores* corymboso-racemosi, caulem ramosque terminantes. *Calycis* foliola patula, elliptica, margine scariosa. *Corollæ Petala* alba, calyce subbreviora, subemarginata. *Stamina* sex, quatuor longiora et duo breviora, omnia *Antheris* perfectis instructa. *Silicula* oblongo-elliptica, compressa, glabra, subemarginata, bilocularis, bisperma, *Stylo* vix ullo prædita. *Semina* subrotunda, ex flavicante-fusca.

Descriptionem dedi ad exemplaria viva, in alpi-  
bus citatis lecta.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

967. \*\* *LEPIDIUM alpinum* foliis pin-  
natis integerrimis glabris, caule florifero  
nudo adscendente, petalis calyce majo-  
ribus, siliculis lanceolatis, mucronatis.  
*Willd. Sp. pl. 3. p. 433.*

*L. alpinum* foliis pinnatis integerrimis, scapo  
subradicato, siliculis, lanceolatis mucro-  
natis. *Linn. Sp. pl. p. 899.*

*L. foliis pinnatis, pinnis ovatis æqualibus.*  
*Hall. hist. n. 516.*

*L. Halleri* petalis calyce longe majoribus,  
silicula mucronata. *Crantz. Austr. p. 5.*  
*tab 1. fig. 3.*

*Hutchinsia alpina.* *Ait. Hort. Kew. ed. 2.*  
*Vol. 4. p. 82. Decand. Regn. Veg. Syst.*  
*nat. 2. p. 389.*

*Cardamine alpina* III. minima. *Clus. hist.*  
*2. p. 128. fig. 1.*

*Nasturtium alpinum tenuissime divisum.*  
*Bauh. hist. 2. p. 918. 919. fig. 1.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 137.*

*Germ. Alpenkresse. Alpensteinkresse.*

*Gall. Cresson des alpes.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch*  
*im Donauthal* in rupibus calcareis rarius,  
et in vicina helvetia prope *Weisbad am*  
*Gamor, Kasten et Sentis* eam vidi *Ann. 1818.*

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 24

Primo intuitu affinis præcedenti, a quo differt: *Caulibus* aphyllis, non ramosis. *Corollæ* petalis, calyce longioribus. *Silicula* non bisperma, sed tetrasperma. *Stylo* manifesto, mucronato.

*Obs.* Cum præcedenti, ex seminibus, in horto Carlsruhensi culta, nullam mutationem passa est.

pag. 25. post *THLASPI arvense*.

971.\* *THLASPI saxatile* siliculis subrotundis, foliis lanceolato-linearibus obtusis carnosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 901. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 93. — *Hoffm. Fl. Germ.* p. 227.

*Thlaspi* siliquis ellipticis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis. *Hebenstr. in Act. Petrop.* 5. p. 330. fig. 6.

*Thlapsi montanum*, pinqui folio, carneo flore, plana et cordata siliqua. *Barr. Ic.* 345.

*Thlaspi parvum saxalie* flore rubente. *Bauh. pin.* 107.

*Nasturtium* foliis pulposis ellipticis, siliculis alatis emarginatis. *Hall. hist. n.* 512.

*Aethionema saxatile.* *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* II. p. 558. *Ait. Hort. Kew.* ed. 2. Vol. 4. p. 80.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 236. *Schkukr. bot. Handb. tab.* 180.

*Germ. Steintäschelkraut.*



*Gall. Tabouret des piérres.*

*Hab.* In collibus saxosis præsertim calcareis asperis dumetosis herbidis in Principatu Fürstenbergensi retro *Geisingen*, et inter *Engen et Griechenthal* non infrequens, ubi eam legi 1814. In Palatinatu transrhenano t. *D. Kochio*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 2 aut *Suffrutex*.

*Radix* dura, ramosa, fibrosa. *Caules* ex radice plures, sublignosi, palmares, subpedales, basi declinati, ramosi, foliosi. *Rami* alterni. *Folia* alterna, sessilia, glauca, subcarnosa, glabra, integerrima, inferiora elliptica, obtusa, superiora sensim angustiora, lanceolata, acutiuscula. *Flores* corymboso-racemosi, caulem ramosque terminates. *Corollæ* majusculæ, albidæ, venis roseo-incarnatis pictæ. *Filamenta* duo longiora, juxta apicem denticulo prædita. *Silicula* majusculæ, sobrotundæ, compressæ, margine alatæ, subcrenulatæ, superne emarginatæ. *Semina* ovata, fusco-rufa.

Planta pulchella ad rariores Floræ cives pertinet. Individua a me in Gallia meridionali et in Hispania lecta, nostratibus similia. In horto ex seminibus culta, mutationem non passa est.

pag. 27. *THLAPSI montanum. Linn.*

*Hab.* Circa *Wertheim* ad montem *Kalmut*, ubi eam post *D. Wibelium* vidi.

pag. 28. *THLASPI perfoliatum. Linn.*

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 2554.

*Hab.* Circa *Wertheim* ad montem *Kalmut*. t. *Wibelio*.

pag. 29. *THLASPI alpestre*. Linn.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 81.*

pag. 30. *THLASPI Bursa Pastoris*. Linn.

*Capsella bursa pastoris*. Decand. *Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 383.*

pag. 52. ante *IBERIDEM amaram*.

977.\* *IBERIS rotundifolia* herbacea, foliis ovatis: caulinis amplexicaulibus lævibus succosis. Linn. *Sp. pl. 2. p. 905.* Hoffm. *Fl. Germ. 230.* Roth. *Fl. Germ. 2. p. 82.* Scopol. *Fl. Carn. ed. 2. n. 805.*

*Iberis repens*. Lamark. *Fl. Franc. 2. p. 674.*

*Lepidium rotundifolium*. Allion. *Fl. Pedem. 1. p. 252.* Decand. *Fl. Franc. 4. p. 706.*

*Lepidium caule repente foliis ovatis amplexicaulibus*. Hall. *helv. n. 517.*

*Thlaspi alpinum folio rotundiore carnoso, flore purpurascente*. Scheuchz. *It. alp. 1. p. 50.*

*Nocca rotundifolia*. Mæench. *Suppl. 89.*

*Hutchinsia rotundifolia* foliis subcarnosis integerrimis, infimis petiolatis obovatis, caulinis ovato-oblongis subamplexicaulibus, staminibus petalis et stylo silicula dimidio brevioribus. Decand. *Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 385.* Ait. *Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p. 82.* Desv. *Journ. 3 p. 168.*

*Icon. Allion. l. c. tab. 55. fig. 2. Scop. l. c. tab. 57.*

*Germ.* Rundblättriges Iberkraut.

*Gall.* Iberide à févilles rondes.

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia retro *St. Gallen* et dem *Weisbad* in rupibus calcareis, *auf dem Sentis*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio. *Semina* Augusto matura. 4

*Radix* repens, multiceps, ramoso-fibrosa, dura, difficile ex rupium fissuris eradicanda. *Caulis* procumbentes, palmares et longiores, foliosi, simpliciusculi. *Folia* radicalia numerosa, petiolata, obovata; caulina amplexicaulia, ovata, integra, omnia glauca, mollia, succulenta, glabra. *Flores* racemoso-corymbosi, albido-purpurecentes. *Petala* subinaequalia, obovata. *Silicula* ovato-lanceolata, stylo filiformi praedita. *Semina* oblonga, fusco-rufa.

pag. 53. post *IBERIDEM amaram*.

977. \*\* *IBERIS umbellata* herbacea, foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus serratis; superioribus integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 906.

I. *umbellata* herbacea glabra, foliis lanceolatis acuminatis inferioribus serratis, superioribus integerrimis, siliculis umbellatis bilobis. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* II. p. 401.

*Thlaspi umbellatum creticum iberidis folio.*  
*Bauh. pin.* 106.

*Thlaspi Candiae umbellatum Iberidis folio.*  
*Lob. Icon.* 216. *fig.* 1.

Thlaspi IV. sive Creticum Cappadociumve.  
*Camerar. Epit. p. 339. Icon.*

*Icon. Curtis Bot. Magaz. tab. 106.*

*Germ. Doldentragendes Iberkraut.*

*Gall. Iberide ombellifere.*

*Hab.* In Italia, Hispania, Creta. Hospitatur in multis hortis ex quibus ad urbium et pagorum ruderata passim emigrat.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. ☉

*Radix* ramoso - fibrosa. *Caulis* erectus, spithameus et altior, simpliciusculus quandoque ramosus, foliatus. *Folia* alterna, sessilia, lanceolata, acuminata: inferiora remote serrata, superiora integra, læte viridia. *Flores* dense corymboso - umbellati, purpurascente - violacei, albidique.

Distinguitur ab affini *I. amara*: Floribus fructibusque corymboso - umbellatis. Fructus hujus corymbosus hemisphæricus persistit, *I. amaræ* vero racemosus evadit, optime *Linnaeus*.

Planta florens ob copiosos flores, pulchella, verum hortorum decus.

pag. 33. *IBERIS nudicaulis. Linn.*

*Teesdalia iberis* petalis inæqualibus, exterioribus majoribus. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 392.*

*Teesdalia nudicaulis. Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p. 83. Smith. transact. Linn. soc. 11. p. 286.*

*Guepinia iberis. Decand. Fl. Fr. Suppl. 596.*



pag. 39. *ALYSSUM incanum*. Linn.

*Berteroa incana* siliculis pubescentibus sub-  
ventricosus. *Decand. Regn. Veg. Syst.*  
*nat. II. p. 291.*

*Farsetia incana*. *Ait. Hort. Kew. ed. 2.*  
*Vol. IV. p. 97.*

*Vesicaria incana*. *Desv. Journ. 3. p. 171.*

pag. 40. ante COCHLEARIAM.

### CCCX. \* PELTARIA.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1083.*

*Calyx* tetraphyllus: *foliolis* ovatis, conca-  
vis, erectis, coloratis, deciduis. *Corolla* tetra-  
petala cruciformis. *Petala* obovata integra, pla-  
na: unguibus calyce brevioribus. *Silicula* in-  
tegra, suborbiculata, compresso - plana, unilo-  
cularis, non dehiscens. *Semen* unicum, subro-  
tundum, compresso - planum, emarginatum.

982. \* *PELTARIA alliacea* foliis am-  
plexicaulibus oblongis, indivisis. *Linn.*  
*Suppl. p. 295. Decand. Regn. Veg.*  
*Syst. nat. II. p. 329.*

*Clypeola alliacea*. *Lamark. Illustr. tab. 560.*  
*fig. 2.*

*Bohadschia* foliis radicalibus cordatis, cauli-  
nis amplexicaulibus lanceolatis. *Crantz.*  
*Austr. p. 5. tab. 1. fig. 1.*

*Thlaspi montanum*, glastifolio, majus. *Bauh.*  
*pin. 106.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 123.*

*Germ. Knoblauchartiges Scheibenkraut.*

*Gall. Peltaire à odeur d'ail.*

*Hab. In Vogesis inter Bellemonte et Baar in  
sylva abietina legit acutissimus Mærcklin  
Ann. 1786.*

*Flor. Majo, Junio. Semina Augusto ma-  
tra. 4*

*Caulis* sesquipedalis, bipedalis, erectus, te-  
res, glaber, viridi - glaucus, superne ramosus.  
*Folia radicalia* in petiolum decurrentis, *caulina*  
alterna, sessilia, amplexicaulia, cordato-lanceo-  
lata, integra, glaucescentia. *Flores* corymbosi.  
*Corollæ* albæ. *Siliculæ* pendulæ.

Odor plantae tritæ alliaceus.

Ad rarissimos Floræ Alsatiæ cives pertinet. De-  
siccata ex loco citato, in herbario amicissimi et  
circa floram meritissimi semper Maerklini vidi.

pag. 42. post COCHLEARIAM *Armoraciam*.

984.\* COCHLEARIA *Draba* foliis cau-  
linis lanceolatis dentatis amplexicaulibus.  
*Linn. Sp. pl. 2. p. 904. Hoffm. Fl. Germ.*  
229.

*Cardaria Draba. Desv. Journ. 3. p. 163.*

*Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus  
dentatis. Linn. Hort. Cliff. 331.*

*Lepidium Draba. Roth. Fl. Germ. 3. p. 88.*

*Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. 4. p. 86.*

*Decand. Regn. Veg. II. p. 529.*

*Draba umbellata sive major capitulis donata.  
Bauh. pin. 109.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 315.*

*Germ. Stielumfassendes Löffelkraut.*

*Gall. Cranson drave.*

*Hab.* Prope Moguntiam ad viarum margines  
passim *t. D. Ziz.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Sep-  
tembri matura. 24

*Radix* ramosa, fibrosa, albida. *Caulis* pedalis, sesquipedalis, erectus, pubescente-incanus, foliosus, superne ramosus. *Folia* radicalia ovato-oblonga, obtusa, *caulina* numerosa, alterna, sessilia, amplexicaulia, lato-ovali-lanceolata, inæqualiter dentata, subvillosula, viridicanescentia. *Flores* in ramis erectis alternis, racemosi, densi, copiosi. *Corollæ* parvæ albæ. *Siliculæ* ovatæ, compressæ, subhirsutæ, apice emarginatæ, carinatæ.

*Nota.* Ad rariores omnino Floræ cives pertinet.

*Obs.* Individua in Gallia meridionali et in Hispania a me visa, nostratibus minora et magis canescentia sunt. In horto Carlsruhensi seminibus ex hispania per me allatis culta, duplo triplove major, minus pubescente-incana.

pag. 43. CORONOPUS *Ruellii.*

*Senebiera Coronopus* foliis pinnatilobatis, lobis integris dentatis pinnatifidisque, siliculis acutiusculis compressis, valvis dorso cristato-rugosis. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 525.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1660.*

pag. 44. CORONOPUS *didyma*.

*Senebiera pinnatifida*. Decand. l. c. II.  
p. 523.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 248.

TETRADYN. SILIQUOSA.

pag. 53. ante CARDAMINEM *impatientem*.

993.\* CARDAMINE *bellidifolia* foliis  
simplicibus ovatis integerrimis, petiolis  
longis. Linn. Sp. pl. 2. p. 913. — Fl. Lapp.  
206. tab. 9. fig. 2.

C. foliis radicalibus petiolatis ovatis, cauli-  
nis ovatis obtusis. Hall. hist. n. 476.  
*var. a.*

Nasturtium alpinum bellidis folio minus. Bauh.  
pin. p. 105.

Icon. Wulfen. in Jacqu. Misc. Austr. 1. tab.  
17. fig. 2. Allion. Fl. Ped. tab. 18. fig.  
3. Oed. Fl. Dan. tab. 20. Sow. Engl. Bot.  
tab. 2355.

Germ. Massliebenblättrige Cardamine.

Gall. Cardamie à féville de Bellis.

Hab. In Principatu superiori retro *Mæskirch*  
*im Donauthal* in rupibus calcareis roridis  
rarius, nec non in vicina helvetia retro  
*dem Weisbad* ad montem *Gamor et Sen-*  
*tis*, ubi eam vidi 1818.

Flor. Junio, Julio. Semina Septembri ma-  
tura, 4



*Caules* unciales, biunciales, digitales, erecti, simplices, glabri. *Folia radicalia* longissime petiolata, ovata, integerrima, glabra, læte viridia, *caulina* radicalibus similia, minora, subsessilia. *Flores* terminales, corymbosi, pauciflori. *Corollæ* petala erecta, alba, calyce duplo fere longiora. *Siliquæ* erectæ, glabræ, lineares, compressæ.

**Obs.** In variis alpinis altioribus et demissioribus helvetiæ et in Pyrenæis, uno eodemque loco, specimina hujus legi: caule florifero foliis brevior, foliorumque longitudine, et foliis longiore.

Hinc *C. alpina* foliis simplicibus oblongo-ovatis integerrimis, caule florifero altiore. Willd. Sp. pl. p. 481. neutiquam a *C. bellidifolia* Linn. separanda, multo minus pro peculiari specie declaranda.

993.\*\* *CARDAMINE resedifolia* foliis inferioribus indivisis, superioribus trilobis pinnatisque. Linn. Syst. Veg. p. 498.

*C.* foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis ovatis aut pinnatis obtusis. Hall, hist. n. 476. var.  $\beta$ .

*Nasturtium alpinum minus resedæ folio.* Bauh. prodr. 45. tab. 45. — Bocc. Mus. 2. p. 41. tab. 46.

*Icon.* Jacqu. Fl. Austr. s. app. tab. 21. (optima.) Hooker. exotic. Flora tab. 54. Allion. Fl. Pedem. tab. 57. fig. 2.

*Germ.* Resedablättrige Cardamine.

*Gall.* Cardamine à févilles de Resede.

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetiæ,

tia, in rupibus calcareis roridis *auf dem hohen Sentis*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matu-  
ra. 24

Habitus omnino *C. bellidifoliae*, cum qua *Hallerus* conjunxit, a qua autem differt: *Fo-  
liis* radicalibus minus longe petiolatis, ovatis,  
obtusis, integris, aliisque bi- aut trilobis inter-  
mixtis. *Caulinis* petiolatis trilobis pinnatisque,  
obtusis.

Plantula laete viridis, delicatula, glabra, in horto  
Carlsruhensi ex seminibus culta, constans.

993. \*\*\* *CARDAMINE trifoliata* foliis  
ternatis obtusis, caule subnudo. *Linn.*  
*Sp. pl.* 2. p. 913. *Hall. helv. n.* 475.

*C.* foliis ternatis crenatis, caule simplici. *Linn.*  
*Fl. Lapp.* 257.

*C.* alpina trifolia. *Clus. hist.* 2. p. 127.

*Nasturtium alpinum trifolium.* *Bauh. pin.*  
104.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 27.

*Germ.* *Dreyblättrige Cardamine.*

*Gall.* *Cardamine à trois févilles.*

*Hab.* In Principatus superioris vicinia ad mon-  
tem *Kasten*, ubi eam vidi Ann. 1818, nec  
non in *Jurasso*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matu-  
ra. 24

*Radix* ramosa, fibrosa. *Caulis* simplex, ere-  
ctus, palmaris, pedalis, teres, subnudus. *Folia* ra-

dicalia numerosa, petiolata, omnia ternata. *Foliola* ovali-subrotunda, obtusa, crenata, plana, læte viridia. *Flores* racemoso-corymbosi, albi, mediocres.

Planta in horto culta, constantissima.

pag. 59. *SISYMBRIUM Nasturtium. Linn.*

*Nasturtium officinale. Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 188. Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p. 110.*

pag. 60. *SISYMBRIUM sylvestre. Linn.*

*Nasturtium sylvestre. Decand. l. c. II. p. 190. Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p. 110.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2324.*

pag. 61. *SISYMBRIUM palustre. Poll.*

*S. terrestre* siliquis declinatis turgidis, foliis pinnatifidis inæqualiter dentatis, radice simplici, petalis calyce brevioribus. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 701. Cart. Fl. Lond.*

*Nasturtium palustre. Decand. l. c. II. p. 191.*

*Nasturtium terrestre* foliis pinnatifidis dentatis glabris, radice fusiformi, petalis calycem æquantibus. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p. 110.*

*Icon. Curt. Fl. Lond. tab. 49. Sow. Engl. Bot. tab. 1747. (sub S. terrestri.)*

pag. 62. *SISYMBRIUM amphibium.*

*S. amphibium* siliquis declinatis pedicellatis,

foliis oblongis pinnatifidis serratisve, petalis calyce longioribus. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 702.

*Nasturtium amphibium.* *Ait. Hort. Kew. ed.* 2. Vol. IV. p. 110. *Decand. l. c. II.* p. 196.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1840.

pag. 63. *SISYMBRIUM pyrenaicum.* *Linn.*

*Nasturtium pyrenaicum* siliculis ovalibus, foliis inferioribus lyratis; superioribus pinnatis amplexicaulibus: foliolis linearibus. *Ait. Hort. Kew. ed.* 2. Vol. IV. p. 110. *Decand. Regn. Veg. Syst. naturale II.* p. 196.

pag. 65. *SISYMBRIUM tenuifolium.* *Linn.*

*Sinapis tenuifolia.* *Ait. Hort. Kew. ed.* 2. Vol. IV. p. 128.

*Diploaxis tenuifolia.* *Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II.* p. 632.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 525.

pag. 67. *SISYMBRIUM Erucastrum.* *Pollichii.*

Deleatur. *Pollichius* sub hoc epitheto Brassicam *Erucastrum Linnæi* *Sp. pl.* 2. p. 932. omnino comprehendebat.

**Nota.** In locis a Cl. Pollichio pro *Sisymbrio Erucastro* suo citatis, circa Ladenburg, in vinearum collibus circa Dürkheim, in agris prope dem Holzhof, Frankenthal, Worms, Oppenheim, Mainz etc. nuper a me perscrutatis, veram Brassicam



*Erucastrum* Linnaei, mihi non incertam aut dubiam, in abundantia vidi.

Pollichius sub *Brassica* *Erucastro*, non Linnaei plantam, sed longe aliam, ut ex ejus descriptione et ex citatis regionibus patet, comprehendebat, nempe *Sisymbrium* *Monense*! Linn.

pag. 67. loco *SISYMBRII Erucastri*. Poll.

1003. *SISYMBRIUM Monense* calycibus clausis, siliquis erectiusculis demum patentibus, foliis radicalibus profunde pinnatifidis rariter setuloso-pilosis, caule subsimplici, nudiusculo, erecto, glabriusculo, glaucescente.

*S. monense* siliquis erectiusculis, foliis pinnatifidis subpilosis, caulibus simplicissimis nudiusculis glabris. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 704. (omnino.)

*S. monense* acaule, foliis pinnato-dentatis subpilosis, scapis laevibus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 918.

*Brassica Monensis*. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* II. p. 599. *Huds. Fl. Angl.* 291.

*Brassica Erucastrum*! *Poll. Fl. Pal. n.* 641. (exclusis synonymis.)

*Brassica Cheiranthos* foliis sinuato-lanceolatis subhirsutis, calice connivente. *Vill. Fl. Delph.* 3. p. 332. (omnino.)

*Eruca monensis* laciniata, flore luteo majore. *Dill. Hort. Elth.* 135. *tab.* 111. *fig.* 135. (omnino.)

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 962. (bona) — *Lightf. Fl. Scot. tab.* 15.

*Germ. Rauke von Mona.*

*Gall. Sisymbre de Mona.*

*Hab.* Prope *Rastadt* in muris raro. Inter *Graben* et *Neudorf* in campis arenosis ad viam publicam frequens, ubi eam legi 1814. In Principatu superiori ad Lacum in sabulosis apricis, nec non in muris urbis *Constanzt* eam abunde vidi *Ann.* 1809. Circa *Lautern* in arvis arenosis ubique; in campis sabulosis nostris cum *Aira canescente Galeopside cannabina*, *tetrahit*, *Antirrhino Orontio* etc. frequens. Passim quoque ad viarum margines arenosas, fossas, muros, nec non in carbonariorum arcis crescit *t. Pollichio*.

*Flor.* Majo, Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4 ♂

*Radix* fusiformis, alba, fibrosa. *Caules* e radice sæpe plures, erecti, quandoque adscendentes, pedales, sesquipedales et altiores, teretes, glaucescentes, raris pilis aut setulis pellucidis adpersi, simpliciusculi, interdum ramosi, ramo uno alterove præditi. *Folia radicalia* in petiolum decurrentia profunde pinnatifida, obtusa, 5-6-7 uncias longa, duas fere uncias lata, ex glauco-viridia, rarioribus pilis seu setulis instructa: pinnis seu segmentis alternis oppositisve, una in alteram decurrente, lineari lanceolatis, obtusis, latioribus et angustioribus, obtuse et grosse dentatis, lacinia extrema trifida. *Caulina* seu *ramea* (in individuis ramosis) ad costam fere pinnatifida, segmentis alternis, sublinearibus, angustis, integriusculis, interdum denticulo uno alterove instructis, piloso.-albide, setulosis. *Flores* caulem ramosque terminantes, longe et laxo racemosi. *Pedunculi* alterni, 3-5 lineas longi,

teretes, glabri, floriferi erecti, fructiferi patentiusculi. *Flores* flavi. *Petalorum* lamina patens, subrotunda integerrima, quatuor fere lineas longa, ultra tres lineas lata, venis obscurioribus picta, *unquis* erectus, albidus, quinque lineas longus. *Calyx* erectus, connivens. *Foliola calycina* lineari-lanceolata, obtusa, integra, læte viridia, margine albicantia, apicem versus albidè setulosa. *Siliquæ* immaturæ erectiusculæ; maturæ erecto-patentes, obtuse tetragonæ, cornu capitato coronatæ, glabræ.

**Nota:** Individua in urbe Constantina visa, illis in arenosis sterilibus lectis, majora, magis ramosa et viridia sunt.

Cl. Lightfootii et Sowerby l. c. planta depicta, omnino omni ex parte, cum nostra convenit, hinc mihi nullum dubium, Pollichii Brassicam Erucastrum, esse *Sisymbrium Monense* Linnaei et Smithii.

Cl. Villarsii descriptio Brassicae Cheiranthos omnino quadrat ad nostram plantam, ad quam citat Sinapin recurvatam Allion. Fl. Ped. n. 963. tab. 82, quae quoad caulem, folia et inflorescentiam, omnino vix redecit a nostra, nisi instructa esset siliquis recurvatis, cornu acuto non coronato.

Sub *Sisymbrio Monense*, Linnaeus ut ex synonymis a summo viro allegatis patet, duas diversas species comprehendebat, scilicet *Monense* verum nostrum et *Erucam perennem* et saxatilem radice crassa e rupe victoriae Galloprovinciae Tournef. seu *Sisymbrium saxatile* Lam. Fl. Franc. 2. p. 517. Decand. Fl. Franc. 4. p. 665. Pers. Syn. 2. p. 197.

*Sisymbrium Monense* Vill. Flor. Delph. 3. p. 350. tab. 39. ad *Sisym-*

brium repandum. Willd. Sp. 3. p. 497. pertinet.

1003. \* *SISYMBRIUM murale* caule adscendente, inferne ramoso folioso, superne simplici aphylo, foliis in petiolum longum decurrentibus, late lanceolatis, sinuato-serratis, læviusculis.

*S. murale* subacaule, foliis lanceolatis sinuato-serratis, læviusculis, scapis subscabris adscendentibus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 918.

*Sisymbrium* foliis lanceolatis sinuato-serratis, caule subnudo erectiusculo. *Linn. Hort. Clifford.* 337.

*Sinapis muralis* siliquis linearibus glabris brevissime rostratis erectiusculis, pedunculis patulis, foliis sinuatis glabris, caule patulo piloso. *Ait. Hort. Kew. ed.* 2. *Vol. IV.* p. 128.

*Diploaxis muralis.* *Decand. Regn. Veg. Syst. nat.* II. p. 634. exclusa varietate  $\beta$ . allegata.

*Eruca viminea*, iberidis folio, flore luteo. *Barrel. pl. rar.* 421. *tab.* 131.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1090.

*Germ.* Mauerrauke.

*Gall.* *Sisymbre de muraille.*

*Hab.* In vineis ad muros prope *Wertheim in der Wettenburg* non infrequens, legi cum optimo *Wibelio Ann.* 1813. In Palatinatu transrhenano prope *Niederengelheim.*



*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. ☉

*Radix* fusiformis, fibrosa, albida. *Caules* ex radice plures, pedales, sesquipedales, flexuoso - adscendentes, teretes, striati, subhirsuti, ramosi. *Rami* alterni, foliosi. *Folia* sparsa, in petiolum longum decurrentia, late lanceolata, sinuato-serrata, cum petiolo 2-3-5 uncias longa, plana, lævia, subtus pilis aliquot vagis adspersa, semiunciam, unciam ad 14 lineas lata. *Flores* caulem superne aphyllum terminantes, racemosi, laxiusculi. *Calycina* foliola glabriuscula. *Corollæ* petala quatuor, obovata, calyce duplo longiora, lutea. *Siliquæ* teretiusculæ, erectæ, glabræ, unciam ad sesquiunciam longæ. *Stylo* tereti crassiusculo et *Stigmate* subcapitato terminatæ.

*Obs.* Folia in nostris saltem speciminibus nunquam pinnatifida, sed semper exacte lanceolata, margine sinuato-serrato-dentata, qua nota facile a *S. tenuifolio* et *S. Erucastro Polichii*, seu *Brassica Erucastro* Linn. nec non a sequenti specie: *S. vimineo* distinguitur.

### 1003. \*\* *SISYMBRIUM vimineum*

caule brevissimo folioso mox scapifero, scapis adscendentibus nudiusculis, foliis longe petiolatis sublyrato - pinnatifidis, segmentis sinuatis subrectangulis obtusis integriusculis glabris.

*S. vimineum* acaule, foliis lyratis lævibus, scapis adscendentibus, floribus minutis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 919. — *Decand. Fl. Franc. IV.* p. 665.

*S. brevicaule.* *Wibel. Fl. Werth. add.* p. 348.

*Diplotaxis viminea* siliquis sessilibus erectis, stylo brevi filiformi, foliis radicalibus lyratis obtusissimis lævibus, caulibus nudis subdecumbentibus. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 635.*

*Eruca pumila* sicula, bursæ pastoris folio. *Bocc. sic. 19. tab. 20.*

*Eruca minimo* flore, monspeliensis. *Bauh. hist. 2. p. 862. fig.*

*Eruca vinealis* parvis luteis floribus. *Moris. hist. 2. p. 229. Sect. 3. tab. 5. fig. 8.*

*Germ. Weinbergs - Rauke.*

*Gall. Sisymbre des vignes.*

*Hab.* In vincis ad montem *Kaiserstuhl* Brisgoviae non infrequens. Prope *Wertheim* in vincis depressis *an der Wettenburg*, nec non in agris *im Sporkert* maxima in abundantia vidi cum amicissimo *Wibelio* 1815.

*Flor.* Julio, Augusto, *Semina* Septembri maturā. ☉

*Radix* tenuis, fusiformis, fibrosa, alba. *Caulis* brevissimus, 3-7 lineas longus, glabriusculus aut setis raris validis hispidus, foliosus. *Scapi* simplices, sæpe plures, adscendentes, teretes, striati, glabriusculi, semipedales, pedales. *Folia* ad caulem sparsa, in longum petiolum decurrentia, 1-2-3 uncias longa, sublyrata, pinnatifida, sinuata, obscure viridia, glabra: *segmentis* subrectangulis, integriusculis, obtusiusculis, extrema majori subcuneiformi, grosse tri-rarius quinquedentata. *Flores* in scapis laxè racemosi. *Racemi* inferne sæpe scabriusculi, digitales, de-

mum semipedales et longiores. *Pedunculi* 3-6 lineas longi, uniflori. *Calycina* foliola erecto-patentia, concava, lanceolato-lineararia, glabra, quandoque hispidiuscula, decidua. *Corolla* tetrapetala. *Petala* calyce paulo longiora, obovata, erecto-patentia, pallide lutea. *Siliquæ* erectæ, unciam ad tredecim lineas longæ, lineares, compressæ, glabræ, *Stylo* brevi subcylindrico et *Stigmate* capitato instructæ. *Semina* plurima, subovata, parva.

*Nota.* Ad novas Florae Germaniae cives pertinet, in Gallia, Italia, Hispania, et Sicilia observata.

Neutiquam confundenda cum *Sisymbrio murali*.

### 1003. \*\*\* *SISYMBRIUM pannonicum*

foliis caulinis superioribus pinnatis, pinnis linearibus integerrimis, extima elongata. *Aiton. Hort. Kew. 2. p. 392. ed. 2. Vol. IV. p. 112. Jacqu. Collect. Austr. 1. p. 70. Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 502.*

*S. pannonicum* foliis inferioribus runcinatis hispidis lobis dentatis, superioribus pinnatisectis glabris lobis linearibus integerrimis, siliquis patentibus. *Decand. l. c. II. p. 470.*

*S. sinapistrum. Crantz, Austr. 52.*

*Icon. Jacqu. Ic. rar. 1. tab. 123.*

*Germ. Ungarische Rauke*

*Gall. Sisymbre de Hongrie.*

*Hab.* In Alsatiæ vincis prope Mutzig teste *D. Nestlero.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. ☉

*Radix* fusiformis, gracilis, fibrosula. *Caulis* erectus, sesquipedalis, bipedalis, teres, simplex, superne subramosus, glaber, inferne retrorsum piloso-scabriusculus. *Folia* alterna, petiolata, caulina superiora pinnata: *foliolis* linearilanceolatis, angustis, integris, glabris, extimo elongato. *Flores* caulem ramosque terminantes, corymbosi. *Calycis* foliola patentia, decidua, linearia, obtusa, pallide virentia. *Corollæ* petala ochroleuca, obovata, obtusa, calyce longiora. *Siliquæ* lineares, graciles, patentes, triunciales, glabræ, *stigmatibus* subcapitato instructæ.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

1003. \*\*\*\* **SISYMBRIUM** *Irio* foliis runcinatis, dentatis nudis, caule lævi, siliquis erectis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 921. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 236. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 132. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 705.

S. *Irio* caule foliisque glabris runcinato-pinnati-partitis, lobis dentatis, terminali elongato, calyce siliquisque patenti - erectis. *Decand. l. c. II.* p. 467.

*Irio* lævis apulus *Erucae* folio. *Col. ecphr.* 1. p. 264. *tab.* 265. *Moris. hist. Sect.* 3. *tab.* 3. *fig.* 3.

*Erysimum* II. *Tabernæmont.* p. 840. *Icon.*

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr.* *tab.* 322. *Curt. Fl. Lond.* *tab.* 48. — *Sow. Engl. Bot.* *tab.* 1631.

*Germ.* *Langblätterige Rauke.*



*Gall. Sisymbre Irio.*

*Hab.* Prope *Wertheim* ad muros antiquos rarius, ubi eam cum amicissimo *Wibelio* vidi 1815.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturatione. ☉

*Radix* fusiformis, obliqua. *Caulis* subsepiipedalis, erectus, teres, sulcatus, glaber, a medio ad apicem ramosus. *Rami* 9-12 alterni, 3-4-5 uncias longi, supremi sensim breviores subaphylli, erecto-flexuosi, teretes, glabri, pedunculos universales imitantes. *Folia radicalia* in orbem digesta, numerosa, circiter 20-25, in petiolum subuncialem decurrentia, omnia subæqualia, 3-4 uncias longa, unciam ad 12 lineas lata, pallide viridia, glabra, runcinata, profunde ad costam fere pinnatifida. *Segmentis* subparallelis, acutis, inæqualiter inciso-acute dentatis, summo subtridentato. *Caulina* alterna, inferiora radicalibus subsimilia, *segmentis* sublongioribus, longius dentatis prædita; *superiora* axillaria sensim breviora, sessilia, minus profunde pinnatifida, *segmentis* lateralibus longioribus, angustioribus, longius denticulatis, subfalcatis, *supremo* latiori, acuto, inferne denticulato, superne integriusculo. *Flores* caulem ramosque terminantes, racemosi. *Racemi* florentes curvato-subnutantes, 2-3 unciales, laxiusculi, multiflori. *Calycis foliola* erecta, lineari-lanceolata, obtusa, rariter setulosa, ex viridi-pallide lutescentia. *Corollæ petala* oblonga, obtusa, calyce duplo longiora, pallide lutescentia, siccitate albescentia. *Siliquæ* tenues, lineares, teretiusculæ, erectæ, subtorulosæ, sesquiunciam ad binas uncias longæ, *stigmatē* subgloboso terminatæ.

**Nota.** Descripti individua in muris l. c. lecta, quae recedunt ab individuis in omnibus partibus procerioribus, succulentioribus, in ruderatis pinguioribus, hortisque obvenientia. Talia sine dubio apud Jacquinum, Curtisium et Sowerbeum descripta et delineata sunt.

Legi Parisiis in muris Ann. 1810 individua hujus plantae, nostratibus Werthemensibus in omnibus partibus, multo tenuiora, caulibus vix ramosis, semipedalibus, pedalibus, superne cum pedicellis setuloso-hispidis.

*Sisymbrium pinnatifidum* siliquis glabris foliis lyrato-pinnatifidis. Forsk. Descr. 118 et

*Erysimum* foliis lyrato-pinnatis: extimo hastato. Linn. Fl. Suec. 556. quae, tanquam synonyma, ad nostram plantam citant auctores, omnino non ad individua nostratia in muris, sed ad illa, in ruderatis cultis, hortisque obvenientia, quadrant. In nostris individuis, folia non lyrata, et segmentum extimum, vix unquam hastatum.

### 1003. \*\*\*\*\* *SISYMBRIUM Columnae*

foliis runcinatis dentatis et caule villoso subincanis, siliquis erectis. Linn. Syst. veg. p. 596. — Roth. Fl. Germ. 3. p. 133. — Hoffm. Fl. Germ. p. 236.

- S. *Columnae* caule villoso subincano, foliis runcinatis pubescentibus, lobis dentatis integrisque acutis, siliquis erectiusculis, calyce laxo. Decand. l. c. II. p. 469. β. *leiocarpum* siliquis glabris, foliorum lobis dentatis.

*Rapistrum montanum* Irionis folio. Column. Ecphr. 1. p. 266. tab. 268.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 323.*

*Germ. Columnasche Rauke.*

*Gall. Sisymbre de Mr. Columna.*

*Hab.* In Alsatia prope *Colmar* in muris antiquis arcis *Herlisheim t. D. Nestlero.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

*Caulis* erectus, sesquipedalis et altior, teres, subdichotomus, villosus-incanus. *Folia* villosa-canescens; *radicalia* in orbem digesta, runcinata, dentata, apice triangula; *caulina inferiora* alterna, petiolata, profunde pinnatifida, segmentis ovato-lanceolatis, uno alterove dente præditis, apice hastata, sinuato-dentata; *caulina media* sagittata; *superiora et ramea* linearilanceolata, integra, obtusiuscula. *Flores* terminales, racemosi, laxi, nudi. *Calyx* flavescens, extus villosus. *Corolla* flava. *Siliquæ* erectæ, lineares, villosus-incanæ, obtusæ, subbiunciales.

*Obs.* Individua in Catalonia a me lecta, magis villosus-incana, minora.

pag. 68. *SISIMBRIUM arenosum. Linn.*

*Arabis arenosa* foliis pube bifurca villosis, radicalibus lyrato-pinnatifidis, caulinis inciso dentatis, caule ramoso pilis simplicibus hispido, pedicellis siliquisque patulis. *Decand. Regn. Veg. Syst. nat. II. p. 232.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 1760.*

pag. 70. *SISIMBRIUM Læselii. Linn.*

*Leptocarpæa Læselii. Decand. Regn. Veg. Syst. nat. p. 202.*

*Hab.* Inter Schwetzingen et Seckenheim ad viam, ubi vidi 1813. prope Mainz t. D. Ziz.

pag. 72. post SISYMBRIUM *Sophia*.

1006.\* *SISYMBRIUM strictissimum*  
foliis lanceolatis dentato-serratis caulinis.  
*Linn. Sp. pl.* 2. p. 922. — *Hoffm. Fl. Germ.* p. 236. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 134. *Wibel. Fl. Werth.* p. 211.

*Draba lutea* siliquis strictissimis. *Bauh. pin.* p. 110.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 194.

*Germ. Steifstengliche Rauke.*

*Gall. Sisymbre roide.*

*Hab.* Ad Nicari ripam in sepibus prope der Bergheimer-Mühle circa Heidelberg, ubi 1813 vidi. In pratis, locis glareosis ad fluvium die Tauber in der Leberklinge post b. *Wibelium* vidi *Ann.* 1817.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. 2

*Radix* ramosa. *Caulis* strictus, 2-3 pedalis, teres, subpubescens, superne ramosus. *Rami* alterni. *Folia* caulina alterna, subpetiolata, ovato-lanceolata, acuta, dentato-serrata, villosa-pubescentia, 3-4 uncias longa, unciam lata, suprema lanceolata, angustiora, breviora. *Flores* caulem ramosque terminantes, corymboso-racemosi. *Petala* calyce duplo fere longiora, aurea. *Siliquæ* graciles, patent-erectæ, tres uncias longæ, glabræ.



**Varietatem:** foliis omnibus integriusculis, vidi in Helvetia, quam Hallerus allegavit in hist. plant. n. 458 sub *Eruca* caule paniculato, foliis nervosis, ovato-lanceolatis, integerrimis.

pag. 73. *ERYSIMUM Barbarea*.

*Barbarea vulgaris* foliis inferioribus lyratis, lobo terminali subrotundo, superioribus obovatis dentatis. *Decand. l. c. II. p. 206.*

Deleatur *var. β. E. præcox. Smith. Fl. Brit. 2. p. 707. Sow. Engl. Bot. tab. 1129.*

Est planta specie diversa, ab *E. Barbarea*, quam hucusque in terris Badensibus et adjacentibus frustra quæsi.

**Nota.** *E. præcox* ex seminibus in horto Carlsruhensi cultum, constans. Differt ab *E. Barbarea* Radice non perenni sed bienni Caulibus strictioribus pallidioribus. Foliis superioribus profunde pinnatifidis, laciniis oppositis lineari-oblongis integris, angustis. Corollis pallidioribus, Siliquis duplo longioribus. Herba gustu *Sisymbrii Nasturtii*, præcocius jam initio Aprilis floret. Herba antiscorbutica, in acetariis grata.

pag. 77. Emendatur *ERYSIMUM hieracifolium*, sub quo duæ species distinctæ militant, scilicet:

1011. *ERYSIMUM odoratum* foliis infimis profunde sinuato-dentatis, reliquis lanceolatis remote argute dentatis, erectis setuloso-scabris, setulis 2-3 partitis, siliquis erectis, strictis, tetraëdris caule erecto, sulcato, scabro.

E.

*E. odoratum* foliis lanceolatis remote argute dentatis, petalis subrotundis, siliquis erectis strictis, caule sulcato. *Willd. Sp. Plant.* 3. p. 512. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 157.

*E. hieracifolium.* *Poll. Flor. Palat. n.* 635. (excl. *Linn. Bauh. et Raj. Synonymo.*)

*E. hieracifolium.* *Jacqu. Fl. Austr.*

*E. strictum.* *Wetterauische Flora.* 2. p. 451. omnino.

*E. strictum* foliis lanceolatis dentatis pube tripartita pubescentibus, caule stricto, siliquis erectis, stylo brevissimo, stigmatе bilobo. *Decand. Regn. Veget. Syst. naturale.* 2. p. 495.

*E. Cheiranthus.* *Wibel. prim. Fl. Wertheim.* p. 212. (omnino.)

*E. pannonicum* foliis lanceolatis dentatis, flore specioso cheiranthi. *Crantz. Austr.* 28.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 73. (sub *E. hieracifolio.*)

*Germ.* Wohlriechender Hederich.

*Gall.* Velar à fleurs odorantes.

*Hab.* Prope *Wertheim* ad muros vinearum am *Remberg* et prope *Kreutzwertheim*, ubi eam cum amicissimo *Wibelio* legi Ann. 1813. In Palatinatu circa *Bingen et Creutzenach* abunde post *Pollichium* vidi. In *Sponhemia* in collibus præruptis, lapidosis, ad *Mosellam* frequens.

*Flor.* Junio, Julio. Semina Augusto matura. ♂

Suppl. ad Flor. Bad. Tom III,

I i

Hujus plantæ descriptionem dedi sub *Erysimo hieracifolio* cui adde. Flores hujus speciei facile maximi, suaviter subodorati.

*Jacquini* planta, foliis subbrevioribus profundius sinuato - dentatis depicta, omnino hic pertinet, ut ex fusiori descriptione Cl. viri patet, qui dicit: *Folia* oblonga, lanceolata, basi attenuata, subsessilia, acuta, raris denticulis munita, (interdum profundius sinuata, ut in specimine picto.)

Differt ab *Erysimo hieracifolio* Lian. *Caulibus* sæpe simplicibus strictioribus. *Foliis* firmioribus, angustioribus, magis remote argute dentatis. *Corollis* multo majoribus subpallide luteis, odoratis. *Siliquis* erectis, strictis, exacte tetragonis, multo longioribus, bi-triuncialibus.

Varietatem levidensem, *Caule* 3-4 pedali ramoso. *Foliis* lanceolatis integriusculis denticulatisve, siliquis justo longioribus, strictis, fere triuncialibus, promiscue prope *Wertheim* l. c. vidi, quam *Scleicherus* sub *E. longisiliquo*, Willd. in *Enum. p.* 680. et *Decand. in Regn. Veg. Syst. nat. 2. p.* 496. sub *E. longisiliquoso* descripserunt.

Varietas in omnibus partibus depauperata cinereo-canescens. *Caule* simplici, graciliori, striato, setuloso, setulis 2-3 partitis adpressis. *Foliis* lanceolatis, subdentatis, setulosis, incanis. *Calycibus* incanis. *Corollis* subminoribus, interdum depauperatis, immo plane nullis. *Siliquis* erectis exacte tetraëdris, novem ad duodecim uncias longis, incanis. Crescit in iisdem regionibus prope *Wertheim* ad Mœnum ubi legit acutissimus *Mertin*, pharmacopœus et mihi benevole misit. Sine dubio planta morbosa.

**Nota.** *E. odoratum*. Ehrh. l. c. omnino ad nostram plantam ob siliquas strictas non laxas pertinet.

1011. \* **ERYSIMUM** *hieracifolium*

caule erecto, sulcato - anguloso, ramoso, setuloso, foliis late lanceolatis acutis remote dentatis, setuloso - scabris, siliquis erectis, strictis, subcompresso - tetraëdris.

*E. hieracifolium* foliis lanceolatis remote serratis, siliquis erectis subadpressis, compresso - tetraëdris. *Willd. Enum. p.* 680.

*E. hieracifolium* foliis lanceolatis remote dentatis, siliquis erectis. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 311. (*excl. Pollichii syn.*)

*E. hieracifolium* foliis lanceolatis basi attenuatis remote argute sinuato - dentatis, caule stricto subramoso, tereti, siliquis erectis. *Decand. Regn. Veg. Syst. natur.* 2. p. 497.

*E. hieracifolium* foliis lanceolatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 923.

*E. hieracifolium* radice bienni, ramis erectis, foliis lanceolatis denticulatis patentibus, siliquis subadpressis, valvulis fere longitudine dissepimenti. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 156.

*Levcojum sylvestre inodorum*, flore parvo pallidiore. *Raj. hist. p.* 781.

*Levcojum luteum sylvestre hieracifolium.* *Bauh. prodr. p.* 102.

*Germ. Habichtskraut-artiger Hederich.*

*Gall. Vêlar à févilles des éperviere.*



*Hab.* Prope *Wertheim* in ruderatis, arvis, nec non ad aggeres et ripas *Mœni* arenosas frequens, ubi eam legi 1815. In *Palatinatu transrhenano t. D. Kochio*.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. ♂

*Radix* subfusiformis, fibrosa, albida. *Caulis* erectus, 3-4 pedalis, sulcato-angulosus, setulis tenuibus adpressis, superne ramosus, *ramis* erectis. *Folia radicalia* in rosulam congesta, oblongo-lanceola, in petiolum attenuata, tres ad quatuor uncias longa, 4-6 lineas lata, integra, rarius et rariter seu remotissime et minutissime denticulata, asperula, læte viridia, tenuia. *Caulina* alterna, subsessilia, late lanceolata, tenuia, læte viridia, asperula, margine remote dentata, septem ad novem lineas lata, 2 ad 3 uncias longa, superiora sensim minora. *Rami* terminales erecti, deflorati elongati, stricti, 5-9 uncias longi. *Pedicelli* erecti, 2-3 lineas longi. *Flores* subinodori. *Corollæ* petala flava vel flavescentia, obovata, interdum subemarginata, cum unguibus quatuor lineas vix longa. *Siliquæ* compresso-tetragonæ, erectæ, strictæ, subadpressæ, setuloso-asperæ, sesquiunciam ad binas uncias longæ. *Stigmate* capitato terminatæ. *Semina* oblonga, subcompressa, rufolutescentia.

*Varietatem* caule foliisque non viridibus sed cinerascentibus promiscue prope *Wertheim* legit acutissimus *Mertin* 1822.

Facile distincta ab *E. odorato*: *Foliis* longioribus et latioribus multo tenuioribus. *Floribus* semper multo minoribus, vix odoratis. *Siliquis* gracilioribus compresso-tetragonis in racemo magis elongato copiosioribus.

Primo intuitu affine *Erysimo cheiranthoidi*, a quo differt: *Radice* non annua sed bienni. *Caule* altiore et crassiore. *Foliis* latioribus et longioribus. *Corollis* majusculis. *Siliquis* non patulis, sed erectis, strictis, semper longioribus.

**Nota.** *Erysimum hieracifolium* Flor. Dan. tab. 923 a nobis in Flora nostra ad *E. hieracifolium* citatum, nec huc, neque ad odoratum, sed omnino ad *E. cheiranthoidem* pertinet.

pag. 79. post CHEIRANTHUM *Cheiri*.

1012. \* CHEIRANTUS *decumbens*  
(*Schleicher.*) foliis lanceolatis basi dentatis, remotissime dentatis glabris, caule adscendente, siliquis cuspidatis. *Willd. Enum. pl. Hort. Berol. p. 680.*

Ch. *ochroleucus* foliis oblongo-lanceolatis, subdentatis, pube bipartita aut nulla, caule decumbente ramoso, petalis obovatis, siliquis erectis stylo pedicelli longitudine apiculatis. *Decand. l. c. II. p. 181.*

Ch. *dubius.* *Suter. Fl. Helv. 2. p. 65.*

*Erysimum ochroleucum. var. α. Decand. Fl. Franc. 4. p. 658.*

Hesperis foliis glabris linearibus lanceolatis obiter dentatis. *Hall. helv. n. 449.*

*Icon. Hall. l. c. tab. 14.*

*Germ. Niederliegende Viole.*

*Gall. Giroflier jaunatre.*

*Hab.* In montis Jurassi rupibus in monte Jas-

*seral* et Falconario, et loco dicto *Creux du Vent*, ubi 1818 vidi.

*Flor.* Junio, Augusto. *Semina* Septembri matura. 4

*Radix* lignosa, longa, cylindrica, multi-ceps. *Caules* plurimi, pedales, decumbenti-adscendentes, simpliciusculi, subramosique, angulati, basi denudati, subpubescentes. *Folia* alterna, petiolata, lanceolata, raris dentibus incisa, sesquiunciam ad duas uncias longa, tres ad quatuor lineas lata, crassiuscula, juniora pubescentia, adultiora glabra. *Flores* racemosi terminales, odorati. *Racemi* 7-9 flori. *Calycina* foliola linearia, clausa, hina exteriora basi magis gibba. *Petala* magna, sulphurea, unque calycem excendente, lamina subrotundo-obovata. *Siliquæ* erectæ, compressæ. *Stylo* filiformi. *Stigmate* capitato. *Semina* pauca, ovata.

1012.\*\* *CHEIRANTHUS incanus* foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 924. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 520.

*Mathiola incana* caule basi suffruticoso erecto ramoso, foliis lanceolatis integerrimis incanis, siliquis subcylindricis eglandulosis. *Decand. l. c. II. p.* 163. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p.* 119. α. β. et γ.

*Leucojum* hiemate et diu durans purpureum roseum ac album. *Bauh. hist.* 2. p. 874.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1935. (sub *Cheirantho incano*.)

*Germ.* *Winter-Levcoie.*

*Gall.* *Giroflée blanchatre. Violier d'hyver.*

*Hab.* In Creta, Tauria, in maritimis mediterraneis. Hospitatur sub multis varietatibus in hortis, ex quibus passim cum hortorum rejectamentis ad urbium et pagorum rudrata migrat.

*Flor.* Aestate. *Semina* Augusto, Septembri maturat. *Suffrutex.*

*Variat.* Floribus simplicibus, semiimpletis et impletis albis, purpureis, roseis, rubris, eccineis et variegatis.

1012. \*\*\* *CHEIRANTHUS glaberrimus* foliis lanceolatis integris glaberrimis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso.

*Ch. glabrus.* *Mill. Dict. n. 9.*

*Ch. incanus.* *Linn. var. alba nuda.*

*Mathiola glabra.* *Decand. l. c. II. p. 165.*

*Leveojum hiemale* diu durans flore albo folio viridi et livido glabro. *Bauh. hist. 2. p. 2. p. 875.*

*Leveojum fruticosum* folio viridi flore albo odorato Camerarii. *Besl. Hort. Eyst. aest. ord. 2. tab. 15. fig. 1.*

*Germ.* *Glatte grüne Winterlevcoie.*

*Gall.* *Giroflée d'yver à févilles vertes.*

*Hab.* . . . . . Hospitatur in hortis.



*Flor.* et semina maturat cum præcedente. Suffrutex.

Sæpissime in hortis floribus simplicibus albis et pallide rubris roseisque obvenit. Similima præcedenti, a qua differt caulibus, petiolis foliisque glabris, læte viridibus.

*Obs.* Planta in horto culta constantissima, omnino specie diversa à *Ch. incano*.

1012. \*\*\*\* **CHEIRANTHUS** *annuus*  
foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *Linn. Sp. pl. 2. p. 925. Willd. Sp. pl. 3. p. 520.*

*Mathiola annua* caule herbaceo erecto ramoso, foliis lanceolatis obtusis incanis, siliquis subcylindricis eglandulosis. *Decand. l. c. II. p. 165.*

*Mathiola incana. var. δ. Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p. 119.*

*Levcojum æstivum* flore purpureo et roseo. *Bauh. hist. 2. p. 875.*

*Icon. Schkuhr. bot. Handb. tab. 184.*

*Germ. Sommerlevcoie.*

*Gall. Giroflée annuelle. Violier d'été.*

*Hab.* In maritinis europæ australis. Hospitatur in hortis sub multis varietatibus.

*Flor.* Aestate. *Semina* Augusto Septembri matura. ☉

Variat Floribus simplicibus, semiimpletis et impletis albis, roseis, rubris, coccineis, purpureis, variegatisque.

pag. 81. *HESPERIS inodora*.

*H. matronalis*  $\beta$ . *sylvestris*. *Decand. regn. veg. syst. nat. p.* 451.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 731.

*Hab.* In Brisgovix monte *Feldberg* inter dem *Ehrlenbacher et Stollenbacher Hofe* non infrequens, ubi eam vidi 1814.

*Obs.* In horto Carlsruhensi culta, constans.

pag. 83. *ARABIS alpina*. *Linn.*

*A. alpina* foliis pluri-dentatis, pube ramosa villosis lanceolatis acutis, radicalibus subpetiolatis, caulinis cordato-amplexicaulibus, pedicellis calyce glabriusculo longioribus, petalorum limbis obovatis, patentibus. *Decand. regn. veg. syst. II. p.* 216.

*Hab.* Porro in Principatu superiori in rupibus calcareis *am Donauthal* prope *Werrewag*, et *Stetten am Kalten-Markt*, nec non retro *St. Gallen*, ubi eam 1814 vidi.

pag. 84. post *ARABIN alpinam*.

1015.\* *ARABIS auriculata* foliis subdentatis pube ramosa scabris, inferioribus ovalibus in petiolum subattenuatis, caulinis obtuse cordato-auriculatis, pedicellis calyce vix longioribus, petalis oblongis erectis. *Decand. l. c. p.* 220. et *Fl. Franc. 4. p.* 673. *Lamark. Dict. 1. p.* 219.

*A. aspera* caule erecto flexuoso ramoso, foliis

ovatis asperis semiamplexicaulibus, siliquis teretibus. *All. Auct. Fl. Ped. p. 18. n. 973.*

**A. aspera** foliis amplexicaulibus obtusis scaberrimis, siliquis erectis strictis teretiusculis. *Willd. Sp. pl. 3. p. 542.*

*Icon. Allion. l. c. tab. 2. fig. 2.*

*Germ. Rauhlättriges Gänsekraut.*

*Gall. Arabette auriculée.*

*Hab.* In Palatinatu trans rhenum *t. D. Kochio et Ziz.*

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio Augusto matura. ♀ ⊙

*Radix* tenuis, ramoso-fibrosa. *Caulis* erectus, spithamæus et altior, subflexuosus, simpliciusculus, ramosusque, hispidus. *Folia* inferiora breviter petiolata, ovali-oblonga, subdentata: *caulina* amplexicaulia, cordata, auriculis brevibus obtusis, omnia utrinque setulis ramosis hispida. *Flores* racemosi, terminales, erecti, demum elongati. *Pedicelli* tenues, filiformes, erectiusculi, 2-3 lineas longi. *Calyces* glabriusculi. *Petala* oblonga, erecta, alba. *Siliquæ* lineares, erectæ, graciles, glabræ, unciam ad sesquiunciam longæ.

pag. 84. ARABIS *Turrita.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 178.*

*Hab.* Porro in Brisgovix montis vallis *Hællenthal* fissuris rupium *t. D. Spennero.*

pag. 87. post *ARABIN thalianam*. Linn.

1017.\* *ARABIS pumila* foliis radicalibus obovatis subdentatis obtusis utrinque scabris, caulinis sessilibus oblongis subhirsutis, racemo subnutante. *Wulf. in Jacqu. Coll. Austr. 2. p. 59. Jacqu. Fl. Austr.*

*A. pumila* foliis scabridis subintegris radicalibus obovatis, caulinis ovatis oblongis, racemo nutante, pedicellis calyce duplo longioribus, siliquis erectis pedicello triplo longioribus. *Decand. regn. veg. syst. nat. II. p. 238.*

*A. scabra. All. Fl. Ped. n. 974. Decand. Fl. Franc. 4. p. 677.*

*A. bellidifolia. Crantz. Austr. 42. tab. 2. fig. 3.*

*A. nutans. Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 537. Mœnch. meth. 258. Hoffm. Fl. Germ. p. 56.*

*Levcojum* foliis radicalibus subrotundis scabris dentatis, caulinis amplexicaulibus hirsutis. *Hall. helv. n. 447.*

*Cardamine pumila Bellidisfolio alpina. Segu. Veron. 387.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 281. Sturm. Deutschl. Fl. (sub A. nutante.)*

*Germ. Niederes Gänsekraut.*

*Gall. Arabette naine.*

*Hab. In subalpinis alpinisque rupestribus Principatus superioris retro Mœskirch am Donnauthal et Stetten am Kalten - Markt,*



nec non retro *dem Weisbad am Gamor et Kasten*, ubi observavi 1814.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. 24

*Radix* ramoso - fibrosa. *Caulis* 1 - 2 - 4 - 5 uncialis, erectus, simplex, teres, glabriusculus, quandoque hispidulus, foliosus. *Folia radicalia* in rosulam digesta, obovata, integriuscula sæpe subdentata, utrinque scabra, *caulina* inferiora ovata, oblonga, superiora lineari-oblonga, sessilia, integra. *Flores* racemosi, seminiferi nutantes. *Calyx* albidus, foliolis duobus reliquis basi magis gibbis. *Petala* cuneato-obovata, subemarginata, calyce duplo longiora, alba. *Siliquæ* latiusculæ, erectæ, lineares, stylo brevi terminatæ. *Semina* orbiculata, compressa, ala cincta.

**N o t a.** *Arabin bellidifoliam* Jacqu. Fl. Austr. tab. 280. foliis utrinque glaberrimis subdentatis, racemo seminifero erecto: seu *Levcojum* foliis laevissimis rariter dentatis imis petiolatis ovatis, caulinis amplexicaulibus. Hall. helv. n. 446. hucusque in nostris alpinis et adjacentibus Abbaticellensibus frustra quaesivi.

*Arabin Halleri* foliis caulinis sublyratis rameis lanceolatis incisis. Linn. Sp. pl. 2. p. 929. seu *Sisymbrium* foliis imis Barbareae, superioribus integris dentatis. Hall. opusc. 101. tab. 1. fig. 1. prope Moguntiam a D. Koelle lectam, ibi repetitis vicibus, sed frustra quaesivi.

pag. 89. *TURRITIS hirsuta*. Linn.

*Arabis sagittata et hirsuta*. Decand. regn. veg. syst. nat. II. p. 221. 223.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 587. (sub Turritidi hirsuta.)*

Obs. Variat in uno eodemque individuo: Foliis caulinis ovato - seu cordato - lanceolatis et cordato - sagittatis hispidis, setulis simplicibus furcatisve.

Hinc *Arabis sagittata* minime pro peculiari specie a *T. hirsuta* Linn. diversa habenda est. *Turritis hirsuta* Gerard. *Galloprov. p. 367.* in Gallia et Hispania a me observata, nullo modo diversa est a nostra seu Linnaei planta.

pag. 93. post *BRASSICAM arvensem.*

1022. \* *BRASSICA campestris* radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Linn. Sp. pl. 2. p. 931.*

B. *campestris* radice cauleque tenui, foliis cordatis acuminatis amplexicaulibus, inferioribus lyratis dentatis subhispidis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 718.*

B. *campestris* foliis polline glaucis subcarnosis, inferioribus novellis subhispidis ciliatisve lyratis dentatis, ceteris cordato-amplexicaulibus acuminatis. *Decand. regn. veg. syst. nat. II. p. 588. var. α oleracea.*

*Brassica campestris perfoliata* flore luteo. *Læs. Fl. Pruss. p. 29.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2234.*

*Germ. Kohlsat. Kolsat. Colza.*

*Gall. Colsat. Colza.*

*Hab.* In agris Angliæ, Scotiæ, Laponiæ, Smolandiæ, Hispaniæ, Transylvaniæ, Tauriæ. Colitur passim in agris, et hortis oleraceis.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. ☉

*Radix* parva, tenuis, fusiformis, fibrosa, albida. *Caulis* 2-3 pedalis et altior, erectus, teres, glaber, glaucescens, foliosus, ramosus. *Folia* radicalia, infimaque lyrata, repanda, dentata, subtus ad venas hispida, reliqua alterna, cordata, amplexicaulia, acuminata, integerrima, lævia, omnia glaucescentia. *Calycina* foliola patentiuscula. *Petala* lutea. *Siliquæ* erectæ, ex tereti obsolete quadrangulæ, subtorulosæ, venoso-reticulatæ, 2-3 uncias longæ, polyspermæ.

*Nota.* Planta persaepe a botanicis et oeconomis cum *Brassica Napus* confunditur.

Seritur semen primo vere in agris bene cultis arenosis, tunc Julio, Augusto floret et Septembri semina maturat. Haec vulgo denominatur Früher Kolsat, Sommer-Kolsat. Aut seritur autumno, tunc sequenti Aprili et Majo floret et Junio semina maturat, haec Winter-Kolsat audit, et hujus cultura praefertur.

Ex seminibus, bonae notae oleum unguinosum pressione obtinetur. Flores melliferi, apibus accepti. Planta adhuc tenella, oleracea.

pag. 94. *BRASSICA Napus.*

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 2146.

pag. 97.

1026. *BRASSICA Erucastrum.* Linn.  
*Sp. pl.* 2. p. 932.

Deleatur synonymon *Pollichii*, quod ad *Sisymbrium Monense* Linn. pertinet. Deleatur porro *Icon Bulliardi herb. tab. 551.* quæ ad Brassicam *Erucam* spontaneam seu campestram pertinet.

Ad Brassicam *Erucastrum* Linn. l. c. pertinent synonyma sequentia certa et indubitata.

*Sisymbrium Erucastrum.* Poll. Fl. Pal. n. 628.

*Sisymbrium obtusangulum* foliis pinnatifidis obtusis dentatis amplexicaulibus, caule retrorsum hispidis. Willd. Linn. Sp. pl. 3. 504. Decand. regn. veg. syst. nat. II. p. 465.

*Erysimum Erucastrum.* Scop. Fl. Carn. ed. 2. p. 27. n. 827. Roth. Fl. Germ. 2. p. 104.

*Eruca* caule hirta, foliis hirsutis semipinnatis, pinnis subrotundis dentatis. Hall. helv. n. 459! (excl. Columnæ et *Boccone synonymis.*)

*Eruca inodora.* Joh. Bauh. hist. II. p. 862. Icon. (bona.)

*Eruca sylvestris.* Tabernæmont. p. 837. Icon (optima.) Camerar. Epit. p. 307. Icon. Lobel. p. 204. Icon. Dodon. Pempt. p. 696. Icon. (bona.)

*Eruca sylvestris major lutea*, caule aspero. Bauh. pin. 98. Mapp. Alsat. p. 101.

**Hab.** Circa *Carlsruhe* retro *Dachsland* in ruderatis ad agrorum margines auf dem



*Rheindamm* copiose. Prope *Ettlingen*, *Durlach*, *Grötzingen*, *Pforzheim*, *Weingarten*. In aggeribus ad vias prope *Ladenburg*, in vineis prope *Weinheim*, *Lauterbach* et *Benzheim*, in vinearum collibus siccis et humidioribus circa *Dürkheim*, in agris prope *dem Holzhof*, *Frankenthal*, *Worms*, *Oppenheim*, *Alzey*, *Niederulm*, *Mainz* et alibi passim frequens. In agris inter *Lichtenau* et *Kehl*, inter *Kehl* et *Goldschier*, in vineis prope *Lahr*, prope *Mahlberg*, in agris et vineis Brisgoviae *am Kaiserstuhl* versus rhenum, prope *Altbreisach*, *Burgheim*, *Achkarn*, *Bückensohl* et alibi frequens. Circa Basileam ad rhenum circa *Neudorf*, inter *Klein-Hünningen* et *Binzen* ad Wiesæ fluvium; prope *Arlesheim*, in agris et vineis frequens. In Alsatia inter *Kehl* et Argentinam inter *dem Rheinzoll* et *der Citadell*, in *der Ruprechtsau an den Rhein-Wörten*, post *Mappum* vidi.

**Nota.** Joh. Bauhinus l. c. citat plantam suam ad montem Kaiserstuhl Brisgoviae, prope Burkheim, ubi adhuc hodie in agris et vineis copiose obvenit.

*Brassica Erucastrum* foliis runcinatis subglabris, lobis inaequalibus obtuse sinuatis caule basi hispido. Decand. regn. veg. syst. nat. II. p. 600, non ad Linnaei plantam, sed omnino ad *Brassicam Erucam* spontaneam seu campestem pertinet. Sic sub *Brassica Erucastro*. Murray. Linn. Syst. veg. p. 601. Willd. Linn. Sp. pl. 3. 351. ut ex synonymis a Cl. Willdenovio allegatis patet *Brassicam Erucastrum Pollichii* seu *Sisymbrium Monense* Linnaei et *Brassicam Erucastrum*

rum Linnaei, nec non Brassicam Erucam spontaneam seu campestram, non cultam seu sativam comprehendebat.

Brassica Erucastrum Linn. differt a B. Erucastro Pollichii seu Sisymbrio Monensi Linn. Calyce hiantе nec clauso. Corollis pallescente luteis, multo minoribus. Caule ramosiori, hispidiori.

1926.\* BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 932.

B. *Eruca* foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris, rostro compresso articulato. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. Vol. IV. p.* 124.

*Sisymbrium* foliis pinnatifidis, laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto. *Linn. Hort. Cliff.* 337.

*Eruca sativa* foliis lyrato-pinnati-partitis, lobis dentatis acutis, caule hirsuto, pedicellis calyce deciduo brevioribus. *Decand. regn. veg. syst. nat. II. p.* 637.

*Eruca sativa.* *Dodon. Pempt. p.* 696. *Icon.*

*Eruca latifolia alba*: sativa Dioscoridis, *Bauh. pin.* 98.

*Eruca major sativa annua*, flore albo striato, *Joh. Bauh. hist. 2. p.* 859. *Icon.*

*Sinapis* alterum genus. *Fuchs. hist.* 539. *Icon.*

*Icon. Bulliard. herb. tab.* 313. *Regn. bot.*

*Blackw. tab. 242. Schkuhr. bot. Handb. tab. 186.*

*Germ. Gartenrauke. Zahme Rauke.*

*Gall. La Roquette de jardins.*

*Hab.* In Europa australi, Gallia meridionali Hispania, Lusitania, Italia. Colitur passim in hortis oleraceis.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. ☉

*Radix* tenuis, fusiformis, fibrosa, albida. *Caulis* 2-3 pedalis, erectus, striato-angulatus, ramosus, plus minusve hirsutus. *Folia* lyrata, subruncinata, glabra, laciniis exterioribus dentatis, acutis, læte aut ex glauco-viridibus. *Flores* terminales, racemosi. *Corollæ* petala majuscula, albida aut ex lutescenti-albida, venis fusconigricantibus reticulata. *Siliqua* ovali-oblonga, obsolete tetragona, crecta, glabra, rarius pilosula, rostro terminata. *Semina* subrotunda.

Hæc est vera B. *Eruca* in hortis oleraceis culta, seu planta sativa. *La Roquette des jardins. Bulliard. l. c.* quæ per culturam in omnibus partibus major, minus hirsuta, sæpissime glabra, a planta spontanea minore, in arvis et ad vias Cataloniæ et in regno Valentino a me observata recedit.

*Nota.* Plantam spontaneam seu campestem depinxit optime Cl. Bulliard in herb. tab. 331. sub Brassica Erucastro Linnaei, la Roquette sauvage.

Brassica Erucastrum. Decand. regn. veg. syst. nat. II. p. 600. de qua dicit, Synonyma fere omnia dubia, icone Bulli-

ardi tab. 331. sola excepta, non ad B. Erucastrum. Linn. sed luce clarius, ad plantam spontaneam seu campestrum B. Erucæ pertinet.

Sine dubio Cl. Murräy demum in Linn. systemate vegetabilium edito, sub B. Erucastro foliis runcinatis, caule hispido, siliquis laevibus, cum Cl. Willdenovio exclus. omnibus fere synonymis allegatis, B. Erucam spontaneam comprehendebat.

Obs. Plantam B. Erucæ spontaneam, vidi in variis hispaniae arvis et campestribus omnino quammaxime polymorpham: Caulibus triuncialibus, pedalibus et altioribus, hispidis, et hirsutis pilosis. Foliis semper runcinatis lyratis, lobis inaequalibus, obtuse et acutiuscule sinuatis, majoribus et minoribus, glabris, hispidis, pilosulis et subhirsutis. Pedicellis calyce deciduo brevioribus et longioribus. Corollis albidis, saepissime albide - flavescentibus, rarius flavis, semper venis fusco - nigricantibus reticulatis. Siliquis plus minusve inflatis, glabris, hirtis et pilosis.

Eruca hispida in regno Neapolitano a Cl. Tenore in Cat. H. Neapol. citata, vix ac ne vix a nostra planta, specie diversa est.

### *Pharm. ERUCÆ Semina.*

Semina acria, rubefacientia, stimulantia, aphrodisiaca. Excitat ad venerem tardos Eruca maritos. Erucas jubeo vitare salaces. Ovid.

Herba apud Italos, Hispanos, Gallos in acetariis usurpatur. Planta omnino antiscorbutica. Laudat decoctum Erucæ in pertinaci infantum tussi, Mathiolus.

pag. 101. SINAPIS *nigra*. Linn.

*Icon. Flor. Dan. tab. 1582.*

K k 2



*Hab.* Ad Nicari fluvium prope *Hasmersheim Hochhausen, Eberbach* et alibi, nec non ad Mœnum circa *Wertheim et Miltenberg* frequens, ubi vidi 1813.

Individua numerosissima, speciosissima pulcherrima, 10-13 pedalia vidi prope *Hochhausen et Hasmersheim*.

CLASSIS XVI.  
MONADELPHIA.

---

POLYANDRIA.

ante MALVAM.

CCCXXVIII. \* LAVATERA Polygyna. Cal.  
exterior trifidus. Arilli monospermi, verticillati.

ante ALTHÆAM.

CCCXXVII. \* HIBISCUS. Monogyna. Cal.  
exterior octofidus. Caps. loculis polyspermis, coadunatis.

---

MONADELPHIA  
DECANDRIA.

---

pag. 111. ante GERANIUM phæum.

1036. \* GERANIUM *macrorrhizum*  
pedunculis bifloris, calycibus inflatis, petalis integris, pistillo longissimo, scapo dichotomo. Linn. Mant. 434. Jacqu. Collect. 1. p. 258.

G. *macrorrhizum* foliis oppositis quinquelobatis, calycibus inflatis, spæricis rubris, pistillo declinato longissimo. Cavan. Diss. p. 212.

*Batrachioides longius radiculatum*, odoratum.  
*Bauh. hist.* 5. p. 477.

*Icon. Jacqu. Icon. rar. tab.* 134. *Cavan. l.*  
*c. tab.* 85. *fig.* 1.

*Germ. Grofswurzlicher Storchenschnabel.*

*Gall. Bec à grue à racine grande.*

*Hab.* In Brisgoviae montis *Feldberg* pascua,  
 ad hospitium infra *der Steig* perraro, ubi  
 legit Studiosus philosophiae *Bausch Ann.*  
 1820.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Sep-  
 tembri matura. 2

*Radix* teres, crassiuscula, fibrosa, dura,  
 multiceps, extus fusco-purpurascens. *Caulis*  
 erectus, teres, aphyllus, spithameus, striatus,  
 villosulus, simplex. *Folia* radicalia numerosa,  
 longe petiolata, erecta, longitudine fere caulis,  
 subrotunda, quinque interdum septempalmata:  
*laciniis* cuneiformibus, inciso-dentato-serratis,  
 obtusis, villosulis. *Flores* terminales in pedunculis  
 bifloris, rubellis. *Calyces* globosi, inflati, rubri,  
 ad basin fere quinquepartiti. *Segmenta* ovata,  
 striata, aristata, villosa. *Corollæ* amœne viola-  
 ceo-rubrae, patentes, pentapetalæ. *Petala* obo-  
 vata, integerrima, calyce duplo longiora. *Sta-*  
*mina* decem, basi connata. *Stylus* prælongus,  
 purpureus, declinatus. *Stigmata* filiformia, ere-  
 cto-potentia, demum revoluta.

Planta pulchra, omnino ad novas Germaniae et  
 rarissimas Florae nostrae cives pertinet.

Exemplar descriptum, benevole mihi misit ami-  
 cissimus medicus *Frommherz*, quod differt ab  
 individuis in horto cultis, Caulibus, Foliisque mi-  
 noribus.

pag. 113. GERANIUM *sylvaticum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 121.

pag. 115. GERANIUM *palustre*.

*Hab.* Prope *Wiesloch* et *Rauhenberg* in pratis ad rivulos frequens, ubi vidi *Ann.* 1813. Circa *Wertheim* ad lacum *Hæfeldensem* et prope *Hasloch* ad rivum *Haselbach* post *D. Wibelim* vidi.

pag. 116. GERANIUM *pratense*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 440.

*Hab.* In pratis Principatus superioris ad Lacum *Bodamicum* vidi. Circa *Wertheim* in pratis ubique *t. Wibelio*.

pag. 115. GERANIUM *pyrenaicum*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 403.

## MONADELPHIA POLYANDRIA.

pag. 130. ante ALTHEAM.

### CCCXXVII.\* HIBISCUS.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1139.

*Calyx* duplex: exterior polyphyllus persistens: foliolis linearibus: interior monophyllus, cyathiformis, semiquinquefidus. *Corolla Petala* quinque subrotundo - oblonga, basi angustiora, patentia, tubo staminum inferne adnata. *Semen* subrotundum. *Stylus* filiformis, staminibus longior, superne quinquefidus. *Stigmata* capitata.



*Capsula* quinquelocularis: *dissepimentis* contrariis, duplicatis. *Semina* solitaria seu plura, ovato - reniformia.

1049.\* *HIBISCUS syriacus* foliis cuneiformi - ovatis superne inciso - dentatis, caule arboreo. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 978.

*H. syriacus* foliis cuneiformi - ovatis trilobis dentatis, calyce exteriori suboctophyllo interioris longitudine, caule arboreo. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 818.

*H. syriacus* caule fruticoso, foliis cuneiformi - ovatis trilobatis inæqualiter dentatis glabris subcoriaceis, seminibus zona hispida. *Cavan. Diss.* 3. p. 169.

*Ketmia syriaca.* *Scop. Carn. n.* 863.

*Alcea arborescens syriaca.* *Bauh. pin.* 316.

*Icon.* *Pfleger. arb. et frut. Cavan. l. c. tab.* 69. *fig. 1. Curt. Magaz.* 85.

*Germ. Syrischer Hibiscus. Syrische Alcea. Gall. Ketmia de Syrie.*

*Hab.* In Syria. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schwetzingen, Heidelberg, Bruchsal, Rohrbach, Weinheim, Mannheim, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden, Lahr, Seelbach, Zell am Hammersbach* et alibi, nec non in hortis rusticorum passim.

*Flor.* Augusto, Septembri, Octobri. *Semina* Octobri matura. ‡

*Furter* elegans, erectus, 5-6-10 pedalis. *Folia* alterna, petiolata, cuneiformi-ovata, trilobata: lobis inæqualiter dentatis, glabra, læte viridia. *Stipulæ* setaceæ. *Flores* axillares, solitarii. *Calyx* exterior suboctophyllus, *foliolis* linearibus acutis. *Corolla* campanulato-patens, alba, purpurea, violacea, flava, unguibus maculatis, ciliatis. *Capsula* ovato-acuminata. *Semina* reniformia, nigra, ambitu lanata.

Primarium praesertim auctumno hortorum decus.

Varietas floribus impletis hyemes fortiores aëgre fert.

pag. 133. *ALTHÆA hirsuta*.

*Hab.* Ad montem *Kaiserstuhl* Brisgoviae prope *Rothweil* et *Ihringen*, ubi eam 1814 vidi. Prope *Wertheim* in montosis *D. Martino*.

pag. 134. ante *MALVAM*.

### CCCXXVIII.\* L A V A T E R A.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 1133.*

*Calyx* duplex: exterior monophyllus trifidus, obtusus, brevior; *interior* semiquinquefidus, acutior, erectior. *Corolla* *Petala* quinque obcordata, plana, patentia, tubo staminum inferne affixa. *Antheræ* reniformes. *Germen* orbiculatum. *Stylus* cylindraceus, brevis. *Stigmata* plura, setosa, longitudine Styli. *Capsula* orbiculata, composita e loculamentis tot quot stigmata, bivalvibus, verticillatim inarticulatis.

circum *Receptaculum* columnare, tandem dilatentibus. *Semina* solitaria, reniformia.

1052.\* *LAVATERA arborea* caule arboreo, foliis septemangularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 972. *Cavan. Diss.* 2. p. 86. et *Diss.* 5. p. 282. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 742. *Decand. Fl. Franc. IV.* p. 854.

*Malva arborea veneta dicta parvo flore. Bauh. pin.* 315.

*Malva arborescens. Dodon. Pempt.* 653.

*Malva arborea marina nostras. Raii Syn.* 252.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 1841. *Cavan. l. c. tab.* 139. *fig.* 2.

*Germ. Baumartige Lavatere.*

*Gall. Lavatère en arbre.*

*Hab.* In Italia, Galia meridionali, Hispania, Anglia. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schwetzingen, Baden* et passim alibi in hortis.

*Flor.* Julio, Augusto, Septembri, Octobri. *Semina* Octobri, Novembri, maturat. ♂

*Caulis* arborescens, erectus, 5-6-7 pedalis, teres, crassus, glaber, ramosissimus. *Folia* alterna, sparsa, longius petiolata, cordata, subrotundo-septemangulato-lobata, subplicata, mollia, subtomentosa, septemnervia, subpedalia, saturate viridia. *Stipulae* breves, basi latae, apice acuminatae. *Flores* axillares, subterni, pedun-

culati. *Calyx* exterior maximus, foliaceus, in tres lacinias latas obtusas semipartitus: *interior* duplo minor, quinquefidus, laciniis acutis. *Corolla* campanulato - patens, uncialis et ultra, purpurascens, ungue violacea. *Petala* obcordata, striis picta. *Stylus* simplex, apice octofidus. *Stigmata* revoluta, rubescentia.

Planta speciosa, biennis, hyemes apud nos aegre fert, hinc primo anno hyeme in frigidario servanda. Verum praesertim in hortis anglicis ornamentum.

1052. \*\* *LAVATERA trimestris* caule herbaceo superne hispido scabro, foliis inferioribus subrotundo - cordatis, superioribus angulatis, summis trilobis lobo intermedio lanceolatis, pedunculis solitariis folio brevioribus. *Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 797.*

*L. trimestris* caule herbaceo scabro, foliis inferioribus subrotundis; mediis quinque-lobatis acutis; summis lobo medio longiore: fructibus orbiculo tectis. *Cavan. Diss. 2. p. 90.*

*L. trimestris* foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 974.*

*L. foliis trilobis: lacinia media productiore, caule herbaceo. Linn. Hort. Cliff. 348.*

*Icon. Jacqu. Hort. Vind. tab. 72. Curtis Magaz. 109.*

*Germ. Garten - Lavatere.*

*Gall. Lavatere à grande fleurs.*

*Hab. In Syria, Hispania, Gallia Narbonensi. Hospitatur in multis hortis cumprimis ru-*



sticorum, ex quibus passim rarius emigrat ad urbium et pagorum ruderata.

*Flor.* Augusto, Septembri. *Semina* Octobri matura. ☉

*Radix* ramoso-fibrosa, albida. *Caulis* erectus, sesquipedalis, bipedalis, teretiusculus, scaber, ramosus. *Folia* alterna, petiolata, cordata, triloba, dentato-erenata, glabra. *Stipulae* ovato-lanceolatae, ciliatae. *Flores* axillares, solitarii, pedunculati. *Pedunculi* foliis longiores. *Calyx* exterior semitrifidus, interior quinquefidus, longior. *Corolla* speciosa, subcampanulato-patens. *Petala* quinque, cuneiformi-obovata, rosea, albide striata, albaque, unque purparascentia, uncialia.

---

# CLASSIS XVII.

## DIADELPHIA

---

### DECANDRIA.

pag. 141. ante SPARTIUM.

CCCXXXI.\* AMORPHA. *Alæ Carinaque nullæ.*

pag. 141. post GENISTAM.

CCCXXXII.\* LUPINUS. *Antheræ alternæ rotundæ; alternæ oblongæ. Legumen coriaceum.*

pag. 143. ante ROBINIAM.

CCCXLIII.\* TRIGONELLA. *Vexillum Alæque patentes quasi tripetalæ. Carina minuta.*

pag. 143. post ERVUM.

CCCXLI.\* CICER. *Calycis 4 laciniae superiores, vexillo incumbentes.*

pag. 143. post CYTISUM.

CCCXLII.\* GALEGA. *Legum. lineare, striis oblique transversis.*

---

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

pag. 146. post FUMARIAM solidam.

1059.\* FUMARIA *lutea* caule ramoso  
diffuso obtusangulo, siliquis lineari-tere-  
tibus pedunculo brevioribus. *Willd. Sp.*  
*pl. 3. p. 865. — Linn. Mant. 258.*

*F. lutea* siliquis teretiusculis pedunculo bre-  
vioribus, caulibus angulatis, bracteis mi-  
natis, calcari brevissimo rotundato. *Smith*  
*Fl. Brit. 2. p. 749.*

*F. tingitana*, radice fibrosa, perennis, flore  
ex albo-flavescente, siliquis curtis. *Pluk.*  
*Phyl. tab. 90. fig. 2.*

*Corydalis lutea.* *Decand. Fl. Franc. V. p.*  
*588.*

*Capnoides lutea.* *Gært. Fruct. et Sem. pl.*  
*2. p. 163.*

*Pseudofumaria* flore luteo. *Rivin. tetrap.*  
*tab. 74.*

*Icon. Mill. illustr. tab. 60. — Sow. Engl.*  
*Bot. tab. 588.*

*Germ. Gelbblühender Erdrauch.*

*Gall. Fume terre à fleurs jaunes.*

*Hab. Prope Durlach* ad muros antiquos horti  
aulici. *Basileæ* et *Argentorati* ad muros an-  
tiquos *t. D. Nestlero.*

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Julio matura. 2

*Radix* fibrosa. *Caules* numerosi, subpedales, erecti, ramosi, trigoni, glabri, foliosi. *Folia* alterna, petiolata, triternata, glabra, glaucescentia. *Foliola* cuneata, trifida. *Racemus* subspicatus, terminalis. *Corollæ* flavæ, *Calcar* brevissimum, rotundato-incurvum. *Siliqua* tereti-oblonga.

**Nota.** Cl. Smith. ad muros antiquos citat. Nostra individua sine dubio ex hortis ad muros migrata sunt.

Casparus Bauhinus, Tabernaemontanus, Lindernius aliique, olim varias plantas exoticas, circa urbes et pagos rhenanos disseminaverunt.

pag. 146. *FUMARIA officinalis*.

*F. officinalis* specieis laxis, siliquis monospermis globosis emarginatis, caule diffuso, foliolorum laciniis dilatatis. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 750.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 589.

1060.\* *FUMARIA media* racemis elongatis, calycibus dentatis, pericarpis subglobosis subtuberculatis monospermis, caule erecto, petiolis subcirrhoso-convolutis.

*F. media* caule subramoso erecto, foliis bipinnatis, pinnis, 2-5 laciniatis, laciniis oblongis planis, petiolis subcirrhoso-convolutis, racemis elongatis oppositifoliis, calycibus dentatis, pericarpis subglobosis subtuberculatis depressiusculis monospermis. *Loisel. Fl. Gall. add. p.* 101.



*F. media.* Decand. *Fl. Franc. Vol. VI. p.*  
587.

*Fumaria major* floribus dilute purpureis.  
*Vaill. Bot. Paris.*

*Icon. Vaill. l. c. tab. 10. fig. 4.*

*Germ. Mittlerer Erdrauch.*

*Gall. Fumeterre intermediaire.*

*Hab.* In arvis et vineis prope *Durlach, Grö-  
tzingen, Berghausen*, in vineis im *Büh-  
lerthal* et passim alibi non infrequens.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura ☉

Medium omnino tenet inter *F. officinalem*  
*et capreolatam*. Differt a priori officinali: *Cau-  
libus* longioribus minus ramosis et diffusis. *Fo-  
liis* majoribus magis glaucis. *Petiolis* subcirrhoso-  
convolutis. *Floribus* semper multo majoribus; a  
sequente: *Caulibus* brevioribus, *Foliorum* la-  
ciniis angustioribus sublinearibus. *Racemis* lon-  
gioribus magis multifloris. *Calycibus* non inte-  
gris sed dentatis. *Corollis* minoribus. *Pericar-  
piis* non lævibus sed subtuberculatis.

Sine dubio a multis hucusque supervisa, aut pro  
*F. officinali* habita est.

1060. \*\* *FUMARIA capreolata* spicis  
laxis, siliquis monospermis globosis, caule  
petiolis contortis scandente, foliolis cu-  
neatis lobatis *Smith. Fl. Brit. 2. p. 751.*

*F. capreolata* pericarpiis monospermis race-  
mosis, foliis scandentibus subcirrhosis.  
*Linn. Sp. pl. 2. p. 985. — Hoffm. Fl.*  
*Germ. 248.*

F.

*F. capreolata* caule ramoso scandente, siliquis globosis monospermis, foliis triter-natis, foliolis obovato - cuneatis incis, petiolis partialibus cirrhoso - convolutis. *Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 868.*

*Fumaria viticulis et capreolis plantis vicinis adhaerens. Bauh. pin. 145.*

*Fumaria major scandens flore pallidiore. Raj. Syn. 204.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 943. Curtis Fl. Lond. tab. 47. Decand. Icon. Gall. rar. tab. 34.*

*Germ. Rankender Erdrauch.*

*Gall. Fume terre grimpante.*

*Hab. In Brisgoviae monte Kaiserstuhl prope Altbreisach in arvis nec non in vineis prope Hohentlimburg, ubi eam vidi Ann. 1814 et sequ.*

*Flor. Junio, Julio, Augusto. Semina Augusto, Septembri matura. ☉*

Affinis *F. officinali*, a qua differt: *Caulibus* longioribus saepe tripedalibus, ramosioribus. *Petiolis* longioribus cirrhoso - convolutis. *Foliolis* latioribus, minus glaucis. *Spica* racemosa laxiori, pauciflora. *Floribus* multo majoribus pallide rubellis, apice atro - sanguineis.

pag. 148. *FUMARIA parviflora.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 590.*

1061.\* *FUMARIA Vaillantii* caule ramoso erectiusculo, foliis bipinnatis, pin-

nis, 2-5-laciniatis, laciniis linearibus planis, racemis brevibus oppositifoliis, pericarpis globosis subtuberculatis monospermis. *Loiseleur Deslongchamps Flor. Gallic. Suppl. p. 102.*

*F. lobis longioribus et angustioribus sparsis. Vaill. Bot. Paris. p. 56.*

*Icon. Vaill. l. c. tab. 10. fig. 6. Sow. Engl. Bot. tab. 590. (sub. F. parviflora.)*

*Germ. Vaillants • Erdrauch.*

*Gall. Fume Terre de Mr. Vaillant.*

*Hab. Circa Carlsruhe, Mühlburg, Eckenstein, Graben et alibi in agris campisque sterilibus, sabulosis, apricis, passim frequens. In Palatinatu prope Schwetzingen et alibi.*

*Flor. Majo, Junio. Semina Julio matura. ☉*

Differt ab affini *F. parviflora*: *Caule erectiusculo. Foliorum laciniis longioribus, planis, non canaliculatis. Corollis rubellis, non albidis.*

pag. 148. *FUMARIA claviculata.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 103.*

## DIADELPHIA OCTANDRIA.

pag. 149.

## 1063. POLYGALA vulgaris. Linn.

*Nota. Quammaxime secundum loca natalia rupestris, montosa, subalpina, alpina, aprica,*

sicca, minus sicca, humidiuscula, pratensia elatiora et demissiora, uda, et uliginosa, quoad staturam, magnitudinem, foliorum radicalium et caulinorum formam, et bracteas mire variantes glabras et ciliatas corollasque majores minoresque coeruleas, cyaneas, persicinas, roseas, albas, albide-varias, ludit. Sic ex sola hac specie, facile in terris nostris Badensibus et jacentibus ultra 15 varietates conspicuae sunt.

Dignoscitur *P. vulgaris* nostra seu *Linneana* facile à *P. amara*: Radicibus semper multoties majoribus, longioribus maxime tenacibus lignosis, ramoso-fibrosis, crassioribus, ponderosioribus, fuscis, firmioribus, difficile eradicandis!

Ad *P. vulgarem* Linn. hinc suo jure (pace meritissimorum botanicorum) me judice pertinent sequentes *Cl. Reichenbachii* species:

a) *Polygala vulgaris* frutescens, foliis imis parvulis lanceolato-spathulatis, reliquis lineari-lanceolatis, sepalis lateralibus ellipticis, corollae fimbriatae aequalibus, capsula cuneato-obcordata latioribus longioribusque. *Reichenb. Iconogr. botan. Dec. 1. Tab. XXV. fig. 52. 53. cyanea et carnea.*

b) *Polygala oxyptera* frutescens, foliis imis parvulis sparsis obovatis reliquis lineari-lanceolatis, sepalis lateralibus cuneato-ellipticis acutis, corolla fimbriata brevioribus, capsula obcordata angustioribus vix longioribus. *Reichenb. l. c.*

α. *collina*: humilis caulibus simplicibus paucifloris. *Reichenb. l. c. Tab. XXIII. fig. 46.*



β. *pratensis* elata, caulibus subramosis multifloris. *Ej. l. c. tab. XXIV. fig. 47-49.*

Flore cyaneo, carneo et albo.

- c) *Polygala alpestris* frutescens, foliis imis parvulis sparsis obovato-spathulatis, reliquis lanceolatis majoribus, sepalis lateralibus cuneato-ellipticis corolla fimbriata longioribus, capsulam cuneato-obcordatam latiore subæquantibus. *Reichenb. l. c. tab. XXIII. fig. 45.*
- d. *Polygala comosa* frutescens, foliis imis parvulis sparsis obovatis, reliquis linearibus, sepalis lateralibus ellipticis capsula obcordata longioribus camque æquilatis, bracteis flores virgineos superantibus. *Reichenb. l. c. tab. XXVI. fig. 54-56. Schkuhr. bot. Handb. 2. p. 324. tab. CXCIV.*

Elore cœruleo, persicino et albo.

- e) *Polygala buxifolia* frutescens, foliis imis majoribus sparsis obovatis; superioribus linearilanceolatis, sepalis lateralibus cuneato-obovatis, corolla fimbriata brevioribus, capsula cuneato-obcordata latiore longioribus. *Reichenb. l. c.*

α. *glabra. l. c. tab. XXIV. fig. 50.*

β. *pubescens. l. c. fig. 51.*

- f) *Polygala amarella* frutescens, foliis imis maximis rosulatis obovatis acutis, sepalis lateralibus ellipticis corolla fimbriata capsulaque obcordato-oblonga longioribus latioribusque, bracteis persistentibus. *Reichenb. l. c. tab. XXII. fig. 43. 44.*

Nota. *P. buxifolia* et *P. amarella* minime pro *P. amara*, cum qua quoad folia infima

aliquatenus conveniunt habendae et in officinis pharmaceuticis ventilandae sunt. Facile ob radices multo longiores, ramoso-fibrosas, lignosas, fuscas, crassiores, difficile ex terra eradicandas, a vera *P. amara* Linnaei seu nostra, dignoscendae sunt.

pag. 150.

1065. *POLYGALA amara. Linn.*

*α. uliginosa* radice minima filiformi-subfillosa, cauliculis herbaceis pluribus, adscendentibus erectisque tenellis, foliis infimis cuneato-obovatis obtusis majoribus.

*P. uliginosa* frutescens, foliis imis maximis rosulatis obovato-subrotundis, sepalis lateralibus cuneato-ellipticis corollam fimbriatam subaequantibus, capsula obcordato-oblonga brevioribus angustioribus. *Reichenb. l. c. p. 25.*

*Icon. Reichenb. l. c. tab. XXI. fig. 40. 41.*

*β. austriaca* radice tenui filiformi-fibrosa, cauliculis adscendentibus herbaceis, tenellis, foliis inferioribus obovato-lanceolatis obtusis majoribus.

*P. austriaca* frutescens, foliis imis brevioribus rosulatis obovato-oblongis, sepalis lateralibus cuneato-ellipticis corollam fimbriatam subaequantibus, capsula obcordato-rotunda brevioribus, duplo angustioribus. *Reichenb. l. c. p. 25.*

*P. austriaca* floribus cristatis racemosis, racemis paniculatis, alis calycinis ovatis acu-

tis corollæ æqualibus, caulibus prostratis, foliis ovali-oblongis. *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 438. *Crantz. Austr.* p. 459.

*Icon.* *Reichenb. l. c. tab. XXI. fig. 39.*  
*Crantz. l. c. tab. 2. n. 4. Flor. Dan. tab.*  
 1169. (sub *P. amara.*)

*Ha b.* var.  $\alpha$ . in pratis montosis et demissioribus uliginosis passim. Inter *Wissloch* et *Rauhenberg* copiose. Circa *Heidelberg* prope *Maischbach*, et in pratis prope *dem Holzhof t. D. Dierbachio*. In pratis udis inter *Eilbach* et *Amorbach* et adjacente regione sylvæ *Odenwald*. Circa *Wertheim* in nemorosis udis in *der Leithe* prope *Alfeld* versus *Windheim*, nec non prope *Tauberbischoffsheim auf dem Kaltenbrunnen, der Herrnweise* (prope *Neuenbürg* et *dem Wildbad*) in Marggraviatu superiori in sylva *Wolfacker* prope *Müllheim* et circa *Zienken*. In Principatu Fürstenbergensi circa *Donaueschingen, Geisingen, Engen* et alibi in pratis pascuisque udis. In Principatu superiori in pascuis udis passim abunde. *Var.*  $\beta$ . in pascuis sabulosis aridis siccis circa *Carlsruhe* retro *Mühlburg* versus *Dachslan*d; in ditione Basileensi prope *Münchenstein, t. Zeyhero*.

*Varietas*  $\alpha$  uliginosa, omnium facile amarissima, est vera *P. amara* medicorum et *Linnaei* seu *P. vulgaris*, foliis circa radicem rotundioribus, flore coeruleo, sapore admodum amaro. *Bauh. pin.* 215. Radicula instructa est, minuta, filiformi, albida, sine dubio annua. Facile et semper integra plantula, cum radicula digitis evellenda, et sic tempore inflorescentiae, cum integra herba efficacissima, in officinis pharmaceuticis siccanda et asservanda est.

**Nota.** Ante triginta annos, in phasmaciis Badensibus, Würtembergensibus, Alsaticis, Helveticis aliisque, loco Polygalae amarae, semper radices praelongas, ramosas, lignosas tenacissimas, fuscas, Polygalae vulgaris vidi. In officinis pharmaceuticis Badensibus tunc veram Radicem cum herba florente P. amarae introduxi et loca natalia, aliaque signa diagnostica, medicis et pharmaceutis monstravi. Cauliculi tenuiores. Flores saepissime coerulei multo minores, quam in P. vulgari.

In var.  $\beta$ . Radiculae subfuscae, submajusculae. Folia infima justo tenuiora. Flores saepissime albi.

## DIADELPHIA DECANDRIA.

pag. 153. ante SPARTIUM.

### CCCXXXI. \* A M O R P H A.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1170.*

*Calyx* monophyllus tubulatus, cylindraceus, turbinatus: ore erecto quinquedentato, obtuso: *dentibus* superioribus duobus majoribus; persistens. *Corolla* Petalum ovatum, concavum, calyce vix majus, erectum, insertum calyci intra dentes duos majores et superiores, ad latus superius collocatum. *Filamenta* decem basi levissime coalita, erecta, inæqualia, corolla longiora. *Antheræ* simplices. *Stylus* subulatus longitudine staminum. *Stigma* simplex. *Legumen* lunulatum, reflexum, calyce majus, compressum, apice magis reflexo, uniloculare, tuberculatum. *Semina* duo oblongo-reniformia.



Obs. Ex sola corolla ab omnibus in universum plantis differt. Petalum est Vexillum, Alae et Carina deficiunt.

1066.\* *AMORPHA fruticosa* dentibus calycinis quatuor obtusis, unico acuminato. *Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 970. Willd. arb. 16.*

*A. fruticosa. Linn. Sp. pl. 2. p. 1005. Hort. Cliff. 353. Duham. arb. 1. tab. 46. Mill. Dict.*

*A. suffruticosa* foliis pinnatis sublævibus. *Walt. Carol. 179.*

Barba jovis americana, pseudo-acaciae flosculis purpureis minimis. *Anglic. hort. 11. tab. 4.*

*Icon. Pfleger arb. et frut. Schmidt arb. tab. 30. Schkuhr. bot. Handb. tab. 97. Mill. l. c. tab. 27. Linn. Hort. Cliff. tab. 19.*

*Germ. Strauchartige Unform. Strauchartiger-Bastardindig.*

*Gall. Amorpha, faux Indigo.*

*Hab. In Carolina. Hospitatur in hortis anglicis Carlsruhe, Schwetzingen, Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden, Lahr, Zell am Hamersbach etc. nec non passim in hortis rusticorum.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. Frutex.*

*Frutex elegans, 4-5 pedalis, erectus. Fo-*

*lia* sparsa, impari-pinnata. *Foliola* vesiculis pellucidis pertusis prædita. *Flores* terminales, spicato-racemosi, purpureo-violacei.

In anglia introducta per *Catesby Ann.* 1724.

pag. 154.

1066.\*\* *SPARTIUM junceum* ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 995.

*Genista juncea. Bauh. hist.* 1. p. 395. *Scop. Carn.* 2. n. 870. *Duham. arb.* 1. p. 257.

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Duham. l. c. tab.* 103.

*Germ. Binsenartige - Pfriemen.*

*Gall. Genet d'Espagne.*

*Hab.* In Gallia narbonensi, Hispania, Italia, Carniolia. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden* etc. ex quibus passim in dumeta migravit.

*Flor.* Iunio, Julio. *Semina* Augusto maturat. h

*Frutex* elegans. *Rami* elongati, glabri, juncei. *Flores* terminales, speciosi, flavi.

*Nota.* Pulcherrima specimina, 8-13 pedalia, floribus simplicibus et impletis prope *Aranjuez Castiliae Ann.* 1789 vidi.

Apud nos hyemes fortiores aegre fert.

pag. 159. post GENISTAM.

CCCXXI. \* L U P I N U S.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1176.*

*Calyx* monophyllus bifidus. *Corolla* papilionacea. *Vexillum* cordato - subrotundum, emarginatum, lateribus reflexis, compressis. *Alæ* subovatae longitudine fere vexilli, carinae non affixæ, inferne conniventes. *Carina* basi bipartita sursum falcata, acuminata, integra, longitudine alarum, angustior. *Filamenta* decem, coalita, subadscendentia superne distincta. *Antheræ* quinque subrotundæ, totidem oblongæ. *Germen* subulatum, compressum, villosum. *Stylus* subulatus, adscendens. *Stigma* terminale, obtusum. *Legumen* magnum, oblongum, coriaceum, compressum, acuminatum uniloculare. *Semina* plura, subrotunda, compressa.

1070. \* *LUPINUS albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro; inferiore tridentato. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1015. Hort. Cliff. 499. Decand. Fl. Franc. IV. p. 506.*

*Lupinus sativus* flore albo. *Bauh. pin. 347.*

*Icon. Regn. Bot. Blackw. tab. 282.*

*Germ. Weisse Lupine. Weisse Feigbohne.*

*Gall. Lupin blanc.*

*Hab.* In Oriente. Colitur passim in hortis et ad vineas.

**Flor.** Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. ☉

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caulis* erectus, sesquipedalis et altior, teres, ramosus subvillosus. *Folia* alterna petiolata, digitata. *Foliola* 5-7 oblonga, integra, sericea, mollia. *Flores* terminales verticillato - racemosi, albi. *Legumen* hirsutum. *Semina* orbiculata, compressa alba.

**Pharm. LUPINI SEMINA.**

*Semina* amariuscula, nutrientia, hodie in medicina fere exoleta.

In Catalonia et Italia saginandis bobus inserviunt. Chomel pl. usuelles. 3. p. 37.

1070. \*\* **LUPINUS varius** calycibus semiverticillatis appendiculatis: labio superiore bifido; inferiore subtridentato. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1015. *Hort. Cliff.* p. 499. *Decand. Fl. Franc.* IV. p. 507.

**L. semiverticillatus.** *Lamarck. Encycl.* 3. p. 596.

**L. sylvestris** flore coeruleo. *Bauh. pin.* 348.

**L. sylvestris** flore purpureo, semine rotundo vario. *Bauh. hist.* 2. p. 291.

**Germ.** Bunte Lupine. Bunte Feigbohne.

**Gall.** *Lupin bigarré.*

**Hab.** In Gallia meridionali, Hispania inter segetes. Colitur passim in hortis rusticorum et aliorum.

**Flor.** Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. ☉



*Radix* ramoso fibrosa. *Caulis* erectus bipedalis et altior, teres, subramosus, villosus. *Folia* alterna, petiolata, digitata. *Foliola* 5-8 lanceolata, integra. *Flores* terminales semiverticillati, rubello - cœrulescentes. *Semina* orbiculata, variegata.

1070.\*\*\* **LUPINUS** *luteus* calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore tridentato. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1015. *Hort. Cliff.* 499. *Decand. Fl. Franc.* IV. p. 508.

*Lupinus sylvestris* flore luteo. *Bauh. pin.* 348.

*Lupinus* flore luteo, semine compresso vario. *Bauh. hist.* 2. p. 291.

*Icon. Schkuhr. bot. Handb. tab.* 98.

*Germ. Gelbe Lupine. Gelbe Feigbohnen.*

*Gall. Lupin jaune.*

*Hab.* In Gallia meridionali, Hispania, Sicilia. Hospitatur in hortis et passim ad vineas.

*Flor.* Julio, Augusto, *Semina* Septembri maturata. ☉

*Flores* terminales, verticillati, lutei, suave odorati. *Bractæ* ovatæ.

pag. 161. **ONONIS** *spinosa*.

β. floribus axillaribus solitariis, leguminibus calyce longioribus.

*Ononis campestris* undique spinosa, spinis inferioribus geminis, caule erecto diffuso,

floribus axillaribus solitariis ovali-oblongis serratis, glabriusculis, stipulis cordato-ovatis acutis, leguminibus calyce longioribus. *Koch. et Ziz. Cat. Plant. Palat.*

pag. 162. *ONONIS mitis.*

β. Ramulis in planta annosiori quandoque spinescentibus, floribus solitariis subbinisque, leguminibus calyce brevioribus.

*Ononis arvensis* caule villosa, ramulis demum spinescentibus, floribus subsolitariis, foliis subsimplicibus postice integerrimis. *Smith. Fl. Angl. 2. p. 758. Koch. et Ziz. Cat. Plant. Palat.*

*Ononis spinosa.* *Poll. Fl. Pal. Roth. Fl. Germ. 2. p. 166.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 682. (sub O. arvensi.)*

pag. 164. post *ONONIDEM altissimam.*

1074.\* *ONONIS Columnae* floribus subsessilibus lateralibus, foliis ternatis oblongis pubescentibus, stipulis lanceolatis denticulatis, calycibus scariosis corolla longioribus. *Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 993.*

*Ononis Columnæ* floribus sessilibus, foliis omnibus ternatis, stipulis lanceolatis dentatis. *Allion. Fl. Pedem. 1. n. 1166.*

*Ononis parviflora.* *Lamarch. Encyl. 1. p. 510. Cavan. Icon. 2. p. 42.*

*Ononis minutissima.* *Jacqu. Fl. Austr.*

*Ononis suboculta.* Vill. Fl. Delph. 3. p. 429.

*Ononis* foliis ternatis ovatis serratis hirsutis, floribus sessilibus, calycibus hiantibus. Hall. helv. n. 359.

*Ononis lutea sylvestris minima.* Column. Ecphras. 1. p. 304. tab. 301.

*Icon.* Jacq. l. c. tab. 240. Cavan. l. c. tab. 154. fig. 1. Allion. l. c. tab. 20. fig. 3.

*Germ.* Kleine Berg-Hauhechel. Columnische Hauhechel.

*Gall.* L'Arrete bœuf de Mr. Columna.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* in *Donauthal* in rupibus calcareis prope *Werrewag*, nec non in alpinis vicinis retro *Weisbad am Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1816.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. 24

*Cauliculi* ex radice numerosi, digitales, et duplo longiores, teretes prostrati, ramosi, pubescentes. *Folia* inferiora ternata. *Foliola* ovata, dentata, striata, superiora simplicia, petiolis duplo breviora. *Stipula* amplexicaulis, petiolo adnata, bifida, subulata, dentata. *Flores* axillares, solitarii, sessiles. *Calyx* quinquepartitus, laciniis subulatis, corolla duplo triplove longioribus. *Corolla* minuta, vix conspicua, minima, lutea. *Legumen* intra calycem subglobosum, trispermum.

*Obs.* Individua nostratia in omnibus partibus similima illis, a me in Pyrenæis, nec non in Aragonia et Castilia lectis.

Plantula ex seminibus in horto botanico Carlsruhensi culta, constantissima.

pag. 166. PHASEOLUS *vulgaris*. Linn.

Ph. *vulgaris* caule volubili, racemo solitario foliis brevioribus, pedunculis geminatis, bracteis calyce minoribus patentibus, leguminibus pendulis. Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 1030.

Deleatur  $\beta$ . quæ omnino peculiaris est species.

pag. 167. post PHASEOLUM *vulgarem*.

1076.\* PHASEOLUS *coccineus* caule volubili, racemo solitario longitudine foliorum, pedunculis geminatis, bracteis calyce minoribus adpressis, leguminibus pendulis. Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 1030. (sub Ph. *multifloro*.) Schkuhr. bot. Handb. 2. p. 313. radice fusiformi.

Ph. *vulgaris*  $\beta$ . *coccineus*. Linn. Sp. pl. 2. p. 1016.

Phaseolus indicus flore coccineo seu puniceo. Moris. hist. 2. p. 69.

Icon. Schkuhr. l. c. tab. 199.

Germ. Feuerbohne. Scharlachbohne. Türkische Bohne.

Gall. Phaseole *ecárlate*.

Hab. In India orientali Colitur in hortis et ad vineas passim.

Flor. Majo, Junio. Semina Augusto Septembri matura, ☉

Flores pulcherrime coccinei.



Verum hortorum et cumprimis domuncularum hortensium ornamentum.

pag. 173. *LATHYRUS Aphaca*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1167.*

*LATHYRUS Nissolia*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 112.*

pag. 174. post *LATHYRUM Nissoliam*.

1083.\* *LATHYRUS Cicera* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis: dorso canaliculatis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1030. Scop. Carn. ed. 2. n. 891.*

*L.* foliis lanceolatis, stipulis latissimis, scapis brevibus unifloris, siliquis brevissime alatis. *Hall. hist. n. 439.*

*L.* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv. Monsp. 193.*

*L.* flore rubro. *Bauh. hist. 2. p. 507.*

*Aracus s. Cicera. Dod. Pempt. 323.*

*Germ. Rothe Platterbse.*

*Gall. Gesse Ciche.*

*Hab.* In Hispania, Gallia meridionali. Colitur passim in hortis, et agris. Prope *Wertheim* in arvis calcareo-argillaceis legit *Mertinus*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. ☉

*Radix*

*Radix* filiformi - teretiuscula, subfibrillosa, albida. *Caulis* flexuoso - erectiusculus, internodiis membranaceis, ramosus, pedalis, sesquipedalis, glaber. *Stipulae* oppositae, sagittato-lanceolatae, acuminatae, unciam longae, quinque lineas latae, laete virides. *Cirrhi* solitarii, subtrifidi. *Folia* bina, lineari-lanceolata, integra, trinervia, glabra, binas uncias longa, duas lineas vix lata. *Flores* axillares, pedunculati. *Pedunculi* solitarii, subbiunciales, uniflori. *Corollae* albae, rarius rubrae. *Legumina* deflexa compressa, dorso canaliculata. *Semina* quatuor.

1083.\*\* *LATHYRUS sativus* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque, leguminibus ovatis compressis dorso bimarginatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1030. *Scop. Carn.* n. 889.

*L.* foliis geminis, gramineis, stipulis folii latitudine, petiolis unifloris, siliquis alatis. *Hall. hist.* n. 438

*L.* anguloso semine. *Bauh. hist.* 2. p. 306.

*Germ. Weisse Platterbse.*

*Gall. Gesse cultivée. Gesse à large gousse.*

*Hab.* In Hispania, Gallia meridionali. Circa *Carlsruhe* inter segetes passim.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. ☉

Præcedenti affinis, a qua differt. *Caule* altiori cubitali. *Foliis* lanceolatis acuminatis, angustioribus, nec ellipticis. *Stipulis* multo minoribus. *Pedunculis* tenuioribus, longioribus biuncialibus, nec subsemiuncialibus. *Corollis* speciosioribus du-

plo majoribus, ochroleucis, albis, cæruleis, alboque roseo-variis, nec rubro-sanguineis. *Leguminibus* latioribus, brevioribus reticulatis, ovatis magis compressis, dorso profunde sulcato-bimarginatis.

pag. 175. *LATHYRUS hirsutus*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1255.*

β. Pedunculis unifloris. *Lathyrus hirtus. Lamarck.*

Varietatem unifloram vidi in Brisgoviae segetibus promiscue.

Non pro peculiari specie habenda est.

pag. 175. ante *LATHYRUM hirsutum*.

1083\*\*\* *LATHYRUS odoratus* pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1032. Hort. Cliff. 368.*

*L. distoplatyphyllos hirsutus mollis magno et peramœno flore odoro. Comm. hort. 2. p. 219. tab. 80.*

*L. Zeylanicus, odorato flore amœno ex albo et rubro vario. Burm. Fl. Zeyl. 138.*

*Icon. Curtis Magaz. 60.*

*Germ. Wohlriechende Platterbse.*

*Gall. Gesse odorante.*

*Hab. In Sicilia, Zeylona. Hospitatur in hortis et ad vinearum marginalia passim.*

*Flor. Julio, Augusto, Septembri. Semina Septembri, Octobri matura. ☉*

Flores pulchri suaviter odorati.

pag. 178. *LATHYRUS sylvestris*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 805.

pag. 179. *LATHYRUS latifolius*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 1108.

pag. 180. *LATHYRUS palustris*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 169.

pag. 182. *VICIA pisiformis*.

*Hab.* Prope *Wertheim* ad montem *Kalmut t. Wibelio*.

pag. 183. *VICIA dumetorum*.

*Hab.* In Principatu Badensi in sylva montosa prope *Nufsloch* cum amicissimo *Mærcklino* vidi, ubi perraro. In Principatu Fürstenbergensi inter *Engen et Griechenthal* frequens: ubi eam vidi 1814. sq.

Descriptio emendanda: *Foliolis 7-9. Stipulis parvis incisso-dentatis.*

pag. 184. *VICIA sylvatica*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 79.

*Hab.* In Principatu Badensi circa *Heidelberg* prope *dem Haarlas*, ubi specimina quædam vidit mertissimus *D. Dierbach*.

pag. 192. *VICIA Lathyroides*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 30.

*Hab.* Circa *Schwetzingen* versus *Seckenheim*, ubi vidit *D. Dierbach*. Prope *Wertheim* in arenosis *im Sporkert. t. D. Wibelio*.



pag. 193. *Vicia lutea*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 721.*

pag. 198. post *ERVUM Lens*.

1104.\* *ERVUM Ervilia* pedunculis subbifloris aristatis folio brevioribus, leguminibus articulatis, 3-4 spermis, pendulis, cirrho simplici brevissimo.

*E. Ervilia* germinibus undato-plicatis, foliis imparipinnatis. *Linn. Sp pl. 2. p. 1040. Leers. Fl. Herb. n. 591. — Roth. Fl. Germ. 2. p. 222. Hoffm. Fl. Germ. p. 258.*

*Ervum. Camerar. Epit. 215. — Hall. hist. n. 420. — Rivin. tetr. tab. 6.*

*Lens minor. Camerar. Epit. p. 211.*

*Vicia Ervilia* pedunculis subbifloris aristatis folio brevioribus, foliolis oblongis truncatis glabris, stipulis hastatis. *Willd. Sp. pl. 3. p. 1103.*

*Icon. Blackw. tab. 208. fig. 3.*

*Germ. Kleine Erven.*

*Gall. Ers. Alliez.*

*Hab.* In agris inter segetes passim. Circa *Carlsruhe* et alibi. Circa *Wertheim* in arvis calcareo - argillaceis, prope *Hochhausen* ad Tuberim, inter *Bettingen* et *Urphar. t. Mertino*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. ☉

*Caules* erecti, debiles, pedales, sesquipedales, et longiores ramosi, angulati, subvillosi. *Folia* alterna, petiolata, impari - quandoque sine impari pinnata: *foliis* lanceolatis, angustis, apice emarginato - retusis. *Cirrhus* simplex, minutus, recurvus. *Stipulae* ovato - lanceolatae, utrinque dentatae. *Pedunculi* alares, folio breviores, subbiflori, interdum uniflori. *Corollae* albidae pendulae. *Legumen* articulatum, glabrum, 3-4 spermum, pendulum, subunciale.

*Pharm.* ERVI Semina. OROBI Farina.

Hodie in medicina fere exoleta.

pag. 198. post ERVUM.

CCCXLI.\* C I C E R.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1189.*

*Calyx* quinquepartitus, longitudine corollae, laciniis quatuor vexillo incumbentibus: *intermediis* duabus longitudinaliter conniventibus, infima lacinia carinae subjecta. *Corolla* papilionacea. *Vexillum* planum, subrotundum, majus, lateribus inflexum. *Alae* obtusae, vexillo dimidio breviores. *Carina* alis brevior, acutiuscula. *Filamenta* diadelpha. *Stylus* simplex assurgens. *Stigma* obtusum. *Legumen* rhomboidale, turgidum, inflatum. *Semina* duo, subrotunda, lateribus nodoso - gibba, apice inflexo-curva.

1104. \*\* *CICER arietinum* foliolis serratis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1040. — *Hall. hist. n.* 399.

*Cicer sativum.* *Bauh. pin.* 347. *Camerar. Epit. p.* 204. *Icon.*

*Cicer I. Tabernæmont. p.* 885. *Icon.*

*Icon. Regnault. Bot. — Blackw. tab.* 557. — *Schkuhr. bot. Hadb. tab.* 202.

*Germ. Kichern. Französischer Caffée.*

*Gall. Ciche tête de Belier. Pois-chiche. Garvance. Cofé françois.*

*Hab.* Inter Orientis, Hispaniæ, Italiæ segetes. Colitur passim in hortis, rarius hucusque in agris.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Septembri matura. ☉

*Caulis* sesquipedalis, bipedalis, erectus, ramosus, angulosus, villosus. *Folia* impari-pinnata, foliolis ovalibus, serratis, villosulis. *Flores* axillares, pedunculati. *Pedunculi* uniflori. *Corolla* alba, aut purpureo-violacea. *Legumen* breve, inflatum, hirsutum, bispermum. *Semina* alba, in varietate rubella.

*Pharm. CICERIS Semina alba, rubra.*

Hodie in medicina fere exoleta, *Semina* bonum et acceptum alimentum praebeant; hispanis Garra-vanços dicta, pro cibo quotidiano notissima.

*Semina* tosta, in quibusdam Galliae et Germaniae regionibus, Caffee loco adhibent.

Ex villis totius plantae in regionibus calidioribus venit liquor viscidulus, acidus: acidum oxalicum secundum Cl. Deyeux.

pag. 199. ante *CYTISUM nigricantem* inseratur.

1105.\* *CYTISUS Laburnum* racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1041. — *Hall. hist. n.* 360. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 258. — *Roth. Fl.* 2. p. 222. *Willd. arb.* 93. *Anagyris* non foetida maior et minor alpina. *Bauh. pin.* 391.

*Laburnum* arbor trifolia anagyridi similis. *Bauh. hist.* 1. p. 361.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 308. *Schkuhr. bot. Handb. tab.* 203. *Pfleger. arb.*

*Germ.* *Bohnenbaum. Alpen-Ebenholz. Geisklee.*

*Gall.* *Cytise aubour. Faux Ébénier. Cytise des alpes.*

*Hab.* In helvetiæ alpinis præsertim' occidentilibus. Hospitatur in hortis passim rusticorum. *Auf der Favorite*, in hortis Carlsruhensibus et Schwetzingensibus copiose.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri, Octobri matura. ‡

*Arbor* mediocris, 15-25 pedalis, cortice glabro viridescenti. *Rami* alterni. *Folia* alterna, petiolata, ternata. *Foliola* ovali-oblonga, acutiuscula, integerrima, superne læte viridia, inferne pallida, subpubescentia, subsericea. *Flores* racemosi. *Racemi* penduli, simplices, speciosi, semipedales, pedales et longiores. *Corollæ* speciosæ, luteæ. *Legumina* compressa, linearilanceolata, utrinque acuta, subsericea. *Semina* reniformia, atro-fusca.



Flores primum in hortis arbustisque decus. Lignum perdurum, flavescens cum venis obscurioribus, ad clavos ligneos, et instrumenta musica exquisitum.

Legumina et semina quammaxime deleteria, drastica, vomitum omnino cient ad flagitium usque. Cocta et ingurgitata à familia quadam in Palatinatu Badensi in Annonae caritate Anni memorabilis 1816, pessima signa veneni pronunciabant: tormina, singultus, alvi dejectiones vomitusque vehementes, anxietates, ardorem, sitim vehementem, sudores. Salus demum fuit in potu Cafféae saturato, repetito.

1105. \*\* *CYTISUS sessilifolius* racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floralibus sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1041. — *Willd. Arb.* 95.

C. foliis sæpius sessilibus, calycibus squamula triplici auctis. *Linn. Hort. Cliff.* 355.

C. glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis. *Bauh. pin.* p. 390.

*Icon. Pfleger. arb. et frut.*

*Germ. Italienischer Bohnenbaum.*

*Gall. Cytise à févilles sessiles. Trifolium des Jardiniers.*

*Hab.* In Principatu superiori in sylvis inter *Radolfzell et Constanz* frequens. Hospitatur in hortis anglicis et arbustis.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri maturatione. ‡

*Frutex* 4-7 pedalis, erectus, valde ramosus, glaber. *Folia* numerosa, superiora sessilia, ternata, integra, subrotunda, glabra, saturate

viridia. *Flores* racemosi. *Racemi* terminales, erecti, 3-4-5 flori. *Corollæ* luteæ. *Calyces* bractea triplici foliacea suffulti. *Legumina* oblonga, glabra.

pag. 201.

1106\* *ROBINIA viscosa* racemis axillaribus ovatis, erectis, foliis imparipinnatis, ramis viscoso-glandulosis. *Ventenat. Hort. Cels.* 4. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1131.

*Icon. Hort. Cels. tab.* 4.

*Germ. Klebrige Robinie.*

*Gall. Robinie visqueux.*

*Hab.* In Carolinæ montibus. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Heidelberg, Bruchsal, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden, Lahr, Zell am Hammersbach* et alibi.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri matura. †

Differt a *R. Pseudacacia*: *Ramis* semper viscoso-glandulosis. *Floribus* vix odoratis, albide-carneis,

Introducta in hortum aulicum *Carlsruhe* per divum *Carolus Friedericus* Ann. 1803.

1106.\*\* *ROBINIA umbraculifera* arborea, ramis copiosissimis umbraculiferis, inermibus, foliis imparipinnatis.

*R. umbraculifera. Decand.*

*Germ. Kugelacacia.*

*Gall. Acacia touffu.*

*Hab.* . . . . Hospitatur in hortis anglicis aliisque passim frequens. Circa *Carlsruhe, Schwetzingen, Mannheim, Heidelberg, Durlach, Ettlingen, Rothenfels, Baden, Lahr, Zell am Hammersbach* et alibi. †

Pulcherrima arbor. *Rami* inermes, multo tenuiores et copiosiores, quam in *Robinia pseudacacia* subdeclinati, foliis læte viridibus, maxime umbraculiferis præditi.

Hucusque apud nos non floruit. Sine dubio peculiaris species.

Introducta in hortum aulicum Carlsruhensem, sub divo Carolo Friederico Ann. 1800 et ab hoc tempore, apud nos maxime evulgata.

Minime confundenda cum varietate inermi *R. pseudacaciae*.

1106. \*\*\* *ROBINIA Caragana* pedunculis simplicibus foliis abrupte pinnatis, petiolis inermibus. *Linn. Sp. pl.*

*Caragana Sibirica. Roy. Lugdunbat. 537.*

*Icon. Psleger arb et frut. Pall. Fl. Ross. tab. 42. fig. intermedia.*

*Germ. Caraganstrauch. Sibirischer Erbsenstrauch.*

*Gall. Caragane de Siberie.*

*Hab.* In Siberia. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Ettlingen, Favorite, Rothenfels, Baden, Lahr, Zell am Hammersbach* et alibi ex his passim emigrata in dumeta et sylvas.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Septembri, Octobri matura. ‡

*Frutex* mediocris. *Folia* 5-6 juga. *Flores* lutei.

pag. 202.

1107.\* *COLUTEA cruenta* foliolis obovatis emarginatis glaucis, vexilli gibbis obtusis minimis, leguminibus apice apertis, caule fruticoso. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1139. *Ait H. Kew.* 3. p. 55.

*C. orientalis* caule fruticoso, foliis imparipinnatis, pinnulis novem ovato-rotundatis emarginatis glabris glaucis, floribus sanguineis. *Cavan. Ic.* 4. p. 4.

*C. orientalis* flore sanguinei coloris, lutea macula notata. *Tourn. Cor.* 44.

*Icon.* *Cavan. l. c. tab.* 307. *Pfleger arb. et frut.*

*Germ.* Rothblühender Blasenstrauch. Orientalischer Blasenbaum.

*Gall.* Baquenotier du Levant.

*Hab.* In Hispania, Italia, Oriente. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Ettlingen, Rothenfels, Baden, Zell am Hammersbach, Lahr* et alibi, ex quibus passim in dumeta et sylvas emigrat.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri maturat. ‡

*Frutex* sæpe arbuscula. *Flores* speciosi cruenti, striati, macula lutea notati.



Introducta in hortum aulicum Carlsruhe per  
divum Carolum Friedericum Ann. 1787.

pag. 204. *CORONILLA coronata*.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi prope *Engen* in valle *Griechenthal*, non infrequens, ubi eam vidi 1810. Prope *Wertheim am Homburg* et alibi legit *Mertin* pharmacopœus.

pag. 205. *CORONILLA minima*.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* in rupibus præaltis calcareis apricis passim, ubi eam vidi 1818.

pag. 211. *HIPPOCREPIS comosa*.

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 31.

pag. 213. post *HEDYSARUM Onobrychis*.

1115. \* *HEDYSARUM coronarium*  
foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis, rectis, caule diffuso. *Linn.*  
*Sp. pl.* 2. p. 1058.

*H. coronarium* caulescens, diffusum foliis pinnatis subrotundo - ellipticis, lomenti articulis subrotundis aculeatis nudis. *Willd.*  
*Sp. pl.* 3. p. 1209.

*Onobrychis* semine clypeato aspero, major.  
*Bauh. pin.* 350.

*Onobrychis altera.* *Dod. Pempt.* 549.

*Germ.* *Kronen - Hahnenkopf.* *Spanischer Süßklee, Schildklee, Sulla.*

*Gall. Sainfoin à bouquets. Sainfoin d'Espagne. Sulla de Calabre.*

*Hab.* In Calabriae et Hispaniae pratis. Colitur passim in hortis.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturatione. 24

*Caulis* diffusus, 2-3 pedalis, subramosus. *Folia* impari-pinnata. *Foliola* 7-9-11, ovata, obtusa, integra, crassiuscula, laete viridia, subtus et margine ciliata, foliolo impari reliquis majori. *Flores* racemosi. *Corollae* speciosae, amoenae rubrae, aut albæ, erectae. *Legumina* compressa, articulata, aculeata, nuda, trisperma.

In quibusdam regionibus pro pratis artificialibus hodie maxime commendabatur. Hyemes fortiores apud nos non fert. Hinc ejus cultura pro pabulo, pratisque vix suadenda est.

In regionibus calidioribus, Hispania, Italia, Gallia meridionali, passim colitur, ubi insigne pratorum decus.

pag. 213. post HEDYSARUM.

CCCXLVIII.\* G A L E G A.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 1206.*

*Calyx* monophyllus, tubulatus, brevis, semiquinquesfidus: dentibus subulatis subæqualibus. *Vexillum* majus, ovatum, apice et lateribus reflexum. *Alae* oblongae, appendice auctae, longitudine fere vexilli. *Carina* oblonga, compressa, erecta, versus apicem deorsum gibba, sursum acuta. *Filamenta* diadelphea. *Germen* tenue

oblongum. *Stylus* tenuis, germine brevior, adscendens. *Stigma* terminale punctum minimum. *Legumen* longissimum, compressum, acuminatum striis obliquis exaratum inter semina plura, oblongo-reniformia.

1115.\*\* *GALEGA officinalis* foliis pinatis, foliolis lanceolatis striatis, nudis, leguminibus strictis erectis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1062. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 261. — *Roth. Fl. Germ.* 3. p. 225.

G. foliis ellipticis, spicis et siliquis erectis. *Hall. hist. n.* 394.

*Galega vulgaris.* *Bauh. pin.* 352.

*Ruta capraria.* *Tabernæmont. p.* 409. *Icon. Icon. Schkuhr. bot. Handb. tab.* 208. — *Blackw. tab.* 92.

*Germ.* Geisraute. Ziegenraute. Fleckenkraut. Pestilenzkraut.

*Gall.* Rue de chèvre. *Lavanese.* *Galega officinale.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris prope *Schaffhausen* in monte *Randenburg t. Muralto.* Colitur passim in hortis rusticorum, nec non in pratis artificialibus.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. 4

*Radix* ramosa, fibrosa, dura. *Caules* 3-4-5 pedales, erecti, firmi. *Folia* caulina alterna, imparipinnata, *foliolis* ovato-lanceolatis, striatis, glabris, integris, mucronulo terminatis, læte

viridibus. *Flores* racemosi, axillares terminalesque. *Racemi* erecti, multiflori. *Corollæ* cœrulescentes, vel albidæ. *Legumina* stricta, erecta, glabra, compressa, linearia, acuta, striis obliquis notata.

*Pharm. GALEGÆ Herba.*

Olim in peste, petechiis, morsuris celebrata hodie fere exoleta. Pro pratis artificialibus earum cultura commendanda. Bonum, sapidum et acceptum pecoribus papulum præbet. Flores apibus mella concedunt.

pag. 214. ASTRAGALUS *glycyphyllos*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 203.*

pag. 215. ASTRAGALUS *Cicer*.

*Hab.* In Palatinatu trans rhenum prope *Frankenthal*. Circa *Wertheim* ad margines agrorum prope *Uettingen* post *Wibelium* vidi.

pag. 216. ASTRAGALUS *arenarius*.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 274. (sub A. hypoglotide.)*

*Hab.* In arenosis sterilibus inter *Schwetzingen* et *Ketsch*, ubi eam vidi 1813.

pag. 217. post ASTRAGALUM *arenarium*.

1118. \* ASTRAGALUS *Onobrychis*  
caulescens, diffusus, pedunculis spicatis,  
vexillis flore duplo longioribus. *Linn.*  
*Sp. pl. 2. p. 1070. Hoffm. Fl. Germ.*  
*p. 262. Roth. Fl. Germ. 2. p. 190.*  
*Jacqu. Fl. Austr.*



*Astragalus caulescens adscendens, vexillis corollæ elongatis linearibus emarginatis. Pall. Astrag. p. 27. n. 31.*

*Astragalus caule suberecto ramoso, foliis linearibus sericeis, vexillis longissimis. Hall. helv. n. 412.*

*Onobrychis spicata flore purpureo. Bauh. pin. 350.*

*Onobrychis Clusii I. Tabernæmont. p. 899. Icon.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 38.*

*Germ. Langfahniger Astragalus.*

*Gall. Astragale à longe vexille.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia in agro Abbatis cellensi retro *dem Weisbad*, in pascuis *am Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. ♀

*Radix* ramosa, fibrosa, dura muliticeps fusca. *Caules* adscendentes, pedales et sublongiores, teretes, ramosi, hispiduli. *Folia* alterna, pinnata: pinnæ ovatae lanceolatae integerrimæ, villosæ. *Stipula* solitaria, amplexicaulis, bifida. *Pedunculi* alares prælongi, in spicam, ovatam, densam terminati. *Flores* purpureo-violacei. *Vexillum* alis duplo longius, obtusum rectum. *Legumina* erecta, ovata, acuta, subinflata, villosa-sericea.

Pulchra omnino planta, capris et pecoribus accepta.

1118.\*\* *ASTRAGALUS alpinus* caulescens, procumbens, floribus pendulis racemosis, leguminibus utrinque acutis pilosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1070. *Jacqu. Collect.* 1.

*Astragalus* pedunculis folio longioribus, floribus laxè spicatis pendulis. *Linn. Hort. Cliff.* 362.

*Astragalus* caule procumbente ramoso, foliis ovatis, siliquis inflatis, pendulis, hirsutis. *Hall. helv. n.* 404.

*Astragalus alpinus minimus.* *Linn. Fl. Lapp.* 267. *tab.* 9. *fig.* 1.

*Astragalus alpinus folio viciæ.* *Scheuchz. alp.* 509. *fig.* 7.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 51.

*Germ. Alpen - Astragalus.*

*Gall. Astragale des alpes.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia in agro Abbatis cellensi, *auf dem Kasten et Sentis* in pascuis asperis, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4

*Radix* ramosa, dura, multiceps. *Cauliculi* biunciales, digitales, palmares, et altiores, procumbentes, pubescentes, laxè foliosi. *Folia* alterna, pinnata. *Pinnæ* ovatæ, obtusæ, hirsutæ. *Stipulæ* ovato-lanceolatae, oppositæ. *Pedunculi* alares foliis longiores, pubescentes, *Racemo* subcapitato brevi terminati. *Flores* speciosi,

cœrulescentes. *Vexillum* longitudine carinæ, reflexum, emarginatum. *Alæ* breves, angustæ, strictæ, hamatæ, albidæ. *Carina* albida, rostro lato, obtuso, cœruleo. *Legumina* pendula, curva, hirsuta, nigra.

1118.\*\*\* *ASTRAGALUS pilosus* caulescens erectus, pilosus, foliolis lanceolatis acutis, stipulis lanceolatis, spicis pedunculatis folio longioribus, leguminibus subulatis pilosis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1262.

*Astragalus pilosus* caulescens erectus, pilosus, floribus spicatis, leguminibus subulatis pilosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1065. *Roth. Fl. Germ.* p. 190. — *Hoffm. Fl. Germ.* 262.

*Astragalus* caule erecto ramoso ex alis spicifero, siliquis teretibus. *Hall. hist. n.* 411.

*Oxytropis pilosa.* *Pers. Synops. Sprengel. Fl. Halens.* p. 207.

*Cicer montanum lanuginosum erectum.* *Bauh. pin.* 347. *Prodr.* 148.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 51.

*Germ. Haariger Astragalus.*

*Gall. Astragale vêlu.*

*Hab.* In Palatinatu transrhenano in collibus graminosis *t. D. Kochio.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* ramosa, longa, lignosa. *Caulis* palmaris, pedalis et altior, erectus, teres, hirsutus,

ramosus. *Folia* pinnata, 10-12 juga. *Foliola* elliptico-lanceolata, integra, pubescente-pilosula. *Stipulae* laevae, lanceolatae. *Spicae* axillares, pedunculatae, densae, erectae. *Calyces* albi, hirsuti. *Corollae* ochroleucae. *Legumina* subcylindrica, subulata, erecta, albicantia, sericea, polysperma.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet.

pag. 218.

1118. \*\*\*\* **ASTRAGALUS** *baeticus*

caulescens, procumbens, foliolis oblongis obtusis mucronatis, spicis pedunculatis paucifloris foliis brevioribus, leguminibus triquetris oblongis apice aduncis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1281.

- A. *baeticus* caulescens, procumbens, spicis pedunculatis, leguminibus prismaticis rectis triquetris, apice uncinatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1068.

*Germ. Caffée - Astragal. Spanischer Astragal.*

*Gall. Astragale d'Espagne.*

*Hab.* In Hispania, Lusitania, Sicilia, Tauria. Colitur passim in hortis et agris *Carlsruhe, Ettlingen, Durlach* et alibi.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

Colitur ob semina, quae à quibusdam Caffeeae seminibus substituuntur. Planta pecoribus accepta.

pag. 218. TRIFOLIUM *M. officinalis*.

*Melilotus officinalis* leguminibus racemosis



nudis dispermis subrugosis ovatis subcompressis acutis, stipulis subulatis, caule erecto. *Willd. Enum. p. 790. (floribus luteis.)*

*Icon. Sturm. Kleearten.*

*var. β. floribus albis.*

*Melilotus vulgaris* leguminibus racemosis undis monospermis rugosis obovatis acutis, stipulis setaceis, caule erecto. *Willd. Enum. p. 790.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 1705.*

pag. 219. TRIFOLIUM *M. altissimum* meum, nunc duas distinctas species constituit. Varietas mea floribus luteis audit.

## 1120. TRIFOLIUM *M. dentata.*

*Melilotus dentata* leguminibus racemosis nudis dispermis subrugosis acutiusculis, stipulis basi dentatis, caule erecto. *Willd. Enum. p. 790. Waldst. et Kit. pl. Hung.*

*Icon. Waldst. et Kitaibl. plant rar. Hung. tab. 42. Sturm Kleearten.*

Varietas mea floribus albis nunc audit:

## 1120.\* TRIFOLIUM *M. Petitpierreana* leguminibus racemosis nudis monospermis rugosis obovatis, stipulis setaceis, caule adscendente. *Willd. Enum. p. 790.*

*Nota. Melilotus Kochiana. Willd. Enum. p. 290. vix ac ne vix diversa est a M. den-*

tata, quae omnino mox caulibus erectis mox subadscendentibus obvenit.

1120. \*\* TRIFOLIUM *M. coerulea*

racemis oblongis pedunculatis, leguminibus ventricosis seminudis, dispermis mucronatis, caule erecto, stipulis lanceolatis membranaceis. *Willd. Enum. p. 789. (sub Meliloto.) Linn. Sp. pl. 2. p. 1077.*

*Lotus hortensis odorata. Bauh. pin. 331.*

*Lotus hortensis. Tabernæmont. Kräuterb. p. 896. Icon.*

*Lotus sylvestris. Camerar. Epit. p. 894. Icon.*

*Icon. Sturm Kleearten. Deutschl. von Schreiber und Hoppé. Blackw. tab. 284.*

*Germ. Blauer Steinklee. Schabziegerklee. Siebenzeit.*

*Gall. Melilot à fleurs bleu.*

*Hab. In Bohemia. Colitur passim in hortis et campis prope Ettlingen et alibi.*

*Flor. Junio, Julio, Augusto. Semina Augusto, Septembri matura. ☉*

*Radix fibrosa, albida. Caulis 2-3-4 pedalis, erectus, angulatus, striatus, glaber, ramosus. Folia alterna, petiolata, ternata. Foliola læte viridia, ovata, margine crenulata. Stipulae lanceolatae, membranaceae. Flores spicato-racemosi, subcapitati. Corollae coeruleae. Legumina ventricosa, disperma, mucronata.*

Planta siccata maxime odorata, ad caseum Schabzieger helvetis et nostratibus notum, sumitur. Herba recens et siccata pecoribus bonum acceptum et sa-

pidum pabulum praebet. Flores apibus mel concedunt.

pag. 221. *TRIFOLIUM hybridum*.

*Icon. Sturm. l. c. Flor. Dan. tab. 1706.*

pag. 222. *TRIFOLIUM repens*.

*Icon. Sturm. l. c.*

pag. 223. post *TRIFOLIUM repens*.

**1122.\*** *TRIFOLIUM alpinum* capitulis umbellaribus, scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1083.*

*Trifolium scapis radicatis, floribus racemosis, foliis lanceolatis nervosis. Hall. helv. n. 369.*

*Trifolium alpinum magno flore radice dulci. Bauh. pin. 328. Prodr. 143.*

*Icon. Sturm. l. c.*

*Germ. Alpenklee.*

*Gall. Trefle des alpes.*

*Hab. In vicina Principatus superioris helvetia, retro dem Weisbad ad montem Gamor, Kasten et Sentis, ubi eam vidi 1818.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 24*

Tota glabra. *Scapus* digitalis, et altior, erectus. *Folia* radicalia ternata. *Foliola* angusta, lineari-lanceolata, integra, læte viridia. *Flores* terminales, capitato-umbellati, speciosi, purpurascente-incarnati. *Legumina* disperma, pendula.

pag. 223. *TRIFOLIUM rubens.*

*Icon. Sturm. l. c.*

*Hab.* In Palatinatu Badensi retro *Eberbach* auf dem *Katzenbuckel* non infrequens, ubi eam vidi 1813. Circa *Wertheim* ad dumeta am *Watzenberg* ad montem *Wartenberg* et alibi t. D. *Wibelio*.

pag. 224. *TRIFOLIUM alpestre.*

*Icon. Sturm. l. c.*

pag. 225. *TRIFOLIUM medium.*

*Icon. Sow Engl. Bot. tab. 190. Sturm. l. c.*

pag. 226. *TRIEOLIUM pratense.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1770. Sturm. l. c. cum T. pratensi sativo.*

pag. 228. *TRIFOLIUM ochroleucum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1221. Sturm. l. c.*

pag. 229. *TRIFOLIUM arvense.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 944. Sturm. l. c.*

pag. 231. *TRIFOLIUM scabrum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 903. Sturm. l. c.*

pag. 232. *TRIFOLIUM striatum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1843. Sturm. l. c.*

pag. 233. *TRIFOLIUM fragiferum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1050. Sturm. l. c.*



pag. 234. *TRIFOLIUM montanum.*

*Icon. Sturm. l. c.*

pag. 235. *TRIFOLIUM spadiceum.*

*Icon. Sturm. l. c.*

*Hab.* In pratis montosis prope *Wertheim t. Wibelio.*

pag. 237. *TRIFOLIUM campestre.*

*Trifolium agrarium. Schreb. ap. Sturm. l. c.*

*Icon. Sturm. l. c.*

pag. 238. *TRIFOLIUM agrarium. Poll. Fl. Pal.*

*Trifolium campestre. Schreb. ap. Sturm. l. c.*

*Trifolium procumbens. Schmith. Fl. Brit. 2. p. 792.*

*Icon. Sturm. l. c. Sow. Engl. Bot. tab. 945. (sub procumbente.)*

pag. 240. *TRIFOLIUM pseudoprocumbens.*

*Trifolium procumbens. Linn. Sp. pl. 2. p. 1088. Schreb. ap. Sturm. l. c.*

*Icon. Sturm. l. c.*

pag. 241. *TRIFOLIUM procumbens. Poll. Deleatur Synon. Linnæi.*

*Trifolium filiforme. Linn. Smith. Fl. Brit. 2. p. 792. Schreb. ap. Sturm. l. c.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 1707. Sturm. l. c. Sow. Engl. Bot. tab. 1257. (bona.)*

β. *Trifolium filiforme* β. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 795.*

*Trifolium minus.* *Sow. Engl. Bot.*

*Icon. Sow. l. c. tab. 1256.*

pag. 245. *Lotus uliginosus.*

*Icon. Flor. Dan. tab. 1521. Sow. Engl. Bot. tab. 2091. (sub Loto majore.)*

pag. 246. post *Lotum.*

# CCCLI. \* TRIGONELLA.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n. 1213.*

*Calyx* monophyllus, campanulatus, semiquinquefidus: denticulis subulatis subæqualibus. *Corolla* papilionacea. *Vexillum* subovatum, obtusum, reflexo - patens. *Alæ* duæ, ovato - oblongæ, extorsum reflexo - patentes, ut vexillum cum alis quasi constituat corollam tripetalam regularem. *Carina* brevissima, obtusa, umbilicum floris occupans. *Filamenta* diadelpha, brevia, assurgentia. *Germen* ovato - oblongum. *Stylus* simplex. *Legumen* ovato - oblongum, compressum, tectum. *Semina* plura, subrotunda.

## II40.\* TRIGONELLA *Foenum grae-*

*cum* leguminibus sessilibus, strictis, erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1095.*

*Buceras* siliquis sessilibus arcuatis undique divergentibus. *Hall. hist. n. 379.*

*Fœnum græcum sativum.* *Bauh. pin.* 348.

*Fœnum græcum.* *Fuchs. hist. pl.* 798. *Icon.*  
*Camerar. Epit.* 199. *Icon.*

*Icon. Blackw. tab.* 384.

*Germ. Griechisch Heu. Fœnugrec. Bockshorn.* *Bockshornkraut.*

*Gall. Fenugrec.*

*Hab.* In Hispania et Gallia meridionali. Colitur passim in hortis præsertim rusticorum, nec non in agris.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. ☉

*Radix* ramosa, fibrosa. *Caulis* sesquipedalis et altior, erectus, sulcatus, subramosus. *Folia* alterna, petiolata, ternata: *Foliola* subpedicellata, cuneiformi-obovata, obtusa, superne serrulata. *Flores* axillares, sessiles, solitarii subbinique. *Corollæ* lutescentes. *Legumina* prælonga, subtriuncialia, subfalcata, polysperma. *Semina* compresso-teretiuscula, oblonga, utrinque truncata, brunnea, glabra, punctulis excavata.

*Pharm. FOENUGRÆCI Semina.*

*Semina* peculiaris odoris fragrantia, masticata mucilaginosâ.

Apud veteres Romanos culinare fuit; parabatur cum Garo, oleo et vino. Apicius Coelius de arte coquinaria p. 159.

Apud veterinarios et rusticos quotidiana fere pro equis medicina.

*Semina* pulverisate in vitris bene clausis servanda.

pag. 250. post MEDICAGINEM lupulinam.

**1143.\* MEDICAGO denticulata** pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis utrinque planis, anfractibus binis reticulatis margine aculeatis, aculeis divergentibus, stipulis ciliatis dentatis, foliolis obovatis, dentatis. *Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 1414.*

*Germ. Gezahnter Schneckenklee.*

*Gall. Luserne denticulée.*

*Hab.* In Palatinatu Badensi in agris ad viarum marginalia prope *Seckenheim* non infrequens teste *D. Dierbach.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. ☉

*Radix* gracilis, fibrosa, albida. *Caulis* ascendens, sulcatus, debilis, glaber, sesquipedalis, bipedalis et longior, ramosus. *Rami* alterni. *Folia* longe petiola, alterna, ternata. *Foliola* cuneiformi-obovata, obtusa, sæpe emarginata, superne obsolete denticulata, mucrone terminata, tenuia, læte viridia, impari longius pedicellato. *Stipulae* laciniatae, *lacinae* subulato-ciliatae. *Flores* in pedunculis axillaribus solitariis, folio sublongioribus, racemosi. *Racemi* subquinqueflori, subcapitati. *Corollae* parvae, luteae. *Legumina* cochleata, utrinque plana, anfractibus binis reticulatis, glabris, margine aculeis divergentibus instructis.

Bonum et acceptum ovibus pabulum praebet,



Plantam pro Flora nostra omnino novam, misit amicissimus D. Dierbach Ann. 1816.

pag. 250. MEDICAGO *minima*.

*H a b.* Prope *Mühlburg*, *Neureith* in collibus sabulosis apricis. Prope *Wertheim* in arenosis *am Tännige* post *D. Wibelium* vidi.

---

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

POLYANDRIA.

pag. 252. ante *HYPERICUM quadrangulare*.

1145.\* *HYPERICUM androsaemum*  
floribus trigynis terminalibus, calycinis  
foliolis inæqualibus subrotundo-ovatis ob-  
tusis, fructibus baccatis, foliis ovatis ses-  
silibus, caule fruticoso ancipiti. *Willd.*  
*Linn. Sp. pl.* 3. p. 1446. *Linn. Sp. pl.* p.  
1102. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 800.

II. maximum: *Androsaemum vulgare* dictum.  
*Raii. Syn.* 345.

*Icon. Curtis. Fl. Lond. fasc.* 3. *tab.* 48. *Sow-  
erby. Engl. Bot. tab.* 1225. *Pfleger. arb.  
et frut.*

*Germ. Englisches Hartheu.*

*Gall. Millepertuis androsæme.*

*Hab.* In Angliæ, Galliæ Narbonensis, Italiæ hu-  
mentibus. Hospitatur in hortis Anglicis ali-  
isque *Carlsruhe, Schwetzingen, Ettlingen,  
Favorite, Baden, Rothenfels, Lahr, Zell  
am Hammersbach* etc.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Octobri ma-  
turat. *Suffrutex.*

*Caules* suffruticosi, erecti, sesquipedales et  
longiores, ramosi, subancipites, glabri. *Folia*

opposita, ovata, integerrima, patentia, glabra. *Flores* terminales cymosi. *Calyces* inæquales deflexi. *Corollæ* speciosæ, luteæ. *Capsula* baccata, elliptica, trilocularis.

# 1145. \* \* HYPERICUM *proliferum*

floribus trigynis corymbosis axillaribus et terminalibus, foliis lanceolato-linearibus obtusis, caule ancipiti fruticoso. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1453. — *Linn. Mant.* 106.

*H.* *Kalmianum* floribus trigynis, caule fruticoso, foliis lineari-lanceolatis marginibus revolutis. *Du Roi. herbk.* 1. p. 310.

*Icon.* *Pfleger. arb. et frut.*

*Germ.* *Sprossendes Hartheu.*

*Gall.* *Millepertuis prolifere.*

*Hab.* In America septentrionali. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe*, *Schwetzingen*, *Heidelberg*, *Ettlingen*, *Favorite*, *Baden*, *Lahr*, *Zell am Hammersbach*, ex quibus passim in dumeta migravit.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturata. *Frutex.*

*Caules* fruticosi, erecti, 2-3 pedales, ancipites, glabri, rubello-purpurascens. *Folia* angusta, integra, margine revoluta, firma. *Flores* corymbosi, terminales, primordiales axillares, subsessiles. *Corollæ* luteæ. *Stamina* numerosa longitudine corollæ.

pag. 253. HYPERICUM *quadrangulare.*

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 370.

pag. 254. *HYPERICUM Leersii.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 236. (sub H. dubio.)*

pag. 257. *HYPERICUM montanum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 371.*

pag. 258. *HYPERICUM hirsutum.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1156.*

pag. 258. Post *HYPERICUM hirsutum.*

**1150.\*** *HYPERICUM elodes* floribus trigynis, caule tereti repente, foliisque villosis subrotundis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1106. Roth. Fl. Germ. 232. Hoffm. Fl. Germ. 271.*

*H. elodes* floribus trigynis, caule tereti foliisque villosis subrotundis, panicula pauciflora. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 805.*

*Hypericum tomentosum. Lobel. Icon. 400.*

*Ascyrum supinum villosum palustre. Bauh. pin. 280.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 109.*

*Germ. Sumpf - Johanniskraut.*

*Gall. Mille pertuis des marais.*

*Ha b. In Alsatiæ vogesis in paludibus spongiosis.*

*Flor. Julio, Augusto. Semina Septembri maturata. 24*

*Radix* repens, articulata, ramoso-fibrosa.  
*Caules* pedales, sesquipedales, decumbentes, ra-



dicantes, teretes, foliosi, canescente-villosi, ramosi. *Rami* oppositi. *Folia* opposita, sessilia, cordato-subrotunda vel subovata, integerrima, utrinque villosa, quinque-nervata - punctis minutissimis pellucidis notata. *Flores* terminales et laterales paniculati. *Panicula* dichotoma, pauciflora. *Calycis* foliola ovata, obtusa, nervosa, margine ciliis capitatis instructa. *Petala* citrina. *Styli* tres.

pag. 559. *HYPERICUM pulchrum*.

*Icon.* Sow. *Eng. Bot. tab.* 1227.

pag. 259. post *HYPERICUM pulchrum*.

# 1151.\* *HYPERICUM nummularium*

floribus trigynis; calycibus serrato-glandulosis, foliis cordato-orbiculatis glabris.

*Linn. Sp. pl.* 2. p. 1106.

*H. nummulariæ folio.* *Bauh. pin.* 379. *Prodr.* 130.

*H. fere orbiculato folio, floribus amplis pallide luteis, petalis in ambitu crenatis.* *Pluk. Alm.* 188.

*Androsæmum supinum saxatile, nummulariæ folio aversa rubente.* *Bocc. Mus.* 2. p. 134.

*Icon.* *Pluk. l. c. tab.* 93. *fig.* 4. *Bocc. l. c. tab.* 91.

*Germ.* Rundblättriges Johanniskraut.

*Gall.* Mille pertuis nummulaire.

*Hab.* In Vogesi rupibus t. *Buch.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 24

*Cauli-*

*Cauliculi* adscendentes, pedales, sesquipedales, teretes, glabri, albidi, simpliciusculi, quandoque subramosi. *Folia* opposita, breviter petiolata, ex cordato-orbiculata, glabra, subtus albidula, margine punctis minutis nigricantibus prædita. *Flores* terminales subfasciculati. *Calyces* obtusi, denticulis glandulosis atris marginati. *Corollæ* petala lutea. *Styli* tres.

**Nota.** Plantam pulchellam frustra hucusque in Vogesis et alpinis helvetiæ quaesivi. Individua pulcherrima in Pyrenæis vidi.

---

# CLASSIS XIX. SYNGENESEA.

---

## POLYGAMIA AEQUALIS.

pag. 261. post APARGIAM.

CCCLVII.\* THRINCIA. *Recept.* vavosum. *Pappus* difformis; marginalis membrana-multifida; centralis stipitatus plumosus. *Calyx* octangularis sub octophyllus, erectus.

pag. 263. post ONOPORDON.

CCCLXXIII.\* CYNARA. *Recept.* setosum. *Pappus* plumosus. *Corolla* flosculosa. *Calyx* squamis squarrosis canaliculatis spinosis.

pag. 263. post ARCTIUM.

CCCLXIX.\* CARTHAMUS. *Recept.* planum pilosum. *Pappus* nullus, vel paleaceus. *Cor.* flosculosa. *Cal.* squamis squarrosus foliaceis.

## POLYGAMIA SUPERFLUA.

post GNAPHALIUM.

CCCLXXXI.\* XERANTHEMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* subsetaceus. *Cal.* scariosus radio explanato.

post ASTER.

CCCLXXXVII.\* TAGETES. *Recept.* nudum.  
*Papp.* aristatus. *Cal.* monophyllus. *Radius* quinqueflorus.

post BUPHTHALMUM:

CCCXCIX.\* ZINNIA. *Recept.* paleaceum. *Papp.*  
 aristatus. *Rad.* 5-florus persistens. *Cal.* imbricatus.

SYNGEN. POLYG. AEQUALIS.

pag. 269. post. TRAGOPOGON *pratense*.

1152.\* TRAGOPOGON *orientale* calycibus corollæ radio brevioribus, foliis integris, linearibus, apice revolutis.

T. *orientale* calycibus corollæ radio brevioribus, foliis integris subundulatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1109.

Tragopogon orientale, angustifolium, flore maximo luteo. *Tournef. Cor.* 36.

Barba Hirci. *Camerar. Epit.* p. 312. *Icon.*

*Germ.* Orientalischer Bocksbart.

*Gall.* Barbe de Bouc orientale.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* zu *Stetten am Kalten-Markt*; in pascuis calcareis frequens, ubi eam vidi 1814. In Palatinatu transrhenano in pratis prope *Dürkheim t. D. Kochio et Ziz.*

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio, Augusto matura. ♂

Differt ab affini. T. *pratensi*: *Foliis* multo



angustioribus, apice in circulum revolutis. *Calyce* octophyllo basi coalito, corolla semper breviori. *Corolla* universali lutea pallidiori. *Radio* corollæ subtus luteo, nec fusco - striato.

Obs. Specimina in Principatu superiori lecta, recedunt a Palatinis: Foliis justo angustioribus, omnibus apice pulcherrime revolutis circinatis.

Planta pro Flora nostra et europaea nova,

pag. 272. *SCORZONERA humilis*. α.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi in pratis pascuisque udis *am Didisee* frequens, ubi eam vidi 1810.

pag. 274. post *SCORZONERAM hispanicam*.

1156.\* *SCORZONERA purpurea* foliis lineari - subulatis integris planis, pedunculis cylindricis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1113. *Scop. Fl. Carn.* n. 494. tab. 46. (omnino.) *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 250. (omnino.)

*S. purpurea* foliis lineari - subulatis canaliculato - triquetris, caule ramoso. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1502.

*Scorzonera* caule ramoso, tereti, foliis linearibus acuminatis, calycibus obtusiusculis. *Gmel. Fl. Sib.* 2. p. 7. tab. 2.

*Scorzonera sylvestris*, foliis angustis, flore cœruleo. *Mentz. pug. tab.* 1. fig. 1.

*Scorzonera angustifolia* elatior panonica. *Clus. hist.* 2. p. 139.

*Tragopogonis* species sive *Scorzonera* major

angustifolia, subcœruleo flore. *Joh. Bauh. hist. 2. p. 1062. Icon.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 35.*

*Germ. Purpurfarbige Haberwurz.*

*Gall. Scorzonere purpré.*

*Hab. Circa Mainz prope Mombach in siccis sabulosis t. D. Ziz.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 2*

*Caulis* erectus, pedalis, sesquipedalis et altior, teres, tenuis, glabriusculus, simplex, uniflorus, in individuis saltem nostratibus perraro superne ramo uno alterove auctus tunc 2-3 florus. *Folia radicalia* numerosa, linearia, canaliculata, angusta, lineam dimidiam vix lata, basin versus sensim attenuata, pilosa, 5-7 uncias longa. *Caulina* alterna, semiamplexicaulia, radicalibus similia, sublatiora. *Flos* terminalis, mediocris, amœne ex cœruleo-purpureus. *Calycinæ* squamæ inæquales *Corolla* universali multo breviores. *Pappus* plumosus, sessilis.

*Obs.* Specimina nostratia in omnibus partibus simillima illis, a Scopolio in Carinthiae subalpinis lecta, fere semper simplicia et uniflora sunt. Individua in Podolia et Austria lecta, superne ramo uno alterove saepe aucta sunt.

*Nota.* Synonyma ad SCORZONERAM roseam Waldst. et Kitaibl. pl. rar. hung. a Cl. Willdenowio. l. c. allegata, omnino ad S. purpuream Linn. pertinent. S. rosea differt a nostra S. purpurea: Foliis radicalibus lanceolato-linearibus, planis multo latioribus, 4-5 lineas latis, 7-8 nervatis, glabris; Caulinis duplo triplove angustioribus. Caulis saepe etiam ramosus,

ramis duobus longioribus, perraro simplex aut uniflorus.

pag. 274. *SCORZONERA laciniata*.

*Hab.* In Brisgovia ad montem *Kaiserstuhl* prope *Rothweil* et alibi passim non infrequens.

pag. 279. post *APARGIAM hispidam*.

1160.\* *APARGIA crispa* scapo nudo unifloro calyceque hirsuto, foliis runcinato-pinnatifidis hirtis, laciniis recurvis dentatis, pilis trifurcatis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1551.

*Leontodon crispum* papporum radiis stipitatis plumosis, foliis erectis pinnato-laciniatis, radice fusiformi, pilis trifurcatis. *Villars. Fl. Delph.* 3. p. 84.

*Rhagadiolus* foliis semipinnatis asperrimis. *Hall. helv. n.* 7.

Dens leonis foliis minimis hirsutis asperis. *Tournef. inst.* 469. *Mapp. Alsat.* p. 92.

*Hieracium* parvum hirsutum, caule aphylo crispum ubi siccatum. *Bauh. hist.* 2. p. 1038.

*Icon.* *Vill. l. c. tab.* 25.

*Germ.* *Krausblättrige Apargie.*

*Gall.* *Apargie à févilles crispée.*

*Hab.* In pascuis montosis *Feldberg* et *Belcher* passim, ubi vidi 1812. Circa Argentoratum in agris sterilibus versus *Illkirch.* *t. Mappo.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 4

Nimis affinis *A. hispida*, a qua mere differt: *Scapo* magis hispido. *Foliis* crispatis, magis hispidis, setis sæpissime trifurcatis.

Sine dubio varietas *A. hispida* sub qua, *Cl. Decandolle in Fl. Franc.* 4. p. 65. sub *var. γ.* allegavit.

Inter hanc et *A. hispidam* varietates intermediae prostant.

pag. 279. *APARGIA alpina*.

*Hab.* In monte *Feldberg*, *Belchen* et *Kandel*, ubi eam vidi *Ann* 1814.

pag. 282. post *APARGIAM pyrenaicam*.

1162.\* *APARGIA Taraxaci* scapis subbifloris erectis subnudis superne incrassatis, calycibus pilosis, foliis lanceolatis runcinato-dentatis glabris. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1550.

*Hieracium Taraxaci* foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subnudo unifloro, calyce hirsuto. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1125. *Lightf. Fl. Scot.* p. 435.

*Hedypnois Taraxaci* scapis subunifloris, foliis runcinato-dentatis glabris, calyce piloso. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 825. (*exclus. Gouani. synonym.*) *Villars. Fl. Delph.* 3. p. 80.

*Picris Taraxaci.* *Allion. Fl. Pedem. n.* 769.

*Picris* caule hirsuto unifloro, foliis glabris semipinnatis, calycibus hirsutissimis. *Hall. helv. n.* 27.



*Icon. Flor. Dan. tab. 1523. Allion. l. c. tab. 31. fig. 1. Sowerby Engl. Bot. tab. 1109. Vill. l. c. tab. 26.*

*Germ. Löwenzahnblättrige Apargie*

*Gall. Apargie à févilles Dent de Lion.*

*Hab.* In vicina principatus superioris helvetiae retro dem Weisbad ad montem Gamor et Kasten in locis roridis ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* præmorsa, longe fibrosa, fusco-nigra. *Scapus* digitalis, palmaris, simplex, teres, erectus, superne incrassatus setuloso-hirsutus, bracteis nonnullis linearibus, angustis, parvis, setulosis præditus, uniflorus rarius biflorus. *Folia* radicalia scapo breviora, erecta, runcinato-pinnatifida, læte viridia, glabra, quandoque sublinearia sinuato-dentata. *Calyx* piloso-setulosus, setis patentibus, nigris. *Corolla* mediocris, flava. *Pappus* sessilis, plumosus.

Planta in alpinis helvetiae et in pyrenaeis maxime polymorpha.

pag. 283. post APARGIAM.

CCCLVII.\* T H R I N C I A.

*Roth. Catalect. bot. 1. p. 97.*

*Calyx* communis ovato-oblongus, octangulus, persistens, *foliolis* lanceolatis, carinatis, æqualibus, basi calyculatus vel subimbricatus *squamis* paucioribus, brevissimis, arcte adpres-

sis. *Corolla* uniformis composita *corollulis* hermaphroditis lingulatis, oblongis, truncatis, quinque-dentatis, extus ad faucem villis longis obsessis. *Calyx fructiferus* immutatus ovato - acuminatus. *Semina* solitaria, oblonga, utrinque attenuata, angulosa, rugosa: *Disci* pappo stipitato plumoso prædita, fugacia; *radii* tot, quot calycis foliola, subincurva, calycis foliolis maxima ex parte inclusa, apice truncata, calyculo brevi, multidentato obliquo coronata, cum calyce persistentia. *Receptaculum* convexo - planiusculum alveolosum: *alveolis* coadunatis, truncatis, dentato-aristatis semine longe minoribus.

1194.\* *THRINCIA hirta* scapis adscendentibus, tenuibus, rariter setulosis, calyce glabro basi squamulis aucto, foliis lanceolatis sinuato - dentatis, setulosis, setis subsimplicibus.

*T. hirta*. Willd. *Linn. Sp. pl.* 3. p. 1554. — *Roth. Catalect. bot.* 1. p. 98.

*Leontodon hirtum* calyce lævi, foliis sinuato-dentatis scabris, seminibus rugosis, radii calyculo proprio multidentato, disci pappo plumoso coronatis. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 245.

*Leontodon hirtum* calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis: pilis simplicibus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1125. (omnino.)

*Hedypnois hirta* scapis unifloris, foliis den-

tatis scabris, calyce glabriusculo, seminibus exterioribus pappo destitutis. *Smith. Fl. Brit. 2. p. 824.*

*Leontodon hirtum* calycē toto erecto, foliis dentatis hirtis. *Leers. Herborn. n. 606.*

*Leontodon hispidum.* *Poll. Fl. Palat. n. 773. (exclus. Linn. Synon.)*

*Crepis* foliis lanceolatis dentato-sinuatis hispidis, setis subulatis, scapo unifloro. *Linn. Sp. pl. 1. p. 799.*

*Hieracium dentis leonis* folio, hirsutie asperum minus. *Bauh. Prodr. p. 63. c. fig.*

*Icon. Curtis. Fl. Lond. tab. 59. Sow. Engl. Bot. tab. 555. (Hedypnois hirta.)*

*Germ. Ausdaurende Thrincie.*

*Gall. Thrincie herissée*

*Hab.* Utrunque in pascuis aridis sabulosis sterilibus ericetisque frequens. Circa *Carlsruhe* prope *Mühlburg*, *Scheibenhart* et alibi.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. 4

*Radix* fibrosa, fasciculata. *Folia radicalia* in orbem congesta, 2-3-4 uncias longa, quatuor lineas ad semiunciam lata, lanceolata, obtusa, in petiolum attenata, sinuato-dentata, sæpe integriuscula, obiter et rarius dentata, setuloso-aspera: *setis* cinereo-albidis, simplicibus. *Scapi* ex radice, 5-7-9 et plures curvato-adscendentes, teretes, striati, tenues, digitales, palmares, semipediales et altiores, uniflori, setulis rarioribus simplicibus præditi. *Flos* ter-

minalis, ante anthesin cernuus, dein erectus. *Calycina foliola* majora erecta, 8-9-15 glabriuscula. *Corolla* universalis flava, mediocris.

Planta omnino diversa, ab *Aparpia hispida* seu *Leontodo hispidus* Linn. cum qua saepe confundebatur.

pag. 289. post *SONCHUS alpinum* inseratur.

1169.\* *SONCHUS Plumieri* pedunculis nudis, floribus paniculatis, foliis runcinatis, *Linn. Sp. pl. 2. p. 1117.*

*Sonchus* pedunculis calycibusque glabris, floribus paniculato-corymbosis, foliis runcinatis amplissimis. *Lamarck. Encycl. 3. p. 588.*

*Sonchus* caule glaberrimo, foliis runcinatis glabris, racemo laxo glaberrimo, pedunculis nudis. *Gouan. Illustr. p. 54.*

*Lactuca alpina* glabra, acanthi folio, flore magno cœruleo. *Vaill. act. 1721. p. 200. Monnier obs. 157.*

*Germ. Plumiersche Gänsedistel.*

*Gall. Laitron de M. Plumier.*

*Hab.* In Alsatiæ monte *Ballon* teste *Villarsio et Nestlero.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Sepsembri maturatione. 2

Differt a *S. alpino* nostro: *Caule* altiore, 4-5 pedali, crassiore. *Foliis* multo majoribus. *Floribus* non racemosis, sed paniculatis. *Pedunculis* nudis, non hispidis. *Corollis* triplo



majoribus, cœruleis. *Calycibus* viridibus, non pilosulis. *Pappo* non sessili, sed stipitato.

Ob Pappum stipitatum melius ad *Lactucam* pertinet.

Pulcherrima hujus individua, 5 - 6 pedalia, in *Pyrenaeis* vidi. Plantae ex seminibus ibi a me lectis, in horto botanico cultae, speciosissimae. Pappus in individuis spontaneis et cultis, omnino semper stipitatus.

pag. 293. *LACTUCA saligna.*

*Hab.* Porro inter *Bruchsal* et *Ubstadt*, ad dextram viæ publicæ, versus saxifodinas minera *Calaminari* abundantes, copiose, ubi eam legi 1815. Prope *Wertheim* inter *Salices an der Tauber. t. Wibelio.*

pag. 294. *LACTUCA perennis.*

*Hab.* Prope *Tauberbischoffsheim* in calcareis rupibus frequens, ubi eam vidi 1813. Prope *Wertheim am Walzenberg* in lapidosis, atque ad montem *Kalmut. t. D. Wibelio.*

pag. 296. *CHONDRILLA juncea.*

Varietatem maxime memorabilem foliis latioribus, observavi cum optimo *Wibelio* prope *Wertheim* in glareosis am *Sparkert. Ann. 1813.*

pag. 304. *HIERACIUM aureum.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen* prope *dem Weisbad auf dem Kasten, Gamor et Sentis* frequens, ubi vidi 1818.

pag. 306. *HIERACIUM alpinum.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris prope

*dem Weisbad* in rupibus calcareis frequens, ubi eam vidi 1818.

pag. 307. *HIERACIUM Pilosella*.

*var. β.* Foliis (scapisque) firmioribus cum calyce pilis longis obsessis. *Poll. Fl. Palat. p.* 386.

*H. Peleterianum. Merat. Fl. Paris.* 305. (*excl. Syn.*) *Decand. Fl. Franc. Vol. VI. p.* 497.

*Hab.* In siccis arenosis montosis apricis. In Palatinatu trans rhenum circa *Steinbach. t. Pollichio*.

Nimis affine *H. Pilosella*, a qua mere differt: *Scapis* subaltioribus, firmioribus. *Foliis* firmioribus, inferne magis albidis. *Corollis* maioribus. *Calycibus* pilis sericeis longioribus obsessis.

pag. 308. post *HIERACIUM Pilosellam*.

# 1185. \* *HIERACIUM brachiatum*

foliis lanceolatis basi attenuatis integerrimis, utrinque pilosis subincanis, scapo adscendente subaphyllo piloso bifido, pedunculis elongatis unifloris, stolonibus repentibus foliosis.

*H. brachiatum Bertolonii. — Decand. Fl. Franc. VI. p.* 442. 443. *in nota*.

*H. bifurcum* scapo ramoso basi subfolioso hispido, ramis elongatis paucifloris, foliis lanceolatis acutis integerrimis pilosis, subtus villosa-tomentosis, stolonibus repentibus. *March. à Biberst. Flor. Taur. Cauc. 3. p.* 532.

*Germ.* Zweyspaltiges Habichtskraut.

*Gall.* Epervier brachié.

*Hab.* In muris antiquis ad Thermas Badenses; ad ruinas arcis *Windeck*; prope *Lahr* in collibus arenoso - argillaceis, *am Kaiserstuhl* Brisgoviae in arvis sterilibus. In Alsatia circa Argentoratum versus *Illkirch* et inter *Ostheim* et *Rappelsweyher* ad vinearum muros non infrequens.

*Flor.* Majo, Junio, Julio. *Semina* Julio, Augusto matura. 24

A. H. *Pilosella* affini, facile distinguitur. *Scapis* ultra medium semper bifidis seu brachiatis, *Pedunculis* binis elongatis unifloris. *Floribus* *Pilosella* paullo minoribus. *Scapi* interdum radicem versus foliati.

pag. 317. post *HIERACIUM scorzoneraefolium*.

1192.\* *HIERACIUM flexuosum* caule erecto inferne glabro, foliis subvillosis lanceolatis acutis, radicalibus denticulatis, caulinis sessilibus subamplexicaulibus, calycibus villosis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1587. *Waldst. et Kit. pl. rar. Hung.*

*Germ.* Habichtskraut gebogenes.

*Gall.* Eperviere à tige flexueuse.

*Hab.* In ditione Basileensi in petris calcareis prope *Dornach* *Ann.* 1814 a me lecta.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri matura. 24

*Caulis* simplex, erecto-flexuosus, teres, striatus inferne glabriusculus, superne pilosulus, pedalis et subaltior. *Folia* radicalia numerosa, sessilia, lanceolata, acuta, glaucescentia, rariter et minute denticulata, pilis raris vagis instructa, plana, duas uncias longa, semiunciam vix lata; *caulina* alterna, subamplexicaulia, ovato-lanceolata, integra, erecta, margine cano-pilosa, semiunciam ad unciam longa, 1 - 2 lineas lata. *Flos* subsolitarius, terminalis, magnitudine fere *H. murorum*, flavus, siccitate non viridescens. *Calycinæ* squamæ pilosissimæ, pilis albide-canescentibus.

pag. 322. *HIERACIUM Lachenalii.*

*Hab.* In Brisgovia prope *Lehen et Betzenhausen am Schönberg* et in adjacentibus regionibus montis *Feldberg t. D. Spennero.*

pag. 323. post *HIERACIUM Lachenalii.*

1197.\* *HIERACIUM Mertini* caule erecto pubescente - villosa, folioso, superne ramoso - paniculato, foliis radicalibus caulisque petiolatis late lanceolatis, acuminatis, a basi ad medium profunde inciso-dentatis, ciliatis, supremis sessilibus.

*Germ.* *Mertinisches Habichtskraut.*

*Gall.* *Epervière de Mr. Mertin.*

*Hab.* Circa *Wertheim* in sylva *Kammerwald, t. Martino.*

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Julio Augusto maturata. 24

*Radix* fibrosa, crassiusculis copiosis fibris



filiformibus fusco-nigricantibus. *Caulis* erectus, quatuor sæpe quinquepedalis, teres, striatus, crassus, foliatus, pubescente villosus, superne ramosus, paniculatus. *Folia* radicalia caulinaque breviter petiolata, alterna, late lanceolata, acuminata, a basi ad medium profunde inciso-dentata, margine setuloso-ciliata, læte viridia, ultra binas uncias lata, quinque ad sex uncias longa, suprema sessilia, minora. *Flores* in pedunculis erectis superne ramosis paniculati, mediocres lutei. *Calyces* setuloso-ciliati.

Plantam speciosam benigne mihi misit, Mertinus, qui eam pro *H. Lachenalii*? habuit. Distincta a *H. Lachenalii* nostro: Caule speciosiori altiori, sæpissime quinquepedali. Foliis longioribus, exacte lanceolatis, acuminatis, non ovali-oblongis, semper profunde a basi ad medium inciso-dentatis: Dentibus sublinearibus, acutis, subparallelis, integriusculis, quinque ad septem lineas longis. Petiolis brevioribus. Floribus numerosioribus.

**Nota.** Plantam hucusque vix descriptam, denominavi in memoriam de Werthemensi flora meritissimi Mertini inventoris.

Neutiquam pro *H. ramoso*. Waldst. et Kitaibl. pl. rar. Hung. 3. p. 241. tab. 217. habenda.

pag. 326. *HIERACIUM Succisæfolium.*

*Hab.* In Marggraviatu superiori inter *Sirnitz et Schweighof*, prope *Schönau*, retro *Horben am Gysibel* et in der *Widen* frequens.

pag. 329. post *HIERACIUM amplexicaule.*

1202. \* *HIERACIUM intybaceum*  
caule erecto ramoso hispido, foliis lanceolatis

olatis dentatis sessilibus utrinque attenuatis, pedunculis incrassatis, calycibus laxis hispidis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1585. *Jacqu. Fl. Austr. app.* — *Allion. Fl. Pedem. n.* 795. *Host. Synops.* 433.

H. foliis oblongis asperis lanceolatis dentatis, calyce hirsutissimo. *Hall. helv. n.* 41.

H. intybaceum flore magno albido. *Scheuchz. it. alp.* 336.

H. Intubaceum flore magno albido. *Bauh. Prodr. p.* 64.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. app. tab.* 43. *Allion. l. c. tab.* 29. *fig.* 3.

*Germ.* Cichorienartiges Habichtskraut.

*Gall.* Epervière blanchatre.

*Hab.* In Alsatiæ vogesis ad montem Hoheneck, ubi nuper legit *D. Griesselich.*

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 4

*Radix* subhorizontalis. *Caulis* pedalis, sesquipedalis, erectus, villosoglutinosus; villis nigris, apice glandulosis, viscidis. *Folia* sparsa, sessilia, longa, sub lanceolata, inæqualiter incisodentata, ore undulata suberispata, mollia; summa angustiora, sublinearia, integra. *Flores* speciosi. *Calycinæ* squamæ rectæ, nigro-villosoglutinæ. *Corollæ* speciosæ, pallide sulphuræ. *Receptaculum* nudum, punctatum. *Pappus* simplex, sessilis.

Ad rariores Floræ cives pertinet.

pag. 530. *HIERACIUM villosum*.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* in rupibus calcareis, nec non retro *dem Weisbad* in adscensu montis *Gamor* frequens.

pag. 533. post *HIERACIUM umbellatum*.

1205.\* *HIERACIUM coronopifolium*  
(*Bernhardi*) foliis lineari - lanceolatis profunde inciso - dentatis, sparsis, floribus subumbellatis.

*H. umbellatum* β. *coronopifolium Bernhardi*. *Willd. Enum. pl. H. Berol. p. 826*.

*Germ.* Krähenfußblättriches Habichskraut.

*Gall.* Epervière coronope.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* prope *Beiertheim, Bülach*, versus *Ettlingen* et alibi ad vias dumetosas passim non infrequens.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 24

Maxime affine *H. umbellato*, a quo autem differt: *Foliis* latioribus profunde inciso - dentatis.

*Obs.* Ex seminibus in horto Carlsruhensi culta, constantissima permansit.

pag. 343. post *CREPIDEM biennem*.

1213.\* *CREPIS pulchra* foliis semiamplexicaulibus cordato - hastatis inæqualiter grosse dentatis, viscoso - hispidis, caule

erecto ramoso, calycibus glaberrimis, pap-  
po sessili.

*Crepis pulchra* foliis sagittatis dentatis, caule  
paniculato, calycibus pyramidatis glabris.  
*Linn. Sp. pl. 2. p. 1134.*

*Prenanthes hieracifolia. Willd. Sp. pl. III.  
p. 1541.*

*Hieracium pulchrum. Joh. Bauh. hist. 2.  
p. 1025. Icon.*

*Hieracioides annua glutinosa, floribus parvis.  
Vaill. act. 1721.*

*Icon. Propria. Sow. Engl. Bot. tab. 2325. (non  
bona.)*

*Germ. Klebriger Pippau. Schöner Pippau.*

*Gall. Crepide visquée.*

*Hab. In collibus argilloso - arenaceo - lapido-  
sis ad vinearum latera inter Grötzingen  
et Berghausen non infrequens cum Genista  
tinctoria, ubi legit rev. Lang Theologus  
meritissimus Ann. 1821 et nuper prope  
Gondelsheim.*

*Flor. Julio. Semina Augusto matura. ☉*

*Radix* ramoso-fibrosa, albido-fusca. *Cau-  
lis* 2-3 pedalis, erectus, angulato-sulcatus, hi-  
spidus, viscosus, ramosus, a basi ultra medium  
foliosus. *Rami* alterni, superne subdichotomi,  
angulati, nudiusculi, glabri, læte viridescentes.  
*Folia* caulina rameaque inferiora, sessilia, al-  
terna, semiamplexicaulia, cordato-hastata, a basi  
ad medium rariter grosse et inæqualiter dentata,  
ultra medium ad apicem integriuscula, costato-  
carinata, viscoso-hispida, 2-3 uncias longa,



unciam et tredecim lineas lata, superiora, rameave sensim minora, pallide viridia, suprema ramea angustiora, integriuscula. *Flores* caulem ramosque terminantes, paniculato-subcorymbosi, mediocres, utrinque lutei. *Pedicelli* angulati, nudi, glaberrimi. *Calycinæ squamæ exteriores* glabræ, ovatæ, muticæ, brevissimæ, *interiores* lineares, tres lineas longæ, virides, conniventes, glaberrimæ. *Corollularum Ligulæ* quinque lineas longæ, luteæ, apice quinquedenticulatæ. *Pappus* sessilis, capillaris, mollis, albus. *Receptaculum* nudum.

*Pedicelli* sauciati lactescunt, lacte amaro, foetidiusculo, nauseoso.

Facile ab omnibus reliquis speciebus dignoscitur, viscositate peculiari et hispitie, calycibus nudis glaberrimis.

Planta pro Flora nostra nova, et perrara.

**Nota.** Omni jure ad *Crepidem* à Linnaeo relata est. a Willdenovio et Decand. ad *Prenanthem*, a Lamarckio ad *Chondrillam* et a Villarsio ad *Lapsanam*.

pag. 345. *HYPOCHÆRIS glabra*.

*Hab.* Prope *Eckenstein* in agris arvisque sabulosis sterilibus.

pag. 355. post *ARCTIUM minus*.

CCCLXIX. \* *CARTHAMUS*.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1261.*

*Calyx* communis ovatus imbricatus: *squamis* numerosis, inferne arctis, auctis apice appendiculo foliaceo, subovato, plano, patente,

obtus. *Corolla composita* uniformis, tubulosa, *propria* infundibuliformis: limbo quinquepartito erecto subæquali. *Calyx fructiferus* connivens. *Receptaculum* planum, pilosum. *Semina* solitaria. *Pappus* nullus, aut paleaceus.

1223.\* *CARTHAMUS tinctorius* foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1162.

*C. tinctorius* caule glaberrimo, foliis ovatis integris spinoso-dentatis, seminibus nudis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1706.

*Cnicus sativus* s. *Carthamus officinarum*. *Bauh. pin.* p. 378.

*Icon. Regn. Bot.*

*Germ. Saflor.*

*Gall. Safran batard. Hisp. Alázor.*

*Hab.* In Aegypto et India orientali. Colitur passim in agris rusticorum hortis, aliisque.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturat. ☉

Planta elegans. *Corollae* rubrae. *Semina* conica, subtetragona, nuda, nitida, alba, ponderosa.

*Pharm. CARTHAMI Flores. Semina.*

Flores *Carthami* duplici praedita sunt parte colorante, altera gummosa, lutea, altera vero resinosa rubra; prior extrahitur aqua simplici, posterior nonnisi in spiritu vini vel lixiviiis alcalinis solubilis, diluitur et pulcherrime ceriseus fit addito succo Citri. In hoc pigmento pulcherrimo parando, antecellunt hispani, qui eo chartas et lintea obducunt, nostratibus sub nomine *Spanische Damenschminke*, *Spanisch-Roth*, nota et acceptissima.

In officinis pharmaceuticis floribus *Carthami* saepe *Crocus orientalis* adulteratur.

Semina *Psittacis* acceptissima, hinc in Gallia *Graine de Perroquet*.

pag. 366. *CARDUUS Cyanoides*.

*Hab.* Prope *Schwetzingen* in arenosis sterilibus, apricis retro *der Eisgrube*, circa *Bruchhausen*, *Sandhausen* et alibi. Circa *Wertheim* in arenosis *am Tännig* cum meritisimo *D. Wibelio* legi 1813, qui jam optime hanc plantam in *Primit. Floræ Wertheimensis* descripsit, sub *Acarua cyanoide*. Variat uno eodemque sæpe loco: Caule simplici unifloro, aut ramoso seu multifloro.

pag. 378. post *CNICUM tuberosum*.

1239.\* *CNICUS Erysithales* foliis amplexicaulibus pinnatifidis hirsutis calycibus nutantibus glutinosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1157. — *Hoffm. Flor. Germ.* p. 285.

*C. Erysithales* foliis amplexicaulibus pinnatifidis ciliatis, pedunculis cernuis, calycibus glutinosis, squamis lanceolatis patulis. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1679.

*Carduus Erysithales* foliis amplexicaulibus pinnatifidis, laciniis lanceolatis spinuloso-ciliatis, calycibus glutinosis nutantibus. *Jacqu. vind.* 279.

*Cirsium* foliis ciliatis, imis ovatis, superioribus semipinnatis, floribus sessilibus obtusis. *Hall. hist. n.* 175.

*Carduo-Cirsium alpinum* polypodii instar pro-

funde laciniatum, et aliquando Dentis leonis foliis, flore luteo, polyanthemum. *Blucken. Alm. p. 83.*

*Icon. Jacqu. Fl. Aust. tab. 310.*

*Germ. Klebriges Kratzkraut.*

*Gall. Cirse Erysithale.*

*Hab.* In pratis pascuisque udis montosis Brisgoviae in convallibus *Bærenthal* retro *dem Didi - See* versus montem *Feldberg*. In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthale*, nec non in vicina helvetia *am Weisbad*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2

*Radix* crassiuscula, nigricans, fibris longis prædita. *Caulis* 2-4 pedalis, erectus, angulatus, glabriusculus, simpliciusculus. *Folia* radicalia caulinaque profunde pinnatifida, subtus pallide viridia, inferiora petiolata, superiora sessilia, subamplexicaulia, remota, utrinque cumprimis ad nervos dorsales hirsuta, quandoque glabriuscula: margine spinoso-ciliata, *radicalia* pedalia: laciniis lanceolatis acutis. *Flores* terminales, pauci, pedunculati, nutantes, *Bracteis* non obvallati. *Calycinae* squamæ imbricatæ, lanceolatae, acuminatae, nudæ, glutinosæ, inermes, apicibus reflexæ *Flosculi* ochroleuci. *Semina* nitida. *Pappus* sessilis, plumosus. *Receptaculum* pilosum.

Planta speciosa in horto culta, constans,

1239.\*\* *CNICUS spinosissimus* foliis  
amplexicaulibus sinuato-pinnatis spino-



sis, caule simplici, floribus sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1157.

**C.** foliis amplexicaulibus pinnatifidis, dentatis spinosis pubescentibus, caule simplici, floribus terminalibus congestis, calycinis squamis lanceolatis spinosis. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1684.

**Cirsium** foliis caulinis semipinnatis, pinnis angulosis spinosissimis, terminantibus mollibus, ciliatis, umbellam floralem comprehendentibus. *Hall. hist. n.* 172.

**Cirsium alpinum** spinosissimum, floribus ochroleucis inter flavescentia folia congestis. *Hall. hist. ad.* 1. p. 679.

**Carlina polycephalos alba.** *Bauh. pin.* 380.

*Icon.* *Hall. l. c. tab.* 5. (optima.)

*Germ.* *Vieldorniges Kratzkraut.*

*Gall.* *Cirse épineuse.*

*Hab.* In Principatus superioris vicinia retro dem *Weisbad* ad montem *Gamor*, *Kasten* et *Sentis* in pascuis non infrequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4

*Radix* ramoso - fibrosa, dura. *Caulis* pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, firmus, angulatus, striatus, crassiusculus, pubescens, simplex. *Folia caulina* alterna, amplexicaulia, non decurrentia, pinnatifida, segmentis multifidis, acutis, margine et apice spinosissimis. *Flores* terminales, numerosi, umbellato - congesti subsessiles, mediocres, albide flavicantes, basi

*Bracteis* numerosis, foliaccis, ovato-lanceolatis, pinnatifidis spinulosis mitioribus, pubescentibus, albide lutescentibus obvallati. *Calyx* conicus, squamis imbricatis lanceolatis, fuscis, apice spinosis. *Pappus* plumosus. *Receptaculum* pilosum.

Folia caulina ferocissime spinosa.

Plantae pulchrae, speciosa individua, fere tripedalia, satis numerosa, vidi retro der Wallfart zur Mutter Gottes im Schnee in adscensu montis Rigi, Helvetiae.

pag. 384. post ONOPORDON:

CCCLXXIII. \* C Y N A R A.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1257.*

*Calyx* communis ventricosus, imbricatus; squamis numerosis, subrotundis, carnosus, acutis apice *appendiculo* squamiformi, patente, majori, subrotundo, canaliculato, emarginato cum spina. *Corolla* composita, tubulosa, uniformis. *Corollulae* hermaphroditae, subaequales. *Propria* monopetala, infundibuliformis: *tubo* tenuissimo, *limbo* erecto, ovato, quinquefido: *laciniis* linearibus, alterna profundius separata. *Semina* solitaria, oblongo-ovata, tetragono-compressa. *Pappus* sessilis, longus, plumosus. *Receptaculum* setosum.

1243.\* CYNARA *Scolymus* foliis sub-spinosis pinnatis indivisisque, calycinis squamis ovatis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1159.*

*C. foliis pinnatis, laciniis serratis. Linn. H. Cliff. 394.*

*Scolymus Dioscoridis. Clus. hist. 2. p. 153.*

*β. Cynara hortensis foliis non aculeatis. Bauh. pin. 385.*

*Scolymus non aculeatus. Tabernæmont Icon. p. 1075.*

*Icon. Blackw. tab. 458.*

*Germ. Artischocken.*

*Gall. Artichaut.*

*Hab. In Sicilæ, Barbariæ agris. Colitur in hortis oleraceis.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Septembri matura. 4*

Flores cœrulei.

Calyces ante florescentiam resecti, elixantur in aqua subsalsa et eduntur squamæ calycinae, vehiculo embammatis, abradendo carnem lateris interioris. Receptaculum magis carnosum, maxime sapidum est.

Corollæ aqua infusa, lac coagulant. In Barbaria utuntur Arabes et Mauri floribus Cynaræ ad caseum conficiendum. Schaw. Voyage dans la Barbarie. 1. p. 311.

1243. \*\* *CYNARA Cardunculus* foliis spinosis omnibus pinnatifidis, calycinis squamis ovatis. *Linn. Spl. pl. 2. p. 1159.*

*C. spinosa, cujus pediculi esitantur. Bauh. pin. 383.*

*Scolymus aculeatus. Tabernæmont. hist. 1075. Icon.*

*Germ.* Cardon.

*Gall.* Cardon d'Espagne.

*Hab.* In Barbariæ arvis. Colitur in hortis ole-raccis.

*Flor.* Aestate. 2

*Caules* teretes, crassi, erecti, sulcati, pubescentes, bipedales et altiores, superne ramosi. *Rami* alterni, erecti, striati, subviscidi, lanuginosi. *Folia radicalia* petiolata præmagna, duplicato-pinnatifida: *pinnis* oppositis oblongis apice elongatis, pinnatifidis, *laciniis* lanceolatis, integris, sinubus subtus reflexis, subtus villosa, albido-cinerea, reticulata, supra glabra, saturate viridia. *Caulina* alterna, sessilia, subdecurrentia, costa valida instructa. *Petioli* crassi, pubescentes, folio breviores, sulcati, margine utrinque dentati. *Pedunculi* crassi, uniflori, subfoliati. *Flores* speciosi, cœrulei.

Folia virentia colliguntur in fasciculum, circumvolvuntur stramine, et postquam albide lutescentia evaserunt, esitantur tanquam turiones Asparagi.

## SYNGEN. POLYG. SUPERFLUA.

pag. 398. post TANACETUM *vulgare*.

1252. \* TANACETUM *Balsamita* foliis ovatis integris, serratis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1184. — *Hall. hist. n.* 153.

*Balsamita vulgaris* caule herbaceo, foliis ellipticis dentatis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus basi auriculatis,



floribus corymbosis. *Willd. Sp. pl.* 3.  
p. 1802.

Balsamita major. *Desfont. Act. Soc. hist. nat. Paris.* 1. p. 3. — *Dodon. Pempt.* p. 295.

Balsamita mas. *Blackw.*

*Costus hortensis. Dalechamp. hist.* 678.

*Icon. Blackw. tab.* 98.

*Germ. Balsamkraut. Frauenmünze. Münz-Balsam.*

*Gall. Balsamite. Menthe coq. Herbe coq.*

*Hab.* In Europa australi. Prope *Wertheim* ad hortorum muros pagi *Bestenheit et Homburg* quasi spontaneam post *D. Wibelum* vidi. Colitur passim in hortis cumprimis rusticorum.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Octobri matura. 4

*Radix* ramosa. *Caules* ex una radice plures, 2-3-4 pedales, erecti, subangulati, subpubescentes, ramosi. *Rami* alterni. *Folia* alterna, petiolata, ovali-elliptica, margine dentato-serrulata, læte viridia, subpubescentia. *Flores* terminales, corymbosi. *Bracteæ* lineares, acutæ, solitariae, ad pedunculos. *Calyces* imbricati, hemisphærici, pubescentes. *Corollæ* luteæ.

*Pharm. BALSAMITÆ Herba.*

Balsamica, grata, fragrans. Resolventes, incidentes, stomachicas, tonicas, emmenagogas virtutes habet. Planta eximia, hodie in medicina fere exoletæ, mulierculis præsertim rusticis quammaxime cognita.

pag. 401. post *ARTEMISIAM campestrum*.

1254.\* *ARTEMISIA saxatilis* foliis caulinis canescentibus pinnatis lineari-filiformibus, floralibus indivisis linearibus, caule adscendente ramosissimo paniculato, pedunculis subcorymbosis, calycibus subgloboso-angulatis nutantibus. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 1830. *Waldst. et Kit. pl. rar. Hung.*

*Germ. Steinbeyfuss.*

*Gall. Armoise des roches.*

*Hab.* In Alsatia, ad collem calcarium inter *Colmar et Gebweiler* cum *Althæa hirsuta*, ubi nuper legit *D. Griesselich*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturatione. 24

*Radix* ramosa, lignosa, dura. *Caules* ex radice plures, adscendentes, sesquipedales et altiores, duri, teretes, inferne fusco-rubelli, glabriusculi, superne pubescentes, incani, ramosi. *Rami* alterni, copiosi, erecti. *Folia* alterna, albida, tomentosa, longius petiolata, pinnato-multifida, pinnulis lineari-filiformibus angustis, 2-3-5 partitis, integris. *Folia floralia* simplicia, sessilia, linearia, integra, obtusiuscula, tomentosa. *Flores* pedunculati, subcorymbosi, subgloboso-angulati, nutantes. *Calyces* tomentosi, incani. *Receptaculum* nudum.

Medium tenet inter *A. campestrum* et *pon-  
ticam*.

Ad novas Florae cives pertinet.

pag. 401. ARTEMISIA *pontica*.

*Hab.* Ad muros vinearum prope *Wertheim*.  
*t. D. Wibelio*.

pag. 402. ARTEMISIA *Absinthium*.

*Hab.* Ad muros hortorum vinearumque prope  
*Wertheim* hinc inde, *t. D. Wibelio*.

pag. 404. post ARTEMISIAM *vulgarem*.

1257.\* ARTEMISIA *mutellina* foliis omnibus palmato-multifidis, floribus terminalibus axillaribusque, calycibus angulatis, receptaculis hirsutis. *Vill. Fl. Delph.* 3. p. 244. *tab.* 35.

A. *mutellina* caule herbaceo simplicissimo, foliis omnibus palmato-multifidis albido-sericeis, floribus axillaribus oblongis, inferioribus pedunculatis, summis sessilibus. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1821.

A. *glacialis* sericeo-villosa incano-virescens, foliis radicalibus subbipinnatis, pinnis foliisque caulinis subpalmato-tri-quinqueve partitis, longe petiolatis. *Wulfen in Jacqu. Collect.* 2 p. 118.

A. *rupestris*. *Allion. Fl. Ped. n.* 315.

Absinthium ex alis floridum, foliis angustis sericeis pinnatis, pinnis trifidis et quinquesfidis. *Hall. hist. n.* 126.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 7. *fig.* 1. 2. 3. — *Allion. l. c. tab.* 9. *fig.* 1.

*Germ.* Kleiner Alpen-Beyfuss.

*Gall.* Absinthe nain des alpes.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris in agro Abbatiscellensium in rupibus calcareis alpinis retro *dem Weisbad auf dem Sentis, Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 24

*Radix* ramosa, fibrosa, lignosa, multiceps, fusca. *Caules* adscendentes, digitales, palmares, et longiores, simpliciusculi, foliati. *Folia* infima sæpe fusca, cum caulinis inferioribus longius petiolata, alterna, multifido-palmata, albido-sericea, *superiora* sensim minora, tri-quinquem-partita, suprema sessilia. *Flores* axillares, terminalesque, spicato-racemosi, inferiores pedunculati, supremi sessiles. *Calyces* oblongi, angulati, albido-tomentosi, *squamis* incumbentibus, margine subsphacelatis. *Corollæ* luteæ. *Receptaculum* pilosum.

Differt ab *A. glaciali* affini: Foliis majoribus, minus anguste divisis. Calycibus angulatis, minoribus, nec rotundatis. Ad hæc Folia in *A. glaciali* magis candide sericea. Flores terminales sessiles glomerati. Conf. Jacq. Fl. Austr. 5. app. tab. 35. et Allion. Fl. Ped. tab. 8. fig. 3. ubi *A. glacialis* depicta est.

*Pharm.* *Herba MUTELLINA.*

Odor plantae grate aromaticus. Infusum ad pleuritidem perinde adhibent, ad febres intermittentes, ad menses pellendos, ad vulnera consolidanda. Vocant Genipi blanc, Grindelienses vero Gäbuse. Hall. l. c.

pag. 414. post. GNAPHALIUM *sylvaticum*.

1263.\* GNAPHALIUM *supinum* caule



herbaceo simplici procumbente, foliis linearibus acutis tomentosis, floribus capitatis. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1888.

G. caule herbaceo simplici procumbente, floribus sparsis. *Linn. Syst. Veg.* 623. — *Vill. Fl. Delph.* 3. p. 192.

G. supinum, lavandulæ folio. *Bocc. Mus.* 107. tab. 85.

Filago caule simplicissimo, spica pauciflora terminato. *Hall. hist. n.* 149.

*Germ. Kleines Alpen-Ruhrkraut.*

*Gall. Perlier nain.*

*Hab.* In summo jago montis *Feldberg* *Brisgoviae* abunde t. *Alexandr. Braunio.* In vicina Principatus superioris helvetia *auf dem Sentis et Gamor*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 4

Affine G. *sylvatico*, a quo differt: *Caule* unciali, biunciali, decumbente, simplicissimo, *Foliis* minoribus angustioribus. *Floribus* minoribus, paucioribus.

Plantula in horto culta, constans permansit.

pag. 414. post *GNAPHALIUM uliginosum.*

1264\* *GNAPHALIUM Leontopodium*  
caule herbaceo simplicissimo, foliis linearilanceolatis subtus tomentosis, floribus terminalibus sessilibus aggregatis, bracteis lanceolatis lanatis radiato-patentibus, calycibus, villosis. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 1892.

G.

G. *Leontopodium* herbaceum, caule simplicissimo, capitulo terminali orbiculato, bracteis dense tomentosis radiato. *Lamarck. Encycl.* 2. p. 751. — *Scop. Carn.* n. 1045. *Vill. Fl. Delph.* 3. p. 191.

Filago *Leontopodium* caule simplicissimo, capitulo terminali bracteis hirsutissimis radiato. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1312.

Filago floribus sessilibus umbellatis, foliis umbellam excedentibus tomentosis. *Hall. hist.* n. 152.

Gnaphalium alpinum pulchrum. *Bauh. hist.* 3. p. 161.

*Leontopodium.* *Dodon. Pempt.* p. 68.

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 86.

*Germ.* Schönes Alpenruhrkraut.

*Gall.* *Perlier pied-de lion.*

*Hab.* In Principatus superioris vicinia, auf dem <sup>2</sup>Sentis, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 24

Pulchra planta, *Bracteis* radiato-patentibus lanatis, calyces excedentibus.

pag. 420. post GNAPHALIUM.

## CCCLXXXI.\* XERANTHEMUM.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1285.

*Calyx* Communis imbricatus: squamis lanceolatis, quarum intimæ disco longiores, mem-

branaceæ, nitidæ, radium coloratum constituentes, coronantes florem compositum. *Corolla Composita* inæqualis: *Corollulæ* hermaphroditæ plurimæ, tubulosæ, in disco. *Femineæ* pauciores, tubulatæ in ambitu. *Propria* hermaphroditis infundibuliformis, calyce longe brevior: *limbo* quinquefido patulo. *Femineis* tubulosa, longitudine hermaphroditi, quinquefida. *Calyx* fructiferus vix mutatus. *Semina* oblonga, coronata Calyculo quinquefido acuto.

1268. \* *XERANTHEMUM annuum*  
herbaceum foliis lanceolatis patentibus.  
*Linn. Sp. pl. II. p. 1201. Jacqu. Fl. Austr. 4. Hall. helv. n. 122. Scop. Carn. n. 1096.*

Jacea oleo folio capitulis simplicibus. *Bauh. pin. 272.*

*Icon. Jacqu. l. c. tab. 388. Mill. Dict. tab. 297.*

*Germ. Spreublume.*

*Gall. Immortelle annuelle.*

*Hab.* In Austria, Italia, Gallia, Hispania. Hospitatur in multis hortis ex quibus interdum ad pagos urbesque adjacentes emigrat. Ad viam in prato prope *Gengenbach Ann. 1814* vidi.

*Flor.* Augusto, Septembri. *Semina* Octobri matrua. ☉

*Radix* ramoso-fibrosa. *Caules* numerosi, erecti, sesquipedales et altiores, ramosi, lanugi-

noſo-incani, duriuſculi. *Folia* alterna, ſeſſilia, lineari-lanceolata, integra, patentia, ſubtus tomentosa. *Flores* terminales, longe pedunculati. *Pedunculi* erecti, firmi, tenues, uniſſori. *Calycinae* ſquamæ radiatæ, plane expaſæ, purpuſcenti-violaceæ, interdum albidæ, ſplendentes.

Verum in ultimum autumnum hortorum præſertim ruſticorum in regionibus noſtris rhenaniſ decus. Floribus condecorant in conviviis pocula, menſasque viasque.

pag. 425. poſt ERIGERON *acre*.

1272.\* ERIGERON *alpinum* caule ſubbiſſoro, calyce ſubhirsuto, foliis obtuſis ſubtus villoſis. *Linn. Sp. pl. p.* 1211.

Erigeron *alpinum* caulibus ſubuniſſoris, calyce ſubhirsuto, radio patente. *Smith. Fl. Brit. 2. p.* 877.

Erigeron caule alterne ramoſo, petiolis uniſſoris, ſemifloſculis pappum ſuperantibus. *Hall. hiſt. n.* 86.

Aſteri montano purpureo ſimilis ſ. globulariæ. *Bauh. hiſt. 2. p.* 107.

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab.* 464. *Fl. Dan. tab.* 292.

*Germ. Alpen-Berufskraut.*

*Gall. Vergerette des Alpes.*

*Hab.* In viciniâ Principatus ſuperioris in ſummis montibus prope *St. Gallen* nec non circa *Weisbad am Wildkirchlein* et auf dem *Hohen-Sentis*, ubi eam vidi 1814.

*Flor.* Julio, Auguſto. *Semina* Septembri matura. 24



*Radix* ramuloso - fibrosa. *Caules* solitarii seu plures, palmares, erecti, angulati, simplici-  
usculi, biflori, sæpe uniflori, rarius triflori, su-  
perne cumprimis piloso - hirsuti. *Folia* radicalia  
subsessilia, lanceolata, acutiuscula, margine cili-  
ata, caulina alterna sessilia, sensim minora, ob-  
tusiuscula. *Calycis* squamæ hirsutæ. *Flosculi*  
radii numerosi, patentes, purpurei, lineares,  
disco duplo longiores; *disci* lutei. *Pappus* sca-  
briusculus. *Semina* setosa.

1272. \*\* *ERIGERON uniflorum* caule  
unifloro, calyce lanato-tomentoso, radio  
erectiusculo.

*Erigeron uniflorum* caule unifloro, calyce  
piloso. *Linn. Sp. pl. p.* 1213.

*Erigeron* caule unifloro calyce tomentoso,  
radiis semiflosculis. *Hall. hist. n.* 87.

*Aster* caule unifloro, foliis integerrimis calyce  
villosus subrotundo. *Linn. Fl. Lapp.* 307,  
*tab. 9. fig. 3.*

*Icon.* Sow. *Engl. Bot. tab.* 2416.

*Germ.* Einblumiges Berufskraut.

*Gall.* Vergerette uniflore.

*Hab.* In iisdem cum præcedenti regionibus.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri ma-  
tura. 4.

Maxime affine præcedenti, a qua mere dif-  
fert: *Calyce* non subhirsuto sed lanato - to-  
mentoso; *Flosculis* radii suberectiusculis.

*Variat.* Flosculis radii purpurascentibus, albi-  
disque.

**Nota.** Varietates omnino inter hanc et praecedentem intermedias in alpinis helvetiae nec non in pyrenaeis vidi.

pag. 441. *SENECIO nemorensis Pollichii*. Deleatur, ab hoc tempore *Pollichii* plantam, mihi antea dubiam, benigne misit amicissimus *D. Geiger* qui eam legit in monte *Geisberg* versus *Rohrbach* *Ann.* 1816. Est *Cineraria lanceolata* nostra, p. 453. descripta.

pag. 447. post *ASTER Amellum*.

1291.\* *ASTER salicifolius* caule herbaceo erecto glabro ramoso, foliis sessilibus, inferioribus lanceolatis, a medio ad apicem remote serratis, reliquis integerrimis margine scabris, calycibus laxis imbricatis.

*Aster salicifolius* foliis lanceolatis serratis, margine scabris, rameis sublinearibus integerrimis, pedunculis alternis subnudis. *Scholler Suppl. Flor. Barbiens.* p. 328. n. 1974. — *Roth. Fl. Germ.* 3. p. 352.

*Aster salignus* foliis lineari-lanceolatis sessilibus integerrimis margine scabris, inferioribus lanceolatis apice serratis, caule paniculato glabro erecto, calycibus laxis imbricatis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 2040.

*Icon.* *Scholler l. c.*

*Germ.* *Weidenblättriger Aster. Weiden-Sternkraut.*

*Gall.* *Aster à févilles des Saules.*

*Hab.* In Palatinatu circa *Frankenthal* ad fossas. Prope Argentinam ad fossas aquaticas *t. D. Nestlero*, non infrequens.

*Flor.* Augusto, Septembri, *Semina* Octobri matura.

*Caules* erecti, cubitales, tripedales et altiores, subangulosi, glabriusculi: superne ramoso-paniculati. *Folia* alterna, sessilia, subsemiamplexicaulia, margine scabriuscula, læte viridia, inferiora a medio ad apicem remote serrata, 3-4 uncias longa 3-4 lineas lata, superiora rameave minora integerrima. *Flores* caulem ramosque terminantes, alterni. *Flosculi* radii mediocres, dilute cœruleo-violacei, disci flavi demum rubescentes, *Calycinæ* squamæ laxè imbricatæ.

Planta in horto Carlsruhensi culta, constantissima.

1291. \*\* *ASTER alpinus* foliis spatulosis hirtis, radicalibus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, unifloro. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1226.

*Aster alpinus* caule unifloro, foliis integerrimis, radicalibus lanceolato-spatulatis, caulinis lanceolatis, calycinis squamis subæqualibus lanceolatis obtusiusculis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 2018.

*Aster* foliis radicalibus petiolatis ovatis scabris, caule unifloro. *Hall. hist. n.* 82.

*Aster* VII. austriacus V. *Clus. hist.* 2. p. 15. (omnino videtur.)

*Icon.* *Jacqu. Fl. Austr.* 1. tab. 88. *Gmel. Fl. Sibir.* 2. tab. 73. fig. 2.

*Germ. Alpen-Aster. Alpen-Sternblume.*

*Gall. Aster des Alpes.*

*Hab.* In summo jugo montis *Feldberg*, *Brisgovicæ perraro*. In vicinia Principatus superioris in summis montibus prope *St. Gallen*, prope *dem Weisbad am Wildkirchlein*, nec non *auf dem Hohen-Sentis* eam vidi 1814. In *Alsatiæ Vogesis* summis nec non in monte *Jura*.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri matuta. 24

*Radix* ramoso-fibrosa, sublignosa. *Caulis* 3-4-7 uncialis, erectus, simplicissimus, uniflorus. *Folia* radicalia petiolata, spatulato-elliptica, obtusa, subhirsuta, integra; *caulina* 2-3 minora, subsessilia, lanceolata. *Flos* solitarius, terminalis. *Flosculi* radii patentes, purpureo-cærulescentes, sat speciosi, disci lutei. *Calycina* squamæ ovato-lanceolatæ, obtusiusculæ, subhirsutæ.

Ad rariores omnino Floræ cives pertinet. Non cum *Erigero unifloro* seu alpino confundenda.

pag. 448.

1292.\* *ASTER chinensis* foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calycibus terminalibus patentibus foliosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1232. *Hort. Cliff.* 407.

*A. chinensis* foliis ovatis grosse dentatis petiolatis, caulinis sessilibus basi cuneatis, floralibus lanceolatis integerrimis, caule hispido, ramis unifloris, calycibus foliaceis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 2058.



*Aster chenopodii folio*, annuus, flore ingenti specioso. *Dill. hort. Elth.* 38. *tab.* 34. *fig.* 38.

*Germ.* Chinesischer Aster.

*Gall.* Aster de la Chine.

*Hab.* In China, Japonia. Hospitatur sub innummeris varietatibus in hortis, ex quibus passim ad vineas, ruderata urbium et pagorum emigrat.

*Flor.* Augusto, Septembri, Octobri. *Semina* Octobri, Novembri. matura. ☉

Insigne hortorum in serum autumnum decus.

pag. 449. ante SOLIDAGINEM.

CCCLXXXVII. \* T A G E T E S.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1302.

*Calyx* communis simplicissimus, monophyllus, tabulosus, oblongus, pentagonus, quinque dentatus. *Corolla* Composita radiata: *Corollulæ* hermaphroditæ, tubulosæ, plures, in disco elevato. *Femineæ* ligulatæ, quinque, in radio. *Propria* Hermaphroditis tubulosa, semiquinquefida, erecta, calyce longior: *laciniis* linearibus, introrsum villosis. *Femineis* ligulata, hermaphroditis longior, obtusissima, tomentosa, persistens. *Semina* linearia, compressa. *Pappus* Paleis quinque, erectis, acuminatis, inæqualibus. *Receptaculum* nudum, planum.

1293. \* *TAGETES patula* caule subdiviso patulo. *Linn. Sp. pl. II. p. 1249. Hort. Cliff. 418.*

*T. patula* foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ciliato-serratis, pedunculis unifloris subincrassatis, calycibus lævibus, caule patulo. *Willd. Linn. Sp. pl. 3. p. 2126.*

*Tanacetum africanum* s. *Flos africanus minor.* *Bauh. pin. 132.*

*Flos africanus.* *Dodon. Pempt. 255.*

β. *Tagetes indicus minor multiplicato flore.* *Tournef. inst. 488.*

*T. minor, flore fulvo maculato.* *Dill. hort. Elth. 273. tab. 279. fig. 361.*

*Germ. Gemeine Todtenblume.*

*Gall. Tagete étalé.*

*Hab.* In Mexico. Hospitatur in multis hortis ex quibus passim ad ruderata circa pagos et urbes migrat.

*Flor.* Augusto, Septembri, Octobri. *Semina* Octobri, Novembri matura. ☉

Planta in hortis apud nos vulgatissima. Flores peculiaris multis ingrati et foetidi odoris.

1293. \*\* *TAGESTES erecta* caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1249. Hort. Cliff. 418.*

*T. erecta* foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ciliato-serratis, pedunculis unifloris ventricosus - incrassatis, calycibus angulatis,

caule erecto. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 2127.

*Tanacetum africanum majus, simpliciflore.*  
*Bauh. pin.* 133.

*Caryophyllus indicus. Camerar. Epit.* 406.

β. *Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato.* *Bauh. hist.* 3. p. 100.

γ. *Tagetes mexicanus, flore fistuloso simplex.*  
*Column. Ecphras.* 2. p. 47. *tab.* 46. *fig.* 1.

δ. *Tagetes mexicanus alter polyanthos, fistuloso flore.* *Column. Ecphr.* 2. p. 48. *tab.* 46.

*Germ. Großblumige Todtenblume. Stinkende*  
*Hoffart. (nostrat.)*

*Gall. Tagète droite. Rose d'inde.*

*Hab.* In Mexico. Hospitatur cum præcedente abunde in hortis.

*Flor.* et Semina cum præcedente maturat. ☉  
Flores præcedentis magis foetidi.

pag. 449. *SOLIDAGO Virgaurea.*

*var.* β. *Foliis integerrimis.*

pag. 464. *INULA montana.*

*Inula hirta. Wibel. Fl. Werth. Addit. p.*  
*343. (omnino.)*

*Hab.* Circa *Wertheim* in saxosis asperis montibus *Walzenberg*, in collibus asperis calcareis *Waltersbach*, *Homburger Hölzchen*, in der *Hardt* et auf dem *Eselsberge* frequens, vidi 1815.

*Caulis* in individuis Werthemiensibus simplex uniflorus, perraro inter centena biflorus. *Flos* speciosus, luteus. *Corollulae* radii ultra unciam longae, lineares, patentes.

Nota. Minime pro *I. hirta* Linn. habenda, cum qua persaepe confunditur.

*Inula montana* Poll. Fl. Palat. ut facile ex descriptione adjecta patet, non ad *I. hirtam* sed omnino ob caulem uniflorum ad *I. montanam* Linn. pertinet.

pag. 468. *DORONICUM pardalianches*.

*Hab.* Prope *Wertheim t. D. Wibelio*.

pag. 472. post *CHRYSANTHEMUM Leucanthemum*,

# 1311.\* *CHRYSANTHEMUM atratum*

caule erecto simplici unifloro, foliis cuneiformi - oblongis, argute serratis, subcarnosis, squamis calycinis margine atris.

*Ch. atratum* foliis omnibus cuneiformi - oblongis serratis, carnosiss. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1252. *Jaqu. Vind. p.* 151.

*Bellis alpina* major, folio rigido. *Bauh. pin.* 261. — *Prodr.* 120.

♂. *Bellis alpina* minor folio non rigido. *Bauh. hist.* 3. p. 115.

*Germ. Schwarzelchige grofse Alpen-Maslieben.*

*Gall. Grande Marqueritte à calyx noir.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro dem *Weisbad*, in passuis alpinis am *Ga-*



*mor, Sentis et Kasten* frequens, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturata. 24

*Ch. Leucanthemo* affine a quo differt: *Caule* rigidiori, simplici, breviori. *Foliis* argutius serratis. *Floribus* subminoribus. *Calycinis* squamis semper margine atratis.

Planta in horto culta, constans permansit.

1311. \*\* CHRYSANTHEMUM *Halleri*  
caule erecto simplici unifloro, foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis sessilibus lanceolatis inciso-dentatis.

*Ch. Halleri. Suter. Fl. helv. 2. p. 193.*

*Pyrethrum Halleri. Willd. Sp. pl. 3. p. 2152.*

*Pyrethrum* caule unifloro, foliis glabris, radicalibus petiolatis semipinnatis, caulinis sessilibus acute dentatis. *Hall. hist. n. 97.*

*Leucanthemum alpinum* foliis profunde incisis. *Scheuchz. It. 1. p. 42. 2. p. 136. 4. p. 307.*

*Leucanthemum alpinum angustifolium. Barrel. Icon. 458. fig. 2.*

*Bellis alpina minor. Bauh. Prodr. p. 120.*

*Germ. Hallersche Wucherblume.*

*Gall. Leucantheme de Mr. Haller.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, auf dem *Sentis et Kasten*, in pascuis lapidosis, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2

Maxime affine *Ch. atrato*, a quo differt *Foliis* radicalibus in petiolum longiorem decurrentibus, profunde inciso-dentatis fere pinnatifidis. *Calyx* atratus.

Inter hanc et *Ch. atratum* varietates intermediae in alpinis obveniunt, hinc vix pro peculiari specie declaranda.

1311. \*\*\* *CHRYSANTHEMUM alpinum*  
foliis cuneiformibus pinnatifidis, laciniis integris, caulibus unifloris. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1253. — *Vill. Fl. Delph.* 3. p. 203.

*Pyrethrum alpinum* foliis inferioribus pinnatifido-dentatis, summis linearibus integerrimis, cule unifloro. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 2153.

*Pyrethrum* caule unifloro, foliis glaucis petiolatis palmatis. *Hall. hist. n.* 96.

*Leucanthemum alpinum tenuifolium.* *Clus. hist.* 1. p. 335. — *Barrel. Icon. rar.* 458. fig. 3.

*Germ.* *Alpen-Wucherblume.*

*Gall.* *Leucanthème des alpes.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris in agro Abbatiszellensi *auf dem Sentis*, in calcareis saxosis pascuis, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2

*Radix* lignosa, ramosa, multiceps. *Caules* ex radice plures, procumbentes, digitales, semi-

pedales, simplices, villosi, uniflori. *Folia infima* longe petiolata, cuneiformia, firma, villosula, glauco-viridia, pinnatifida: *laciniis* subseptenis integris subbitidisve, *caulina* alterna, sessilia, *summa* linearia, integra. *Calycinae squamæ* fusco-nigricantes, scariosæ. *Corolla* majuscula.

pag. 487. post *ACHILLEAM Ptarmicam*.

1520.\* *ACHILLEA atrata* foliis pectinato-pinnatis glabris, pinnis linearibus acuminatis subtripartitis, cyma simplici, pedunculis pubescentibus, caule simplicissimo. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 2200.

*Achillea atrata* foliis pinnulis pectinatis integrisculis, pedunculis villosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1267.

A. foliis glabris pinnatis, pinnis simplicibus et multifidis. *Hall. hist. n.* 111.

*Chamæmelum alpinum* saxatile perenne, flore albo singulari, calyce nigricante. *Tilli. hort. Pis. tab.* 19.

*Matricaria alpina* chamomillæ foliis. *Bauh. pin.* 134.

*Parthenium alpinum*. *Clus. hist.* 1. p. 336.

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 77.

*Germ. Schwartzkelchiges Garbenkraut.*

*Gall. Millefeville à calyx noir.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris, retro dem *Weisbad auf dem Sentis* ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 24

*Radix* ramosa, lignosa, atra. *Caules* ex una radice plures, semipedales, pedales, simplices. *Folia* glabriuscula, pectinato-pinnata: *pinnis* lineari-acutis integris, quandoque, 3-4-5 partitis. *Flores* terminales cymosi. *Pedunculi* villosi - tomentosi. *Corollæ* majusculæ. *Calycinæ* squamæ margine atræ, sphacelatae. *Corollulæ* radii 6-8-10, albæ.

*Radix* fervida, saporem *Pyrethri* durabilem in lingua relinquit. Hall. l. c.

1320. \*\* *ACHILLEA macrophylla*  
foliis pinnatis glabris pinnis lanceolatis  
inciso-serratis, extimis confluentibus, co-  
rymbo composito. Willd. *Sp. pl.* 3. p.  
2204.

A. foliis pinnatis planis inciso-serratis, ex-  
timis majoribus coadunatis. Linn. *Sp. pl.*  
2. p. 1265.

A. foliis pinnatis, pinnis acutis serratis, ex-  
tremis confluentibus. Hall. *hist. n.* 115.

*Ptarmica alpina* *matricariæ* foliis. *Triumph.*  
*obs.* 83. *tab.* 23. *Bocc. Mus.* 2. p. 150.  
*tab.* 110. *Barrel. Icon. rar. tab.* 991.

*Millefolium Tanacetii* foliis flore albo. *Mor-*  
*ris. hist.* 3. *Sect.* 6. p. 38. *tab.* 11.

*Germ.* *Großblättriges Garbenkraut.*

*Gall.* *Milleseville macrophyll.*

*Hab.* In vicinia Principatus superioris helvetia,  
retro dem *Weisbad*, ultra dem *Sentissee*,  
ubi eam vidi 1818.



*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Septembri matura. 2

*Radix* ramosa, fibrosa, dura, crassa, fusca. *Caulis* 2-5 pedalis, erectus. *Folia* pinnata, plana, glabriuscula, pinnarum paribus tribus majoribus, extremo confluyente, omnibus acutis, inciso-serratis. *Flores* terminales corymbosi. *Calycinae squamæ* imbricatæ, ovatæ, margine fusco-nigricantes. *Flosculi radii* 5-7-9, tridentati, albi, majusculi.

Pulchra planta, in horto culta, constans permansit. Flores fere ut in *A. Ptarmica*.

pag. 492. post BUPHTHALMUM.

CCCXCIX. \* Z I N N I A.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1305.*

*Calyx* communis ovato-cylindricus, lævis, imbricatus: *squamis* plurimis, obtusis, erectis, persistentibus. *Corolla* Composita radiata. *Corollulae* hermaphroditæ plures in disco elevato. *Femineæ* quinque ad decem, in radio. *Propria* Hermaphroditi infundibuliformis, quinquefida, intus villosa. *Feminea* ligulata, subrotunda, retusa, disco major, persistens. *Semina* oblonga, tetragona-ancipitia. *Pappus* mucronibus duobus: altero aristato. *Receptaculum* paleaceum: *Paleis* lingulatis canaliculatis, longitudine calycis deciduis.

1324.\* *ZINNIA pauciflora* floribus paucis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1269.*

Z.

*Z. pauciflora* floribus sessilibus. *Linn. Syst. Veg.* 641.

*Z. pauciflora* floribus sessilibus, foliis oppositis cordato-lanceolatis amplexicaulibus sessilibus. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 2139.

*Verbesina* foliis oppositis ovatis acutis integerrimis scabris. *Act. Petrop.* 1763. p. 325. tab. 13.

*Bidens* calyce oblongo, seminibus radii corolla non decidua coronatis. *Mill. Dict.*

*Rudbeckia* foliis oppositis. *Zinn. Gött.* 409. tab. 1.

*Icon.* *Mill. l. c. tab.* 64.

*Germ.* *Wenigblumige Zinnie.*

*Gall.* *Zinnia pauciflora.*

*Hab.* In Peru. Hospitatur in permultis hortis abunde.

*Flor.* Augusto, Septembri, Octobri. *Semina* Octobri, Novembri matura. ☉

*Radix* ramosa-fibrosa. *Caulis* erectus sesquipedalis et longior, teres, compositus. *Folia* opposita, sessilia, amplexicaulia, cordato-lanceolata, glabra, subtrinervia, integerrima, margine scabra. *Calyx* terminalis, sessilis, solitarius, glaber, cylindricus. *Corolla* lutea, persistens. *Rami* ex alis foliorum non flori proximis, cauli similes, altiores. *Linn. l. c.* optime.

Planta verum in serum autumnum hortorum decus.

1324. \*\* *ZINNIA multiflora* floribus pedunculatis, foliis oppositis ovato-lanceolatis subpetiolatis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 3. p. 2159.

*Z.* floribus pedunculatis. *Linn. Dec.* 23. *tab.* 12.

*Z.* ramis villosis numerosis; lateralibus primarium superantibus. *Jacqu. Obs.* 2. p. 19.

*Icon.* *Jacqu. l. c. tab.* 40.

*Germ.* Vielblumige Zinnie.

*Gall.* *Zinnia à plusieurs fleurs.*

*Hab.* In Louisiana. Hospitatur cum præcedenti in complurimis hortis abunde.

*Flor.* et Semina cum præcedente matura. ☉  
 Florum radius ruber, explanatus, quandoque pallide luteus.

*Nota.* *Zinnia verticillata*, elegans. *Jacqu. Icon. rar.* 3. *tab.* 589 seu violacea. *Cavan. Icon. tab.* 81. et *Z. tenuiflora*. *Jacqu. Icon. rar.* 3. *tab.* 590. seu *Z. revoluta*. *Cavan. Icon. tab.* 251. sub divo Carolo Friederico in hortum botanicum Carlsruhensem introductae, nunc in pluribus hortis rusticorum hospitantur.

## SYNGEN. POLYG. FRUSTRANEA.

pag. 498. *CENTAUREA montana*.

*Hab.* Prope *Wertheim* in sylvis montosis ad torrentem *Theilbach* in rupestribus *t. D. Wibelio*.

pag. 501. *CENTAUREA Scabiosa*.

*var. β.* Foliis omnibus lanceolatis integris,

inferioribus longissime pedunculatis, superioribus sessilibus.

*Hab.* Prope *Wertheim* in dumetis supra vineas ad montem *Kalmuth* cum *Athamantha Libanotide* perraro t. *Mertino*.

Vix ac ne vix pro peculiari specie sed varietate insigni *Centaureæ Scabiosæ* habenda est. *Caulis* 2-3 pedalis, erectus, teretiusculus, inferne glabriusculus, basi sublignosus. *Folia* radicalia, caulinaque inferiora longissime petiolata, late lonceolata, integra, versus petiolum attenuata, saturate viridia, scabriuscula, superiora, rameaque sessilia, lanceolata, angustiora, integra, saepe recurva. *Flores* in longis pedunculis alternis solitarii, erecti, cum calycibus *Centaureæ Scabiosæ* in omnibus partibus similes.

pag. 507. *CENTAUREA solstitialis*.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* in agris sabulosis apicis retro *Beiertheim* versus *dem Pulverthurm* rarius.

## SYNGENESIA MONOGAMIA.

pag. 512 post *JASIONEM montanam*.

1340.\* *JASIONE perennis* foliis oblongis subcrenatis obtusis læviusculis planis. *Lamarck. Encyelop. bot. p. 207.*

*Icon. Lamarck. Illustr. tab. 724. fig. 2.*

*Germ. Ausdaurende Jasione.*

*Gall. Jasione vivace.*

*Hab.* In motosis saxosis sterilibus dumetosis



prope *Triberg am Schlofsberg* et prope *Elzach* ubi eam vidi 1814. In Palatinatu trans rhenum prope *Kaiserslautern t. D. Kochio*. In Alsatiae monte *Hoheneck* legit *D. Griesselich*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri maturata. 4

Maxime affinis præcedenti, sed perennat. Flores dilute cœrulei.

*Nota.* Planta ex seminibus in horto Carlsruhensi culta, constantissima permansit.

pag. 515. *VIOLA canina*.

*var. a. sylvestris*.

*Viola sylvestris* caulibus tetragonis erectis, foliis radicalibus cordato-reniformibus, pedunculis folio longioribus, calycis laciniis lanceolato-subulatis, stipulis barbato-ciliatis. *Kitaibl. Römer et Schult. Linn. Sp. pl. V. p. 366.*

*V. sylvestris* adscendens, foliis profunde cordatis supra hispidulis, calcare compresso integerrimo colorato, calycis appendicibus superioribus rotundatis in fructu acuto, evanidis. *Reichenb. Iconogr. botan. I. p. 80.*

*V. canina* podolica. *Besser. Cat. hort. Crem. Suppl. IV. p. 25.*

*V. sylvestris* inodora. *Dodon. Pempt. p. 158. Icon.*

*V. martia* inodora, *sylvestris* foliis majoribus et rotundioribus. *Bauh. pin. 199.*

*Icon. Reichenb. l. c. tab. XCIV.*

*Hab.* In sylvestribus et nemorosis passim non infrequens.

*var. β. Riviniana.*

*Viola Riviniana* adscendens, foliis profunde cordatis supra hispidulis, calcare apice emarginato decolore, calycis appendicibus superioribus angulatis in fructu acuto immutatis. *Reichenb. l. c. p.*

*V. canina Curt. Fl. Lond. Fl. Dan.*

*V. canina sylvestris Fl. Dan.*

*Viola inodora major. Rivin. pentap. Icon. bona.*

*Icon. Reichenb. l. c. tab. XCV. Curtis. Fl. Lond. Flor. Dan. tab. 1453.*

*Hab.* Promiscue cum var.  $\alpha$ . in nemoribus et sylvis passim frequens.

Planta præcedenti sæpe magis robusta. *Folia* firmiora, magis rotundata. *Flores* magni, albide violacei, quandoque albidi, inodori.

*Obs.* Inter  $\alpha$  et  $\beta$  omnino varietates intermediae prostant.

*var. γ. lucorum.*

*V. neglecta* caule erecto angulato, foliis cordatis dentato-crenatis glabris margine scabris, stipulis uno latere dentatis, bracteis supra medium pedunculi, floribus omnibus corollatis. *Schmidt. Fl. Bohem. n. 233. Pio. Viol. p. 22. n. 29. Römer et Schult. Linn. Sp. pl. 5. p. 367.*

*V. canina*  $\delta$ . *lucorum* glaberrima viridis, ramosa, elatior, stipulis supremis postice subintegerrimis. *Reichenb. l. c. p. 60.* (*excluso Kochii et Zizii.*) (*V. montana*) synonymo, quod ad *V. stagninam* pertinet.)

*Icon. Reichenb. l. c. tab. LXXV.*

*Hab.* Cum  $\alpha$  et  $\beta$  in nemorosis passim non infrequens.

*Nota.*  $\alpha$   $\beta$  et  $\gamma$  pro nemoribus et sylvis humidioribus plus minusve umbrosis maxime variabiles sunt. Sic ex varietate  $\gamma$  prostrant in sylva circa Schwetzingen am Reihergestell et passim alibi individua pedalia et altiora, in omnibus partibus tenuiora, foliis tenuioribus, magis elongatis, laete viridibus, floribusque majoribus praedita, varietates  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$  ad Specimina majora *V. caninae* Linn. pertinent.

*var.  $\delta$ . sabulosa* caespitosa, multicaulis, glabra, foliis cordato-subrotundis obtusis crenatis.

*V. canina*  $\beta$ . *sabulosa* glaberrima colorata. *Reichenb. l. c. p. 60.*

*Icon. Reichenb. l. c. tab. LXXIV. fig. 152.*

*Hab.* In pascuis pratisque sabulosis cis et transrhenanis aliisque passim abunde.

*Caespites* rotundos, elegantissimos, densos, copiosis floribus oculos delectantes, format. *Caulles* ex radice plures, breves. *Folia* cordata, subrotunda, glabra, quandoque subpilosula, laete viridia, subtus livida, semiunciam ad unciam lata. *Flores* majusculi, longe pedunculati, vio-

lacei, ex cœruleo-rubelli, albido-cœrulei, varii, sæpe albi, inodori.

Nota. V. Allioni  $\beta$  livida. Reichenb. l. c. nullo modo diversa est.

var.  $\epsilon$ . *ericetorum* humilis, ramosa, foliis cordato-ovatis glabris crenulatis, saturate viridibus.

V. *canina*  $\gamma$ . *ericetorum*: glaberrima viridis ramosa, humilis. Reichenb. l. c. p. 60.

V. *ericetorum*. Schrad. ap. Hayne.

Icon. Reichenb. l. c. tab. LXXIV. fig. 153.

Hab. In ericetosis sabulosis sylvaticis passim abunde. Circa *Carlsruhe im Hardtwald*, prope *Schwetzingen*, et alibi.

*Caules* humiles, ramosi. *Folia* cordato-ovata, quandoque subcordata, saturatius viridia, glabra, obsolete crenulata, 4-5-6 lineas lata, semiunciam ad unciam longa. *Flores* longius pedunculati, mediocres, pallide cœrulei, rarius albidi, inodori.

Nota. Haec abit in V. caninam sylvestrem, Rivinianam et lucorum.

$\xi$ . *arenaria* pumila, caulibus subpubescentibus, foliis cordatis subrotundis subpubescentibus crenulatis.

V. *arenaria* caulibus subpubescentibus patulis, foliis cordato-rotundatis, crenulatis, calcare crasso obtuso. Loisel. Fl. Gall. 1. p. 128. Decand. Fl. Franc. n. 4465. Schummach. pl. Siles. Cent. VII.

V. *Allioni* caulibus simplicibus subpubescen-



tibus, foliis cordato-subrotundis subglabris crenulatis stipulis lanceolatis dentatis, calycibus acutis. *Pio Viol. p. 20. n. 27.* — *Römer et Schult. Linn. Sp. pl. V. p. 367.*

V. *Allionii* caulescens puberula, foliis cordatis, crenulatis, stipulis ovatis, sepalis ovato-lanceolatis calcare sublongioribus, capsula acuta puberula. *Reichenb. l. c. p. 58.*

V. *nummulariæfolia*. *Schleicher. pl. exsicc.*

*Icon. Reichenb. l. c. tab. LXXII. Pio. l. c. tab. 1. fig. 2.*

*Hab.* In sylvis *Pinus sylvestris* sabulosis siccis et ad earum marginalia aprica sabulosa passim abunde. Prope *dem Hardthof* retro *Bulach*, prope *Schwetzingen*, nec non in palatinatu trans rhenum prope *Kaiserslautern. t. Cl. Kochio.*

*Radix* densa ramoso-fibrosa. *Cauliculi* ex radice numerosi, adscendentes, semiunciales, unciales et longiores, subpubescentes. *Folia* numerosa, petiolata, cordata, subrotunda, crenulata, subpubescentia, læte aut pallide viridia, semiunciam longa et lata, sæpe minora. *Stipulæ* minutæ, lanceolatæ, dentatæ, interdum integriusculæ, acutæ. *Flores* axillares, pedunculati. *Pedunculi* tenues, sesquiunciales, biunciales, et altiores, erecti, subpubescentes. *Flores* nutantes, majusculi, albi, pallide cœrulei, inodori.

*Nota.* Specie non diversa a V. *canina* Linn. Varietates inter hanc, arenariam et sabulosam intermediae in locis citatis aliis.

que obveniunt, hinc omnino suo jure et secundum primaria artis amabilis principia, non pro peculiari specie declaranda est.

*V. rupestris.* Schmidt. neue böhm. Abh. I. fig. 10. — Reichenb. l. c. p. 57. tab. LXXI. fig. 141. est omnino eadem cum *V. caninae* var. nostra *arenaria*! sic:

*V. Schmidiana.* Römer et Schult. Linn. Sp. pl. V. p. 363. seu *V. nummulariae* folia Schmidt. Fl. Bohem. n. 246. nullo modo diversa est à *V. caninae* var. *arenaria*.

*V. canina* Linn. pro diverso loco natali, aprico, sabuloso, montoso et petroso, ac demissiori, sylvatico, umbroso, mire et canino more ludit.

pag. 516. *VIOLA montana* caule erecto, foliis ovato-subcordatis elongatis, serratis, stipulis dentato-serratis, subincisis.

*Jacea tricolor* surrectis caulibus, quibusdam arborea dicta. Joh. Bauh. hist. 3. p. 547. (*Icon. bona.*)

*Icon.* Schkuhr. bot. Handb. tab. 269. (*sub V. persicifolia.*) Reichenbach. l. c. p. 87. tab. C. (*sub persicifolia.*) Flor. Dan. tab. 1329. (individuum foliis latioribus cordatis.)

Nostra Planta omnino est *montana* Linn. quam Cl. Koch in *Cat. pl. Palat.* sub *Viola persicifolia* allegavit. Plantam a *V. montana* Linnæi maxime diversam: *V. stagninam* sub *V. montana* in Catalogo citato comprehendit, ubi ejus *V. lactea* Smith. quæ est *V. persicifolia* nostra.

1545.\* *VIOLA stagnina* caule adscendente - erecto subflexuoso ramoso tenui, foliis omnibus cordatis, crenatis-obtusis, stipulis rariter inciso-serratis.

V. *stagnina* caulibus adscendentibus flexuosis ramosis, foliis cordato-ovatis longis acuminatis, stipulis lineari-lanceolatis setaceis. *Kitaibel. Römer et Schult. Linn. Sp. pl. 5. p. 370.*

V. *montana. Koch et Ziz. Cat. pl. Palat. Reichenb. l. c. p. 84. tab. XCVIII. (excl. Synonymis.)*

*Icon. Propria.*

*Germ. Pfützen Veilchen.*

*Gall. Violette stagnine.*

*Hab. In Palatinatu am Holzhof in prato sylvatico udo circa Frankenthal, ubi eam legi 1822.*

*Flor. Junio, Julio. Semina Augusto matura. 4*

*Radix* tenuis, ramoso-fibrosa, fusca. *Caulis* ex radice plures, herbacei, adscendente-erecti, subflexuosi, tenues, ramosi, digitales, palmares, semipedales, et longiores, angulati, glabri. *Folia* alterna, longe petiolata, omnia cordata, margine obsolete crenata, obtusa, tenuia, glabra, venosa, pallide viridia, semiunciam lata, septem ad decem lineas longa. *Stipulae* mediores foliaceae, lanceolatae, rariter inciso-serratae, serraturis apice tenuibus, setulosis, incurvatis. *Flores* axillares, longe pedunculati. *Pedunculi* solitarii, erecti, angulati, glabriusculi, tenues,

biunciales et sublongiores, uniflori. *Corolla* dilute albide-cœrulea, mediocris, inodora.

Differt a *V. montana* Linnæi: Radice multo semper tenuiori. Caulibus semper multo tenuioribus, duplo triplove brevioribus. Foliis omnibus exacte cordatis, obsolete obtuse crenatis, duplo triplove brevioribus, tenuioribus, nec ovato-seu ovato - subcordato - lanceolatis, serratis. Pedunculis multo tenuioribus, duplo brevioribus, non 3-4-5 uncialibus. Stipulis multo angustioribus et brevioribus. *Corolla* semper duplo triplove minori, pallidiori.

Differt a *V. persicifolia* nostra, seu *V. lactea*. Smith. Foliis cordatis, nec ovali-lanceolatis. Corollis minoribus.

pag. 517. *VIOLA persicifolia*.

Delcatur *Schkuhrii* Icon qui ad *V. montanam* pertinet.

*Icon.* Sowerby. Engl. Bot. tab. 545. (sub. *V. lactea*.) Reichenb. l. c. tab. XCIX. (sub *lactea*.)

*Nota.* Cl. Roth nobiscum sub *V. persicifolia*, minime *V. montanam* Linn. comprehendebat!

pag. 519. *VIOLA mirabilis*.

*Hab.* Prope *Weingarten* in sylvis montosis calcareis abunde. Prope *Wertheim* in umbrosis sylvæ *Waldenhausen* t. D. *Wibelio*.

pag. 520. *VIOLA biflora*.

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch im Donauthal* in montosis umbrosis calcareis sylvaticis, nec non in vicina helvetia, retro *St. Gallen*, ubi eam vidi 1818.

---



CLASSIS XX.

GYNANDRIA

DIANDRIA.

---

pag. 530. ORCHIS *pyramidalis*.

*Hab.* In Brisgovia ad montem *Kaiserstuhl* in montosis gramineis sylvaticis inter *Leiselheim Büchensohl* et alibi passim.

pag. 531. ORCHIS *globosa*.

*Hab.* In Brisgoviae valli in *Rothwasserthal*, ubi frequentem vidit *D. Frommherz*.

pag. 532. ORCHIS *coriophora*.

*Hab.* In pratis vallis *Murgthal* prope *Rothensfels*. Circa *Wertheim* in pratis *am Käsejacobs Brüngen*. t. *D. Wibelio*.

pag. 536 ORCHIS *Tabernæmontani*.

*Hab.* In pratis udis prope *Waghäusel*, et prope *Kaiserslautern*, nec non in Principatu superiori.

pag. 541. ORCHIS *fusca*.

*Hab.* Circa *Wertheim* in sylvis prope *Wibelbach* et *Röttersheim*. t. *D. Wibelio*. In pratis *an der Bildeiche*, in der *Wittenbach* et prope *der Sachsenhauser-Klinge* t. *Mertino*.

pag. 545. ORCHIS *odoratissima*.

*Hab.* In Principatu Fürstenbergensi inter *En-*

*gen et Griechenthal* in montosis gramino-  
sis calcareis. In Principatu superiori retro  
*Mæskirch im Donauthale* et prope *Pfu-  
lendorf*. Prope *Wertheim* in sylva *Spes-  
sart* rarius t. *Mertino*.

pag. 548 post ORCHIDEM *sambucinam*.

1372.\* ORCHIS *abortiva* bulbis fas-  
ciculatis filiformibus, nectarii labio ovato  
integerrimo. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1336.*  
*Hoffm. Fl. Germ. 315. Roth. Fl. Germ.*  
*2. p. 392.*

*Orchis abortiva violacea. Bauh. pin. p. 86.*

*Epipactis aphylla*, calcare longo, labello ovato  
lanceolato. *Hall. hist. n. 1288. tab. 36.*

*Limodorum. Hall. opusc. 212. Rupp. Fl.*  
*Jen. p. 295.*

*Limodorum abortivum* aphyllum scapo va-  
ginato, petalis erectis, labello ovato un-  
dulato, cornu subulato, germinis longi-  
tudine. *Swartz. Nov. Act. Holm. 6. p.*  
*80. Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 129.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab. 195.*

*Germ. Violette Orchis.*

*Gall. Orchis violette.*

*Hab.* In *Brisgovia* monte *Kaiserstuhl am  
Scheibenberg* prope *Rothweil* in colle aprico,  
et prope *Oberschaffhausen* rarius.

*Flor.* Junio. 2

*Radix fascicularis*, carnosae, fibrosae, luteo-  
fuscae. *Scapus* erectus, sesquipedalis et altior,

firmus, violaceo-virens, *bracteis* amplexantibus, vaginantibus, concoloribus, longis, striatis vestitus. *Spica* terminalis, rara, 5-7 uncias longa. *Flores* erecti, ad scapum adpressi. *Spathæ* erectæ, acuminatæ, germen amplexantes, pallide virescentes. *Petala* quinque suberecta, acuta, pallide violacea, lineis saturatioribus picta: tria exteriora concava et latiora, duo interiora sublinearia, angustiora, plana. *Nectarii* cornu subulatum.

Ad rariores Floræ cives omnino pertinet. Locis citatis detecta, a filia in arte botanica optime versata, generosi Yttneri.

pag. 551. SATYRIUM *viride*.

*Hab.* Circa *Carlsruhe* prope *Neureith* in pratis rarius, ubi legit *Alexander Braun. Ann.* 1819.

pag. 552. SATYRIUM *nigrum*.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris retro dem *Weisbad* in adjacentibus alpinis, ubi eam vidi 1818.

pag. 561. OPHRYS *Læselii*.

*Hab.* In Principatu superiori in pascuis udis turfosis prope *Bohlingen* et alibi vidi 1814.

pag. 562. OPHRYS *paludosa*.

*Hab.* Prope *Waghäusel* in pascuis turfosis udis frequens, ubi vidi 1818. In Principatu superiori cum precedenti, ubi vidi 1814.

pag. 575. *CYPRIPEDIUM Calceolus*.

*Hab.* Ad montem *Kaiserstuhl* Brisgoviae in  
sylva prope *Bischoffingen* copiose.

## GYNANDRIA HEXANDRIA.

pag. 576.

1398. \* *ARISTOLOCHIA Siphon* foliis  
cordatis petiolatis, floribus solitariis, lim-  
bo trifido æquali, bractea ovata, caule  
volubili frutescente. *Ait. Kew. 3. p. 311.*  
*l'Herit. Stirp. 13. Willd. Linn. Sp. pl.*  
*4. p. 155.*

*A. Siphon* fruticosa, volubilis, foliis petiola-  
tis amplissime cordatis, floribus solitariis,  
calycis tubo retorto, limbo æqualiter tri-  
fido. *Mich. Fl. Amer. 2. p. 161.*

*A. macrophylla.* *Lam. Encycl. 1. p. 252.*

*Icon.* *l'Heritier l. c. tab. 7. — Pfleger. arb.*  
*et frut.*

*Germ.* *Großblättrige Osterluzey.*

*Gall.* *Aristolochie a grandes févilles*

*Hab.* In montibus Alleghanis a Pennsylvania  
ad Carolinam. Hospitatur in hortis angli-  
cis aliisque permultis *Carlsruhe, Schwe-*  
*tzingen, Heidelberg, Weinheim, Dur-*  
*lach, Ettlingen, Rastadt, Favorite, Ro-*  
*thenfels, Baden, Lahr, Zell am Ham-*  
*mersbach, Heitersheim* et alibi passim in  
hortis rusticorum.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri ma-  
turat. *Frutex.*



Alte, longe lateque arbores, muros, domunculas hortenses brevi tempore, mire et elegantissime cooperit et foliis amplissimis laete viridibus pulcherrimis, in serum autumnum conspicuis, condecorat.

Introducta in hortum aulicum Carlsruhe, sub divo Carolo Friederico inter Ann. 1770 — 1780.

---

# CLASSIS XXI.

## MONOECIA.

---

### TETRANDRIA.

pag. 580. post BETULAM.

- CCCCXXIII. \* LITTORELLA. ♂ *Cal.* 4-phyl-  
lus. *Cor.* 4-fida. *Stamina*  
longissima.  
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-fida.  
*Stylus* longissimus. *Sem.* Nux.

### MONOECIA POLYANDRIA.

pag. 582. post CORYLUM.

- CCCCXXXVII.\* PLATANUS. ♂ *Amentum* glo-  
bosum. *Cal.* ○. *Cor.* vix  
manifesta. *Antheræ* filamen-  
tum circumnatae.  
♀ *Cal.* *Amentum* globosum.  
*Cor.* polypetala. *Styli* stig-  
mate recurvo. *Sem.* subro-  
tunda stylo mucronata, basi  
papposa.

### MONOECIA MONADELPHIA.

pag. 582. post PINUM.

- CCCCXXXVIII.\* THUJA. ♂ *Ament.* imbrica-  
tum. *Cal.* Squama. ♀ *Ament.*  
strobilaceum. *Cor.* ○. *Cal.*

squama biflora. *Nux* 1. cincta ala marginata.

pag. 782. post *THUJAM*.

CCCCXXXVIII. \*\* *RICINUS*. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ○. *Stam.* numerosa.

♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ○. *Styli* 3. bifidi. *Caps.* trilocularis. *Sem.* 1.

### MONOECIA SYNGENESIA.

pag. 582. ante *BRYONIAM*.

CCCCXXXIX. \* *MOMORDICA*. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.

♀ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Styl.* 3-fidus. *Pomum* elasticum!

CCCCXXXIX. \*\* *CUCURBITA*. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filamenta* 3.

♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Pistillum* 5-fidum. *Pomi* semina margine tumido.

CCCCXXXIX. \*\*\* *CUCUMIS*. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filamenta* 3.

♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Pistillum* 3-fidum. *Pomi* semina arguta.

## MONOECIA MONANDRIA.

pag. 594. ad *CHARAM vulgarem*.

1405. *CHARA vulgaris* caulibus ramosis teretibus scabriusculis, verticillosum ramis octonis linearibus, apice aphyllis inarticulatis obtusis, bracteis quatuor inæqualibus, binis longissimis nuculas duplo excedentibus, reliquis eas æquantibus. *Wallroth. Ann. Botanicus s. Suppl. III. ad Spreng. Fl. Hall. tab. 1. fig. 1. Sow. Engl. Bot. tab. 336. (optima.)*

β. *elongata* caulibus ramosis scabris, verticillorum ramis octo longissimis patentissimis inarticulatis inferne bibracteatis. *Wallroth. l. c.*

γ. *papillata* caulibus ramis elongatis teretiusculis striatis apice aculeolatis, aculeis papillæformibus, reflexis, adpressis, aggregatis obtusis demum caducis, verticillorum ramis 8-10, bracteis quatuor inæqualibus, nuculas duplo excedentibus, ramulos constringentibus. *Wallroth. l. c.*

*Hab.* β et γ in rivulis segnioribus prope *Dachsland*, *Gnülingen* (et alibi) ubi legit *Alex. Braun* 1821.

1406. *CHARA tomentosa* nostra, est sine dubio, *CHARÆ hispidae* mera varietas, cujus aculei maxima ex parte elapsi sunt. *Wallroth. l. c.*

1407. *CHARA hispida* caulibus hispidis ramosis inferne demum inermibus con-



torto - falcatis sub erosis, superne in-  
crassatis aculeatis: aculeis densis setaceis  
reversis, verticillorum ramis octonis arti-  
culatis patentibus, bracteis inæqualibus  
quatuor, nuculas ovatas subæquantibus.  
*Wallroth. l. c. Icon. tab. 4. (optima.)* —  
*Sow. Engl. Bot. tab. 463. (bona.)*

*Hab.* Prope Mannheim ubi legit *Petiv.*

1407.\* *CHARA aspera* caulibus inferne  
inermibus subsimplicibus, superne hispi-  
dis, aculeis sparsis brevibus rectis: verti-  
cillorum ramis, 6-8 substriatis articula-  
tis, bracteis quatuor nucula brevioribus.  
*Wallroth. l. c. tab. 6. fig. 3. (optima.)*

*Germ.* Rauher Armleuchter.

*Gall.* Charagne âpre.

*Hab.* In foveis aquaticis limosis prope *Gnie-  
lingen* frequens, ubi legit *A. Braun* 1821.

*Flor.* Julio. Semina Augusto matura. ☉

Media quasi inter *Charam pulchellam* et  
*hispidam*.

1407.\*\* *CHARA pulchella* caulibus  
glaberrimis, gracilibus ramosis pellucidis,  
verticillorum ramis octo lineari-subarti-  
culatis æqualibus mucronatis, bracteis  
quatuor nucula ovali brevioribus. *Wall-  
roth. l. c.*

*Chara fragilis* caulibus opacis rigidissimis  
fragilibus, ramulis articulatis, articulis ap-  
proximatis, bracteis fructu brevioribus.  
*Lois. Fl. Gall. Suppl. p. 137.*

β. minor et tenerior, ramis subsenis.

*Chara delicatula.* Desv.

*Germ.* *Schöner Armleuchter.*

*Gall.* *Charagne delicate.*

*Hab.* In fossis aquaticis et aquis stagnantibus passim. Prope *Carlsruhe*, *Dachslund*, *Gnielingen*, *Neureith*. Prope *Wiesloch*, *t. Märklino*. Prope *Frankenthal*. β. In foveis aquaticis prope *Gnielingen* legit *A. Braun* 1821.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

1407. \*\*\* *CHARA glomerata* cauliculis gracilibus glaberrimis, inferne ramosis teretibus pellucidis, verticillorum ramis senis bis quadripartitis, apice incrassatis obtusis, nuculis solitariis sessilibus, internodiis caulinis ternis remotis. *mihi.*

*Chara tenuissima* caulibus setaceis pellucidis, ramis glomerato-verticillatis brevissimis tenuissimis pellucidis, ramulis subflabellatis. Desv. *Journ. Bot.* 2. p. 313. et ej. *Chara glomerata.*

*Chara hyalina.* Decand. *Fl. Franc.* Vol. VI. p. 247.

*Chara flexilis.* β. *stellata.* Wallroth. l. c.

*Germ.* *Kugelförmiger Armleuchter.*

*Gall.* *Charaigne glomifere.*

*Hab.* In foveis aquaticis limosis prope *Gnielingen* cum *Chara pulchella*, *aspera* et *vulgari* γ *papillata*, ubi legit *A. Braun*. 1820.

*Flor.* Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

Plantula pulcherrima, elegantissima, tenerima, 4-6 uncias longa, pellucida. *Internodia* caulina tria, remota, fusca, glabra, in supremis cauliculis evanescentia. *Verticillorum rami* remoti seni, exacte bis-quadripartiti, setacei, 3-4 lineas longi, læte virides, glaberrimi, pellucidi, apicibus incrassati, obtusi, superiores cæspitose glomerati, inferioribus similes, sed duplo minores. *Nuculæ* in ramorum divisionibus supremis, sessiles, solitariae, fuscae, nitidae, oblongae, minutissimae, glabrae.

1407. \*\*\*\* *CHARA Braunii* caulibus teretibus diaphanis, flaccidis, glaberrimis ramosis, verticillorum ramulis lineari-setaceis, articulatis obtusis indivisis, basi bracteatis, nuculis lateralibus quinque bracteatis; bracteis tribus mediis nuculam æquantibus, duabus exterioribus ea brevioribus. *mihi.*

*Germ.* *Braunischer Armleuchter.*

*Gall.* *Charaigne de Mr. Braun.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* in fossis aquaticis prope *Rintheim et Scheibenhart*, magna in abundantia vidit acutissimus *Alex. Braun.* 1820.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ♄

*Caules* 7-9 uncias longi, teretes, flaccidi, ramosi, diaphani, glaberrimi, læte virides.

Plantam sine dubio hucusque vix notam, in memoriam meritissimi *Alexandri Braunii*, inventoris, denominavi.

1408. *CHARIA flexilis*.

*Chara nidifica*. Sow. *Engl. Bot. tab.* 1703.  
*Flor. Dan. tab.* 761.

Variat Verticillorum ramis senis octonis et pluribus simplicibus, vel bi-trifurcatis plus minusve elongatis.

Varietatem verticillorum ramis cylindricis crassioribus, longioribus indivisis, obtusis, apice mucronulatis, nuculis conglobatis, legit acutissimus *Märklinus* prope *Wiesloch* cum *Ch. flexili* in aquis stagnantibus limpidioribus, rivulisque lente fluentibus, quam sub *Chara translucente*. Sow. *Engl. Bot. tab.* 1855. depinxit.

## MONOECIA TRIANDRIA.

pag. 609. sub *CARICE dioica* militat *Carex Davalliana*, hinc differentia specifica inter ambas stabilienda.

1420. *CAREX dioica* spica simplici dioica, stigmatibus binis, fructibus eretiusculis ovatis nervosis superne margine hispidis, foliis culmisque glabris. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 207.

C. *dioica* spica simplici dioica, fructibus ovatis nervosis adscendentibus margine serrulatis. *Smith. Fl. Brit.* 3. p. 963.

C. *dioica* spica foeminea oblonga densiflora, floribus distigmaticis, capsulis ovali-ovatis utrinque convexis nervosis, subcoriaceis, superne serrulato-marginatis, foliis



filiformibus, radice stolonifera. *Wahlenb. Act Holm.* 1805. p. 158.

*C. dioica* spica simplici dioica, capsularum marginibus serrulatis. *Gooden. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. p. 159.

*C. dioica* spica simplici dioica. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1379. *Hoffm. Fl. Germ.* p. 324. — *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 423.

*C. lævis.* *Hoppé.*

*Carex* spica unica subrotunda, seminibus inflatis. *Hall. hist. n.* 1351.

*Cyperoides* parvum, caulibus et foliis tenuissimis, triangularibus, spica subrotunda, capsulis oblongis, in angustum collum vix bifidum attenuatis. *Mich. Gen.* 56. *tab.* 32. *fig.* 2.

Gramen cyperoides minimum, spica cassa simplici. *Moris. hist.* 3. *Sect.* 8. *tab.* 12. *fig.* 22. (*mas.*)

Gramen cyperoides minimum Ranunculi capitulo rotundo. *Moris. hist.* 3. p. 244. *Sect.* 8. *tab.* 12. *fig.* 36. (*fœm.*)

*Icon.* *Schkuhr. Caric. t. A. fig.* 1. *Sow. Engl. Bot. tab.* 543. *Fl. Dan. tab.* 369.

*Hab.* In pratis udis, turfosis spongiosis passim non infrequens.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 24

*Radix* repens. *Culmi* simplicissimi, erecti, triquetri, basi foliosi, læviusculi, tenues, digitales, palmares, pedales. *Folia* radicalia culmo sub breviora, basi vaginantia, triquetra, tenuia, glabra. *Spica* terminalis, dioica, simplicissima: *mascula* unciam longa, erecta, linearis, multiflora. *Glumæ* pallide ex luteo-ferrugineæ, mar-

gine membranaceæ, scariosæ. Fœminea cylindrica, brevior, obtusa. *Capsulæ* ovatæ, extus gibbæ, nervosæ, apicem versus margine serrulatæ, demum erecto-patentes.

Obs. Rarius in basi Spicæ masculæ flores nonnulli foeminei conspicui sunt.

1420.\* *CAREX Davalliana* spica simplici dioica, stigmatibus binis, fructibus recurvatis oblongo-lanceolatis triquetris nervosis, superne margine scabris, foliis culmisque retrorsum hispidis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 208.

C. *Davalliana* spica simplici dioica, fructibus lanceolato-triquetris nervosis, patenti-deflexis, angulis apice scabris. *Smith. Fl. 3. Brit. p.* 964 *Act. Soc. Linn. Lond.* 5. p. 266.

C. *dioica* β. *Davalliana* spica sublineari, subdensiflora, capsulis attenuatis recurvis, culmo acutangulo serrato, foliis brevissimis, radice cæspitosa. *Wahlenb. Act. Holm.* 1803. p. 138.

C. *scabra.* *Hoppé.*

C. *dioica* spica simplici dioica, capsularum marginibus serrulatis. *Willd. Act. Acad. Berol.* 1794. p. 36. *Host. gram.* 1. p. 31.

*Carex* spica unica tereti seminibus rostratis. *Hall. hist. n.* 1550.

*Icon. Schkuhr. Caric. tab. A. Q. W. fig. 2.*  
*Host. l. c. tab. 41. Sow. Engl. Bot. 30.*  
*tab. 2123.*

*Germ. Davallische getrennte Segge.*

*Gall. Carex de Mr. Davall.*

*Hab.* In pratis montosis demissioribusque udis spongiosis passim copiose.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 24

Primo intuitu affinis præcedenti, a quo distinguitur: *Radice* fibrosa, cæspitosa. *Culmis* subaltioribus scabris, quandoque scaberrimis. *Foliis* scabris culmo semper multo, et quidem duplo triplove brevioribus. *Capsulis* lanceolato-triquetris (non gibbis) rostratis, undique nervosis, angulis apice scabris, demum deflexo-patentibus, acuminatis.

pag. 620. post *CARICEM teretiusculam*.

1428.\* *CAREX paradoxa* spicis androgynis anguste paniculatis superne masculis, ramis inferioribus remotiusculis, stigmatibus binis, fructibus subrotundo-ovatis rostellatis bidentatis, margine superne ciliato-serratis. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 243. — *Act. Acad. Berol. Ann.* 1794. p. 59. *tab.* 1. *fig.* 1.

*C. paradoxa* spica supradecomposita laxa, ramosa, congestiuscula, ramis inferioribus remotiusculis, squamis oblongo-ovatis. *Schkuhr. bot. Handb.* 3. p. 336.

*C. paradoxa* spiculis masculis in paniculam digestis, ramis inferioribus subdistantibus, capsulis subrotundo-ovalibus convexo-convexiusculis, subobtusangulis, ore bidentato. *Wahlenb. Act. Holm. Ann.* 1803. p. 142.

*C. canescens* paniculata, paniculæ ramis bre-

vibus, capsulis bifidis, laciniis conniventibus. *Host. Gram.* 1. p. 43.

*Icon. Schkuhr. l. c. Tab. E. n. 21. — Host. l. c. tab. 57.*

*Germ. Seltsame Seggè.*

*Gall. Carex paradoxe.*

*Hab.* In pascuis spongiosis udis sylvaticis passim. In Briegovia prope *Elsach* et inter *Tryberg* et *Furtwangen* vidi *Ann.* 1814. Circa *Wertheim* in locis udis legit amicissimus *Dr. Armann.* In Palatinatu transrhenano *Cl. D. Koch.*

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 2

*Radix* fibrosa, pallide fusca. *Culmi* pedales, sesquipedales, erecti, subtriquetri, tenues, scabri, læte virides, basi fusci, squamis foliaceis atro-fuscis supra radicem vestiti, inferne ultra quatuor uncias foliati. *Folia* culmi longitudine, et longiora, in statu fructificationis culmo breviora, linearia, subcarinata, acuta, lineam vix lata, retrorsum margine et carina scabriuscula, læte viridia. *Spica* terminalis, paniculato-ramosa, erecta, sesquiunciam ad binas uncias longa, unciam lata. *Ramuli* alterni, subpedicellati, superiores subcontigui, inferiores longiores, remotiusculi. *Spiculæ* florentes oblongo-teretiusculæ, acutæ. *Bracteæ* setaceæ fuscae. *Glumæ* ovato-acutæ, fuscae, glabræ. *Capsulæ* subrotundo-ovatae, rostellatae, apice acutæ, bifidæ, margine superne ciliatæ. *Stigmata* duo, plumosa.

Non confundenda cum varietate minori, *C. paniculatae.*



pag. 621. post *CARICEM paniculatam*.

1429.\* *CAREX chordorrhiza* spica composita, spiculis androgynis approximatis superne masculis, capsulis compressis, radice repente filiformi. *Linn. Suppl. p. 414.*

*C. chordorrhiza* spicis androgynis superne masculis, in formam ovatam aggregatis, stigmatibus binis, fructibus ovatis acuminatis, foliis culmceis adpressis, culmo basi subramoso. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 219.*

*C. chordorrhiza* spica composita, spiculis approximatis inferioribus bracteis ovatis acutis subæquantibus, culmo subramoso. *Schkuhr. Caric. p. 25. n. 17.*

*C. chordorrhiza* spiculis apice masculis subaggregatis, capsulis semiglobosis ligneis basi elongata, folio intimo perbrevis, vaginis ceteris aphyllis, radice filiformi procumbente. *Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 142.*

*Icon. Schkuhr. l. c. tab. G. I i. fig. 31.*

*Germ. Fadenwurzliche Segge.*

*Gall. Carex à longue racine.*

*Hab. In Palatinatu transrhenano prope Kaiserslautern in pratis paludosis teste D. Kochio.*

*Flor. Junio. Semina Augusto matura. 2*

*Radix* longa, filiformis, repens. *Culmus* erectus, teretiusculus, 7-10 uncias altus, superne nudus, inferne foliis quibusdam vaginatis, line-

aribus acutis, brevibus, squamisque instructus. *Spica* terminalis, composita spiculis approximatis, 4-6-8, ovata, semiunciam circiter longa. *Bracteæ* ovato-mucronatæ, fusco-rubellæ, margine albidæ, dorso viridescentes. *Capsulæ* ovatæ, acuminatæ, apice subbifidæ, pallide fuscae.

Ad novas omnino Florae germaniae cives pertinet.

pag. 633. post *CARICEM elongatam*.

++++\* *Spicis androgynis, apice femineis, Stigmatibus tribus.*

1437.\* *CAREX atrata* spicis terminalibus pedunculatis, florentibus erectis, fructiferis pendulis, capsulis ovatis acutiusculis, apice bidentatis. *Schkuhr. l. c. p. 356.*

*C. atrata* spicis androgynis terminalibus pedunculatis; florentibus erectis, fructiferis pendulis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1386. Hoffm. Fl. Germ. 330. Roth. Fl. Germ. 2. 447.*

*C. atrata* diandra, vaginis subnullis, spicis ovatis pedunculatis pendulis, terminali inferne mascula, fructibus compressis. *Smith. Fl. Brit. 3. p. 987.*

*Carex* spicis ovatis petiolatis congestis, senescendo nutantibus. *Hall. helv. n. 1369.*

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllaceis, spicis atris et tumentibus. *Scheuchz. Agrost. 481. tab. 11. fig. 1. 2.*

*Icon. Schkuhr. l. c. tab. X. fig. 77. Host.*

*Gram. tab. 88. Flor. Dan. tab. 158. Sow. Engl. Bot. tab. 2044.*

*Germ. Schwarze Segge.*

*Gall. Carex noire.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia in alpinis retro *dem Weisbad am Wildkirchlein, Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto maturatione. 4

*Radix* fibrosa, fusca. *Culmus* pedalis et longior, erectus, triqueter, striatus, basi foliosus. *Folia* culmo breviora, plana, margine scabra, læte viridia. *Spicæ* terminales, 3 - 4 - 5, pedunculatæ, androgynæ, apice femineæ, inferne masculæ, floribus quandoque hermaphroditis subdiandris mixtæ, florentes erectæ, fructiferæ pendulæ. *Bractææ* foliaceæ vix vaginatæ. *Glumæ* ovatæ, atræ. *Capsulæ* ellipticæ, compressæ, glabræ, ore emarginatæ, subrostratæ, glumis subbreviares. *Stigmata* tria. *Stamina* sæpe tria quandoque duo.

pag. 637. post *CARICEM flavam.*

1440.\* *CAREX gynobasis* spicis femineis paucifloris sessilibus masculæ approximatis, inferiori radicali longe pedunculata, capsulis pyriformibus apice integris. *Schkuhr. l. c. p. 374.*

*C. gynobasis* spicis paucifloris, inferiore ex pedunculo radicali fluitante, squamis fuscis margine argenteo cinctis. *Vill. Fl. Delph. 2. p. 207.*

**C.** *alpestris* spicis subpaucifloris, infima longissima exserte pedunculata, superioribus subpedunculatis, bractea infima radicali foliata, superioribus spicæ masculæ subapproximatis, brevissime vaginantibus cuspidato - subfoliatis, capsulis oblongo-turbinatis, triquetris, apiculatis subpubescentibus, ore unilobo. *Wahlenb. Act. Holm.* 1803. p. 157. — *Willd. Linn. Sp. pl. IV.* p. 284. *Allion. Fl. Ped. n.* 2329.

**C.** *diversiflora.* *Host. Gram.* 1. p. 53.

**C.** *Halleriana.* *Asso. Syn. n.* 922. *tab.* 9. *fig.* 2.

**C.** spica foeminea infima radicali, capsulis triquetris elongatis. *Hall. helv. n.* 1385.

*Icon.* *Schkuhr. l. c. tab. G. n.* 35. *Host. l. c. tab.* 70.

*Germ.* Grundweibliche Segge.

*Gall.* *Carex à épi radicale.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, in agro Abbatis cellensium, retro dem *Weisbad auf dem Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 4

*Radix* fibrosa. *Culmus* pedalis, sesquipedalis, erectus, triquetrus, basi foliatus. *Folia* linearia, acuta, culmo breviora. *Bracteæ* subfoliatae, infima radicali foliata. *Spica* mascula terminalis solitaria, foemineæ tres, binæ sessiles, approximatae, suppaucifloræ, tertia infima radi-



cali longissime pedunculata. *Glumæ* foemineæ acutiusculæ, fusco-rubellæ, margine albidæ. *Capsulæ* pyriformes, triquetræ, apice integriusculæ, subpubescentes. *Stigmata* tria.

pag. 645. post *CARICEM piluliferam*.

1445.\* *CAREX supina* spicis foemineis subbinis subsessilibus globosis, bracteis sub-amplexicaulibus squamaceis confertis, capsulis subglobosis rostellatis ore bilobo spica mascula tenui, culmo debili, foliis angustissimis. *Wahlenb. Act. Holm.* 1805. p. 158.

*C. supina* spica mascula solitaria, foeminea subsolitaria subrotunda, sessili approximata, stigmatibus tribus, fructibus elliptico-triquetris rostratis ore emarginatis squamam ovatam subæquantibus. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 265.

*C. glomerata* spica mascula oblonga, foemineis subbinis ovatis confertis sessilibus, capsulis subglobosis glabris glomeratis. *Schkuhr. Caric.* p. 79. n. 65.

*Icon.* *Schkuhr. l. c. tab. I. n. 41.*

*Germ.* *Niedere Segge.*

*Gall.* *Carex nain.*

*Hab.* In sterilibus arenosis apricis circa *Mannheim* inter *Seckenheim* et *dem Relais*hause, ubi eam vidi 1815. In pascuis sterilibus arenosis apricis et collibus in Principatu superiore prope *Salem* et *Heiligenberg* vidi *Ann.* 1814. Prope *Mombach* circa *Mainz* in sabulosis graminosis teste *D. Kochio*.

*Flor.*

*Flor.* Aprili, Maio. *Semina* Julio matura. 2

*Culmus* erectus, tenuis, triqueter, striatus, glaber, 2-3-7 uncias longus, superne nudus versus radicem foliatus. *Folia* vaginantia, erecta, linearia, angusta, acuta, glabra, læte viridia, culmo breviora. *Spica* erecta; *mascula* pedicellata, terminalis, solitaria, lanceolata, tenuis, 3-4-5 lineas longa, lineam vix lata: *fæmineæ* infra masculam, solitariae, sæpe subbinæ, sessiles, *Bractea* sublongiori, ovata, mucronulata, suffultæ. *Glumæ* ovatae, obtuse mucronatae, saturate fuscae, margine membranaceae, albidæ. *Capsulae* ovali-subglobosae, glabrae, fuscae, apice subbifidæ.

pag. 648. *CAREX clandestina*.

*Hab.* Prope *Wertheim* ad montem *Kalmuth*, ubi post *D. Wibelum* vidi.

pag. 650. post *CARICEM filiformem*.

1449.\* *CAREX firma* foliis brevibus lineari-lanceolatis firmis, spica mascula sæpe refracta, capsulis oblongis apice vaginantibus. *Schkuhr. l. c. p.* 387.

*C. firma* spicis masculis terminali unica, femineis pedunculatis alternis, foliis trifariis firmis. *Host. Gram. 1. p.* 56.

*C. firma* spicis exserte pedunculatis strictis oblongis submultifloris, bracteis breviter vaginantibus subfoliatis subremotis, capsulis oblongo-lanceolatis attenuato-rostellatis acute serrulateque marginatis, ore unilobo. *Wahlenb. Act. Holm. 1803. p.* 157. — *Willd. Linn. Sp. pl. IV. p.* 286.

*C. rigida.* Schrank. *Fl. Bav.* 1. p. 290.  
*Icon.* Schkuhr. l. c. tab. O. Y. n. 54.  
*Germ.* Steife Segge.  
*Gall.* *Carex roide.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia  
 apud Abbatis-cellenses retro *dem Weisbad*  
 in rupibus calcareis *am Wildkirchlein*, *Ga-*  
*mor*, *Kasten et Sentis* frequens, ubi vidi  
 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto, Sep-  
 tembri matura. 2

*Radix* fibrosa. *Culmi* digitales, palmares  
 et longiores, erectiusculi subcurvatique trique-  
 tri, radicem versus subfoliosi, cæterum aphylli.  
*Folia* cæspiticia, linearia, acuta, firma, unciam  
 ad tres uncias longa, læte viridia. *Spica* mas-  
 cula terminalis, pedunculata, sæpissime refracta!  
 fœmineæ pedunculatæ 1 - sæpe 2, rarius 3, al-  
 ternæ, tenues, oblongæ, strictæ. *Bracteæ* sub-  
 foliatæ, breviter vaginantes, remotiusculæ. *Glu-*  
*mæ* ellipticæ, obtusiusculæ, fusco-rufæ, mar-  
 gine pallide albidæ, nervo dorsali viridi, fœmi-  
 neæ mucronulatæ. *Capsula* oblongo-lanceo-  
 lata, rostrata, margine serrulato-hispida. *Stig-*  
*mata* tria.

*Obs.* In helvetiæ alpinis vulgatissima, in alpe *Rigi*  
 abunde vidi, nec non ad montem *Canigou* in  
 pyrenæis.

pag. 650. post *CARICEM filiformem.*

1449. \*\* *CAREX umbrosa* spica mas-  
 cula solitaria, fœmineis subternis appro-

ximatis, subsessilibus alternis, infima bractea foliacea, glumis foemineis carina scabris, capsulis oblongis pubescentibus.

**C.** *umbrosa* spica mascula unica, spicis foemineis approximatis duabus tribusve, squamis foemineis carina scabris, capsulis oblongis hirtis. *Host. Gram. 1. p. 52. Schkuhr. Caric.*

*Icon. Host. l. c. tab. 69. — Schkuhr. l. c. tab. U. u. u. fig. 165.*

*Germ. Schatten-Segge*

*Gall. Carex ombragée.*

*Hab.* Circa *Carlsruhe* prope *Neureith* in umbrosis, nec non in nemoribus prope *Hohenwettersbach*. Prope *Wertheim* in sylvis frequens, *t. D. Axmanno*. Prope *Frankfurtum* ad *Moenum* prope *Offenbach* in nemorsis umbrosis.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 4

*Radix* densa, fibrosa, fusca. *Culmi* ex radice plures, ultrapedales bipedales, obtuse triquetri, tenues, glabriusculi, erecti, superne cernui, laete virides, basi foliosi, caeterum aphylli. *Folia radicalia* caespitosa, numerosa, linearia, acuta, duriuscula, carina et margine retrorsum scabra, pedalia, sesquipedalia et longiora, lineam vix lata, laete viridia, juniora culmo breviora: *culmea* inferiora vaginantia, uncialia, biuncialia, adultiora culmo multo longiora, apicem versus emarcida. *Spica* terminalis mascula, erecta, cylindrica, obtusa, pedunculata, semiunciam longa. *Femineae* inferiores subapproximatae, subsessiles, alternae, tres, rarius duo, breviores,



ovales, infima breviter pedunculata remotiuscula, bractea tenui foliacea, erecta, longitudine spicæ, interdum sub breviori vel sub longiori, suffulta. *Glumæ* masculæ oblongæ, mox acutæ, mox obtusæ, integræ, interdum sub erosæ, ferrugineæ. *Glumæ* fœmineæ obovatæ, obtusæ, subemarginatæ, ferrugineo-fuscæ, *carina* scabriuscula, albide-virescenti. *Capsulæ* oblongæ, villosulæ, subtriquetræ, subrostratæ, pallide viridulæ, apice bifidæ. *Stigmata* tria, plumulosa.

C1 Willdenowii in Sp. pl. 4. p. 677. n. 142. data descriptio C. umbrosæ recedit a nostrate: Spica mascula non obovata, binis inferioribus non exserte pedunculatis, fructibus non compressis, ore integriusculis, nec bifidis.

Individua Turini lecta, in herbario meo siccata, nostratibus simillima, sed duplo fere longiora.

1449. \*\*\* *CAREX Buxbaumii* spica androgyna pedunculata obovata inferne mascula, fœmineis subternis remotis subpedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus ellipticis triquetris, obtusis, obsolete bidentatis, squamam oblongam mucronatam subæquantibus. *Willd. Sp. pl. 4. p. 252.*

C. *Buxbaumii* spicis pseudoandrogynis subsessilibus oblongis, bracteis subamplectentibus foliaceis distantibus, squamis subæquantibus cuspidatis, capsulis ovali-oblongis obtusiusculis triquetro-depressis, ore bidentato. *Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 164.*

C. *polygama* spica androgyna terminali, in-

ferne mascula, femineis ovatis subsessilibus remotis erectis, capsulis obovatis glabris, apice integris. *Schkuhr. bot. Handb.* 3. p. 588.

*Cyperoides majus*, spicis brevibus, rotundis, spadiceo-viridibus. *Buxb. Cent.* 4. p. 33. *tab.* 59.

*Icon.* *Schkuhr. l. c. n.* 76. X. G. g.

*Germ.* *Buchsbaamsche Segge.*

*Gall.* *Carex de Mr. Buxbaum.*

*Hab.* In Brisgovia prope *Tryberg* versus *Liedenweiler* in pratis humidis versus rivulorum margines. Circa Francofurtum ad mœnum prope *Offenbach* in prato udo prope *dem Metzlerschen Landgute*, non infrequens, ubi eam vidi *Ann.* 1822.

*Flo r.* Majo, Junio. *Semina* Augusto maturata. 4

*Radix* repens, stolonifera, fusca. *Culmus* pedalis, subsesquipedalis, erectus, triqueter, glaber, versus radicem foliosus, cæterum excepta bractea foliacea aphyllus. *Folia* culmo sæpe breviora, quandoque longiora, linearia, acuta, striata, glabra, læte viridia, margine retrorsum scabriuscula. *Spica* terminalis superne fœminea, inferne mascula, subpedunculata, ovata, 4-5 lineas longa, erecta, solitaria, bractea nulla aut parva setacea suffulta. *Femineæ* tres, subremotiusculæ, alternæ, superiores subsessiles, bractea setacea breviori præditæ, *infima* breviter pedunculata, reliquis duplo fere longior, subcylindrica, 6-7 lineas longa, bractea foliacea erecta duplo triploque longiori suffulta. *Glumæ* oblongæ,

mucrone brevi terminatæ, fusco-ferrugineæ, margine pallidiores. *Capsulæ* obovatæ, triquetrae, glabræ, ore integriusculæ aut obsolete bidentatæ. *Stigmata* tria.

Spica terminalis quandoque superne mascula, inferne fœminea.

pag. 650. *CAREX ferruginea*.

Deleantur signa interrogationis apud *Schkuhrii et Villarsii* synonyma.

*C. ferruginea* spica mascula solitaria, fœmineis tribus distantibus, binis inferioribus pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus oblongis compresso-triquetris margine hispidis ore membranaceo bilobo squama oblonga acuta longioribus. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 274.

*C. varia* spica mascula terminali, unica, fœmineis pedunculatis, capsulis oblongis, margine aculeatis. *Host. Gram.* 1. p. 50. *tab.* 80.

*Hab.* Porro in vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen*, prope *dem Weisbad*, *auf dem Gamor*, *Hohenkasten et Sentis* in rupibus frequens, ubi legi 1818.

*Radix* longe denseque fibrosa, nigricante-fusca. *Culmus* curvato-erectus, tenuis, obtuse triqueter, 5-8-13 uncialis, glaber, pallide viridis, inferne foliis paucis, unciam circiter longis lineari lanceolatis instructus. *Folia radicalia* cæspiticia, erecta, linearia, acuta, lineam vix lata, sesquiunciam ad octo uncias longa, pallide viridia, retrorsum margine scabriuscula. *Spica* terminalis mascula, pedunculata, solitaria,

erecta, teretiuscula, acuta, aut tereti lanceolata interdum sed raro subovata, 5-6-7 lineas longa, fusco-ferruginea, basi bractea brevissima lanceolata concolori suffulta. *Fæmineæ* sub mascula, tres, remotæ, alternæ: suprema subsessilis, inferiores laxiusculæ longe pedunculatæ, pedunculis filiformibus tenuibus, *Bractea* foliacea, tenui, prælonga, instructa. *Glumæ fæmineæ* ovato-lanceolatæ, acutæ, aut obtusiusculæ fusco-ferrugineæ, nervo dorsali subvirescente. *Capsulæ* laxæ, oblongæ, compresso-triquetræ, lateribus subsetulosæ, apice membranaceæ, bilobæ, glumis longiores. *Stigmata* tria, plumulosa.

Planta in alpinis subalpinisque maxime polymorpha. Spica mascula quandoque inferne foeminea. Spicæ foemineæ interdum apicem versus masculæ.

In summo jugo montis Rigi helvetiæ ubi abundantem vidi, legi inter alia bene multa, individua quaedam, spica solitaria mere foeminea stigmatibus duobus instructa.

pag. 651. post *CARICEM ferrugineam*.

1450.\* *CAREX frigida* spica mascula solitaria, fœmineis tribus distantibus, binis inferioribus pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus lanceolatis triquetris margine hispidis bicuspidatis, squama oblonga longioribus. *Willd. Sp. pl. 4. p. 275.* — *Allion. Fl.*

*C. spadicea* vaginis subdimidiatis, spicis fœmineis suprema subsessili, capsulis oblongis mucronatis apice bifidis, squamis dimidiatis longioribus. *Schkuhr. Caric. p. 90. n. 75. tab. N. fig. 47.*



β. *C. fuliginosa* vaginis subdimidiatis spicis androgynis basi masculis, foemineis interdum oblongo-pedunculatis, capsulis oblongis mucronatis apice bifidis, squamis longioribus. *Schkuhr. l. c. p. 91. n. 76. tab. C. c. fig. 47.*

*C.* spicis foemineis ternis, quaternisque distichis, capsulis longe mucronatis. *Hall. hist. n. 1591.*

*Germ. Brand - Seggè.*

*Gall. Carex frigide.*

*Hab.* In Brisgoviae monte *Feldberg*, infra dem *Feldberg - See* in humidis, ubi vidi 1814. In vicinia Principatus superioris retro *St. Gallen* prope dem *Weisbad auf dem Gamor* 1818 vidi cum var. β.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. 24

Affinis *C. ferrugineæ*, a qua differt: *Culmis*, foliis, pedunculis, spicisque longioribus, in varietate β fusco-fuligineis, subnutantibus, radicali sæpissime longissime capillarique pedunculata; *Glumis* angustioribus, acutis, fusco-fuligineis splendidis, dorso nervo tenuiori fusco præditis, capsula dimidio brevioribus; *Capsulis* densius imbricatis, lanceolatis, fuligineo-fuscis, angulis hispidis, rostro bicuspidatis.

Specimina in altioribus alpinis helvetiae et passim in Pyrenaeis a me lecta, nostratibus simillima.

pag. 654. post *CARICEM sylvaticam*.

1453.\* *CAREX capillaris* spicis pendulis, mascula erecta, foemineis oblongis

distichis, capsulis nudis acuminatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1386.

*C. capillaris* vaginis dimidiatis, spicis fœmineis oblongis laxis, fructiferis pendulis, pedunculis capillaribus, capsulis acuminatis. *Good. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. p. 180. *Smith. Fl. Brit.* 3. p. 985. *Host. Gram.* 1. p. 47.

*Carex* spicis femineis raris, pendulis capsulis ovato-conicis mucronatis. *Hall. helv. n.* 1394.

*Icon. Schkuhr. Caric. tab. O fig.* 56. *Sow. Engl. Bot. tab.* 2069. *Flor. Dan. tab.* 168. *Host. l. c. tab.* 62. *Scop. Flor. Carn. tab.* 59.

*Germ. Haarstielige Segge.*

*Gall. Carex capillaire.*

*Hab.* In vicina Principatus superioris helvetia, apud Abbatiscellenses prope *St. Gallen* retro *dem Weisbad am Wildkirchlein*, *Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 4

*Radix* fibrosa. *Culmus* erectus, digitalis, striatus, glaber, nudus. *Folia* radicalia culmo multo breviora, linearia, angusta, margine versus apicem scabriuscula. *Spica* mascula terminalis, erecta, linearis, fusco-argentea. *Femineæ* persæpe tres, pedunculis prælongis capillaribus, triquetris, scabris, nutantes, demum pendulæ, ovatæ, breves, 6-11 floræ. *Bracteæ* foliaceæ, basi vaginantes, pedunculis breviores. *Glumæ* ovatæ, fusæ, apice scariosæ, albidæ. *Capsulæ*

ovatae, triquetrae, acuminatae, subventricosae, glabrae, fuscae. *Stigmata* tria.

1453. \* \* *CAREX brachystachys*  
 spicis longe exserte pedunculatis angustissimis brevibus sparsifloris, bracteis vaginantibus subfoliatis subremotis, squamis brevibus submucronatis, capsulis lanceolatis ore bidentatis, culmo setaceo, foliis angustissimis convolutis. *Wahlenb. Act. Holm.* 1803. p. 154. *Willd. Linn. Sp. pl. IV.* p. 276.

*C. brachystachys* spicis brevibus linearibus longe pedunculatis subpendulis, foemineis laxis, capsulis utrinque mucronatis apice paulo bifidis, foliis convolutis setaceis. *Schkuhr. l. c. p. 402. Schrank. Fl. Bav.* 294. — *Hoppé Taschenb.* 1800. p. 34.

*C. strigosa.* *Allion. Fl. Pedem. n.* 2331.

*Carex* foliis caespitosis brevibus, spicis foemineis paucifloris, suprema sessili. *Hall. helv. n.* 1386.

*Cyperoides alpinum angustifolium*, spicis seminiferis tenuibus fusco-viridibus. *Scheuchz. Agrostr.* 416. *tab. 10. fig. 7.*

*Icon.* *Schkuhr. l. c. tab. P. n.* 58.

*Germ.* Kurzährige Segge.

*Gall.* *Carex à courte épi.*

*Hab.* In Principatus superioris vicina helvetia, retro dem *Weisbad* ad montem *Sentis* vidi 1818,

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. 24

*Radix* fibrosa. *Culmus* semipedalis, pedalis et altior, erectus, filiformis. *Folia* angustissima, convoluta, culmo breviora, interdum sublongiora. *Spica* mascula terminalis, solitaria; foemineæ 2-3, longius pedunculatæ, distantes, filiformes, laxifloræ, breves. *Bractea* subfoliata, varginans. *Glumæ* breves mucronatæ, fusco-viridescentes. *Capsulæ* lanceolatæ, utrinque mucronatæ, apice subbifidæ.

pag. 656. CAREX *pendula*.

*Hab.* Prope Ettlingen, inter Wohlfartsweiher et Wettersbach.

pag. 659. CAREX *fulva*.

*Icon.* Flor. Dan. tab. 1768.

*Hab.* Circa Carlsruhe prope Neureith in pratis udis.

## MONOECIA TETRANDRIA.

pag. 674. ante BETULAM.

## CCCCXXIII. \* LITTORELLA.

*Linn. Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1415.

*Masculi* flores. *Calyx* tetraphyllus erectus. *Corolla* monopetala. *Tubo* longitudine calycis, *Limbo* quadripartito, erecto, persistente. *Filamenta* quatuor filiformia, longissima, receptaculo inserta. *Antheræ* cordatæ. *Feminei* in eadem planta. *Calyx* nullus. *Corolla* monopetala, eonica, ore subquadrifida, persistens.



*Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longissimus. *Stigma* acutum. *Nux* unilocularis.

1467.\* *LITTORELIA lacustris*. Willd.  
*Linn. Sp. pl.* 4. p. 330. *Linn. Mant.*  
 295.

*Plantago uniflora* scapo unifloro. *Linn. Sp.*  
*pl.* 1. p. 167. — *Hall. hist. n.* 655.

*Plantago palustris* gramineo folio monanthos,  
*Parisiensis*. *Raj. Syn.* 316.

Gramen junceum minimum, capitulis longis-  
 simis filamentis donatis. *Moris. hist. Sect.*  
 8. tab. 9. fig. 30.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 468. *Schkuhr.*  
*bot. Handb. tab.* 287. *Oed. Fl. Dan. tab.*  
 170.

*Germ.* Sumpf- oder Seesträndling.

*Gall.* Littorelle des étangs.

*Hab.* In Principatu superiori ad lacum Bodam-  
 micum in inundatis sabulosis prope *Constan-  
 et Mainau* frequens, ubi eam vidi 1814.  
 In Vogesi Lacu t. *D. Nestlero*.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto ma-  
 tura. 4

*Radix* fibrosa, sarmentosa, cinereo-albida.  
*Sarmenta* procumbentia, simplicia, filiformia,  
*Scapi* plures, 2-3-5, erecti, filiformes, glabri,  
 1-2-3 unciales, uniflori, masculini. *Folia* ra-  
 dicalia linearia, integerrima, subtus convexa:  
 glabra, læte viridia, erecta, basi latiora, vagi-  
 nantia, sesquiunciam ad duas uncias longa. *Fi-*

*lamenta* tenuia, flexuosa prælonga, uncialia et longiora. *Antheræ* magnæ pallide luteæ. *Flores feminei* inter foliorum basin, sessiles. *Stylus* rectus, simplicissimus, prælongus. *Nucleus* ovali-oblongus, brunneus.

pag. 679. *BETULA ovata*.

*Hab.* Prope *Elzach*, *Yach*, *Waldkirch* et alibi passim frequens.

pag. 685.

1476.\* *MORUS nigra* foliis cordatis ovatis lobatisque inæqualiter dentatis scabris. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 369.

*M. nigra* foliis cordatis scabris. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1398.

*Morus* fructu nigro. *Bauh. pin.* 459.

*Icon. Psleger. arb. et frut. Regn. bot. Blackw.* tab. 126.

*Germ.* Schwarzer Maulbeerbaum.

*Gall.* Morier à fruits noirs. Morier noir.

*Hab.* In Persia. Hospitatur in hortis, et ad rusticorum passim stabula.

*Flor.* Majo, Junio. *Fructus* Julio maturat. ‡

Arbor mediocris, sæpe dioica. *Fructus* immaturi rubri, maturi nigri, acidulo - dulcescentes, succulenti, sapidissimi. *Succus* rubro-purpureus.

*Pharm.* MORI Cortex. Buccæ.

Cortex radicis extus lutescens, adstringens, an-

thelminthicas vires habet, contra Taeniam commendatur. Nic. Andry de la generation des vers. p. 172.

Ex baccis maturis paratur Roob refrigerans, in febribus ad linguam aridam emolliendam, ardorem et sitim infringendam.

## MONOECIA PENTANDRIA.

pag. 688. AMARANTHUS *Blitum*.

Deleantur synonyma: Amaranthus sylvestris et vulgaris *Tournef. et Lobel. Icon.* 250, et inseratur Blitum album minus. *Bauh. hist. 2. p. 967.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2212.*

pag. 689. AMARANTHUS *prostratus*.

Deleantur: Blitum album minus. *Joh. Bauh. hist. 2. p. 967*, et Blitum rubrum minus. *Camerar. Epitom. 255. Icon.* et inseratur: Blitum album. *Camerar. Epitom. 236. Icon.*

pag. 690. post AMARANTHUM *prostratum*.

1480. \* AMARANTHUS *sylvestris* glomerulis axillaribus, triandris, foliis ovatis acutis, calycibus triphyllis, caule erecto ramoso.

A. *sylvestris* caule ramoso erectiusculo, foliis ovatis petiolatis, floribus triandris glomeratis axillaribus, calycibus triphyllis mucronatis. *Loiseleur. Fl. Gall. app. p. 140.*

A. *sylvestris*. *Defont. Catal. hort. Paris. 44.*

**A.** *sylvestris* et *vulgaris*. *Tournef. Pl. de Paris.* 2. p. 248. (*exclus. Synon.*)

*Germ.* *Wilder Amaranth.*

*Gall.* *Amaranthe sauvage.*

*Hab.* In ruderatis ad viarum marginalia circa *Carlsruhe*, *Mühlburg*, *Neureith*, *Eckenstein*, et alibi passim non infrequens.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

*Radix* ramosa, fibrosa. *Caulis* sesquipedalis, bipedalis, et altior, erectus, sulcatus, glaber, ramosus. *Folia* alterna, petiolata, ovata, acuta, integra, subtus venosa, glabra, læte viridia, sesquiunciam ad binas uncias longa, unciam ad quatuordecim lineas lata. *Flores* axillares, sessiles, glomerati, triphylli, triandri, virides, rubello mixti.

Distinetissima ab *A. Blito* et *prostrato*: *Caulibus* erectis. *Foliis* semper apice acutis, nec retusis. *Floribus* omnibus axillaribus.

*Obs.* Planta ex seminibus in horto per plures annos culta, mutationem non passa est.

1480. \*\* *AMARANTHUS retroflexus*  
racemis pentandris lateralibus terminalibusque, caule flexuoso villosa, ramis retrocurvatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1407.

**A.** *retroflexus* racemis pentandris supradecompositis confertis, erectis, ramis pubescentibus, foliis ovatis undulatis. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 391.

*Icon.* *Willd. Amaranth. tab.* 11. *fig.* 21,



*Germ. Zurückgebogener Amaranth.*

*Gall. Amaranthe recourbé.*

*Hab.* In ruderatis ad vias pagorum circa *Carlsruhe, Mühlburg, Grünwinkel, Dachsland, Neureith, Gnielingen, Eckenstein, Schreck*, et alibi passim frequens.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

*Radix* ramosa, fibrosa. *Caulis* bipedalis, tripedalis et altior, flexuoso-erectus, villosus-pubescent, crassus, sulcatus, ramosus. *Rami* infimi sæpe elongati et retroflexi. *Folia* alterna, petiolata, ovata, acuta, nervosa, margine subundulata. *Flores* axillares terminalesque, spicato-racemosi. *Spicis* supradecompositis, dense confertis, erectis. *Calyces* pentandri, viridi-albescentes.

*Nota.* Planta ante decem annos vix in nostris regionibus conspicua, sine dubio ex horto botanico ab hoc tempore emigravit, americanae originis, nunc vulgata, indigena facta est.

Rami praesertim infimi, saepe versus terram elongati et retroflexi.

## MONOECIA POLYANDRIA.

pag. 698. post *QUERCUS Robur*.

1487.\* *QUERCUS lanuginosa* foliis deciduis oblongis superne angustioribus grosse sinuato-dentatis, subtus villosolanuginosis, fructibus sessilibus.

*Q. lanuginosa* foliis subtus villosolanuginosis, glandibus mediocribus oblongis, cupulis

pulis subtuberculatis. *Thuil. Flor. Paris. II. p. 502.*

*Q. Robur* δ. *lanuginosa*. *Lamarck. Encyclop. 1. p. 717.*

*Germ. Wollhaarige Eiche.*

*Gall. Chene roure lanugineux.*

*Hab.* In collibus apricis passim. In *Brisgovia am Kaiserstuhl* non infrequens.

*Flor.* Primo vere. *Semina* Autumno maturat. h

*Arbor* mediocris, tortuosa. *Ramuli* villosopubescentes. *Folia* petiolata, binas uncias longa, unciam lata, plana, firma, oblonga, superne angustiora, glabra, læte viridia, subtus venosa, villosa-lanuginosa, subincana. *Fructus* sessiles, mediocres. *Cupulæ* subtuberculatæ.

*Nota.* Habitus arboris *Ramuli* et *Folia* multo semper minora, superne angustiora, subtus semper villosa-lanuginosa, dicuntur separetorem à *Quercu Robur*.

1487.\*\* *QUERCUS pinnatifida* foliis deciduis ovatis, pinnatifidis superne glabris, subtus villosa-lanuginosis, segmentis suboppositis integris sublinearibus obtusis. *mihi.*

*Germ. Zerschlitzte Eiche.*

*Gall. Chêne pinnatifide.*

*Hab.* In *Brisgovia* ad montem *Kaiserstuhl*, ubi nuper detexit *A. Braun*.

*Arbor* mediocris, tortuosa. *Ramuli* glabriusculi. *Folia* petiolata, ovata, omnia pro-

funde sinuato-pinnatifida, 2-2½ uncias longa, 14 ad 16 lineas lata, plana, superne glabra, viridia, sublucida, subtus venulosa, villosa-lanuginosa, subincana. *Segmenta* opposita alternave; sublinearia, integra, obtusa. *Fructus* non vidi.

**Nota.** Ad novas et rarissimas Florae cives pertinet. Unicum saltem individuum hujus arboris vidit acutissimus Braun loco citato.

An varietas maxime memorabilis *Quercus lanuginosae*?

pag. 701.

1490.\* *JUGLANS nigra* foliolis quindenis subcordatis, serratis, fructu globoso punctato scabriusculo, nuce corrugato. *Michaux. hist. des Noyers de l'Amer. septentr. p. 157.*

*J. nigra* foliolis numerosis lanceolatis serratis, subtus petiolisque subpubescentibus, fructibus globosis punctato-scabris. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 456. — Linn. Sp. pl. 2. p. 1415.*

Jux *nuglans virginiana nigra. Herm. Lugd. bat. 452.*

*Icon. Michaux. l. c. tab. 1. Pfleger. arb. et frut. — Jacqu. Icon. rar. tab. 191. Catesby. Carol. tab. 67. Wangenh. Amer. tab. 8. fig. 20.*

*Germ. Schwarzer Wallnussbaum.*

*Gall. Noyer noir.*

*Hab.* In Pennsylvania, Virginia. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe* et alibi nec non

*circa Carlsruhe passim auf dem Kammergut Gottsau et Scheibhardt ad vias publicas.*

*Flor.* Majo. *Fructus* Septembri, Octobri maturat. h

*Arbor* medioeris. *Foliola* subcordato-lanceolata, serrata, quindena, septena, novena.

Nuclei edules minus sapidi. Oleum dulce Lignum nigricans, variegatum, compactum, durum, pro scriniariorum operibus exquisitum

pag. 706. post CORYLUM.

# CCCCXXXVII.\* P L A T A N U S.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1451.*

*Masculi Flores* compositi in *Amentum* globosum digesti. *Calicis* lacinulae nonnullae minimae. *Corolla* vix manifesta. *Antherae* tetragonae Filamento circuminatae. *Foeminei Flores* in globum digesti, numerosi, in eadem arbore. *Corollae petala* plura, concava, oblonga, clavata. *Fructus* plures in globum congesti. *Semen* subrotundum, stylo setaceo insidens, styloque subulato terminatum, *Pappo* capillari basi seminis adhærente.

pag. 706.

1494.\* PLATANUS *orientalis* foliis quinquelobo - palmatis basi cuneatis, lacinii lanceolatis sinuatis, stipulis subin-



tegerimis. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 473.*

*P. orientalis* foliis subpalmatis nervis subtus glabriusculis. *Ait. H. Kew. 3. p. 364.*

*P. orientalis* foliis palmatis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1417. Du Ham. arb.*

*Platanus. Clus. hist. 1. p. 9.*

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Du Ham. l. c. tab. 33.*

*Germ. Morgenländische Platane.*

*Gall. Platane de Levant.*

*Hab.* In Asiæ locis riguis. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Mannheim, Weinheim, Heidelberg, Bruchsal, Durlach, Ettlingen, Baden, Favorite, Rothenfels, Zell am Hammersbach, Lahr*, nec non ad viam publicam inter *Carlsruhe et Mühlburg* cum *P. occidentali*.

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Novembri, Decembri matura.  $\frac{1}{2}$

Arbores annosiores, grandosae, seminiferae, in horto *Carlsruhensi* et ad ambulacra circa urbem prostant.

Arbor sub divo Carolo Friederico in hortum *Carlsruhe* introducta, Anno 1750—1751.

1494.\*\* *PLATANUS occidentalis* foliis quinquangularibus obsolete lobatis dentatis, basi cuneatis subtus pubescentibus. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 474.*

*P. occidentalis* foliis lobato-angulatis, nervis subtus tomentosis. *Ait. H. Kew.* 3. p. 365.

*P. occidentalis* foliis lobatis. *Linn. Sp. pl.* p. 1417. *Du Ham. arb.*

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Catesby. Carol.* 1. tab. 56. *Du Ham. l. c. tab.* 35.

*Germ. Abendländische Platane.*

*Gall. Platane de Virginie.*

*Hab.* In America septentrionali. Hospitatur in iisdem locis cum præcedenti et passim in sylvaticis circa *Carlsruhe*.

Arbores pulcherrimae, grandosae, annosiores, seminiferae, ubique ad ambulacra circa *Carlsruhe* obveniunt.

Lignum durum, compactum, albidum, tornatoribus exquisitum.

## MONOECIA MONADELPHIA.

### 1495. *PINUS sylvestris.*

*var. β. tatarica* foliis geminis brevioribus latiusculis glaucis, conis minimis. *Mill. Dict. Ait. h. Kew.* 3. p. 366.

*Hab.* In Tartaria. Hospitatur circa *Carlsruhe* in sylva *die Hardt, im Lämmerts-löchle* abundat. Introducta per divum *Carolus Friedericum, Ann.* 1770.

pag. 708.

1496.\* *PINUS Cembra* foliis quinis, conis ovatis obtusis, squamis adpressis.

nucibus duris. *Ait. H. Kew.* 3. p. 369.  
*Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 500.

*P. Cembra* foliis quinis lævibus. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1419.

*P. foliis quinis*, cono erecto, nucleo eduli.  
*Gmel. Fl. Sib.* 1. p. 179.

*P. foliis quinis triquetris.* *Hall. helv. n.* 1659.

*P. sylvestris Cembra.* *Camerar. Epit.* 42.

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Pall. Fl. Ross.*  
 1. tab. 2. *Du Ham. arb. tab.* 32. *Gmel.*  
*l. c. tab.* 59.

*Germ. Zürbelfichte. Zürbelbaum.*

*Gall. Pin - Cembre.*

*Hab.* In alpihus helvetiæ, Tirolensium, Sibiricæ Tartariæ. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schweizingen, Heidelberg, Rothenfels, Favorite, Baden, Zell am Hammersbach*, in montosis *auf dem Kaltenbrunn*. Circa *Carlsruhe* in sylva *die Hardt in der langen Blöse*.

*Flor.* Majo. *Semina* Octobri Novembri maturantur. h

Nuces majusculæ, duræ. Nuclei recentes edules, sapidi, oleosi, dulcescentes; oleo abundant. Lignum resinosum.

Introducta per divum Carolum Friedericum.

1496.\*\* *PINUS Strobis* foliis quinis, conis cylindræis folio longioribus laxis.

*Ait. H. Kew.* 3. p. 369. — *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 501.

**P.** *Strobis* arbor excelsa; cortice lævi, cinereo ætate, foliis quinis gracilibus, vaginis nullis; amentis masculis parvis rufis; strobilis lævigatis, pendulis longo-cylindraceis. *Michaux. hist. des arb. forest. de l'Amer. septentr.* p. 103.

**P.** *Strobis* foliis quinis margine scabris, cortice lævi. *Linn. Sp. pl.* 2. 1419. *Gronov. virg.* 152. *Wangenh. Amer.*

**Icon.** *Pfleger. arb. et frut. Michaux. l. c. tab. X.* — *Wangenh. l. c. tab. 1. fig. 1.*

**Germ.** *Weymouths - Fichte.*

**Gall.** *Pin de Lord Weymouth. Angl. Weymouth Pine Tree.*

**Hab.** In Virginia, Canada. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schwetzingen, Weinheim, Mannheim, Heidelberg, Ettlingen, Favorite, Baden, Rothenfels, Lahr, Zell am Hammersbach, Donaueschingen* etc. In sylva die *Hardt* prope *Carlsruhe*, nec non in sylvaticis montosis prope *Gernsbach et Forbach.*

**Flor.** Majo, Junio. *Semina* Octobri maturat.  $\frac{1}{2}$

Arbor speciosa, excelsa pulcherrima, introducta, Ann. 1748, in hortum *Carlsruhe*, per divum *Carolus Friedericum.*

1499.\* **PINUS** *Balsamea* foliis solitariis planis emarginatis subpectinatis supra sub-



erectis, squamis coni florentis acuminatis reflexis. *Ait. H. Kew.* 3. p. 370. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 504.

*P. Balsamea* foliis solitariis subemarginatis, subtus linea duplici punctata. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1421.

*Abies balsamifera* foliis solitariis planis subtus argenteis apice emarginatis integrisve, subrecurvo-patentissimis; strobilis cylindraceis, violaceis, sursum spectantibus. *Michaux. l. c.* p. 145.

*Icon. Psleger. arb. et frut. Michaux. l. c. tab.* 14.

*Germ. Balsam Tanne.*

*Gall. Pin Baumier de Giléad.*

*Hab.* In altissimis montibus Americæ septentrionalis. Hospitatur in hortis anglicis aliisque *Caulsruhe* et alibi, nec non in montosis sylvaticis *auf dem Kaltenbrunn.*

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Octobri maturat.  $\frac{1}{2}$

Arbor in loco natali 40-46 pedalis. Folia subtus argentea, digitis trita, suaveolentia, maxime balsamea.

Therebinthinam, Canadenses, ex hac specie parant, sub Balsamo de Gilead seu Balsamo Canadensi notam. Verum autem Balsamum de Gilead ex Amyride Gileadensi elicitur.

CCCCXXXVIII.\* T H U J A.

*Linn. Gen. pl. ed Schreb. n.* 1457.

*Masculus flos. Calyx Amentum* ovatum

constans rachi communi, cui flores oppositi, triplici oppositione apponuntur. Singuli floris in basi *Squama* subovata, concava, obtusa. *Corolla* nulla. *Stamina* quatuor. *Fæmineus* flos. *Calyx Strobilus* subovatus flosculis oppositis compositus, constans squamis bifloris ovatis convexis longitudinaliter conniventibus. *Corolla* nulla. *Stylus* subulatus. *Strobilus* ovato-oblongus, obtusus, longitudinaliter dehiscens: squamis oblongis, subæqualibus, extrorsum convexis, obtusis. *Semina* oblonga, longitudinaliter cincta ala membranacea, emarginata.

1499. \*\* *THUJA occidentalis* ramulis ancipitibus, foliis quadrifariam imbricatis ovato-rhombeis adpressis nudis tuberculatis, strobilis ovatis, squamis interioribus truncatis infra apicem gibbosis. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 508.*

*T. occidentalis* strobilis lævibus squamis obtusis. *Linn. Sp. pl. Wangenh. Amer. 7.*

*Thuja* Theophrasti. *Bauh. pin. 488.*

Arbor vitæ. *Clus. hist. 1. p. 36.*

*Icon. Pfleger. arb. et frut. Wangenh. Amer. tab. 2. fig. 3. Blackw. tab. 210.*

*Germ. Abendländischer Lebensbaum.*

*Gall. Arbre de vie de Canada.*

*Hab.* In Canadæ et Sibiriae subhumidis. Hospitatur frequentissime in omnibus hortis anglicis aliisque, nec non in parte sylvatica

horti aulici *Carlsruhe im Fasanengarten*,  
prope *Heidelberg* in muris arcis antiquis  
abunde, et passim in hortis rusticorum.

*Flor.* Majo. *Semina* Septembri Octobri ma-  
tura. ♀

*Frutex* sæpe arbor, sempervirens.

*Pharm.* *ARBORIS VITÆ frondes.*

1499. \*\*\* *THUJA orientalis* ramulis  
ancipitibus, foliis quadrifariam imbricatis  
ovato-rhombéis adpressis medio sulcatis,  
strobilis ellipticis, squamis interioribus  
obtusis, infra apicem mucronatis. *Willd.*  
*Linn. Sp. pl.* 4. p. 509.

*T. orientalis* strobilis squarrosis: squamis  
acutis. *Linn. Sp. pl.* 1422. *Thunb. Fl.*  
*Japon.* p. 266.

*Icon.* *Pfleger. arb. et frut.*

*Germ.* *Chinesischer Lebensbaum.*

*Gall.* *Arbre de vie chinois.*

*Hab.* In China, Japonia. Hospitatur cum præ-  
cedente specie.

*Flor.* Majo. *Semina* Septembri, Octobri ma-  
turat. ♀.

*Frutex* sempervirens. *Rami* erecti.

CCCCXXXVIII. \*\* *R I C I N U S.*

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1464.

*Masculi* flores. *Calyx* monophyllus quin-

quepartitus, laciniis ovatis concavis. *Corolla* nulla, *Stamina* numerosissima, *Filamenta* inferne ramosa, in varia corpora coalita. *Antheræ* didymæ subrotundæ. *Feminei*: *Calyx* monophyllus, tripartitus, deciduus. *Corolla* nulla. *Styli* tres, bipartiti, erecto-patentes, hispidi. *Stigmata* simplicia. *Capsula* subrotunda, trisulca, aculeata, trilocularis, trivalvis. *Semina* solitaria subovata.

1499. \*\*\*\* *RICINUS communis* foliis peltatis palmatis, lobis lanceolatis serratis, caule herbaceo pruinoso, stigmatibus tribus apice bifidis, capsulis echinatis. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 564.*

*R. communis* foliis peltatis subpalmatis serratis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1430.*

*R. vulgaris. Bauh. pin. 459.*

*R. gallis Palma Christi. Lob. hist. 592.*

*Icon. Regn. bot. Blackw. tab. 148.*

*Germ. Gemeiner Wunderbaum.*

*Gall. Ricinus vulgaire.*

*Hab.* In India orientali. Hospitatur in hortis passim rusticorum et pharmacopæorum. Colebatur in agris prope *Friedrichsthal.*

*Flor.* Septembri. *Semina* Octobri, Novembri maturat. ☉

Planta pulcherrima speciosa, 6-7-9 pedalis. *Nux* ovata utrinque obtusa, magnitudine seminis *Phaseoli*, utrinque compressa, nitida,



ex spadiceo-fusco-viridi variegata, marmorea. *Nucleus* niveus, membrana alba acri, intra testam tenuem fragilem obductus.

*Pharm. RICINI s. CATAPUTIAE MAJORIS Semina. RICINI s. PALMAE CHRISTI Oleum.*

Semina testa membranaque tenui acri, rodenti, sedulo separata et abjecta, oleosa, mitia, sapida.

Oleum summa cum cautela, ex seminibus maturis, non rancidis sedulo a testa et membrana tenui purgatis, parandum est. Oleum recenter expressum albidum, spissiusculum mite, facile rancescens, aetate rubicundum, in Alcohole perfecte solubile. Laxans, deobstruens, in obstructionibus alvi, doloribus ventris, Colica pictonum, colica nephritica, febribus biliosis, ad Taeniam pellendam, in volvulo, calculo felleo ubi vomituritiones frequentes cum singultibus urgent, insigni cum emolumento, ab uncia dimidia datur. Th. Fraser Medical observations and inquiries 2. p. 235. Petr. Canvane Diss. on the Oleum Ricini as it is commonly called Castor oil etc. Lond. 1769. Bergii mat. medica regn. veget. p. 772. etc. Murray app. med.

**Nota.** In officinis pluribus pharmaceuticis nostratibus, cum primis tempore belli gallici, sub Oleo Ricini miti, maxime coloratum, rubicundum, rancidum, linquam et fauces mordens vidi, caute indagavi et sancte removi. Tale oleum omnino vomituritiones violentas, purgationes alvi, colicam, linguae, faucium et intestinorum inflammationem, immo mortem caussat.

## MONOECIA SYNGENESIA.

pag. 712. ante BRYONIAM.

## CCCCXXXIX.\* M O M O R D I C A.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1477.*

*Masculi Flores.* Calyx monophyllus, concavus, quinquefidus: *laciniis* lanceolatis, patulis. *Corolla* quinquepartita, calyci adnata, patentior, magna, venosa, rugosa. *Filamenta* tria, subulata, brevia. *Antheræ* in duobus filamentis bifidæ, lateribus utrinque auritæ, in tertio simplex, hinc tantum aurita, constans corpore compresso, et linea farinifera semel reflexa. *Feminei Flores.* Calyx ut in mare, superus, deciduus. *Corolla* ut in mare. *Filamenta* tria, brevissima, absque antheris. *Germen* inferum, magnum. *Stylus* unicus, teres, columnaris, trifidus. *Stigmata* tria, gibba, oblonga, extrorsum spectantia. *Pomum* oblongum, siccum, vi elastica dissiliens, triloculare; *loculis* membranaceis, mollibus, distantibus. *Semina* plura, compressa.

1500.\* MOMORDICA *Elaterium* pomis hispidis, cirrhis nullis. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1434.*

M. pomis ovalibus hispidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis. *Hort. Cliff. 451.*

Cucumis sylvestris asininus dictus. *Bauh. pin. 314.*

*Cucumis sylvestris.* *Camerar. Epit.* 946.  
*Icon.*

*Icon. Bull. herb. tab.* 81. *Regn. Bot. Blackw. tab.* 108.

*Germ. Eselskukummer. Eselskürbis. Vexierkürbse.*

*Gall. Concombre d'âne. Concombre sauvage.*

*Hab.* In Gallia australi, Hispania. Hospitatur in multis hortis, ex quibus rarius emigrat ad urbium et pagorum ruderata.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Augusto matura. ☉

*Radix* longa, crassa, succulenta, albida, maxime amara. *Caules* decumbentes, ramosi, hispidi. *Folia* alterna, longe petiolata, cordata, hispida. *Flores* axillares lutei, parvi. *Pomum* ovale, unciale, sesquiunciale, maxime hispidum; maturum viride-candicans, sponte, aut leviter impulsum, cum impetu momento citius a pedunculo disjungitur et tormenti instar, semina nigra cum succo amarissimo ejaculantur.

*Pharm. CUCUMIS ASININUS. ELATERIUM ALBUM, NIGRUM.*

Elaterium album paratur e succo pomi submaturi, absque omni expressione emanante e pomo minutim resecto, qui vase exceptus et quieti redditus, sponte ad fundum vasis dejicit faeculas subsidentes. Postea decantatur liquidum supernatans, et faeculae exsiccantur calore solis.

Nigrum Elaterium paratur e succo pomi expresso, cujus faeculae subsidentes exsiccantur. Purgantes, drasticas, hydragogas, eneticas, abortientes, errhinas viuitutes possidet.

*Elaterium album heroicum* est purgans hydragogum in hydropē, ab antiquis temporibus usitatum post quidem oblitteratum, sed nunc demum in frequentem usum redactum. Fortissimum est purgans hydragogum; purgat violentissime, saepe cum torminibus, et dejectiones aquosas inducit. Hinc communiter a medicis usurpatur ad aquas hydropicorum per alvum educendas. Ut plurimum emesin juxta movet. A minima dosi semper incipiendum, sc. a quadrante grani vel a grano dimidio. Sunt tamen, qui granum bene ferunt. Gravidis non propinandum. Nec in hydropē adhibendum, cum pulsus durus est visceraque obstructa. Si cum aqua teritur, naribusque intraditur, turunda exceptum, satis validum est errhinum. Bergii Mat. Med. p. 777.

Pomum M. *Elaterii* exsiccatum, tum pulveratum et propinatum, bonum esse hydragogum, observavit Boulduc. hist. de Lacad. des Sc. 1719. p. 46.

## CCCCXXXIX.\*\* C U C U R B I T A.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1478.*

*Masculi Flores.* Calyx monophyllus, campanulatus margine terminato dentibus quinque subulatis. *Corolla* quinquefariam divisa, calyci adnata; campanulata: *laciniis* venoso-rugosis. *Nectarium* glandula in centro floris, concava, triangularis. *Stamina Filamenta* tria conniventia, superne connexa, inferne distincta, calyci adnata. *Antheræ* reptantes sursum deorsumque, lineares. *Feminei Flores.* Calyx ut in mare, superus, deciduus. *Corolla* ut in mare. *Stamen* margo cingens in tres cuspidēs brevissimos desinens. *Germen* magnum, inferum. *Stylus* conicus, apice trifidus. *Stigma* unicum,



margine crasso convexo, sursum deorsumque repens, trifidum. *Pomum* triloculare: *loculis* membranaceis, mollibus, distinctis. *Semina* plurima, compressa, margine tumida, obtusa, gemino ordine posita.

1500.\*\* *CUCURBITA lagenaria* foliis cordatis rotundato-obtusis pubescentibus denticulatis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis clavatis. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 606.

*C. lagenaria* foliis subangulatis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1434.

*C. oblonga*, flore albo, folio molli. *Bauh. pin.* 113.

*Icon. Blackw. tab.* 522. *a. b. Rumpf. Amboin.* 5. *tab.* 144.

*Germ. Flaschen-Kürbis.*

*Gall. Cource calebasse.*

*Hab.* In America. Hospitatur in hortis rusticorum aliisque passim, rarius ad vinearum marginalia *am Kaiserstuhl* in Brisgovia.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri maturat. ☉

*Flores* albi. *Poma* sæpe prælonga, 2-3 pedalia, recta, curvata, clavata, et pyriformia, lignosa. *Semina* numerosa, cinerea linearia, rugosula, bisulcata, utrinque obtusa, apice retusa.

*Pharm. CUCURBITÆ Semina.*

In emulsionibus passim adhibentur.

Poma

Poma pro lagenis, cochlearibus, pileis, infundibulis, aliisque utensilibus.

1500. \*\*\* **CUCURBITA** *Pepo* foliis cordatis obtusis subquinelobis denticulatis, pomis subrotundis oblongisque lævibus. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 609.*

*C. Pepo* foliis lobatis, pomis lævibus. *Linn. Sp. pl. 2. p. 1435.*

*C. major* rotunda, flore luteo, folio aspero. *Bauh. pin. 213.*

β. pomis oblongis.

*Pepo* oblongus. *Bauh. pin. 311.*

*Germ. Feld - Kürbis. Ackerkürbis. Weinbergkürbis.*

*Gall. Cource potiron.*

*Hab.* In Oriente. Colitur in agris, hortis et ad vinearum marginalia cis et transrhenana.

*Flor.* Junio, Julio, Augusto. *Semina* Septembri, Octobri maturat. ☉

*Corollæ* magnæ luteæ. *Pomum* rotundum, ovali oblongum, glabrum, pedunculatum, subsulcatum, citrinum seu stramineum, magnum, pedale, sesquipedale et majus. *Parenchyma* carnosum - succosum, albido - lutescens. *Semina* numerosa, obovata, utrinque compressa, undique margine incrassato cincta, albida.

*Pharm. PEPONIS Semina.*

*Semina* plurimum olei subrubelli expressi mitis et sapidi dant. *Fructus* maturi coquantur in pulvem cum lacte, satis sapidum, rusticis aliisque acceptum.

1500. \*\*\*\* *CUCURBITA verrucosa*  
 foliis cordatis profunde quinquelobis lobo  
 medio basi angustato denticulatis, pomis  
 subrotundo-ellipticis verrucosis. *Willd.*  
*Linn. Sp. pl.* 4. p. 609.

*C. verrucosa* foliis lobatis, pomis nodoso-  
 verrucosis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1435.

*C. verrucosa.* *Bauh. hist.* 2. p. 222.

*Melopepo verrucosus.* *Tournef. inst.* 106.

*Germ. Warzen - Kürbis.*

*Gall. Cource barbarine.*

*Hab. . . . .* Colitur passim in hortis, agris  
 et ad vinearum marginalia.

*Flor.* Junio, Julio. *Semina* Septembri, Oc-  
 tobri matura. ☉

In omnibus fere partibus convenit cum *C.*  
*Peponis.* Pomum sæpe minus grande, verruco-  
 sum, cortice subduriori tectum.

*Nota.* *CUCURBITA aurantia.* *Willd. Linn.*  
*Sp. pl.* 4. p. 607. Pomis Aurantiorum ma-  
 gnitudine, forma et colore similibus, laevibus,  
 hinc inde in hortis sub nomine: *Pomeran-*  
*zen-Kürbis* colitur.

*CUCURBITA ovivera* pomis obovatis fla-  
 vis longitudinaliter vittato-lineatis, lacteis laevi-  
 bus, magnitudine et figura ovi gallinacei, cor-  
 tice duro. In hortis passim rusticorum aliis-  
 que sub nomine: *Eyer - Kürbis* prostant.  
*Sic: CUCURBITA Melopepo* pomis de-  
 presso-umbonatis margine tumidis hinc inde  
 sub nomine: *Turban - Kürbis* hospi-  
 tatur.

## CCCCXXXIX. \*\*\* C U C U M I S.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1479.*

*Masculi Flores.* Calyx monophyllus, campanulatus margine terminato dentibus quinque subulatis. *Corolla* quinquepartita, calyci adnata: laciniis ovatis, venoso-rugosis. *Filamenta* tria, brevissima, calyci inserta conniventia, quorum duo apice bifida. *Antheræ* sunt lineæ sursum et deorsum repentes, extrorsum adnatæ. *Receptaculum* trigonum, truncatum, in centro floris. *Feminei Flores.* Calyx ut in masculis superus, deciduus. *Corolla* ut in masculis. *Filamenta* tria, minima, acuminata sine antheris. *Germen* inferum, magnum. *Stylus* cylindraceus, brevissimus. *Stigmata* tria, crassa, gibba, bipartita, extrorsum versa. *Pomum* triloculare: loculamentis membranaceis, mollibus, separatis. *Semina* numerosa, ovato-acuta, compressa, gemino ordine posita.

1500. \*\*\*\*\* *CUCUMIS sativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Linn. Sp. pl. p. 1437.*

*C. sativus vulgaris. Bauh. pin. 310.*

*Icon. Regn. Bot. — Blackw. tab. 4.*

*Germ. Gemeine Gurke.*

*Gall. Concombre cultivé.*

*Hab.* In Tartaria, India. Colitur in hortis, agris, et vineis.



*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Septembri, Octobri maturat. ☉

*Pharm.* *CUCUMERIS Semina.*

Fructus immaturi eduntur crudi, in taleolas resecti, addito oleo, aceto, sale et pipere. Condiuntur fructus integri minores immaturi sale culinari sive aceto, atque per totum annum servantur.

*CUCUMIS* Melo foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. Linn. colitur passim in hortis sub multis varietatibus, carne viridi, rubello, lutescente, dulci, sapido, aromatico, suaveolenti.

---

CLASSIS XXII.  
D I O E C I A  
D I A N D R I A.

---

pag. 718. *SALIX triandra*.

*var. β. Salix triandra androgyna.*

*S. Hoppeana* foliis lanceolatis utrinque attenuatis, serratis subtus glaucis, amentis coaetaneis triandris polygamis, germinibus pedicellatis oblongo-lanceolatis, glabris, stigmatibus sessilibus. *Willd. Sp. pl. 4. p. 654.*

*S. androgyna. Hoppé.*

*Icon. Sturm. Deutschl. Flor. 25. Heft.*

*Hab. In Palatinatu transrhenano t. D. Kochio.*

*Nota. Minime peculiaris species, sed mera varietas androgyna Salicis triandrae. Conf. Seringe Monogr. p. 76.*

*γ. Salix triandra glaucophylla. Seringe. Monogr. p. 78.*

*S. amygdalina. Vill. Fl. Dauph. 3. p. 762. (omnino.)*

*S. Villarsiana. Willd. Sp. pl. 4. p. 655.*

*Hab. Prope Dachsland, Gnielingen, Schreck et alibi frequens. Prope Mainz teste D. Ziz et D. Kochio.*

*Folia subtus glauca.*

*Minime pro peculiari specie declaranda.*

pag. 719. post *SALICEM triandram*.

1502.\* *SALIX undulata* foliis linearilanceolatis undulatis serratis, glabris, stipulis trapezoideis, staminibus tribus, amentis fœmineis squamis pilosis, germinibus pubescentibus, stylis elongatis a basi ad medium conglutinatis, apice bifidis. *Ehrh. Beitr.* 6. p. 101. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 655. — *et Arb.* 332. — *Hoffm. Fl. Germ.* 342.

*Germ.* Dreymännige Wellenförmige Weide.

*Gall.* Saule à trois étamines ondulée.

*Hab.* In Palatinatu transrhenano prope Kusel.  
t. D. Kochio.

*Flor.* Aprili. Majo. *Semina* Junio, Julio matura. ‡

Maxime affinis *S. triandra*, a qua mere differre videtur, foliis subangustioribus, subundulatis. *Stylis* elongatis.

Me saltem iudice, vix a *S. triandra* removenda est.

pag. 722. deleatur *SALIX amygdalina*, *Pollichii*. quæ est *S. fragilis* Linnæi s. *S. pendula Seringe* quam *Cl. Smith. in Fl. Brit.* 3. p. 1045. *Sow. Engl. Bot. tab.* 1808. individuum fœmineum sub *S. Russeliana* descripsit. *Conf. Seringe Monographie des Saules de la Suisse.* p. 79.

pag. 723 *SALIX fragilis*.

*Hab.* In Palatinatu inter *Wiesloch* et *Neckar*.

*gemünd*, ad rivos frequens, nec non ad *Nicarum* passim, ubi eam vidi 1816.

**Nota.** *SALIX Russeliana* Smith. et *S. amygdalina*. *Pollichii*, omnino huc pertinent. Cl. Smith. individuum foemineum *S. fragilis* Linn. sub *S. Russeliana*, et individuum masculum sub *S. fragili* comprehendebat.

*Salicis fragilis* vimina juniora maxime tenacia. Hinc passim in *Salicetis* ad rivos collitur et amputatur. Cortex ad rem coriariam praestantissimus, anglis notissimus.

**Obs.** In pharmaciis pluribus, loco *Cort. Salicis fragilis*, saepissime *Cort. Salicis viminalis* vidi.

pag. 724. post *SALICEM fragilem*.

1506.\* *SALIX nigricans* foliis elliptico-lanceolatis crenatis glabris subtus glaucis, germinibus pedicellatis lanceolatis acuminatis sericeis. *Smith. Fl. Brit.* 3. p. 1047. — *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 271. tab. 17. fig. 3. — *Willd. Sp. pl.* 4. p. 659. *Seringe.* l. c. p. 42.

*S.* foliis ovato-lanceolatis, serratis, subtus albissimis. *Hall. hist. n.* 1655.

*Icon.* *Sow. Engl. Bot. tab.* 1213.

*Germ.* *Schwärzliche Weide.*

*Gall.* *Saule noircissant.*

*Hab.* In Principatu superiori retro *Mæskirch* im *Donauthal* prope *Werrenwag* et alibi. In ditone Basileensi circa *Wallenburg t. Hallero.*



*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Junio matura. ‡

*Frutex* seu arbuscula, 4-5-6 pedalis. *Rami* suberecti, teretes, nigricantes, glabri, juniores villosuli. *Folia* alterna, petiolata, ovoideo-lanceolata, acuta, crenulato-serrulata, bi-ad triuncialia, supra saturate viridia, glabra, demum nigricantia, subtus venosa, glauco-subtomentosa. *Stipulae* mediocres, interdum majusculae, oblique cordatae, aut subreniformes, serratae, glabrae. *Amenta* uncialia et longiora, crassiuscula. *Squamae* lanceolatae vel obovatae obtusae. fuscae, pilosae. *Flores* diandri. *Antherae* oblongae aureae. *Germina* elongata, pedicellata, subulata, plus minusve sericea, albida.

Folia per desiccationem nigricantia.

pag. 724. *SALIX præcox.*

*S. daphnoides.* Vill. Fl. Delph. 3. p. 765.

*S. cinerea.* Willd. Sp. pl. 4. p. 690. Smith. Fl. Brit. 3. p. 163. Sow. Engl. Bot. tab. 1897.

*S. præcox.* Hoppii. — Sturm. Deutschl. Flor. 25. Heft.

pag. 731. post *SALICEM arbusculam.*

1512.\* *SALIX retusa* foliis obovatis obtusis acutiusculisve, emarginatis, integris, glabris, caule ramosissimo reptante.

*S. retusa* foliis subserratis glabris obovatis, obtusissimis. Linn. Sp. pl. 2. p. 1445. — Willd. Sp. pl. 4. p. 684.

*S. kitaibeliana.* Willd. l. c. p. 683.

- S.** foliis glabris ovatis, nitentibus, julis paucifloris. *Hall. hist. n.* 1648.
- β. *S. retusa serpillifolia*. *Seringe. l. c. p.* 86.
- S.** *serpillifolia* squamis diandris, foliis oblongis integerrimis utrinque glabris, caule reptante, ramosissimo. *Scop. Fl. Carn.* 2. n. 1207. *tab.* 61.
- S.** *serpillifolia* foliis ovatis ovato-lanceolatisque integerrimis: acutis glabris, supra nitidis, amentis oblongis paucifloris, capsulis ellipticis glabris, stigmatibus sessilibus. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 684.
- Icon.** *Schkuhr. bot. Handb. tab.* 317. a. — *Sturm. Deutschl. Flor.* 25. *Heft.*
- Germ.** *Ausgerandete Weide.*
- Gall.** *Saule à févilles rétuses.*
- Hab.** In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscelesenses retro *dem Weisbad*, *auf dem Gamor*, *Kasten et Sentis* cum β. in petrosis calcareis abunde, ubi vidi 1818.
- Flor.** Majo, Julio. *Semina* Julio matura. †
- Fruticulus* arcte petras terramque reptans, ramosissimus. *Rami* alterni, divisi, longe sæpe lateque reptantes. *Folia* parva, ovali-cuneiformia, apice retusa, obtusa, (in var β. acutiuscula,) omnia integra, superne amœne viridia, nitentia, glaberrima, subtus pallidiora. *Amenta* foliis coætanea, laxa, pauciflora, ovalia, erecta. *Flores* diandri. *Filamenta* longa. *Germina* pedicellata, conico-ovata, glabra.
- Obs.** In alpinis helvetiae et pyreneorum uno eodem loco et individuo quoad foliorum formam et mag-

nitudinem ludit. In horto cicurata, *mutationem* non passa est, ibidem omnium ramosissima; ramis arcte supra terram reptantibus.

1612. \*\* *SALIX reticulata* foliis elliptico-orbiculatis, obtusis integerrimis glabris, reticulato venosis, subtus glaucis, capsulis villosis. *Smith. Fl. Brit.* 3. p. 1057. — *Willd. Sp. pl.* 4. p. 685.

*S. reticulata* foliis integerrimis glabris ovatis, obtusis subtus reticulatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1446. — *Flor. Lapp.* 359. tab. 8. fig. 1. et tab. 7. fig. 1. 2.

*S.* foliis rotundis integerrimis, subtus tomentosis, julis gracilibus longe petiolatis. *Hall. hist. n.* 1650.

*Icon. Flor. Dan. tab.* 212. — *Sow. Engl. Bot. tab.* 1908. *Hoffm. Salic.* 2. p. 3. tab. 25. fig. 1. 2. tab. 26. 27. — *Schkuhr. bot. Handb. tab.* 317. a. — *Sturm. Deutschl. Flor.* 25. Heft.

*Germ.* Netzblättrige Weide.

*Gall.* Saule reticulé.

*Hab.* In vicinia Principatus superioris apud Abbatiscellenses retro *dem Weisbad*, auf *dem Gamor et Sentis*, ubi vidi 1818.

*Flor.* Majo, Junio. *Semina* Julio matura. †

*Cauliculi* ramosi, diffusi. *Ramuli* erectiusculi, digitales, glabri, foliati. *Folia* longe petiolata, patentia, ovali-subrotunda, obtusa, integerrima, plana, reticulato-venosa, glabra, supra viridia, subtus glaucescentia. *Amenta*

**terminalia**, longe pedunculata, brevia. *Flores*  
**diandri**. *Germina* ovata, pilosa.

pag. 732. *SALIX argentea*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 1864. (bona.)

pag. 734. *SALIX repens*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 183.

pag. 736. *SALIX fusca*.

*Icon.* Sow. Engl. Bot. tab. 1960.

pag. 738. *SALIX rosmarinifolia*.

*Icon.* Sow. Eng. Bot. tab. 1365.

pag. 738.

1517.\* *SALIX Lavendulaefolia* foliis  
lineari-lanceolatis, serrulatis, apice mu-  
cronatis, supra pubescentibus, subtus gri-  
seo-tomentosis, germinibus ovatis, gla-  
bris.

*S. Lavendulaefolia.* Lapeyr. — *Seringe*  
*l. c. p.* 70.

*S. incana.* Schrank. *Fl. Bav.* 1. p. 230.  
*Hoppe. Cent.* 4. *Seringe. Saul. n.* 8. —  
*Decand. Flor. Franc. n.* 2073.

*S. riparia* foliis lineari-lanceolatis glandu-  
loso-dentatis basi integerrimis, supra pu-  
bescentibus, subtus tomentosis rugoso-  
venosis, germinibus ovatis glabris. *Willd.*  
*Sp. pl.* 4. p. 698.

*S. rosmarinifolia.* Host. *Synops.* 529. —  
*Schrank Salisb. n.* 38.



*Icon. Sturm. Fl. Deutschl. 25. Heft. (sub S. riparia.)*

*Germ. Lavendelblättrige Weide.*

*Gall. Saule à févilles de Lavande.*

*Hab. Inter Baden et Lichtenthal ad flavium die Oos lepit A. Braun. 1821. Circa Argentoratum ad ripam Ellæ. In vicinia Principatus superioris apud Abbatiszellenses in subalpinis alpinisque ad rivulos am Sentis, ubi vidi 1818.*

*Flor. Majo. Semina Julio matura. ‡*

*Frutex* erectus, 15-25 pedalis, fusco-purpureus, aut viridiusculus, glaber. *Rami* erecti. *Folia* alterna, subpetiolata, erecto-patentiuscula, lineari-lanceolata, basi obtusiuscula, apice mucronata, obsolete serrulata, margine subreflexa, nervo medio prominente, fuscoluteolo, tomentoso, 2-3 uncias longa, 1-3 lineas lata, superne pallide viridia, subpubescentia, inferne griseo-tomentosa. *Stipulæ* obsoletæ, vix ullæ. *Amenta mascula*, unciam circiter longa, subsessilia, *scæmina* masculis sublongiora. *Germi-  
mina* ovata, glabra.

Distinctissima omnino a *Salice viminali*.

1517. \*\* *SALIX versifolia* germinibus subpedicellatis pilosiusculis, stylo elongato, amenti foliolis lanceolatis, foliis oblongis oblique acuminatis, integerrimis pilosiusculis. *Wahlenb. Fl. Lapp. p. 271. tab. 18. fig. 2. — Seringe. Saules. p. 40. n. 16.*

*S. spatulata* foliis lanceolato-obovatis, re-

curvato-acutis, apice serratis, supra pubescentibus, subtus rugoso-venosis, tomentosis, stipulis lanceolatis. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 700.

*Germ. Spattelblättrige Weide.*

*Gall. Saule à févilles variables.*

*Hab.* In montosis turfosis *auf der Herrnwiese, auf dem Kaltenbrunn, Gniebis*, et alibi passim. In Palatinatu transrhenano prope *Kaiserslautern t. D. Kochio.*

*Flor.* Aprili, Majo. *Semina* Julio matura.  $\frac{1}{2}$

*Frutex* 2-4 pedalis, cortice cinereo. *Folia* lanceolato-obovata, recurvato-acuta, integra, apicem versus remote serrulata, quandoque integruscula, petiolata, septem lineas ad unciam longa, 4-5 lineas lata, supra pallide viridia, glabriuscula, per lentem spectata, pilis brevibus instructa, subtus reticulato-venoso-rugosula, incana, vel subsericeo-tomentosa. *Stipulae* lanceolatae, integrae, longitudine fere petiolorum. *Amenta* *foeminea* brevia, dense imbricata.

*Nota.* Individua mascula hucusque in nostris et helveticis regionibus nondum detecta sunt.

## 1523. *SALIX mollissima.*

*var. β.* Foliis ovato-lanceolatis, subtus venulosis sericeo-tomentosis, incanis.

*S. mollissima* foliis lanceolatis acuminatis subcrenatis, subtus sericeo-incanis, stipulis lunatis minimis. *Smith. Fl. Brit.* 3. p. 1070. *Sow. Engl. Bot. tab.* 1509.

*S. Smithiana.* *Willd. Enum.* p. 1008.

**Hab.** In iisdem locis, nec non in Palatinatu transrhenano prope *Reichenbach t. D. Kochio.*

Ob varietates intermedias, omnino non pro peculiari specie declaranda est.

pag. 741. *SALIX aurita.*

**Icon.** Sow. Engl. Bot. tab. 1487.

pag. 741. *SALIX aquatica.*

**Icon.** Sow. Engl. Bot. tab. 1437.

pag. 742. *SALIX caprea.*

**Icon.** Sow. Engl. Bot. tab. 1488.

pag. 744. *SALIX acuminata.*

**Icon.** Sow. Engl. Bot. tab. 1434.

pag. 745. *SALIX viminalis.*

**Icon.** Sow. Engl. Bot. tab. 1898.

## DIOECIA TETRANDRIA.

pag. 751. Nro. 1526, ad *VISCUM* inseratur *album.*

pag. 752. et 753. deleatur *MONOECIA*: inseratur *DIOECIA.*

pag. 753. deleatur *XANTHOXYLUM Clava Herculis* et ejus loco inseratur: *fraxineum.* Willd. seu *ramiflorum.* Michx. amer. 2. p. 235.

## DIOECIA HEXANDRIA.

pag. 758. *TAMUS communis.*

*Hab.* In Principatu superiori prope *Con-*  
*Ganz* in sylvis umbrosis non infrequens,  
ubi vidi 1814.

## DIOECIA OCTANDRIA.

pag. 763.

1537.\* *POPULUS graeca* foliis subro-  
tundo - ovatis leviter cordatis æqualiter  
adpresso serratis glabris margine subcilia-  
tis, petiolis compressis, ramis teretibus  
glabris. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 804.*

*P. græca* foliis cordatis glabris basi glandu-  
losis remote crenatis, petiolis compressis,  
ramis teretibus. *Ait. H. Kew. 3. p. 407.*

*Icon.* *Pfleger. arb. et frut.*

*Germ.* *Griechische Pappel.*

*Gall.* *Peuplier de l'Archipel.*

*Hab.* In insulis Archipelagi maris mediterranei.  
Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe,*  
*Schwetzingen, Favorite, Rothenfels, Ba-*  
*den.* Ad ambulacrum pulcherrimum inter  
*Baden et Lichtenthal.*

*Flor.* Martio, Aprili. *Semina* Julio matu-  
rat. h

Arbor pulchra, introducta in hortum *Carls-*  
*ruhe* sub divo Carolo Friederico Ann. 1787.

Arbores hujus femineae grandosae speciosae prope



thermas Badenses, ad viam publicam per prata versus Lichtenthal ducentem.

1537. \*\* *POPULUS balsamifera* foliis ovatis acuminatis adpresso-serratus albidis reticulato-venosis gemmis resinosis. Willd. *Linn. Sp. pl.* 4. p. 805.

*P. balsamifera* foliis subcordatis denticulatis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1464.

*P. Tacamahaca*. *Mill. Dict.*

*P. nigra* folio maximo, gemmis balsamum odoratissimum fundentibus. *Catesby. Carol.* 1. p. 34. — *Du Ham. arb.* 2. p. 178.

*Tacamahaca*. *Trew. Ehret. pl. select.*

*Icon.* *Catesb. l. c. tab.* 34. *Du Ham. l. c. tab.* 38. *fig.* 6. *Pfleger. arb. et frut. Pall. Fl. Ross. tab.* 41. *Ehret. l. c. tab.* 46.

*Germ. Balsam-Pappel.*

*Gall. Peuplier Baumier.*

*Hab.* In America septentrionali, Sibiria. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schwetzingen, Baden, Favorite* et speciosissimæ grandosæ arbores, prope *Zell am Hammersbach* et in horto aulico prope *Donaueschingen*.

*Flor.* Aprili. †

Arbor pulchra, procera, in regionibus montosis humidis sylvae nigrae et in sylva Odenwald, ubi egregie venit magis propaganda.

Folia digitis trita, balsamea.

Gemmae

Gemmae tempore vernali tumidae, ovato-oblongae, acutae, squamis concavis imbricatae, balsamum aurei coloris, spissiusculum fragrantem aromaticum amaricantem fendant.

Gemmae apibus melliferae.

1537. \*\*\* *POPULUS candicans* foliis cordatis ovatis acuminatis obtuse inaequaliter serratis subtus albidis subtriplicinerviis reticulato-venosis, gemmis resinosis. *Willd. Sp. pl. 4. p. 800.*

*P. candicans* foliis ovatis cordatis acuminatis subtus albidis, stipulis resinosis, ramis teretibus. *Ait. Hort. Kew. ed. 1. 3. p. 406.*

*Icon. Pfleger. arb.*

*Germ. Canadische Balsam-Pappel.*

*Gall. Peuplier Baumier de Canada.*

*Hab.* In Canada. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe, Schwezingen, Baden, Favorite, Lehr, Zell am Hammersbach*, et in horto aulico prope *Donaueschingen*.

*Flor.* Martio. ̄

Arbor pulchra, a praecedenti *Foliis* ovatis latioribus, et brevioribus distinguitur.

*Nota.* In locis montosis humidis sylvae nigrae magis propaganda.

## DIOECIA ENNEANDRIA.

1539. *MERCURIALIS annua.*

*var. β. monstrosa:* caule ramosissimo bra-

*Suppl. ad Flor. Bad. Tom III,*

Y y

chiato, foliis linearibus sessilibus, nunc integris, nunc pinnatifidis.

Mercurialis foliis capillaceis. *Marchant. Act. Paris. 1719. in 4to. p. 59. et sequ. tab. 6. et*

Mercurialis altera, foliis in varias et inæquales lacinias quasi dilaceratis *ibid. tab. 7.*

Mercurialis *annua*  $\beta$ . foliis linearibus, sessilibus, nunc integris, nunc varie lacinatis. *Lamarck. Encycl. Bot. 4. pars 1. p. 117. 118.*

*Icon.* Propria.

*Hab.* In vineis prope *Arlesheim*, ubi legi cum generosissimo Domino *ab Andlau* 1810.

*Flor.* Septembri. ☉

*Radix* cylindrica, fibrosa, descendens, alba. *Caulis* sesquipedalis, bipedalis, erectus, geniculatus, glaber, striatus, ramosissimus. *Rami* brachiiati, oppositi, alternive, solitarii, bini, fasciculati, patenti-erecti, numerosissimi. *Folia* opposita, alternave, quandoque fasciculata, sessilia, linearia, angusta, integra, tunc fere capillacea, aut linearia sublatiora, tunc inordinate pinnatifida, saturate viridia, glabra, lucida, pilis raris quandoque instructa, acuta aut obtusa, sesquiunciam ad 3-4 uncias longa  $\frac{1}{4}$  lineam ad 2 lineas lata. *Flores* axillares, subsessiles, verticillato-glomerati, numerosi, monstrosi, steriles. *Filamenta* antheris destituta.

Habitus totalis *Mercurialis annuae* cum qua promiscue loco citato perraro obvenit. Odor et sapor *M. annuae*.

Planta in herbario meo desiccata, amoene coerulesco-rubella, lucida.

## DIOECIA MONADELPHIA.

1541. \* *JUNIPERUS virginiana* foliis ternis basi adnatis, junioribus imbricatis, senioribus patulis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1471. *Wangenh. Amer.* 9.

*J. virginiana* foliis vetulis ternis adnato-decurrentibus, subulato-spinescentibus, junioribus oppositis, modo accrosis modo imbricatis, lanceolato-ovalibus acutis. *Mich. Amer.* 2. p. 245.

*J. Caroliniana.* *Mill. Dict.* n. 4.

*J. major americana.* *Raj. hist.* 1413.

*Icon. Psleger. arb. et frut. Wangenh. l. c. tab.* 2. *fig.* 51.

*Germ. Virginischer Wachholder.*

*Gall. Gênévrier de Virginie.*

*Ha b.* In Virginia, Carolina. Hospitatur in hortis anglieis aliisque *Carlsruhe, Schwetzingen, Weinheim, Heidelberg, Favorite, Rothenfels, Baden, Lahr, Zell am Hammersbach, Donaueschingen* et alibi, ex quibus passim in sylvas adjacentes migravit.

*Flo r.* Martio, Aprili. *Baccæ* Octobri maturæ. †

Arbores speciosae annosiores in parte sylvatica horti Carlsruhensis.

Lignum durum, amoene rubellum, rubello-fus-



cum, pro elegantioribus scriniariorum operibus exquisitum. Gratam fragrantem flammam alit.

In regionibus montosis aridis magis propaganda.

pag. 770. *Taxus baccata*.

*Hab.* In hortis anglicis *Carlsruhe*, *Schwetzingen*, *Heidelberg*, *Weinheim*, *Durlach*, *Favorite*, *Baden* et alibi. In montosis sylvaticis retro *Fohrbach*.

---

CLASSIS XXIII.  
POLYGAMIA.  
MONOECIA.

---

pag. 774. ante VERATRUM *nigrum*.

1544.\* VERATRUM *album* racemo supradecomposito, corollis erectis. *Linn. Sp. pl.* 2. p. 1479.

V. *album* racemis paniculatis, bracteis ramorum oblongis, partialibus pedunculum pubescentem subæquantibus, floribus erectis. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 895.

V. spica paniculata, floribus maribus et femineis. *Hall. hist. n.* 1204.

Helleborus albus flore subviridi. *Bauh. pin.* p. 186.

Helleborus albus, mas. *Tabernæmont. Icon.* p. 1095.

Helleborum album, sive Veratrum *Lobel. pag.* 311. *Icon. ej. Stirp. Observ. p.* 167. *Icon.*

*Icon. Jacqu. Fl. Austr. tab.* 335. — *Blackw. tab.* 74. *Bull. herb. tab.* 155.

*Germ. Weißer Germer. Weiße Nieswurz, mit grünlich-weißen Blumen.*

*Gall. Vératre blanc. Hellebor blanc.*

**Hab.** In ditione Basileensi. prope Brundrutum.  
*t. Lachenalio.* In vicinia Principatus superioris in subalpinis alpinisque retro *St. Gallen am Weisbad*, et alibi in pascuis abunde, ubi vidi *Ann.* 1814 et 1818.

**Flor.** Junio, Julio. *Semina* Septembri, Octobri matura. ♀

*Radix* oblonga, subpræmorsa, subdigitalis, crassiuscula, carnosa, lutescente - albida, fibris simplicibus teretibus longis, carnosis, undique obsessa. *Caulis* 2-3-4 pedalis, erectus, simplex, crassiusculus, obsolete angulatus, viridi-albidus, foliatus. *Folia* radicalia caulinaque inferiora petiolata, petiolo vaginante, ovalia, acuta, integra, firma, nervosa, glabra, quandoque subpubescentia, viridia, reliqua alterna, sessilia, superiora sensim minora. *Racemi* axillares terminalesque, erecti, simpliciusculi, compositique, multiflori, densi. *Corollæ* viridescenti-albidæ, villosæ, erectæ, lineatæ. *Flores* superiores androgyni, inferiores mares.

**Obs.** Variat in uno eodemque loco subalpino alpinoque: Bracteis brevioribus et longioribus. Foliis plus minusve pubescentibus.

**Nota.** V. Lobelianum Bernhardi in diario Schrad. Ann. 1808. specie nullo modo differt a V. albo Linnaei.

### **Pharm.** *HELLEBORI albi Radix.*

Radix bene mundata, fibris resectis siccata, in vasis bene clausis servanda.

In Pharmacis saepe non rite siccata, mundata, et asservata, vermibus destructa est.

Odor radiceis recentis viroso - ingratus. Sapor nauseosus, acerrimus, adurens. Vim maxime venena-

tam, emeticam, drasticam, rodentem virosamque exercet.

Externe in infuso aquoso contra scabiem, pediculos animalium domesticorum, et Tineam vaccarum valet.

Adeo acre mihi erat hoc infusum ex radice siccata paratum, ut postquam id degustassem, et insuper aquam bibissem ardorem faucium cum sequente sensatione corrodente cardialgica, atque etiam oppressionem pectoris, diu deinde sustinerem. Post sumtum cochlear aceti paululum quidem remisit cardialgia, sed exorti sunt dolores lancinantes infimi ventris, et usque in horam prandii postiei diei, partim tormina ventris sensi, partim dolores lancinantes vagos, cum quodam veluti piperis sensu in faucibus. Bergii Mat. Med. p. 819. — Conradus Gesnerus hausit drachmas 2, ex infuso, parato ex Hellebori albi drachm. semi et aquae bullientis Unc. 2, unde percepit ardorem circa scapulas et in facie capiteque, fervorem insuper linguae et gutturis, cum subsequente singultu, quo per senihoram perseverante, non aliud ipsi relinquebatur, quam penna digitisque in fauces insertis, vomitum aliquoties provocare. C. Gesner. Epist. medic. 69.

Usus internus Hellebori albi a medicinae patribus et ipso Gesnero tantopere in morbis desperatis celebratus, hodie fere exolevit. In parca dosi propinata radix, saepe horrenda symptomata exercet: ut sitim, cardialgiam, tormina, singultum, suffocationes, convulsiones, tremores, inflammationem primarum viarum, sudorem frigidum, immo et mortem.

Herba pecoribus, capris ovibusque deleteria, a quibus in pascuis vix tangitur.

Semina ejusdem, avibus domesticis omnis generis deleteria. Pall. Reise d. Russl. 1. p. 49.

Radix minime cum rad. Hellebori nigri, multo minus cum rad. Gentianae luteae confundenda.



pag. 780. *HOLCUS odoratus*.

*H. odoratus*. Schkuhr Handb. 3. p. 522.  
(excl. Syn. Linn. Fl. Suec.) Host. Gram.  
1. p. 4. Hoppé Taschenb. 1791. p. 155.

*H. australis* panicula subsecunda, pedunculis ad spicularum basin pilosis, flosculo hermaphrodito mutico, masculo inferiori infra apicem brevissime aristato, masculo superiori a dorsi medio aristam geniculatam exserente, radice repente. Schrad. Fl. Germ. 1. p. 253.

*Icon*. Schkuhr l. c. tab. 344. Host. l. c. tab. 4.

Nota. b. Linnaeus sub *H. odorato* duas diversas species: *H. australem* et *H. borealem* Schrad. comprehendebat.

pag. 786. post *ATRIPLICEM hortensem*.

1554 \* *ATRIPIEX nitens* caule erecto herbaceo, foliis triangulari-hastatis sinuato-dentatis subtus argenteis, calycibus fructus triangulari-ovatis integerrimis. Willd. Sp. pl. IV. p. 961.

*A. nitens* caule herbaceo, foliis triangularibus sinuato-dentatis, superne nitentibus, valvulis calycinis femineis triquetris integerrimis. Rebentisch prodr. n. 441.

*A. acuminata* caule erecto herbaceo, foliis triangulari-hastatis subtus argenteis, superioribus integerrimis, calycibus fructus ovatis integerrimis. Willd. Linn. Sp. pl. IV. p. 961.

**A. acuminata** caule herbaceo, foliis triangulari-hastatis, basi apiceque productis lucidis, calycibus fructus integerrimis glabris. *Waldst. et Kitaibl. Hung. 2. p. 107.*

*Icon. Schkuhr. bot. Handb. tab. 348. Waldst. et Kitaibl. l. c. tab. 163.*

*Germ. Glänzende Melde. Zugespitzte Melde.*

*Gall. Arroge nitide.*

*Hab. Prope Wertheim in ruderatis arvisque infrequens, in der Homburger Klinge raro, t. Mertino.*

*Flor. Augusto, Septembri. Semina Octobri, Novembri matura. ☉*

*Radix* ramosa, fibrosa, albida. *Caulis* cubitalis, 3-4-7 pedalis, erectus, subangulatus, striato-sulcatus, glaber, albido-viridi fusco-purpurascens, ramosus. *Rami* oppositi, alternive, erecti. *Folia* opposita alternave, petiolata, triangulari-hastata, sinuato-dentata, 2-3 uncias longa, unciam ad sesquiunciam lata, superne saturate viridia, nitida, inferne cinereo-argentea, suprema subsessilia, lanceolata, integriuscula, interdum basi dente uno alterove prædita. *Flores* racemoso-spicati, conglomerati, numerosi. *Valvulae* calycinae femineae ovatae, integrae. *Semina* subrotunda, complanata, reticulata.

*Obs. Planta in horto culta, speciosa, 8-12 pedalis, pulcherrima. A. acuminata Waldst. et Kit. in horto Carlsruhensi culta, nullo modo diversa est, ab A. nitente.*

1554. \*\* *ATRIPLEX campestris* caule herbaceo erecto, foliis inferioribus hastato-lanceolatis sinuato-dentatis, superioribus lineari-lanceolatis integerrimis, calycibus fructus deltoideo-ovatis integerrimis. *Koch et Ziz Catal. Plant. palatin. p. 24.*

*Germ. Feld-Melde.*

*Gall. Arroche des champs.*

*Hab.* Prope *Schwetzingen am Rohrhof* abunde t. *Zeyhero.* In Palatinatu trans rhenum ad viarum margines, in muris, ad agrorum versuras, inque collibus sterilibus siccis, in planitie rhenum versus vulgatissima.

*Flor.* Augusto, Septembri. *Semina* Octobri, Novembri matura. ☉

*Caulis* bi-tri-quadripedalis. *Rami* erecto-patentes, elongati, virgati. *Folia* Atriplicis angustifoliae, sed inferiora magis dentata. *Spicae* fructigeræ elongatæ, nudæ, apice nutantes. *Fructus* fere Atriplicis nitentis, sed paullo minores et magis deltoideo-ovati, scilicet lateribus basin versus utrinque non perfecto rotundatis, sed angulo obsoleto instructis, rarius ibidem denticulo uno alterove minuto notatis. Dorso muricati non sunt. Sic *D. Koch. l. c.*

Differt ab Atriplice angustifolia caule erecto, ramis erecto-patentibus, foliis inferioribus magis dentatis, calycibus fructus deltoideo-ovatis, angulis lateralibus obsoletis, minime hastatis. ib.

pag. 787. *ATRIPLEX hastata* deleatur. *Linnaeus* sub hac duas distinctas species ut ex synonymis allegatis patet comprehendebat. Vera *A. hastata* vix in

Germania obvenit. *Atriplex hastata* nostra seu *Pollichiana* ad *Atriplicem patulam* pertinet, sub qua tres diversæ species militabant, scilicet. *Atriplex hastata* nostra et *A. patula* nostra, quæ *angustifolia* nunc audit, et *A. erecta*. Hinc characteres et descriptiones earum stabiliendæ.

1556. *ATRIPLEX patula* caule herbaceo patulo, foliis triangulari-hastatis acuminatis subdentatis, calycibus fructus rhombeis apice denticulatis, disco submuricatis. *Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 964.*

*Atriplex patula* caule herbaceo patulo, foliis deltoideo-lanceolatis subhastatis, calycibus seminum disco submuricatis. *Smith. Fl. Brit. 3. p. 1091.*

*Atriplex* foliis triangularibus basi productis, valvulis triangularibus subasperis. *Hall. hist. n. 1617.*

*A. sylvestris* annua, folio deltoide triangulari sinuato et mucronato hastæ cuspidis simili. *Moris. hist. 2. p. 607. Sect. 5. tab. 32. fig. 14.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. 13. tab. 936. Curtis. fl. Lond. tab. 66. (sub. A. hastata.)*

*Germ. Ausgebreitete Melde.*

*Gall. Arroche en fer de lance.*

*Hab.* Utrunque passim in ruderatis, cultis, ad vias, muros, sepes et fossas.

*Flor.* Julio, Augusto. *Semina* Septembri maturæ. ☉



*Caulis* cubitalis, tripedalis et altior, erectus, sæpe flexuosus, sulcatus, ramosus. *Rami* oppositi alternave, divergentes, patuli, sulcati. *Folia* opposita alternave, longius petiolata, subtus plerumque pulverulento-farinosa, inferiora triangulari deltoideo-hastata, sinuato dentata, obtusiuscula, glauco-viridia, superiora multo angustiora lanceolata, acutiuscula, subintegra. *Spicæ* axillares, terminalesque. *Valvulæ* calycum femineorum deltoideo-rhombæ, acutæ, margine denticulatæ, disco tuberculato-muricatæ. *Semen* magnum, subcochleatum, punctulatum.

*Atriplex hastata* Linnaei abunde discrepat, valvulis fructus maximis reticulato-venosis, submembranaceis, margine sinuato-dentatis, dentibus apice setaceis. Smith. l. c.

1557. *ATRIPLEX angustifolia* caule herbaceo divaricato, foliis inferioribus hastatis subdentatis, superioribus lanceolatis integerrimis, calycibus fructus hastato-lanceolatis integerrimis. Willd. Linn. Sp. pl. 4. p. 965.

A. *angustifolia* caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis integerrimis, infimis subhastatis, calycibus seminum hastatis lævisculis. Smith. Fl. Brit. 3. p. 1092.

A. *patula*. Poll. Fl. Palat. n. 943. Huds. Fl. Angl. 443. Schkuhr. bot Handb.

*Atriplex* foliis imis hamatis, reliquis lingu-  
latis, valvulis seminalibus dentatis. Hall.  
hist. n. 1617.

*Atriplex* angusto oblongo folio. Bauh. pin.  
219. Mapp. fl. Als. p. 35.

*Atriplex sylvestris* Polygoni aut Helxines foliis.  
Lob. Icon. 257.

*Atriplex sylvestris.* *Taberæmont. p. 811. Ic.*

*Icon. Sow Engl. Bot. 25. tab. 1774. Schkuhr. l. c. tab. 347. (sub A. patula.)*

*Germ. Schmalblättrige Melde.*

*Gall. Arroche à fevilles étroite.*

*Hab.* Utrunque in ruderatis, sepibus, ad parietes pagorum et urbium, nec non ad fimeta et conspurcata passim frequens, in urbe *Carlsruhe* im *Heckengäfslein*.

*Flor.* Augusto. *Semina* Septembri, Octobri matura. ☉

Differt ab *A. patula*. *Caule* magis divaricato, sæpe prostrato. *Foliis* brevius petiolatis, omnibus fere lanceolatis, integerrimis, infimis cuneiformi-hastatis, lanceolatis, integriusculis aut vix denticulatis. *Valvulis* seminiferis hastatis, deltoideis, apice elongato-lanceolatis, acutis, margine integerrimis, disco vix unquam muricatis. *Seminibus* duplo minoribus.

1557.\* *ATRIPLEX erecta* caule herbaceo erecto, foliis ovato-lanceolatis; inferioribus sinuatis, calycibus seminum undique muricatis. *Smith. Fl. Brit. 3. p. 1093.*

*A. erecta.* *Huds. Fl. Angl. ed. 1. p. 376.*

*A. patula.* β. *Huds. ed. 2. p. 444.*

*Atriplex angustifolia laciniata.* *Dill. in Raj. Syn. 152.*

*Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2223.*

*Germ. Aufrechte Melde.*

*Gall. Arroche étroit.*

*Hab.* In ruderatis passim cum præcedenti specie

**Flor.** Augusto, Septembri. *Semina* Octobri matura. ☉

Differt ab affini *A. patula*: *Caulium* ramis erectis, firmioribus. *Foliis* ovato-lanceolatis, inferioribus sinuato-dentatis, superioribus integris. *Racemis* subaphyllis. *Seminibus* multo minoribus, vix punctulatis.

Differt ab *A. angustifolia*: *Valvulis* seminiferis triplo minoribus deltoidis, acutis, gibbosis, disco utrinque muricatis, dentibus porrectis, validis, numerosis. *Seminibus* minoribus.

1559.\* *ACER dasycarpum* foliis palmato-quinquelobis dentato-serratis, subtus glaucis, lobis sublanceolatis acutissimis, umbellis sessilibus paucifloris, germinibus villosis, seminum alis erectiusculis. *Ehrh. Beitr.* 4. p. 24. *Willd. Linn. Sp. pl.* 4. p. 985.

*A. eriocarpum* foliis palmato-quinquelobis inaequaliter dentatis subtus glabriusculis glaucisque, sinubus obtusis, floribus fertilibus subsessilibus conglomeratis. *Mich. Amer.* 2. p. 253.

*A. rubrum.* *Wangenh. Amer.* 28.

*Icon. Pfleger. arb. et frut.*

*Germ. Rauher Ahorn.*

*Gall. Erable ériocarpe.*

**Hab.** A Pennsylvania ad Carolinam. Hospitatur in hortis anglicis *Carlsruhe* et alibi. Ambulacra constituit pulcherrima circa urbem, ad fossas aquaticas prope *Gottsau*, ad viam publicam prope *Scheibenhardt*.

**Flor.** Februario. *Semina* Augusto matura. †

Arbor, pulchra, speciosa, introducta sub divo Carolo Friederico in hortum Carlsruhensem Ann 1770. Saepissime confundebatur cum *A. rubro*, qui distinguitur germinibus glabris, seminum alis patentibus.

In sylvaticis montosis humidis magis propaganda.

## A P P E N D I X.

Ad *Tom. I. pag. 164.*

*AIRA montana. Linn.*

Sine dubio *Linnaeus* nostrum gramen in montosis alpinisque cum *Aira flexuosa* obveniens, ut ex ejus descriptione et praesertim ex synonymo *Scheuchzeri* et tabula optima citata patet, comprehendebat.

**Nota.** *AIRA bottnica* foliis filiformibus, panicula laeviuscula argusta stricta, calycibus acuminatis, flosculis pedicellatis calycem subaequantibus, arista recta *Wahlenb. Fl. Lapon. p. 36. tab. 4.* ab *Aira montana* longe differt. In *A. montana* *Linnaei* arista nunquam recta, sed semper tortilis.

*AIRA montana* *Linn.* in herbario *Schreberi* *Gouani* et *Lachenalii* a me visa, in Suecia, in pyrenaeis et alpinis helvetiae ab amicissimis in me viris lecta, nullo modo à nostrati differt.

Ad *Tom. II. pag. 384. post MESPILUM Cotoneaster.*

743.\* *MESPILUS tomentosa* inermis, foliis ovatis integerrimis obtusis subtus



tomentosis, germinibus lanatis, baccis pentaspermis. *Ait. hort Kew. 2. p. 174.*  
*Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 1012.*

*M. eriocarpa. Decand. Fl. Franc. VI. p. 552.*

*Germ. Filzige Zwergmispel.*

*Gall. Neflier à fruit cotonneux.*

*Hab. In Principatu superiori retro Mœskirch am Donauthal in summis rupibus calcareis apricis ad Werrewag et retro Stetten am kalten Markt, nec non in vicina helvetia retro dem Weisbad am Gamor, ubi observavi 1818. In Jurasso nuper post alios legit Alex. Braun.*

*Flor. Majo. Baccæ Augusto maturæ. h*

*Frutex primo intuitu maxime affinis M. Cotoneaste, a quo differt: Foliis duplo fere majoribus. Pedunculis longioribus, 3-5 floris. Germinibus albide tomentosis (nec glabris.) Baccis rubris albide subtomentosis, (nec glabris) subpentaspermis.*

# INDEX GENERUM

ET

## SPECIERUM ALPHABETICUS.

|                   | Tom. | Pag.     |                   | Tom.         | Pag.     |
|-------------------|------|----------|-------------------|--------------|----------|
| <b>Acer</b>       | III. | 772. 789 | <b>Aethusa</b>    | I.           | 403. 687 |
| campestre         | III. | 791      | Cynapium          | I.           | 688      |
| dasycarpum        | IV.  | 718      | Meum              | I.           | 689      |
| monsessulanum     | III. | 792      | <b>Agrimonia</b>  | II.          | 307. 314 |
| Platanoides       | III. | 790      | Eupatoria         | II.          | 315      |
| Pseudoplatanus    | III. | 789      | odorata           | IV.          | 326      |
| <b>Achillea</b>   | III. | 266. 485 | <b>Agrostemma</b> | II.          | 195 285  |
| atrata            | IV.  | 622      | Coronaria         | II. 287. IV. | 322      |
| macrophylla       | IV.  | 623      | Githago           | II.          | 286      |
| Millefolium       | III. | 487      | <b>Agrostis</b>   | I. 62. IV.   | 141      |
| nobilis           | III. | 488      | acutiflora        | IV.          | 48       |
| Ptarmica          | III. | 485      | alba              | I. 155. IV.  | 51       |
| <b>Aconitum</b>   | II.  | 466. 495 | alpina            | I. 150 IV.   | 50       |
| Cammarum          | IV.  | 409      | arundinacea       | I. 144. IV.  | 48       |
| Lycoctonum        | II.  | 496      | Calamagrostis     | I.           | 145      |
| Napellus          | II.  | 497      | canina            | I. 147. IV.  | 50       |
| neomontanum       | IV.  | 408      | capillaris        | I. 154. IV.  | 51       |
| <b>Acorus</b>     | II.  | 4. 63    | dubia             | I.           | 149      |
| Calamus           | II.  | 63       | festucoides       | I. 152 IV.   | 50       |
| <b>Actaea</b>     | II.  | 465 468  | interrupta        | I.           | 143      |
| spicata.          | II.  | 468      | minima            | I. 155. IV.  | 52       |
| <b>Adonis</b>     | II.  | 467. 527 | pumila            | I. 157. IV.  | 52       |
| aestivalis        | II.  | 527      | Spica venti       | I.           | 142      |
| autumnalis        | II.  | 528      | stolonifera       | I. 152. IV.  | 51       |
| flammea           | II.  | 529      | varia             | IV.          | 49       |
| vernalis          | II.  | 530      | vinealis          | I.           | 148      |
| <b>Adoxa</b>      | II.  | 132. 186 | <b>Aira</b>       | I.           | 62 159   |
| Moschatellina     | II.  | 186      | aquatica          | I. 159 IV.   | 52       |
|                   | IV.  | 271      | caespitosa        | I. 161. IV.  | 52       |
| <b>Aegopodium</b> | I.   | 404. 733 | canescens         | I.           | 165      |
| Podagraria        | I.   | 733      | caryophylla       | I.           | 167      |
| <b>Aesculus</b>   | II.  | 129      | flexuosa          | I.           | 162      |
| carnea            | IV.  | 259      | montana           | I. 164. IV.  | 719      |
| Hippocastanum     | II.  | 129      | praecox           | I. 166. IV.  | 53       |

Z z

|                      | Tom.      | Pag.    |                          | Tom.      | Pag.    |
|----------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| <b>Ajuga</b>         | II.       | 567.    | <b>Alyssum arenarium</b> | III.      | 36      |
| <i>genevensis</i>    | II.       | 572     | <i>calycinum</i>         | III.      | 38      |
| <i>pyramidalis</i>   | II.       | 571     | <i>incanum</i>           | III. 39.  | IV. 476 |
| <i>reptans</i>       | II.       | 573     | <i>montanum</i>          | III.      | 35      |
| <b>Alchemilla</b>    | I.        | 307.    | <b>Amaranthus</b>        | III. 580. | 688     |
| <i>alpina</i>        | IV.       | 122     | <i>Blitum</i>            | III. 688. | IV. 670 |
| <i>vulgaris</i>      | I.        | 372     | <i>prostratus</i>        | III. 689. | IV. 670 |
| <b>Alisma</b>        | II.       | 5.      | <i>retroflexus</i>       | IV.       | 671     |
| <i>graminea</i>      | IV.       | 256     | <i>sylvestris</i>        | IV.       | 670     |
| <i>natans</i>        | II.       | 126     | <b>Amorpha</b>           | IV.       | 535     |
| <i>Plantago</i>      | II. 125.  | IV. 255 | <i>fruticosa</i>         | IV.       | 536     |
| <i>ranunculoides</i> | II.       | 127     | <b>Amygdalus</b>         | II.       | 347.    |
| <b>Allium</b>        | II.       | 3       | <i>communis</i>          | II.       | 366     |
| <i>Ampeloprasum</i>  | II.       | 10      | <i>Persica</i>           | II. 365.  | IV. 338 |
|                      | IV.       | 222     | <b>Anagallis</b>         | I.        | 397.    |
| <i>angulosum</i>     | II.       | 24      | <i>coerulea</i>          | I.        | 458     |
| <i>arenarium</i>     | II. 17.   | IV. 222 | <i>phoenicea</i>         | I.        | 456     |
| <i>carinatum</i>     | II. 18.   | IV. 222 | <i>tenella</i>           | I.        | 459     |
| <i>Cepa</i>          | II.       | 28      | <b>Anchusa</b>           | I.        | 397.    |
| <i>fistulosum</i>    | II.       | 28      | <i>angustifolia</i>      | I.        | 418     |
| <i>oleraceum</i>     | II. 23.   | IV. 222 | <i>italica</i>           | IV.       | 139     |
| <i>Porrum</i>        | II.       | 11      | <i>officinalis</i>       | I.        | 417     |
| <i>rotundum</i>      | II.       | 12      | <b>Andromeda</b>         | II.       | 193.    |
| <i>sativum</i>       | II.       | 15      | <i>polifolia</i>         | II.       | 204     |
| <i>Schoenoprasum</i> | II.       | 29      | <b>Andropogon</b>        | III.      | 732.    |
| <i>Scorodoprasum</i> | II.       | 16      | <i>Ischaemum</i>         | III.      | 776     |
|                      | IV.       | 222     | <b>Androsace</b>         | I.        | 397.    |
| <i>ursinum</i>       | II. 26.   | IV. 222 | <i>elongata</i>          | IV.       | 148     |
| <i>Victorialis</i>   | II.       | 13      | <i>Halleri</i>           | IV.       | 151     |
| <i>vineale</i>       | II. 22.   | IV. 222 | <i>Lachenalii</i>        | I.        | 437     |
| <b>Alopecurus</b>    | I.        | 61.     | <i>lactea</i>            | I.        | 436     |
| <i>agrestis</i>      | I.        | 138     | <i>maxima</i>            | I.        | 435     |
| <i>geniculatus</i>   | I. 139.   | IV. 46  | <i>septentrionalis</i>   | IV.       | 149     |
| <i>pratensis</i>     | I.        | 137     | <i>villosa</i>           | IV.       | 150     |
| <i>utriculatus</i>   | IV.       | 47      | <b>Anemone</b>           | II.       | 467.    |
| <b>Alsine</b>        | I.        | 405.    | <i>alpina</i>            | II. 511.  | IV. 412 |
| <i>media</i>         | I.        | 750     | <i>coronaria</i>         | II. 513.  | IV. 412 |
| <b>Althaea</b>       | III.      | 106.    | <i>Hepatica</i>          | II.       | 506     |
| <i>hirsuta</i>       | III. 132. | IV. 521 | <i>hortensis</i>         | II.       | 512     |
| <i>officinalis</i>   | III.      | 131     | <i>narcissiflora</i>     | IV.       | 410     |
| <i>rosea</i>         | III.      | 133     | <i>nemorosa</i>          | II. 515.  | IV. 413 |
| <b>Alyssum</b>       | III.      | 3.      | <i>pratensis</i>         | IV.       | 411     |

|                           | Tom.      | Pag.     |                      | Tom.     | Pag.     |
|---------------------------|-----------|----------|----------------------|----------|----------|
| <b>Anemone Pulsatilla</b> | II.       | 508      | <b>Aphanes</b>       | I.       | 1. 3     |
| <i>ranunculoides</i>      | II.       | 516      | <i>arvensis</i>      | I.       | 3        |
| <i>sylvestris</i>         | II.       | 513      | <b>Apium</b>         | I. 404.  | 730      |
| <i>vernalis</i>           | II.       | 507      | <i>graveolens</i>    | I.       | 731      |
| <b>Anethum</b>            | I. 404.   | 7. 8     | <i>Petroselinum</i>  | I.       | 730      |
| <i>Foeniculum</i>         | I.        | 718.     | <b>Aquilegia</b>     | II.      | 466 499  |
| <i>graveolens</i>         | IV.       | 210      | <i>vulgaris</i>      | II.      | 506      |
| <b>Angelica</b>           | I. 403.   | 665      | <b>Arabis</b>        | III.     | 4. 83    |
| <i>Archangelica</i>       | IV.       | 207      | <i>alpina</i>        | III. 83. | IV. 505  |
| <i>sylvestris</i>         | I. 665.   | IV. 207  | <i>auriculata</i>    | IV.      | 505      |
| <b>Anthemis</b>           | III.      | 266. 481 | <i>pumila</i>        | IV.      | 507      |
| <i>arvensis</i>           | III.      | 481      | <i>Thaliana</i>      | III.     | 86       |
| <i>Cotula</i>             | III.      | 482      | <i>Turrita</i>       | III. 84. | IV. 506  |
| <i>tinctoria</i>          | III.      | 483      | <b>Arbutus</b>       | II.      | 193. 206 |
| <b>Anthericum</b>         | II. 4.    | 46       | <i>Uva ursi</i>      | II.      | 206      |
| <i>Liliago</i>            | II.       | 48       | <b>Arctium</b>       | III.     | 263. 352 |
| <i>Liliastrum</i>         | IV.       | 233      | <i>majus</i>         | III.     | 354      |
| <i>ramosum</i>            | II.       | 46       | <i>minus</i>         | III.     | 355      |
| <i>serotinum</i>          | IV.       | 232      | <i>tomentosum</i>    | III.     | 353      |
| <b>Anthoxanthum</b>       | I. 11.    | 58       | <b>Arenaria</b>      | II.      | 194. 263 |
| <i>odoratum</i>           | I.        | 58       | <i>ciliata</i>       | IV.      | 311      |
| <b>Anthyllis</b>          | III.      | 141. 165 | <i>fasciculata</i>   | II. 270. | IV. 317  |
| <i>Vulneraria</i>         | III.      | 165      | <i>Gerardi</i>       | IV.      | 314      |
| <b>Antirrhinum</b>        | II.       | 570. 687 | <i>laricifolia</i>   | IV.      | 313      |
| <i>alpinum</i>            | IV.       | 452      | <i>multicaulis</i>   | IV.      | 313      |
| <i>arvense</i>            | II.       | 692      | <i>rubra</i>         | II.      | 265      |
| <i>Cymbalaria</i>         | II.       | 688      | <i>saxatilis</i>     | II.      | 267      |
| <i>Elatine</i>            | II.       | 689      | <i>serpyllifolia</i> | II.      | 264      |
| <i>genistifolium</i>      | IV.       | 453      | <i>tenuifolia</i>    | II.      | 268      |
| <i>Linaria</i>            | II. 693.  | IV. 454  | <i>trinervia</i>     | II.      | 264      |
| <i>minus</i>              | II.       | 691      | <i>verna</i>         | IV.      | 315      |
| <i>Orontium</i>           | II.       | 697      | <i>viscidula</i>     | IV.      | 316      |
| <i>spurium</i>            | II.       | 690      | <b>Aristolochia</b>  | III.     | 527. 576 |
| <b>Apargia</b>            | III.      | 261. 277 | <i>Clematitis</i>    | III.     | 576      |
| <i>alpina</i>             | III. 279. | IV. 582  | <i>Sipho</i>         | IV.      | 639      |
| <i>autumnalis</i>         | III.      | 281      | <b>Arnica</b>        | III.     | 265. 465 |
| <i>crispa</i>             | IV.       | 582      | <i>montana</i>       | III.     | 465      |
| <i>hastilis</i>           | III.      | 277      | <b>Arnoseris</b>     | III.     | 262. 347 |
| <i>hispida</i>            | III.      | 278      | <i>pusilla</i>       | III.     | 347      |
| <i>incana</i>             | III.      | 282      | <b>Artemisia</b>     | III.     | 264. 398 |
| <i>pyrenaica</i>          | III.      | 280      | <i>Abrotanum</i>     | III.     | 399      |
| <i>Taraxaci</i>           | IV.       | 583      | <i>Absinthium</i>    | III.     | 402      |
|                           |           |          |                      | IV.      | 606      |



|                             | Tom.      | Pag.     |                     | Tom.      | Pag.     |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|
| <i>Artemisia campestris</i> | III.      | 400      | <i>Astragalus</i>   |           |          |
| <i>Dracuncul</i>            | III.      | 404      | <i>Cicer</i>        | III. 215. | IV. 559  |
| <i>Mutellina</i>            | IV.       | 606      | <i>glycyphyllos</i> | III.      | 214.     |
| <i>pontica</i>              | III. 401. | IV. 606  |                     | IV.       | 559      |
| <i>saxatilis</i>            | IV.       | 605      | <i>Onobrychis</i>   | IV.       | 559      |
| <i>vulgaris</i>             | III.      | 405      | <i>pilosus</i>      | IV.       | 562      |
| <i>Arum</i>                 | III.      | 578 583. | <i>Astrantia</i>    | I.        | 402. 606 |
| <i>italicum</i>             | III.      | 583      | <i>major</i>        | I. 606.   | IV. 195  |
| <i>maculatum</i>            | III.      | 585      | <i>minor</i>        |           | IV. 195  |
| <i>Arundo</i>               | I.        | 62. 260  | <i>Athamanta</i>    | I.        | 403. 642 |
| <i>Calamagrostis</i>        | I.        | 267      | <i>Cervaria</i>     | I.        | 646      |
|                             | IV.       | 92       | <i>cretensis</i>    | I. 644.   | IV. 204  |
| <i>effusa</i>               | I.        | 262      | <i>Libanotis</i>    | I. 643.   | IV. 204  |
| <i>epigejos</i>             | I. 264.   | IV. 89   | <i>Oreoselinum</i>  | I.        | 647      |
| <i>Halleri</i>              | IV.       | 91       | <i>Atriplex</i>     | III.      | 7-3. 785 |
| <i>intermedia</i>           | I.        | 266      | <i>angustifolia</i> | IV.       | 716      |
| <i>litoria</i>              | IV.       | 89       | <i>campestris</i>   | IV.       | 714      |
| <i>Phragmites</i>           | I. 261.   | IV. 87   | <i>erecta</i>       | IV.       | 717      |
| <i>Plinii</i>               | IV.       | 87       | <i>hastata</i>      | III. 787. | IV. 714  |
| <i>Asarum</i>               | II.       | 307. 309 | <i>hortensis</i>    | III.      | 787      |
| <i>europaeum</i>            | II.       | 309      | <i>nitens</i>       | IV.       | 712      |
| <i>Asclepias</i>            | I.        | 400 557  | <i>patula</i>       | III. 788. | IV. 715  |
| <i>Vincetoxicum</i>         | I.        | 557      | <i>rosea</i>        | III.      | 786      |
| <i>Asparagus</i>            | II.       | 4. 49    | <i>Atropa</i>       | I.        | 399. 510 |
| <i>officinalis</i>          | II.       | 49       | <i>Belladonna</i>   | I.        | 510      |
| <i>Asperugo</i>             | IV.       | 134. 147 | <i>physaloides</i>  | IV.       | 174      |
| <i>procumbens</i>           | IV.       | 147      | <i>Avena</i>        | I.        | 62. 249  |
| <i>Asperula</i>             | I.        | 307. 327 | <i>chinensis</i>    | IV.       | 82       |
| <i>arvensis</i>             | I.        | 329      | <i>elatior</i>      | I.        | 249      |
| <i>Cynanchica</i>           | I.        | 331      | <i>fetua</i>        | I.        | 254      |
| <i>odorata</i>              | I.        | 327      | <i>flavescens</i>   | I.        | 287      |
| <i>tinctoria</i>            | I.        | 330      | <i>nuda</i>         | I. 254.   | IV. 82   |
| <i>Aster</i>                | III.      | 265. 446 | <i>orientalis</i>   | I. 252.   | IV. 81   |
| <i>alpinus</i>              | IV.       | 614      | <i>pratensis</i>    | I. 259.   | IV. 84   |
| <i>Amellus</i>              | III.      | 446      | <i>pubescens</i>    | I. 256.   | IV. 82   |
| <i>annuus</i>               | III.      | 447      | <i>sativa</i>       | I. 253.   | IV. 81   |
| <i>chinensis</i>            | IV.       | 615      | <i>strigosa</i>     | I. 251.   | IV. 81   |
| <i>salicifolius</i>         | IV.       | 613      | <i>tenuis</i>       |           | IV. 85   |
| <i>Astragalus</i>           | III.      | 142. 213 | <i>versicolor</i>   |           | IV. 83   |
| <i>alpinus</i>              | IV.       | 561      | <i>Azalea</i>       | IV.       | 134. 157 |
| <i>arenarius</i>            | III. 216. | IV. 559  | <i>procumbens</i>   | IV.       | 157      |
| <i>baeticus</i>             | IV.       | 563.     |                     |           |          |

|                   | Tom.         | Pag. |                        | Tom.        | Pag.   |
|-------------------|--------------|------|------------------------|-------------|--------|
| <b>Ballota</b>    | II.          | 568. | <b>Bromus arvensis</b> | I.          | 239.   |
| alba              | II.          | 636  |                        | IV.         | 78     |
| nigra             | II.          | 634  | asper                  | I. 232.     | IV. 77 |
| <b>Bartsia</b>    | II.          | 569. | Badensis               | IV.         | 74     |
| alpina            | II.          | 665  | commutatus             | IV.         | 72     |
| <b>Bellis</b>     | III.         | 264. | giganteus              | I.          | 240    |
| perennis          | III.         | 471  | gracilis               | I. 244.     | IV. 81 |
| <b>Berberis</b>   | II.          | 3.   | grossus                | IV.         | 71     |
| vulgaris          | II.          | 90   | hordeaceus             | IV.         | 68     |
| <b>Beta</b>       | I.           | 401. | incrimis               | I.          | 230    |
| vulgaris          | I.           | 574  | <b>Kochii</b>          | IV.         | 76     |
| <b>Betonica</b>   | II.          | 567  | mollis                 | I.          | 226    |
| officinalis       | II.          | 624  | montanus               | I. 242.     | IV. 80 |
| <b>Betula</b>     | III.         | 580. | multiflorus            | I. 225      | IV. 68 |
| alba              | III.         | 675  | pinnatus               | I. 243.     | IV. 81 |
| Alnus             | III.         | 677  | pratensis              | I. 236.     | IV. 78 |
| incana            | III.         | 679  | racemosus              | IV.         | 73     |
| ovata             | III.         | 678  | Scheuchzeri            | IV.         | 78     |
| pubescens         | III.         | 676  | secalinus              | I. 224.     | IV. 68 |
| <b>Bidens</b>     | III.         | 264. | squarrosus             | I.          | 228    |
| cernua            | III.         | 389  | sterilis               | I. 234.     | IV. 77 |
| tripartita        | III.         | 388  | tectorum               | I. 235.     | IV. 77 |
| <b>Biscutella</b> | III.         | 3.   | villosus               | I.          | 229    |
| laevigata         | III.         | 46   | <b>Bryonia</b>         | III.        | 582.   |
| <b>Blitum</b>     | I.           | 1.   | alba                   | III.        | 712    |
| capitatum         | I.           | 7    | dioica                 | III.        | 713    |
| <b>Borago</b>     | I.           | 396. | <b>Bunium</b>          | I.          | 403.   |
| officinalis       | I.           | 429  | Bulbocastanum          | I.          | 629    |
| <b>Brassica</b>   | III.         | 4.   |                        | IV.         | 204    |
| alpina            | III.         | 91   | <b>Buphthalmum</b>     | III.        | 266.   |
| arvensis          | III.         | 93   | salicifolium           | III.        | 491    |
| campestris        | IV.          | 509  | <b>Bupleurum</b>       | I.          | 403.   |
| Eruca             | IV.          | 513  | angulosum              | IV.         | 197    |
| Erucastum         | III. 97. IV. | 510  | falcatum               | I.          | 610    |
| Napus             | III. 93. IV. | 510  | longifolium            | I. 609. IV. | 196    |
| oleracea          | III.         | 95   | Pollichii              | I. 613. IV. | 200    |
| orientalis        | III.         | 90   | ranunculoides          | IV.         | 199    |
| Rapa              | III.         | 94   | rotundifolium          | I.          | 608    |
| <b>Briza</b>      | I.           | 62.  | stellatum              | IV.         | 196    |
| media             | I.           | 199  | tenuissimum            | I.          | 612    |
| minor             | I.           | 201  | <b>Butomus</b>         | II.         | 191    |
| <b>Bromus</b>     | I.           | 62.  | umbellatus             | II.         | 191    |

|                      | Tom.        | Pag.     |                      | Tom.          | Pag.     |
|----------------------|-------------|----------|----------------------|---------------|----------|
| <b>Buxus</b>         | III.        | 580. 680 | <b>Cardamine</b>     | III.          | 4. 53    |
| <i>sempervirens</i>  | III.        | 681      | <i>amara</i>         | III.          | 57       |
| <b>Cacalia</b>       | III.        | 263. 391 | <i>bellidifolia</i>  | IV.           | 479      |
| <i>albifrons</i>     | III.        | 392      | <i>hirsuta</i>       | III.          | 54       |
| <i>alpina</i>        | III.        | 391      | <i>impatiens</i>     | III.          | 53       |
| <b>Calendula</b>     | III.        | 266. 507 | <i>pratensis</i>     | III.          | 56       |
| <i>arvensis</i>      | III.        | 508      | <i>resedifolia</i>   | IV.           | 480      |
| <i>officinalis</i>   | III.        | 509      | <i>trifoliata</i>    | IV.           | 481      |
| <b>Calla</b>         | III.        | 578. 586 | <b>Carduus</b>       | III.          | 263. 358 |
| <i>palustris</i>     | III.        | 586      | <i>crispus</i>       | III.          | 361      |
| <b>Callitriche</b>   | I.          | 1. 4     | <i>Cyanoides</i>     | III. 366. IV. | 598      |
| <i>autumnatis</i>    | I.          | 6        | <i>defloratus</i>    | III.          | 363      |
| <i>intermedia</i>    | I.          | 5        | <i>marianus</i>      | III.          | 365      |
| <i>verna</i>         | I.          | 5        | <i>nutans</i>        | III.          | 359      |
| <b>Caltha</b>        | II.         | 466. 565 | <i>personata</i>     | III.          | 364      |
| <i>palustris</i>     | II.         | 565      | <i>polyacanthos</i>  | III.          | 360      |
| <b>Calycanthus</b>   | IV.         | 331. 397 | <b>Carex</b>         | III.          | 579. 609 |
| <i>floridus</i>      | IV.         | 397      | <i>alba</i>          | III.          | 665      |
| <b>Campanula</b>     | I.          | 399. 465 | <i>ampullacea</i>    | III.          | 672      |
| <i>barbata</i>       | IV.         | 161      | <i>arenaria</i>      | III.          | 612      |
| <i>Cervicaria</i>    | I.          | 478      | <i>atrata</i>        | IV.           | 653      |
| <i>glomerata</i>     | I. 477. IV. | 161      | <i>brachystachys</i> | IV.           | 665      |
| <i>hederacea</i>     | IV.         | 165      | <i>brizoides</i>     | III.          | 616      |
| <i>hybrida</i>       | I. 481. IV. | 165      | <i>Buxbaumii</i>     | IV.           | 660      |
| <i>latifolia</i>     | I. 469. IV. | 160      | <i>caespitosa</i>    | III.          | 633      |
| <i>linifolia</i>     | I.          | 469      | <i>canescens</i>     | III.          | 627      |
| <i>Medium</i>        | IV.         | 164      | <i>capillaris</i>    | IV.           | 664      |
| <i>patula</i>        | I.          | 470      | <i>chordorrhiza</i>  | IV.           | 652      |
| <i>persicifolia</i>  | I.          | 472      | <i>ciliata</i>       | III.          | 642      |
| <i>pusilla</i>       | I.          | 467      | <i>clandestina</i>   | III.          | 647      |
| <i>pyramidalis</i>   | IV.         | 159      |                      | IV.           | 657      |
| <i>rapunculoides</i> | I.          | 475      | <i>cyperoides</i>    | III.          | 621      |
|                      | IV.         | 161      | <i>Davalliana</i>    | IV.           | 649      |
| <i>Rapunculus</i>    | I.          | 471      | <i>digitata</i>      | III.          | 646      |
| <i>rhomboidea</i>    | IV.         | 160      | <i>dioica</i>        | III. 609. IV. | 647      |
| <i>rotundifolia</i>  | I.          | 466      | <i>distans</i>       | III.          | 659      |
| <i>Speculum</i>      | I.          | 480      | <i>divulsa</i>       | III.          | 616      |
| <i>thyrsoides</i>    | IV.         | 163      | <i>elongata</i>      | III.          | 631      |
| <i>Trachelium</i>    | I.          | 476      | <i>ferruginea</i>    | III. 650. IV. | 562      |
|                      | IV.         | 161      | <i>filiformis</i>    | III.          | 648      |
| <b>Cannabis</b>      | III.        | 716. 755 | <i>firma</i>         | IV.           | 657      |
| <i>sativa</i>        | III.        | 755      | <i>flacca</i>        | III.          | 661      |

|                    | Tom. | Pag.     |                        | Tom.    | Pag.     |
|--------------------|------|----------|------------------------|---------|----------|
| <b>Carex flava</b> | III. | 636      | <b>Carthamus</b>       | IV.     | 596      |
| frigida            | IV.  | 663      | tinctorius             | IV.     | 597      |
| fulva III. 658.    | IV.  | 667      | <b>Carum</b>           | I. 404. | 720      |
| gracilis           | III. | 634      | Carvi                  | I.      | 720      |
| gynobasis          | IV.  | 654      | <b>Caucalis</b>        | I. 402. | 620      |
| hirta              | III. | 673      | daucoides              | I.      | 621      |
| intermedia         | III. | 614      | grandiflora            | I.      | 620      |
| leporina           | III. | 623      | latifolia I. 625.      | IV.     | 202      |
| limosa             | III. | 660      | leptophylla            | I.      | 624      |
| montana            | III. | 640      | <b>Centaurea</b>       | III.    | 266. 495 |
| muricata           | III. | 617      | amara                  | III.    | 503      |
| pallescens         | III. | 664      | Benedicta              | III.    | 504      |
| paludosa           | III. | 667      | Calcitrapa             | III.    | 505      |
| panicea            | III. | 663      | Cyanus                 | III.    | 499      |
| paniculata         | III. | 620      | Jacea                  | III.    | 502      |
| paradoxa           | IV.  | 650      | montana III. 497.      | IV.     | 626      |
| pauciflora         | III. | 611      | nigra                  | III.    | 497      |
| pedata             | III. | 645      | paniculata             | III.    | 500      |
| pendula III. 654.  | IV.  | 667      | phrygia                | III.    | 495      |
| pilosa             | III. | 651      | Scabiosa III. 501.     | IV.     | 626      |
| pilulifera         | III. | 643      | solstitialis III. 507. | IV.     | 627      |
| praecox            | III. | 638      | <b>Centunculus</b>     | I. 306. | 361      |
| pseudo Cyperus     | III. | 656      | minimus I. 361.        | IV.     | 120      |
| pulicaris          | III. | 610      | <b>Cerastium</b>       | II.     | 195      |
| remota             | III. | 630      | alpinum                | IV.     | 323      |
| riparia            | III. | 669      | arvense                | II.     | 297      |
| Schreberi          | III. | 624      | aquaticum II. 299.     | IV.     | 325      |
| stellulata         | III. | 628      | brachypetalum          | IV.     | 322      |
| strigosa           | III. | 652      | semidecandrum          | II.     | 296      |
| supina             | IV.  | 656      | strictum               | IV.     | 324      |
| sylvatica          | III. | 653      | viscosum II. 295.      | IV.     | 322      |
| teretiuscula       | III. | 619      | vulgatum II. 294.      | IV.     | 322      |
| tomentosa          | III. | 639      | <b>Ceratophyllum</b>   | III.    | 581. 690 |
| umbrosa            | IV.  | 658      | demersum               | III.    | 690      |
| vesicaria          | III. | 670      | submersum              | III.    | 691      |
| vulpina            | III. | 615      | <b>Cerinthe</b>        | I. 396. | 428      |
| <b>Carlina</b>     | III. | 263. 385 | minor                  | I.      | 428      |
| acaulis            | III. | 385      | <b>Chaerophyllum</b>   | I. 404. | 698      |
| vulgaris           | III. | 387      | aureum                 | I.      | 705      |
| <b>Carpesium</b>   | III. | 264. 420 | bulbosum               | I.      | 700      |
| cernuum            | III. | 420      | hirsutum               | I.      | 703      |
| <b>Carpinus</b>    | III. | 582. 704 | sylvestre              | I.      | 698      |
| Betulus            | III. | 704      | temulum                | I.      | 701      |



|                      | Tom.          | Pag.     |                       | Tom.         | Pag.     |
|----------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------|----------|
| <b>Chara</b>         | III.          | 579. 593 | <b>Chrysanthemum</b>  |              |          |
| aspera               | IV.           | 644      | corymbosum            | III.         | 475      |
| Braunii              | IV.           | 646      | Halleri               | IV.          | 620      |
| flexilis             | III.          | 597      | inodorum              | III.         | 473      |
| glomerata            | IV.           | 645      | leucanthemum          | III.         | 472      |
| hispida              | III. 595. IV. | 643      | segetum               | III.         | 476      |
| pulehella            | IV.           | 644      | <b>Chrysocoma</b>     | III.         | 263. 395 |
| tomentosa            | III. 595. IV. | 643      | Lynosyris             | III.         | 396      |
| vulgaris             | III. 594. IV. | 643      | <b>Chrysos lenium</b> | II.          | 194. 214 |
| <b>Cheiranthus</b>   | III.          | 4. 78    | alternifolium         | II.          | 214      |
| annuus               | IV.           | 504      | opposilifolium        | II.          | 215      |
| Cheiri               | III.          | 79       | <b>Cicer</b>          | IV.          | 549      |
| decumbens            | IV.           | 501      | arietinum             | IV.          | 550      |
| glaberrimus          | IV.           | 503      | <b>Cichorium</b>      | III.         | 261. 350 |
| incanus              | IV.           | 502      | Endivia               | III.         | 352      |
| <b>Chelidonium</b>   | II.           | 465. 470 | Intibus               | III.         | 351      |
| Glaucium             | II.           | 473      | <b>Cicuta</b>         | I.           | 404. 684 |
| corniculatum         | IV.           | 400      | virosa                | I. 684. IV.  | 210      |
| laciniatum           | II.           | 472      | <b>Cineraria</b>      | III.         | 265. 450 |
| majus                | II.           | 470      | cordifolia            | III.         | 452      |
| <b>Chenopodium</b>   | I.            | 401. 561 | lanceolata            | II.          | 453      |
| album                | I. 566. IV.   | 185      | palustris             | III.         | 451      |
| ambrosioides         | I.            | 569      | spathulaefolia        | III.         | 454      |
| Bonus Heinricus      | I.            | 562      | <b>Circaea</b>        | I.           | 11. 15   |
| ficifolium           | IV.           | 186      | alpina                | I. 16 IV.    | 3        |
| glaucum              | I. 570. IV.   | 186      | intermedia            | IV.          | 2        |
| hybridum             | I. 568. IV.   | 185      | Lutetiana             | I.           | 15       |
| murale               | I. 565. IV.   | 184      | <b>Cistus</b>         | II.          | 465. 487 |
| opulifolium          | IV.           | 185      | Fumana                | IV.          | 404      |
| polyspermum          | I.            | 573      | Helianthemum          | II.          | 488      |
| rubrum               | I. 564. IV.   | 184      |                       | IV.          | 403      |
| urbicum              | I. 563. IV.   | 184      | oelandicus            | II.          | 489      |
| viride               | I. 567. IV.   | 185      | piliferus             | IV.          | 403      |
| Vulvaria             | I.            | 571      | vinealis              | IV.          | 406      |
| <b>Chironia</b>      | I.            | 398. 522 | <b>Clematis</b>       | II.          | 466. 517 |
| Centaureum           | I.            | 522      | erecta                | IV.          | 419      |
| Gerardi              | I.            | 523      | Flammula              | IV.          | 417      |
| <b>Chlora</b>        | II.           | 131. 144 | Vitalba               | II. 518. IV. | 415      |
| perfoliata           | II.           | 144      | Viticella             | IV.          | 416      |
| <b>Chondrilla</b>    | III.          | 262. 295 | <b>Clinopodium</b>    | II.          | 569. 639 |
| juncea               | III. 296. IV. | 588      | vulgare               | II.          | 640      |
| <b>Chrysanthemum</b> | III.          | 265. 472 | <b>Cnicus</b>         | III.         | 263. 368 |
| alpinum              | IV.           | 621      |                       |              |          |
| atratum              | IV.           | 619      | Cnicus                |              |          |

|                       | Tom.      | Pag. |                       | Tom.      | Pag.    |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------|-----------|---------|
| <b>Cnicus acaulis</b> | III.      | 379  | <b>Cornus mascula</b> | I.        | 365     |
| anglicus              | III.      | 372  | sanguinea             | I.        | 366     |
| eriphorus             | III.      | 371  | <b>Coronilla</b>      | III. 142. | 202     |
| <b>Erysithales</b>    | IV.       | 598  | coronata              | III. 204. | IV. 556 |
| heterophyllus         | III.      | 374  | Emerus                | III.      | 203     |
| <b>Lachenalii</b>     | III.      | 380  | miniata               | III. 205. | IV. 556 |
| <b>lanceolatus</b>    | III.      | 370  | <b>Securidaca</b>     | III.      | 207     |
| oleraceus             | III.      | 381  | varia                 | III.      | 207     |
| <b>palustris</b>      | III.      | 369  | <b>Coronopus</b>      | III. 4.   | 43      |
| <b>rivularis</b>      | III.      | 376  | didyma                | III.      | 44      |
| <b>spinosissimus</b>  | IV.       | 599  | Ruellii               | III.      | 43      |
| <b>tuberosus</b>      | III.      | 377  | <b>Corrigiola</b>     | I. 405.   | 747     |
| <b>Cochlearia</b>     | III. 3.   | 40   | littoralis            | I. 748.   | IV. 214 |
| Armoracia             | III.      | 41   | <b>Corylus</b>        | III. 582. | 705     |
| <b>Draba</b>          | IV.       | 477  | Avellana              | III.      | 705     |
| officinalis           | III.      | 40   | <b>Crassula</b>       | I. 405.   | 765     |
| <b>Colchicum</b>      | II. 4.    | 122  | rubens                | I.        | 765     |
| autumnale             | II.       | 123  | <b>Crataegus</b>      | II. 347.  | 367     |
| montanum              | II.       | 124  | Aria                  | II.       | 368     |
| <b>Colutea</b>        | III. 142. | 201  | coccinea              | IV.       | 340     |
| arborescens           | III.      | 201  | monogyna              | II.       | 373     |
| cruenta               | IV.       | 555  | <b>Oxyacantha</b>     | II.       | 371     |
| <b>Comarum</b>        | II. 348.  | 462  | torminalis            | II.       | 369     |
| palustre              | II.       | 462  | <b>Crepis</b>         | III. 262. | 333     |
| <b>Conium</b>         | I. 402.   | 630  | biennis               | III.      | 341     |
| maculatum             | I.        | 631  | <b>Dioscoridis</b>    | III.      | 337     |
| <b>Convallaria</b>    | II. 2.    | 50   | foetida               | III.      | 334     |
| bifolia               | II.       | 58   | <b>Lachenalii</b>     | III.      | 335     |
| latifolia             | II.       | 57   | pulchra               | IV.       | 594     |
| majalis               | II.       | 51   | setosa                | III.      | 336     |
| <b>Mappi</b>          | II.       | 52   | tectorum              | III.      | 339     |
| multiflora            | II.       | 56   | virens                | III.      | 340     |
| <b>Polygonatum</b>    | II.       | 55   | <b>Crocus</b>         | IV. 20.   | 28      |
| verticillata          | II.       | 53   | vernus                | IV.       | 28      |
| <b>Convolvulus</b>    | I. 398.   | 461  | <b>Cucubalus</b>      | II. 194   | 246     |
| arvensis              | I.        | 461  | Behen                 | II.       | 247     |
| sepium                | I.        | 462  | Otites                | II.       | 248     |
| <b>Conyza</b>         | III. 264. | 421  | <b>Cucumis</b>        | IV.       | 691     |
| squarrosa             | III.      | 422  | Melo                  | IV.       | 692     |
| <b>Coriandrum</b>     | I. 403.   | 691  | sativus               | IV.       | 691     |
| sativum               | I.        | 692  | <b>Cucurbita</b>      | IV.       | 687     |
| <b>Cornus</b>         | I. 307.   | 364  | aurantia              | IV.       | 690     |

|                    | Tom.          | Pag. |                  | Tom.         | Pag.     |
|--------------------|---------------|------|------------------|--------------|----------|
| <b>Cucurbita</b>   |               |      | <b>Dentaria</b>  | III. 4.      | 49       |
| Iagenaria          | IV.           | 688  | bulbifera        | III.         | 50       |
| Melopepo           | IV.           | 690  | heptaphyllos     | III.         | 51       |
| ovivera            | IV.           | 690  | pentaphyllos     | III.         | 52       |
| Pepo               | IV.           | 689  | <b>Dianthus</b>  | II.          | 194. 235 |
| verrucosa          | IV.           | 690  | Armeria          | II.          | 237      |
| <b>Cuscuta</b>     | I. 308.       | 373  | barbatus         | II.          | 235      |
| epithymum          | I.            | 375  | caesius          | IV.          | 302      |
| europaea           | I.            | 374  | carthusianorum   | II.          | 236      |
| <b>Cynara</b>      | IV.           | 601  | Caryophyllus     | IV.          | 301      |
| Cardunculus        | IV.           | 602  | deltoides        | II.          | 242      |
| Scolymus           | IV.           | 601  | diminutus        | II.          | 239      |
| <b>Cynoglossum</b> | I. 397.       | 419  | plumarius        | II.          | 245      |
| officinale         | I.            | 419  | prolifer         | II.          | 238      |
| Omphalodes         | IV.           | 141  | superbus         | II.          | 243      |
| scorpioides        | IV.           | 142  | sylvestris       | II.          | 240      |
| sylvaticum         | I. 421. IV.   | 140  | <b>Dictamnus</b> | II.          | 193. 196 |
| <b>Cynosurus</b>   | I. 63.        | 204  | albus            | II. 196. IV. | 279      |
| cristatus          | I.            | 204  | <b>Digitalis</b> | II.          | 570. 702 |
| <b>Cyperus</b>     | I. 61.        | 89   | ambigua          | II.          | 705      |
| flavescens         | I.            | 90   | lutea            | II.          | 706      |
| fuscus             | I.            | 91   | media            | IV.          | 455      |
| virescens          | I.            | 91   | purpurascens     | IV.          | 454      |
| <b>Cypripedium</b> | III. 527.     | 574  | purpurea         | II.          | 703      |
| Calceolus          | III. 575. IV. | 638  | <b>Dipsacus</b>  | I. 306.      | 312      |
| <b>Cytisus</b>     | III. 143.     | 198  | laciniatus       | I.           | 314      |
| Laburnum           | IV.           | 551  | pilosus          | I.           | 316      |
| nigricans          | III.          | 199  | sativus          | I. 314. IV.  | 111      |
| sessilifolius      | IV.           | 552  | <b>Doronicum</b> | III.         | 265. 467 |
| <b>Dactylis</b>    | I. 62.        | 202  | bellidiastrum    | III.         | 469      |
| glomerata          | I.            | 202  | Pardalianches    | III.         | 468      |
| <b>Daphne</b>      | II. 131.      | 155  |                  | IV.          | 619      |
| Cneorum            | II. 160. IV.  | 267  | plantagineum     | III.         | 469      |
| Laureola           | II.           | 156  | <b>Draba</b>     | III. 3.      | 14       |
| Mezereum           | II.           | 156  | aizoides         | III. 15. IV. | 464      |
| <b>Datura</b>      | I. 398        | 504  | muralis          | III.         | 17       |
| Stramonium         | I.            | 504  | stellata         | IV.          | 466      |
| <b>Daucus</b>      | I. 402.       | 626  | tomentosa        | IV.          | 467      |
| Carota             | I.            | 627  | verna            | III. 16. IV. | 465      |
| <b>Delphinium</b>  | II. 466.      | 493  | <b>Drosera</b>   | I. 406.      | 761      |
| Ajacis             | II.           | 494  | anglica          | IV.          | 216      |
| Consolida          | II.           | 493  | longifolia       | I. 764. IV.  | 216      |

|                        | Tom.         | Pag.     |                       | Tom.         | Pag.     |
|------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|
| <b>Drosera</b>         |              |          | <b>Eriophorum</b>     | l. 61.       | 110      |
| <i>rotundifolia</i>    | l.           | 762      | <i>alpinum</i>        | IV.          | 37       |
|                        | IV.          | 216      | <i>angustifolium</i>  | l.           | 113      |
| <b>Dryas</b>           | IV.          | 331. 393 |                       | IV.          | 39       |
| <i>octopetala</i>      | IV.          | 396      | <i>capitatum</i>      | IV.          | 37       |
| <b>Echinops</b>        | III.         | 266. 509 | <i>gracile</i>        | IV.          | 38       |
| <i>sphaerocephalus</i> | III.         | 509      | <i>polystachium</i>   | l. 111. IV.  | 38       |
| <b>Echium</b>          | l.           | 396. 432 | <i>vaginatium</i>     | l.           | 110      |
| <i>vulgare</i>         | l.           | 433.     | <b>Eryum</b>          | III.         | 143. 196 |
| <b>Elatine</b>         | II.          | 132. 187 | <i>Ervilia</i>        | IV.          | 548      |
| <i>Alsinastrum</i>     | II. 190 IV.  | 272      | <i>hirsutum</i>       | III.         | 197      |
| <i>hexandra</i>        | IV.          | 272      | <i>Lens</i>           | III.         | 198      |
| <i>Hydropiper</i>      | II.          | 188      | <i>tetraspermum</i>   | III.         | 196      |
| <i>triandra</i>        | II.          | 189      | <b>Eryngium</b>       | l.           | 401. 601 |
| <b>Elymus</b>          | l.           | 63       | <i>campestre</i>      | l.           | 601      |
| <i>arenarius</i>       | IV.          | 96       | <b>Erysimum</b>       | III.         | 4. 72    |
| <i>europaeus</i>       | l. 274. IV.  | 95       | <i>Alliaria</i>       | III.         | 75       |
| <b>Empetrum</b>        | III.         | 715. 749 | <i>Barbarea</i>       | III. 73. IV. | 496      |
| <i>nigrum</i>          | III.         | 749      | <i>cheiranthoides</i> | III.         | 76       |
| <b>Epilobium</b>       | II.          | 131. 134 | <i>hieracifolium</i>  | III.         | 77       |
| <i>alpinum</i>         | IV.          | 266      |                       | IV.          | 499      |
| <i>angustifolium</i>   | II.          | 135      | <i>odoratum</i>       | IV.          | 496      |
| <i>collinum</i>        | IV.          | 265      | <i>officinale</i>     | III.         | 72       |
| <i>hirsutum</i>        | II.          | 138      | <b>Euonymus</b>       | l.           | 400. 531 |
| <i>montanum</i>        | II.          | 141      | <i>europaeus</i>      | l.           | 531      |
| <i>palustre</i>        | II. 143. IV. | 266      | <i>latifolius</i>     | l.           | 532      |
| <i>parviflorum</i>     | II.          | 139      | <b>Eupatorium</b>     | III.         | 264. 394 |
| <i>roseum</i>          | IV.          | 264      | <i>cannabinum</i>     | III.         | 394      |
| <i>rosmarinifolium</i> | II.          | 136      | <b>Euphorbia</b>      | II.          | 307. 320 |
|                        | IV.          | 264      | <i>amygdaloides</i>   | II.          | 333      |
| <i>tetragonum</i>      | II.          | 142      | <i>cajogala</i>       | II.          | 339      |
| <b>Epimedium</b>       | IV.          | 109. 121 | <i>carniolica</i>     | II.          | 326      |
| <i>alpinum</i>         | IV.          | 121      | <i>Cyparissias</i>    | II.          | 335      |
| <b>Erica</b>           | II.          | 131. 153 | <i>dulcis</i>         | II.          | 325      |
| <i>vulgaris</i>        | II.          | 154      | <i>Esula</i>          | IV.          | 327      |
| <b>Erigeron</b>        | III.         | 265. 423 | <i>exigua</i>         | II.          | 322      |
| <i>acre</i>            | III.         | 424      | <i>falcata</i>        | II.          | 221      |
| <i>alpinum</i>         | IV.          | 611      | <i>Gerardi</i>        | II.          | 337      |
| <i>canadense</i>       | III.         | 423      | <i>Helioscopia</i>    | II.          | 327      |
| <i>uniflorum</i>       | IV.          | 612      | <i>Lathyris</i>       | II.          | 324      |
| <b>Erinus</b>          | II.          | 570. 710 | <i>mollis</i>         | II. 330. IV. | 327      |
| <i>alpinus</i>         | II.          | 710      | <i>palustris</i>      | II.          | 340      |



|  | Tom.     | Pag.    |                            | Tom.      | Pag.    |
|--|----------|---------|----------------------------|-----------|---------|
| <b>Enphorbia</b> Peplus                | ll.      | 320     | <b>Fumaria</b> claviculata | lll.      | 148     |
| platyphyllos                           | ll.      | 331     |                            | IV.       | 530     |
| verrucosa                              | ll.      | 329     | lutea                      | IV.       | 526     |
| <b>Euphrasia</b>                       | ll.      | 569.    | media                      | IV.       | 527     |
| lutea                                  | ll.      | 673     | officinalis                | lll. 146. | IV. 527 |
| Odontites                              | ll.      | 672     | parviflora                 | lll. 147. | IV. 529 |
| officinalis                            | ll. 671. | IV. 447 | solida                     | lll.      | 145     |
| <b>Fagus</b>                           | lll.     | 581.    | Vaillantii                 | IV.       | 529     |
| Castanea                               | lll.     | 702     | <b>Galanthus</b>           | IV.       | 219.    |
| sylvatica                              | lll.     | 703     | nivalis                    | IV.       | 220     |
| <b>Fedia</b>                           | l.       | 60.     | <b>Galega</b>              | IV.       | 557     |
| Auricula                               | IV.      | 27      | officinalis                | IV.       | 558     |
| carinata                               | IV.      | 26      | <b>Galeobdolon</b>         | ll.       | 568.    |
| dentata                                | l. 73.   | IV. 25  | luteum                     | ll. 617.  | IV. 441 |
| eriocarpa                              | IV.      | 26      | <b>Galeopsis</b>           | ll.       | 568.    |
| olitoria                               | l.       | 72      | cannabina                  | ll. 623.  | IV. 441 |
| <b>Festuca</b>                         | l.       | 62.     | Ladanum                    | ll. 619.  | IV. 441 |
| arundinacea                            | l.       | 219     | Tetrahit                   | ll.       | 621     |
|  | IV.      | 66      | villosa                    | ll. 620.  | IV. 441 |
| bromoides                              | l. 215.  | IV. 65  | <b>Galinsoga</b>           | lll.      | 266.    |
| cinerea                                | l.       | 210     | parviflora                 | lll.      | 490     |
| decumbens                              | l. 217.  | IV. 66  | <b>Galium</b>              | ll.       | 307.    |
| duriuscula                             | l. 214.  | IV. 64  | anglicum                   | IV.       | 116     |
| elatior                                | l. 218.  | IV. 66  | Aparine                    | l. 353.   | IV. 117 |
| fluitans                               | l.       | 221     | Bocconi                    | l. 339.   | IV. 115 |
| heterophylla                           | l. 213.  | IV. 63  | boreale                    | l. 349.   | IV. 117 |
| lioliacea                              | IV.      | 66      | campanulatum               | l.        | 346     |
| ovina                                  | l. 208.  | IV. 63  |                            | IV.       | 116     |
| pratensis                              | l.       | 212     | harcynicum                 | l.        | 338     |
| rubra                                  | l. 211.  | IV. 63  |                            | IV.       | 115     |
| <b>Filago</b> vid. <b>Gnaphalium</b> . |          |         | hyssopifolium              | IV.       | 113     |
| <b>Fragaria</b>                        | ll.      | 348.    | Mollugo                    | l.        | 345     |
| collina                                | IV.      | 379     | palustre                   | l. 334.   | IV. 114 |
| elatior                                | IV.      | 380     | rotundifolium              | l.        | 350     |
| grandiflora                            | IV.      | 381     | rubrioides                 | l.        | 333     |
| vesca                                  | ll. 439. | IV. 379 | rubrum                     | l.        | 348     |
| <b>Fraxinus</b>                        | lll.     | 773.    | spurium                    | l. 336    | IV. 114 |
| excelsior                              | lll.     | 793     | sylvaticum                 | l.        | 343     |
| Ornus                                  | lll.     | 794     | uliginosum                 | l. 335.   | IV. 114 |
| <b>Fumaria</b>                         | lll.     | 141.    | verum                      | l.        | 141     |
| capreolata                             | IV.      | 528     | <b>Genista</b>             | lll.      | 141.    |
| cava                                   | lll.     | 144     | germanica                  | lll.      | 158     |

|                          | Tom.          | Pag.     |                      | Tom.        | Pag.     |
|--------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|----------|
| <i>Genista pilosa</i>    | III.          | 157      | <i>Glaux</i>         | I. 400.     | 547      |
| <i>sagittalis</i>        | III.          | 155      | <i>maritima</i>      | I. 547. IV. | 183      |
| <i>tinctoria</i>         | III.          | 156      | <i>Glechoma</i>      | II.         | 567. 609 |
| <i>Gentiana</i>          | I. 401.       | 585      | <i>hederacea</i>     | II.         | 610      |
| <i>acaulis</i>           | I. 591. IV.   | 190      | <i>Globularia</i>    | I. 306.     | 309      |
| <i>Amarella</i>          | I. 596. IV.   | 193      | <i>cordifolia</i>    | I. 311. IV. | 110      |
| <i>Asclepiadea</i>       | I.            | 588      | <i>nudicaulis</i>    | IV.         | 109      |
| <i>bavarica</i>          | IV.           | 191      | <i>vulgaris</i>      | I. 309. IV. | 110      |
| <i>campestris</i>        | IV.           | 194      | <i>Gnaphalium</i>    | III.        | 264. 405 |
| <i>ciliata</i>           | I.            | 597      | <i>arenarium</i>     | III.        | 407      |
| <i>Cruciata</i>          | I.            | 599      | <i>arvense</i>       | III.        | 417      |
| <i>lutea</i>             | I. 585. IV.   | 189      | <i>dioicum</i>       | III.        | 409      |
| <i>Pneumonanthe</i>      | I.            | 589      | <i>gallicum</i>      | III.        | 416      |
| <i>punctata</i>          | IV.           | 189      | <i>germanicum</i>    | III.        | 415      |
| <i>purpurea</i>          | I.            | 587      | <i>Leontopodium</i>  | IV.         | 608      |
| <i>utriculosa</i>        | I. 594. IV.   | 191      | <i>luteo - album</i> | III.        | 408      |
| <i>verna</i>             | I. 598. IV.   | 191      | <i>margaritaceum</i> | III.        | 411      |
| <i>Geranium</i>          | III.          | 106. 107 | <i>montanum</i>      | III.        | 418      |
| <i>cicutarium</i>        | III.          | 107      | <i>supinum</i>       | IV.         | 607      |
| <i>columbinum</i>        | III.          | 125      | <i>sylvaticum</i>    | III.        | 412      |
| <i>dissectum</i>         | III.          | 124      | <i>uliginosum</i>    | III.        | 414      |
| <i>lucidum</i>           | III.          | 121      | <i>Gratiola</i>      | I. 10.      | 45       |
| <i>Macrorrhizon</i>      | IV.           | 517      | <i>officinalis</i>   | I. 45. IV.  | 10       |
| <i>malvaefolium</i>      | III.          | 126      | <i>Gypsophila</i>    | II.         | 194. 229 |
| <i>molle</i>             | III.          | 122      | <i>fastigitata</i>   | IV.         | 299      |
| <i>moschatum</i>         | III.          | 110      | <i>muralis</i>       | II.         | 230      |
| <i>palustre</i>          | III. 115. IV. | 519      | <i>repens</i>        | IV.         | 298      |
| <i>phaeum</i>            | III.          | 111      | <i>saxifraga</i>     | II.         | 231      |
| <i>pimpinellaefolium</i> | III.          | 109      | <i>Hebelia</i>       | II. 5.      | 117      |
| <i>pratense</i>          | III. 116. IV. | 519      | <i>allemannica</i>   | II.         | 118      |
| <i>pyrenaicum</i>        | III.          | 118      | <i>collina</i>       | II.         | 117      |
| <i>robertianum</i>       | III.          | 120      | <i>Hedera</i>        | I. 400      | 541      |
| <i>rotundifolium</i>     | III.          | 128      | <i>Helix</i>         | I.          | 541      |
| <i>sanguineum</i>        | III.          | 129      | <i>quinquefolia</i>  | IV.         | 179      |
| <i>sylvaticum</i>        | III. 113. IV. | 519      | <i>Hedysarum</i>     | III.        | 142. 212 |
| <i>Geum</i>              | II. 348.      | 456      | <i>coronarum</i>     | IV.         | 556      |
| <i>hederaefolium</i>     | II.           | 460      | <i>Onobrychis</i>    | III.        | 212      |
| <i>montanum</i>          | II. 461. IV.  | 397      | <i>Helianthus</i>    | III.        | 266. 493 |
| <i>rivale</i>            | II.           | 458      | <i>annuus</i>        | III.        | 493      |
| <i>urbanum</i>           | II.           | 457      | <i>tuberosus</i>     | III.        | 494      |
| <i>Gladiolus</i>         | I. 60.        | 76       | <i>Heliotropium</i>  | I. 396      | 407      |
| <i>communis</i>          | I.            | 77       | <i>europaeum</i>     | I.          | 407      |

|                     | Tom.          | Pag.     |                    | Tom.          | Pag.     |
|---------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| <b>Helleborus</b>   | ll.           | 466. 560 | <b>Hieracium</b>   |               |          |
| foetidus            | ll.           | 563      | sabaudum           | lll.          | 330      |
| hyemalis            | IV.           | 431      | saxatile           | lll.          | 313      |
| niger               | ll.           | 561      | scorzoneraefolium  | lll.          | 315      |
| viridis             | ll.           | 562      | staticefolium      | lll.          | 313      |
| <b>Hemerocallis</b> | IV.           | 219. 234 | succisaefolium     | lll.          | 326      |
| flava               | IV.           | 234      |                    | IV.           | 592      |
| fulva               | IV.           | 235      | umbellatum         | lll.          | 332      |
| <b>Heracleum</b>    | l.            | 402. 658 | villosum           | lll. 329. IV. | 594      |
| alpinum             | l.            | 661      | <b>Hippocrepis</b> | lll.          | 143. 210 |
| Sphondylium         | l.            | 659      | comosa             | lll. 211. IV. | 556      |
| <b>Herniaria</b>    | l.            | 401. 559 | <b>Hippophaë</b>   | lll.          | 715. 752 |
| glabra              | l.            | 559      | rhamnoides         | lll.          | 752      |
| hirsuta             | l. 561. IV.   | 184      | <b>Hippuris</b>    | l.            | 1. 2     |
| <b>Hesperis</b>     | lll.          | 4. 80    | vulgaris           | l. 2. IV.     | 1        |
| inodora             | lll.          | 81       | <b>Holcus</b>      | lll.          | 772. 777 |
| matronalis          | lll.          | 80       | lanatus            | lll.          | 777      |
| <b>Hibiscus</b>     | IV.           | 519      | mollis             | lll.          | 779      |
| syriacus            | IV.           | 520      | odoratus           | lll. 780. IV. | 712      |
| <b>Hieracium</b>    | lll.          | 262. 304 | <b>Holosteum</b>   | l.            | 63. 304  |
| alpinum             | lll. 306. IV. | 588      | umbellatum         | l.            | 304      |
| amplexicaule        | lll.          | 327      | <b>Hordeum</b>     | l.            | 63. 278  |
| angustifolium       | lll.          | 323      | distichum          | l.            | 281      |
| aurantiacum         | lll.          | 314      | hexastichon        | l.            | 280      |
| aureum              | lll. 304. IV. | 588      | murinum            | l.            | 283      |
| Auricula            | lll.          | 310      | secalinum          | l. 284. IV.   | 97       |
| blattarioides       | lll.          | 325      | vulgare            | l. 279. IV.   | 97       |
| brachiatum          | IV.           | 589      | zeocriton          | l.            | 282      |
| bupleuroides        | lll.          | 317      | <b>Hottonia</b>    | l.            | 397. 449 |
| chondrilloides      | lll.          | 333      | palustris          | l.            | 450      |
| coronopifolium      | IV.           | 594      | <b>Humulus</b>     | lll.          | 716. 756 |
| cymosum             | lll.          | 311      | Lupulus            | lll.          | 757      |
| dubium              | lll.          | 308      | <b>Hyacinthus</b>  | ll.           | 4. 60    |
| flexuosum           | IV.           | 590      | botryoides         | IV.           | 236      |
| humile              | lll.          | 318      | comosus            | ll.           | 60       |
| intybaceum          | IV.           | 592      | racemosus          | ll. 62. IV.   | 236      |
| <b>Lachenalii</b>   | lll. 322. IV. | 591      | <b>Hydrocharis</b> | lll.          | 717. 766 |
| Mertini             | IV.           | 591      | morsus ranae       | lll.          | 766      |
| murorum             | lll.          | 320      | <b>Hydrocotyle</b> | l.            | 401. 603 |
| paludosum           | lll.          | 324      | vulgaris           | l.            | 603      |
| Pilosella           | lll. 307. IV. | 589      | <b>Hyoscyamus</b>  | l.            | 398. 506 |
| praemorsum          | lll.          | 312      | niger              | l.            | 506      |

|                    | Tom.      | Pag.    |                    | Tom.      | Pag.    |
|--------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
| <b>Hypericum</b>   | III.      | 252     | <b>Inula hirta</b> | III.      | 462     |
| Androsaemum        | IV.       | 573     | montana            | III. 464. | IV. 618 |
| Elodes             | IV.       | 575     | Pulicaria          | III.      | 460     |
| hirsutum           | III. 258. | IV. 575 | salicina           | III.      | 461     |
| humifusum          | III.      | 256     | <b>Iris</b>        | I. 60.    | 78      |
| Leersii            | III. 253. | IV. 575 | germanica          | I.        | 78      |
| montanum           | III.      | 257     | graminea           | IV.       | 31      |
|                    | IV.       | 575     | Pseud-Acorus       | I.        | 80      |
| nummularifolium    | IV.       | 576     | pumila             | IV.       | 29      |
| perforatum         | III.      | 255     | sibirica           | I.        | 82      |
| proliferum         | IV.       | 574     | spuria             | IV.       | 30      |
| pulchrum           | III. 258. | IV. 576 | squalens           | IV.       | 29      |
| quadrangulare      | III.      | 252     | <b>Isatis</b>      | III. 3.   | 12      |
|                    | IV.       | 574     | tinctoria          | III.      | 13      |
| <b>Hypochaeris</b> | III. 261. | 343     | <b>Isnardia</b>    | I. 308.   | 368     |
| glabra             | III. 345. | IV. 596 | palustris          | I.        | 368     |
| maculata           | III.      | 343     | <b>Ittnera</b>     | III. 578. | 590     |
| radicata           | III.      | 346     | minor              | III.      | 592     |
| <b>Hyssopus</b>    | II. 567.  | 586     | Najas              | III.      | 590     |
| officinalis        | II.       | 586     | <b>Iuglans</b>     | III. 582  | 700     |
|                    |           |         | nigra              | IV.       | 674     |
| <b>Iasione</b>     | III. 267. | 510     | regia              | III.      | 700     |
| montana            | III.      | 511     | <b>Iuncus</b>      | II. 4.    | 65      |
| perennis           | IV.       | 627     | angustifolius      | II.       | 85      |
| <b>Iberis</b>      | III. 3.   | 32      |                    | IV.       | 247     |
| amara              | III.      | 32      | articulatus        | II.       | 72      |
| nudicaulis         | III. 33.  | IV. 475 |                    | IV.       | 238     |
| rotundifolia       | IV.       | 473     | bufonius           | II. 80.   | IV. 244 |
| umbellata          | IV.       | 474     | bulbosus           | II. 79.   | IV. 243 |
| <b>Ilex</b>        | I. 308.   | 376     | campestris         | II. 88.   | IV. 247 |
| Aquifolium         | I.        | 376     | β. congestus       | IV.       | 247     |
| <b>Illecebrum</b>  | IV. 134.  | 182     | γ. multiflor.      | IV.       | 247     |
| verticillatum      | IV.       | 182     | conglomeratus      | II.       | 65      |
| <b>Impatiens</b>   | III. 267. | 525     |                    | IV.       | 237     |
| Nolitangere        | III.      | 525     | effusus            | II. 66.   | IV. 237 |
| <b>Imperatoria</b> | I. 404.   | 707     | ericetorum         | II.       | 72      |
| Ostrutium          | I.        | 708     |                    | IV.       | 238     |
| <b>Inula</b>       | III. 265  | 455     | filiformis         | II. 68.   | IV. 237 |
| Britannica         | III.      | 457     | Forsteri           | IV.       | 244     |
| dysenterica        | III.      | 459     | glaucus            | II. 67.   | IV. 237 |
| germanica          | III.      | 463     | latifolius         | II. 83.   | IV. 245 |
| Helenium           | III.      | 456     | niveus             | II.       | 87      |



|                        | Tom. | Pag.     |                  | Tom. | Pag.         |
|------------------------|------|----------|------------------|------|--------------|
| <i>Iuncus</i> spadicus | IV.  | 245      | <i>Lathyrus</i>  | III. | 142. 173     |
| spicatus               | IV.  | 248      | Aphaca           | III. | 173. IV. 544 |
| squarrosus II. 70.     | IV.  | 238      | Cicera           | IV.  | 544          |
| subverticillatus       | II.  | 77       | hirsutus         | III. | 175. IV. 546 |
|                        | IV.  | 241      | latifolius       | III. | 179. IV. 547 |
| sylvaticus II. 75.     | IV.  | 239      | Nissolia         | III. | 174. IV. 544 |
| α. acutifl.            | IV.  | 239      | odoratus         | IV.  | 546          |
| β. nemorosus           | IV.  | 239      | palustris        | III. | 180. IV. 547 |
| γ. Lambocarp.          | IV.  | 240      | pratensis        | III. | 177          |
| δ. fusco-ater          | IV.  | 240      | sativus          | IV.  | 545          |
| ε. nigricans           | IV.  | 241      | sylvestris       | III. | 178. IV. 547 |
| Tenageja II. 78.       | IV.  | 243      | tuberosus        | III. | 176          |
| trifidus II. 70.       | IV.  | 238      | <i>Lavandula</i> | II.  | 567. 589     |
| vernalis II. 82.       | IV.  | 244      | Spica            | II.  | 589          |
| <i>Juniperus</i>       | III. | 717. 767 | <i>Lavatera</i>  | IV.  | 521          |
| communis               | III. | 768      | arborea          | IV.  | 522          |
| Sabina                 | III. | 769      | trimestris       | IV.  | 523          |
| virginiana             | IV.  | 707      | <i>Ledum</i>     | II.  | 193. 201     |
| <i>Lactuca</i>         | III. | 262. 289 | palustre         | II.  | 202          |
| augustana              | III. | 292      | <i>Leersia</i>   | I.   | 61 116       |
| perennis III. 294.     | IV.  | 588      | oryzoides        | I.   | 116          |
| saligna III. 293.      | IV.  | 588      | <i>Lemna</i>     | III. | 579. 597     |
| sativa                 | III. | 290      | gibba            | III. | 599          |
| Scariola               | III. | 290      | minor            | III. | 598          |
| virosa                 | III. | 291      | polyrhiza        | III. | 600          |
| <i>Lamium</i>          | II.  | 567. 611 | trisolca         | III. | 598          |
| album                  | II.  | 613      | <i>Leontodon</i> | III. | 261. 301     |
| amplexicaule           | II.  | 615      | salinum          | III. | 303          |
|                        | IV.  | 441      | Taraxatum        | III. | 302          |
| laevigatum             | II.  | 611      | <i>Leonurus</i>  | II.  | 567. 638     |
| maculatum              | II.  | 612      | Cardiaca         | II.  | 638          |
|                        | IV.  | 441      | Marrubiastrum    | IV.  | 442          |
| purpureum              | II.  | 614      | <i>Lepidium</i>  | III. | 3. 18        |
| <i>Lapsana</i>         | III. | 262. 349 | alpinum          | IV.  | 470          |
| communis               | III. | 349      | graminifolium    | III. | 21           |
| <i>Laserpitium</i>     | I.   | 402. 655 | latifolium       | III. | 20           |
| Cervaria               | I.   | 657      | petraeum         | IV.  | 468          |
| latifolium I. 655.     | IV.  | 205      | ruderales        | III. | 23           |
| prutenicum             | IV.  | 205      | sativum          | III. | 19           |
| Siler                  | IV.  | 206      | <i>Leucojum</i>  | II.  | 3. 6         |
| <i>Lathraea</i>        | II.  | 569. 681 | vernum           | II.  | 6. IV. 220   |
| Squamaria              | II.  | 681      |                  |      | Ligu-        |

|                     | Tom.     | Pag.     |                    | Tom.     | Pag.     |
|---------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| <b>Ligusticum</b>   | I.       | 403. 663 | <b>Lotus</b>       | III.     | 143. 242 |
| Levisticum          | I.       | 663      | corniculatus       | III.     | 244      |
| <b>Ligustrum</b>    | I.       | 10. 12   | siliquosus         | III.     | 243      |
| vulgare             | I.       | 12       | uliginosus         | III.     | 245      |
| <b>Lilium</b>       | II.      | 4. 30    |                    | IV.      | 569      |
| bulbiferum          | II.      | 31       | <b>Lunaria</b>     | III.     | 3. 47    |
| candidum            | IV.      | 222      | biennis            | III.     | 47       |
| Martagon            | II.      | 33       | perennis           | III.     | 48       |
| pyrenaicum          | II.      | 32       | <b>Lupinus</b>     | IV.      | 538      |
| <b>Limosella</b>    | II.      | 570. 711 | albus              | IV.      | 538      |
| aquatica            | II.      | 711      | luteus             | IV.      | 540      |
| <b>Lindernia</b>    | II.      | 570. 708 | varius             | IV.      | 539      |
| Pyxidaria II        | 708. IV. | 456      | <b>Lychnis</b>     | II.      | 195. 289 |
| <b>Linnaea</b>      | IV.      | 432. 457 | arvensis           | II.      | 293      |
| borealis            | IV.      | 457      | floscuculi         | II.      | 289      |
| <b>Linum</b>        | I.       | 405. 754 | sylvestris         | II.      | 291      |
| austriacum          | I.       | 758      | viscaria           | II.      | 290      |
| catarticum          | I.       | 759      | <b>Lychnanthus</b> | II.      | 195. 249 |
| Radiola I.          | 760. IV. | 216      | scandens           | II.      | 250      |
| tenuifolium         | I.       | 756      | <b>Lycopsis</b>    | I.       | 396. 431 |
| usitatissimum       | I.       | 755      | arvensis           | I.       | 431      |
| <b>Lithospermum</b> | I.       | 396. 413 | <b>Lycopus</b>     | I.       | 11. 52   |
| arvense             | I.       | 414      | europaeus          | I.       | 53       |
| officinale          | I.       | 413      | <b>Lysimachia</b>  | I.       | 397. 451 |
| purpureo-coeruleum  | I.       | 415      | nemorum            | I.       | 453      |
|                     | IV.      | 139      | <b>Nummularia</b>  | I.       | 455      |
| <b>Littorëlla</b>   | IV.      | 667      | thyrsiflora I.     | 452 IV.  | 156      |
| lacustris           | IV.      | 668      | vulgaris I.        | 451. IV. | 155      |
| <b>Lolium</b>       | I.       | 63. 269  | <b>Lythrum</b>     | II.      | 307. 311 |
| arvense             | IV.      | 95       | hyssopifolia       | II.      | 312      |
| Halleri I.          | 271. IV. | 94       | Salicaria          | II.      | 311      |
| perenne             | I.       | 269      | <b>Malva</b>       | III.     | 106. 134 |
| speciosum           | IV.      | 93       | Alcea              | III.     | 138      |
| temulentum          | I.       | 273      | crispa             | III.     | 137      |
| <b>Lonicera</b>     | I.       | 399. 487 | mauritiana         | III.     | 136      |
| alpigena            | I.       | 493      | moschata           | III.     | 139      |
| Caprifolium         | I.       | 487      | rotundifolia       | III.     | 135      |
| coerulea I.         | 494. IV. | 168      | sylvestris         | III.     | 136      |
| nigra I.            | 490. IV. | 168      | <b>Marrubium</b>   | II.      | 568. 636 |
| Periclymenum        | I.       | 489      | vulgare II.        | 637. IV. | 442      |
| sempervirens        | IV.      | 167      | <b>Matricaria</b>  | III.     | 264. 478 |
| tatarica            | IV.      | 167      |                    |          |          |
| Xylosteum           | II.      | 491      |                    |          |          |

|                   | Tom.      | Pag.    |                    | Tom.      | Pag.    |
|-------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
| <b>Matricaria</b> |           |         | <b>Mentha</b>      |           |         |
| Chamomilla        | III.      | 479     | sylvestris         | II. 592.  | IV. 433 |
| Parthenium        | III.      | 478     | viridis            | II. 595.  | IV. 434 |
| <b>Medicago</b>   | III. 143. | 246     | <b>Menyanthes</b>  | I. 397.   | 445     |
| denticulata       | IV.       | 571     | trifoliata         | I.        | 446     |
| falcata           | III.      | 248     | <b>Mercurialis</b> | III. 717. | 763     |
| lupulina          | III.      | 249     | annua              | III. 765. | IV. 705 |
| minima            | III. 250. | IV. 571 | perennis           | III.      | 764     |
| sativa            | III.      | 247     | <b>Mespilus</b>    | II. 347.  | 380     |
| <b>Melampyrum</b> | II. 570.  | 674     | Chamaemespilus     | IV.       | 341     |
| arvense           | II. 676.  | IV. 449 | Cotoneaster        | II.       | 382     |
| cristatum         | II.       | 675     | germanica          | II.       | 380     |
|                   |           | IV. 449 |                    | IV.       | 341     |
| nemorosum         | II.       | 677     | tomentosa          | IV.       | 719     |
| pratense          | II. 679.  | IV. 449 | <b>Moehringia</b>  | II. 132.  | 163     |
| sylvaticum        | II. 680.  | IV. 449 | muscosa            | II. 163.  | IV. 267 |
| <b>Melica</b>     | I. 62.    | 169     | <b>Momordica</b>   |           | IV. 685 |
| ciliata           | I. 170.   | IV. 53  | Elaterium          |           | IV. 685 |
| coerulea          | I.        | 174     | <b>Monarda</b>     | IV. 2.    | 12      |
| nutans            | I.        | 171     | didyma             | IV.       | 12      |
| uniflora          | I.        | 173     | <b>Monotropa</b>   | II. 193.  | 200     |
| <b>Melissa</b>    | II. 569.  | 648     | Hypopithys         | II.       | 200     |
| Calamintha        | II.       | 652     |                    | IV.       | 279     |
|                   |           | IV. 445 | <b>Montia</b>      | I. 63.    | 301     |
| grandiflora       | II.       | 650     | minor              | I.        | 301     |
| Nepeta            | II. 653.  | IV. 446 | rivularis          | I.        | 302     |
| officinalis       | II.       | 449     | <b>Morus</b>       | III. 580. | 684     |
| <b>Melittis</b>   | II. 569.  | 655     | alba               | III.      | 685     |
| Melysophyllum     | II.       | 655     | nigra              | IV.       | 669     |
| <b>Mentha</b>     | II. 567.  | 592     | <b>Myagrüm</b>     | III. 3.   | 5       |
| aquatica          | II. 598.  | IV. 434 | Bauhini            | III. 7.   | IV. 462 |
| arvensis          | II. 605.  | IV. 440 | paniculatum        | III.      | 10      |
| Badensis          | II.       | 604     |                    | IV.       | 462     |
| citrata           | IV.       | 434     | perfoliatum        | III.      | 6       |
| crispa            | II.       | 597     | rugosum            | III. 5.   | IV. 462 |
| gentilis          | II. 602.  | IV. 439 | sativum            | III. 9.   | IV. 462 |
| Halleri           | II.       | 594     | saxatile           | III. 11.  | IV. 462 |
| piperita          | IV.       | 436     | <b>Myosotis</b>    | I. 397.   | 409     |
| Pulegium          | II. 607.  | IV. 440 | arvensis           | I. 410.   | IV. 137 |
| rotundifolia      | II.       | 596     | Lappula            | I.        | 411     |
|                   |           | IV. 434 | nana               | IV.       | 138     |
| sativa            | II. 601.  | IV. 439 |                    |           |         |

|                     | Tom.      | Pag.     |                        | Tom.      | Pag.     |
|---------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|----------|
| <b>Myosotis</b>     |           |          | <b>Ononis Columnae</b> | IV.       | 541      |
| palustris           | I. 409.   | IV. 135  | mitis                  | III. 162. | IV. 541  |
| sylvatica           |           | IV. 136  | spinosa                | III. 161. | IV. 540  |
| <b>Myosurus</b>     | I. 406.   | 767      | <b>Onopordum</b>       | III. 263. | 383      |
| minimus             |           | I. 767   | Acanthium              |           | III. 383 |
| <b>Myriophyllum</b> | III. 581. | 692      | <b>Onosma</b>          | IV. 134.  | 145      |
| spicatum            |           | III. 692 | echioides              |           | IV. 146  |
| verticillatum       |           | III. 693 | <b>Ophrys</b>          | III. 527. | 556      |
| <b>Narcissus</b>    |           | II. 3. 7 | anthropophora          |           | III. 564 |
| poeticus            | II. 8.    | IV. 221  | apifera                |           | III. 566 |
| pseudonarcissus     |           | II. 9    | arachnites             |           | III. 568 |
|                     |           | IV. 222  | aranifera              |           | III. 567 |
| <b>Nardus</b>       | I. 61.    | 114      | Corallorhiza           |           | III. 557 |
| stricta             |           | I. 114   | cordata                |           | III. 560 |
| <b>Nepeta</b>       | II. 568.  | 588      | Loeselii               | III. 561. | IV. 638  |
| Cataria             | II. 588.  | IV. 433  | monorchis              |           | III. 562 |
| <b>Nicotiana</b>    | I. 398.   | 508      | myodes                 |           | III. 565 |
| fruticosa           |           | IV. 172  | Nidusavis              |           | III. 556 |
| macrophylla         |           | IV. 172  | ovata                  |           | III. 559 |
| rustica             |           | IV. 173  | paludosa               | III. 562  | IV. 638  |
| Tabacum             |           | I. 509   | spiralis               |           | III. 558 |
| <b>Nigella</b>      | II. 466.  | 501      | <b>Orchis</b>          | III. 527. | 528      |
| arvensis            |           | II. 504  | abortiva               |           | IV. 637  |
| Damascena           |           | II. 502  | bifolia                |           | III. 528 |
| sativa              |           | II. 503  | Conopsea               |           | III. 546 |
| <b>Nymphaea</b>     | II. 465.  | 480      | coriophora             |           | III. 531 |
| alba                |           | II. 482  |                        |           | IV. 636  |
| lutea               |           | II. 480  | fusca                  | III. 540. | IV. 636  |
| minima              |           | IV. 401  | globosa                | III. 531. | IV. 636  |
| <b>Ocimum</b>       | II. 568.  | 657      | maculata               |           | III. 544 |
| Basilicum           |           | II. 657  | mascula                |           | III. 534 |
| <b>Oenanthe</b>     | I. 402.   | 675      | militaris              |           | III. 539 |
| fistulosa           | I. 675.   | IV. 209  | moravica               |           | III. 541 |
| Lachenalii          | I. 678.   | IV. 209  | Morio                  |           | III. 532 |
| Pollichii           | I. 679.   | IV. 210  | odoratissima           |           | III. 545 |
| Tabernaemontani     | I. 676    |          |                        |           | IV. 636  |
|                     |           | IV. 209  | palustris              |           | III. 542 |
| <b>Oenothera</b>    | II. 131.  | 133      | pyramidalis            |           | III. 529 |
| biennis             |           | II. 133  |                        |           | IV. 636  |
| parviflora          |           | IV. 263  | sambucina              |           | III. 547 |
| <b>Ononis</b>       | III. 141. | 161      | Tabernaemontani        |           | III. 535 |
| altissima           |           | III. 163 |                        |           | IV. 636  |



|                     | Tom.     | Pag.    |                    | Tom.    | Pag.   |
|---------------------|----------|---------|--------------------|---------|--------|
| <b>Orchis</b>       |          |         | <b>Panicum</b>     |         |        |
| tephrosanthos       | III.     | 537     | miliaceum          | I.      | 132    |
| ustulata            | III.     | 536     | sanguinale         | I.      | 129    |
| variegata           | III.     | 538     | verticillatum      | I.      | 123    |
| <b>Origanum</b>     | II.      | 569.    | viride             | I.      | 126    |
| Majorana            | II.      | 643     | <b>Papaver</b>     | II.     | 465.   |
| vulgare             | II.      | 641     | Argemone           | II.     | 475    |
| <b>Ornithogalum</b> | II.      | 4.      | dubium             | II.     | 476    |
| luteum              | II. 37.  | IV. 226 | officinale         | II.     | 479    |
| minimum             | II. 38.  | IV. 229 | Rhoeas             | II.     | 477    |
| nutans              | II. 42.  | IV. 230 | somniferum         | II.     | 478    |
| pyrenaicum          | II.      | 41      | <b>Parietaria</b>  | III.    | 773.   |
|                     | IV.      | 230     | judaica            | III.    | 784    |
| sylvaticum          | IV.      | 228     | officinalis        | III.    | 783    |
| umbellatum          | II.      | 40      | <b>Paris</b>       | II.     | 132.   |
| <b>Ornithopus</b>   | III.     | 142.    | quadrifolia        | II.     | 184    |
| perpusillus         | I.       | 209     | <b>Parnassia</b>   | I.      | 405.   |
| <b>Orobanche</b>    | II.      | 569.    | palustris          | I.      | 751    |
| caryophyllacea      | IV.      | 459     | <b>Pastinaca</b>   | I.      | 404.   |
| coerulea            | II.      | 715     | sativa             | I.      | 716    |
| elator              | IV.      | 458     | <b>Pedicularis</b> | II.     | 570.   |
| major               | II. 713. | IV. 458 | flammea            | IV.     | 451    |
| minor               | IV.      | 460     | foliosa            | IV.     | 449    |
| ramosa              | II.      | 716     | palustris          | II.     | 684    |
| <b>Orobis</b>       | III.     | 142.    | sylvatica          | II.     | 686    |
| niger               | III.     | 171     | verticillata       | IV.     | 450    |
| tuberosus           | III.     | 170     | <b>Peltaria</b>    | IV.     | 460.   |
| vernus              | III.     | 169     | alliacea           | IV.     | 476    |
| <b>Oxalis</b>       | II.      | 195.    | <b>Peplis</b>      | II.     | 4.     |
| Acetosella          | II.      | 283     | Portula            | II.     | 92     |
| corniculata         | II. 284. | IV. 320 | <b>Peucedanum</b>  | I.      | 402.   |
| stricta             | IV.      | 320     | alsaticum          | I.      | 653    |
|                     |          |         | officinale         | I.      | 649    |
| <b>Paeonia</b>      | II.      | 465.    | Silaus             | I.      | 651    |
| officinalis         | II. 491. | IV. 407 | <b>Phalaris</b>    | I.      | 61.    |
| <b>Panicum</b>      | I.       | 61.     | arenaria           | IV.     | 41     |
| ciliare             | IV.      | 44      | arundinacea        | I.      | 122    |
| Crus galli          | I.       | 128     | aspera             | I. 120. | IV. 41 |
| Dactylon            | I. 131.  | IV. 45  | canariensis        | IV.     | 40     |
| germanicum          | IV.      | 42      | phleoides          | I. 118. | IV. 40 |
| glaucum             | I.       | 125     | <b>Phaseolus</b>   | III.    | 142.   |
| italicum            | IV.      | 43      | coccineus          | IV.     | 543    |

|                        | Tom.      | Pag.     |                            | Tom.      | Pag.     |
|------------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------|
| <b>Phaseolus nanus</b> | III.      | 167      | <b>Plantago lanceolata</b> | I.        | 360      |
| vulgaris               | III. 166. | IV. 543  | major                      | I.        | 357      |
| <b>Phellandrium</b>    | I.        | 404 680  | maritima                   | IV.       | 118      |
| aquaticum              | I.        | 680      | media                      | I.        | 359      |
| Mutellina              | I. 682    | IV. 210  | <b>Platanus</b>            | IV.       | 675      |
| <b>Philadelphus</b>    | II.       | 347. 349 | occidentalis               | IV.       | 676      |
| coronarius             | II.       | 349      | orientalis                 | IV.       | 675      |
| <b>Phleum</b>          | I.        | 61. 35   | <b>Poa</b>                 | I.        | 62. 176  |
| alpinum                | IV.       | 45       | alpina                     | I. 178.   | IV. 53   |
| nodosum                | I. 135    | IV. 45   | angustifolia               | I.        | 182      |
| pratense               | I.        | 134      |                            | IV.       | 55       |
| <b>Physalis</b>        | I.        | 399. 513 | annua                      | I.        | 188      |
| Alkekengi              | I.        | 513      | aquatica                   | I.        | 177      |
| <b>Phyteuma</b>        | I.        | 399. 482 | bulbosa                    | I.        | 194      |
| orbicularis            | I. 482.   | IV. 166  | collina                    | IV.       | 53       |
| spicata                | I.        | 484      | compressa                  | I.        | 190      |
| <b>Picris</b>          | III.      | 261. 275 | cristata                   | I.        | 196      |
| hieracioides           | III.      | 275      | disticha                   | IV.       | 61       |
| <b>Pimpinella</b>      | I.        | 404. 722 | dura                       | I.        | 197      |
| Anisum                 | IV.       | 212      | <b>Eragrostis</b>          | I.        | 191      |
| dioica                 | I.        | 727      | glauca                     | IV.       | 60       |
| dissecta               | I.        | 726      | laxa                       | I. 179.   | IV. 55   |
| magna                  | I.        | 724      | megastachia                | IV.       | 58       |
| Saxifraga              | I.        | 722      | nemoralis                  | I. 192.   | IV. 61   |
| <b>Pinguicula</b>      | I.        | 10. 47   | pilosa                     | IV.       | 57       |
| alpina                 | IV.       | 10       | pratensis                  | I. 184.   | IV. 55   |
| vulgaris               | I. 47.    | IV. 10   | salina                     | I. 187.   | IV. 57   |
| <b>Pinus</b>           | III.      | 582. 706 | sudetica                   | IV.       | 56       |
| Abies                  | III.      | 710      | sylvatica                  | I. 186.   | IV. 57   |
| Balsamea               | IV.       | 679      | trivialis                  | I.        | 180      |
| Cembra                 | IV.       | 677      | <b>Polemonium</b>          | I. 398.   | 464      |
| Larix                  | III.      | 708      | coeruleum                  | I.        | 464      |
| Picea                  | III.      | 709      | <b>Polycarpon</b>          | IV.       | 20. 107  |
| pumilio                | III.      | 707      | tetraphyllum               | IV.       | 108      |
| Strobilus              | IV.       | 678      | <b>Polycnemum</b>          | I.        | 60. 74   |
| sylvestris             | III.      | 707      | arvense                    | I. 75.    | IV. 28   |
|                        | IV.       | 677      | <b>Polygala</b>            | III.      | 141. 149 |
| <b>Pisum</b>           | III.      | 142. 167 | amara                      | III. 150. | IV. 533  |
| sativum                | III.      | 168      | chamaebuxus                | III.      | 151      |
| <b>Plantago</b>        | I.        | 306. 357 | vulgaris                   | III. 149. | IV. 530  |
| alpina                 | IV.       | 119      | <b>Polygonum</b>           | II.       | 132. 165 |
| arenaria               | IV.       | 120      | amphibium                  | II. 168.  | IV. 267  |

|                            | Tom.      | Pag.    |                    | Tom.      | Pag.     |
|----------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|----------|
| <b>Polygonum aviculare</b> | II.       | 177     | <b>Potamogeton</b> |           |          |
|                            | IV.       | 271     | pusillum           | I. 389.   | IV. 133  |
| Bellardi                   | II.       | 180     | rufescens          |           | IV. 126  |
| Bistorta                   | II. 165.  | IV. 267 | serratum           | I. 385.   | IV. 129  |
| Braunii                    | IV.       | 268     | setaceum           |           | I. 387   |
| Convolvulus                | II.       | 182     | spathulatum        |           | IV. 125  |
|                            | IV.       | 271     | <b>Potentilla</b>  | II. 348.  | 441      |
| dumetorum                  | II.       | 183     | alba               | II. 450.  | IV. 392  |
| Fagopyrum                  | II.       | 181     | Anserina           |           | II. 441  |
|                            | IV.       | 271     | argentea           |           | II. 447  |
| Hydropiper                 | II. 173.  | IV. 270 | aurea              |           | IV. 385  |
| lapathifolium              | II.       | 170     | canescens          |           | IV. 383  |
|                            | IV.       | 268     | caulescens         |           | IV. 392  |
| minus                      | II. 175.  | IV. 270 | cinerea            |           | IV. 388  |
| orientale                  | II.       | 176     | crocea             |           | IV. 390  |
| Persicaria                 | II. 172.  | IV. 268 | fragariaefolia     |           | II. 452  |
| viviparum                  | II. 167.  | IV. 267 | fruticosa          |           | IV. 382  |
| <b>Populus</b>             | III. 716. | 759     | opaca              |           | IV. 386  |
| alba                       | III.      | 759     | recta              | II. 445.  | IV. 383  |
| balsamifera                | IV.       | 704     | reptans            |           | II. 451  |
| candicans                  | IV.       | 705     | rupestris          |           | II. 443  |
| canescens                  | III.      | 760     | supina             |           | II. 444  |
| graeca                     | IV.       | 703     | verna              | II. 448.  | IV. 388  |
| nigra                      | III.      | 761     | <b>Poterium</b>    | III. 581. | 695      |
| pyramidalis                | III.      | 762     | Sanguisorba        |           | III. 695 |
| tremula                    | III.      | 762     | <b>Prenanthes</b>  | III. 262. | 297      |
| <b>Portulaca</b>           | II. 308.  | 342     | muralis            |           | III. 299 |
| oleracea                   | II.       | 343     | purpurea           |           | III. 298 |
| <b>Potamogeton</b>         | I. 308.   | 378     | tenuifolia         |           | III. 297 |
| complanatum                | IV.       | 131     | viminea            |           | III. 300 |
| compressum                 | I. 386.   | IV. 130 | <b>Primula</b>     | I. 397.   | 439      |
| crispum                    | I. 384.   | IV. 129 | Auricula           | I. 444.   | IV. 154  |
| densum                     | I. 381.   | IV. 128 | elatior            |           | I. 441   |
| gramineum                  | I.        | 387     | farinosa           | I. 443.   | IV. 153  |
|                            | IV.       | 132     | integrifolia       |           | IV. 154  |
| heterophyllum              | I         | 383     | officinalis        |           | I. 439   |
|                            | IV.       | 129     | pubescens          |           | IV. 153  |
| lucens                     | I. 382.   | IV. 128 | uniflora           |           | I. 442   |
| marinum                    | I. 388.   | IV. 132 | <b>Prunella</b>    | II. 568.  | 660      |
| natans                     | I. 379.   | IV. 123 | grandiflora        |           | II. 662  |
| perfoliatam                | I.        | 380     | laciniata          |           | II. 663  |
|                            | IV.       | 128     | vulgaris           |           | II. 661  |
| <b>Plantagineum</b>        | IV.       | 127     |                    |           |          |

|                   | Tom.     | Pag.     |                   | Tom.     | Pag.     |
|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>Prunus</b>     | II.      | 347.     | <b>Ranunculus</b> | II.      | 467.     |
| Armeniaca         |          | II. 356  | aconitifolius     |          | II. 540  |
|                   |          | IV. 332  | acris             |          | II. 548  |
| avium             | II. 359. | IV. 334  | alpestris         |          | IV. 427  |
| cerasifera        |          | IV. 337  | aquatilis         | II. 554. | IV. 431  |
| Cerasus           | II. 358. | IV. 333  | arvensis          |          | II. 551  |
| Chamaecerasus     |          | II. 356  | asiaticus         |          | IV. 429  |
| domestica         | II. 361. | IV. 335  | auricomus         |          | II. 638  |
| insititia         |          | II. 362  |                   |          | IV. 425  |
| Mahaleb           |          | II. 354  | bulbosus          |          | II. 544  |
| Padus             | II. 350. | IV. 331  | capillaris        |          | II. 556  |
| rubra             |          | IV. 331  | Ficaria           |          | II. 536  |
| serotina          |          | II. 352  | Flammula          |          | II. 532  |
| spinosa           |          | II. 363  |                   |          | IV. 424  |
| <b>Pulmonaria</b> | I.       | 396.     | hederaceus        |          | II. 553  |
| angustifolia      |          | I. 424   |                   |          | IV. 430  |
|                   |          | IV. 143  | hirsutus          | II. 543. | IV. 430  |
| officinalis       |          | I. 423   | lanuginosus       |          | II. 549  |
| <b>Pyrola</b>     | II.      | 193.     |                   |          | IV. 430  |
| chlorantha        |          | IV. 284  | <b>Lingua</b>     | II. 533. | IV. 424  |
| media             |          | IV. 282  | montanus          |          | IV. 426  |
| minor             | II. 210. | IV. 283  | parviflorus       |          | II. 552  |
| rosea             |          | IV. 284  |                   |          | IV. 430  |
| rotundifolia      |          | II. 209  | peucedanifolius   |          | II. 557  |
|                   |          | IV. 282  | platanifolius     |          | II. 542  |
| secunda           | II. 211. | IV. 285  | polyanthemus      |          | II. 547  |
| umbellata         |          | II. 211  |                   |          | IV. 430  |
|                   |          | IV. 285  | repens            |          | II. 546  |
| uniflora          | II. 212. | IV. 286  | reptans           |          | II. 534  |
| <b>Pyrus</b>      | II.      | 348.     | rutaefolius       |          | IV. 428  |
| Amelanchier       |          | II. 391  | sceleratus        |          | II. 539  |
| communis          | II. 384. | IV. 343  | Thora             |          | IV. 424  |
| Cydonia           |          | II. 387  | <b>Raphanus</b>   | III.     | 4. 103   |
| Malus             | II. 388. | IV. 349  | Raphanistrum      |          | III. 103 |
| pollvilla         |          | II. 386  | sativus           |          | II. 105  |
| <b>Quercus</b>    | III.     | 581.     | <b>Reseda</b>     | II.      | 307.     |
| lanuginosa        |          | IV. 672  | lutea             |          | II. 318  |
| pedunculata       |          | III. 698 | Luteola           |          | II. 316  |
| pinnatifida       |          | IV. 673  | odorata           |          | II. 319  |
| pyramidalis       |          | III. 699 | <b>Rhamnus</b>    | I.       | 399.     |
|                   |          |          | alpinus           |          | I. 528   |
|                   |          |          | catharticus       |          | I. 525   |



|                         | Tom.     | Pag.     |                          | Tom.     | Pag.         |
|-------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|--------------|
| <b>Rhamnus Frangula</b> | I.       | 526      | <b>Rosa fraxinifolia</b> | II.      | 413          |
| pumilus                 | I.       | 529      | gallica                  | II. 406. | IV. 357      |
| <b>Rheum</b>            | IV.      | 273      | lutea                    | II. 403. | IV. 356      |
| hybridum                | IV.      | 276      | mitissima                |          | IV. 358      |
| Rhaponticum             | IV.      | 273      | mollissima               | II. 409  | IV. 357      |
| <b>Rhinanthus</b>       | II.      | 569. 616 | montana                  |          | IV. 365      |
| alectorolophus          | II.      | 668      | parviflora               |          | IV. 359      |
| angustifolia            | II.      | 669      | pomifera                 | II. 410. | IV. 357      |
| Crista galli            | II.      | 667      | provincialis             |          | II. 429      |
| <b>Rhododendron</b>     | IV.      | 279. 280 |                          |          | IV. 372      |
| ferrugineum             | IV.      | 280      | pumila                   |          | IV. 364      |
| hirsutum                | IV.      | 281      | repens                   | II. 418. | IV. 360      |
| <b>Rhus</b>             | IV.      | 135. 213 | — arvensis               |          | IV. 360      |
| Cotinus                 | IV.      | 213      | rubiginosa               |          | II. 407      |
| <b>Ribes</b>            | I.       | 400. 534 |                          |          | IV. 357      |
| alpinum                 | I.       | 535      | rubrifolia               |          | IV. 361      |
| floridum                | IV.      | 178      | spinosissima             |          | II. 414      |
| glandulosum             | IV.      | 178      |                          |          | IV. 357      |
| Grossularia             | I.       | 539      | sulphurea                |          | II. 404      |
| nigrum                  | I.       | 536      | tomentosa                |          | IV. 368      |
| reclinatum              | I.       | 538      | umbellata                |          | II. 425      |
| rubrum                  | I.       | 534      | <b>Rosmarinus</b>        | IV. 2.   | 13           |
| Uva crispa              | I.       | 540      | officinalis              |          | IV. 14       |
| <b>Ricinus</b>          | IV.      | 682      | <b>Rubia</b>             | I.       | 307 355      |
| communis                | IV.      | 683      | tinctorum                |          | I. 355       |
| <b>Robinia</b>          | III.     | 143. 200 | <b>Rubus</b>             | II.      | 348 432      |
| Caragana                | IV.      | 554      | argenteus                | II. 434. | IV. 373      |
| pseudacacia             | III.     | 200      | caesius                  |          | II. 437      |
| umbraculifera           | IV.      | 553      | corylifolius             |          | IV. 373      |
| viscosa                 | IV.      | 553      | fruticosus               | II. 435. | IV. 374      |
| <b>Rosa</b>             | II.      | 348. 402 | glandulosus              |          | IV. 376      |
| agrestis                | II. 416. | IV. 358  | Idaeus                   | II. 433. | IV. 373      |
| alba                    | II. 427. | IV. 371  | nemorosus                |          | IV. 377      |
| austriaca               | II. 421. | IV. 362  | odoratus                 |          | IV. 3-8      |
| Axmanni                 |          | IV. 367  | saxatilis                | II. 438. | IV. 379      |
| canina                  | II. 422. | IV. 370  | <b>Rumex</b>             | II. 5.   | 94           |
| carolina                |          | IV. 359  | Acetosa                  |          | II. 111      |
| cinnamomea              |          | II. 411  | Acetosella               |          | II. 113      |
| collina                 |          | IV. 362  | acutus                   | II. 102. | IV. 251      |
| corymbifera             | II. 424. | IV. 371  | alpinus                  | II. 109. | IV. 254      |
| francofurtana           |          | II. 405  | aquaticus                |          | II. 105      |
|                         |          | IV. 356  |                          |          | <b>Rumex</b> |

|                        | Tom.      | Pag.    |                        | Tom.      | Pag.     |
|------------------------|-----------|---------|------------------------|-----------|----------|
| <b>Rumex crispus</b>   | II. 97.   | IV. 249 | <b>Salix nigricans</b> | IV.       | 695      |
| digynus                | II. 108.  | IV. 254 | pentandra              | III.      | 719      |
| hispanica              | II. 112.  | IV. 255 | praecox                | III. 724. | IV. 696  |
| maritimus              | II. 100.  | IV. 250 | purpurea               | III.      | 726      |
| maximus                | II. 99.   | IV. 249 | repens                 | III. 733. | IV. 699  |
| <b>Nemolapathum</b>    | II.       | 98      | reticulata             | IV.       | 698      |
| nemorosus              | IV.       | 252     | retusa                 | IV.       | 696      |
| obtusifolius           | II. 103.  | IV. 254 | rosmarinifolia         | III.      | 738      |
| palustris              | IV.       | 250     | rubra                  | III.      | 729      |
| <b>Patientia</b>       | II. 94.   | IV. 249 | triandra               | III. 718. | IV. 693  |
| pulcher                | II. 104.  | IV. 254 | undulata               | IV.       | 694      |
| sanguineus             | II.       | 96      | versifolia             | IV.       | 700      |
| scutatus               | IV.       | 249     | viminalis              | III. 745. | IV. 702  |
| <b>Ruta</b>            | II. 193.  | 198     | <b>Salsola</b>         | IV.       | 134. 187 |
| graveolens             | II.       | 198     | <b>Tragus</b>          | IV.       | 187      |
| <b>Sagina</b>          | I. 308.   | 390     | <b>Salvia</b>          | I. 11.    | 54       |
| apetala                | I.        | 392     | glutinosa              | I.        | 56       |
| erecta                 | I.        | 393     | officinalis            | IV.       | 15       |
| procumbens             | I.        | 391     | pratensis              | I.        | 55       |
| <b>Sagittaria</b>      | III. 581. | 693     | Sclarea                | IV.       | 18       |
| sagittifolia           | III.      | 694     | verticillata           | IV.       | 17       |
| <b>Salix</b>           | III. 715. | 718     | <b>Sambucus</b>        | I. 405.   | 738      |
| acuminata              | III.      | 744     | Ebulus                 | I.        | 739      |
| alba                   | III.      | 747     | nigra                  | I. 740.   | IV. 212  |
| amygdalina             | III.      | 722     | racemosa               | I.        | 742      |
| arbuscula              | III.      | 730     | <b>Samolus</b>         | I. 399.   | 485      |
| argentea               | III. 732. | IV. 699 | Valerandi              | I.        | 486      |
| aquatica               | III. 741. | IV. 702 | <b>Sanguisorba</b>     | I. 307.   | 363      |
| aurita                 | III. 739. | IV. 702 | officinalis            | I.        | 363      |
| babilonica             | III.      | 725     | <b>Sanicula</b>        | I. 402.   | 604      |
| <b>Caprea</b>          | III. 742. | IV. 702 | europaea               | I.        | 605      |
| fragilis               | III. 722. | IV. 694 | <b>Saponaria</b>       | II. 194.  | 233      |
| fusca                  | III. 735. | IV. 699 | Ocymoides              | IV.       | 300      |
| <b>Helix</b>           | III.      | 727     | officinalis            | II.       | 232      |
| incubacea              | III.      | 736     | Vaccaria               | II.       | 233      |
| <b>Lavandulaefolia</b> | IV.       | 699     | <b>Satureja</b>        | II. 568.  | 584      |
| mollissima             | III. 740. | IV. 701 | hortensis              | II.       | 585      |
|                        |           |         | <b>Satyrion</b>        | III. 527. | 548      |
|                        |           |         | albidum                | III.      | 552      |
|                        |           |         | epipogium              | III.      | 553      |
|                        |           |         | hircinum               | III.      | 549      |

|                     | Tom.      | Pag.     |                     | Tom.      | Pag.    |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------|
| <b>Satyrion</b>     |           |          | <b>Schoenus</b>     | I. 60.    | 84      |
| nigrum              | III. 551. | IV. 638  | albus               | I.        | 86      |
| repens              |           | III. 554 | compressus.         | I.        | 88      |
| viride              | III. 550. | IV. 638  |                     | IV.       | 33      |
| <b>Saxifraga</b>    | III. 194. | 216      | fuscus              | I. 85.    | IV. 33  |
| Aizoon              | II. 216.  | IV. 287  | Mariscus            |           | IV. 31  |
| aspera              |           | IV. 293  | nigricans           | I. 84.    | IV. 32  |
| autumnalis          |           | II. 219  | Schweyckerta        | I. 398.   | 447     |
|                     |           | IV. 288  | Nymphoides          | I.        | 448     |
| biflora             |           | IV. 292  | Scilla              | II. 4.    | 43      |
| brvroides           |           | IV. 290  | bifolia             | II. 43.   | IV. 230 |
| caesia              |           | IV. 289  | verna               |           | IV. 231 |
| condensata          |           | II. 226  | Scirpus             | I. 61.    | 93      |
| Cotyledon           |           | IV. 286  | acicularis          | I. 98.    | IV. 34  |
| granulata           |           | II. 221  | caespitosus         | I. 94.    | IV. 34  |
| moschata            |           | IV. 297  | fluitans            | I. 99.    | IV. 34  |
| muscoides           |           | IV. 295  | Halleri             | I. 95.    | IV. 34  |
| mutata              |           | IV. 287  | lacustris           | I.        | 100     |
| oppositifolia       |           | IV. 291  | maritimus           | I.        | 106     |
| rotundifolia        |           | II. 220  | mucronatus          | I.        | 104     |
|                     |           | IV. 293  | multicaulis         | I. 96.    | IV. 34  |
| Sponhemica          |           | II. 224  | palustris           | I.        | 93      |
|                     |           | IV. 294  | radicans            | IV.       | 35      |
| stellaris           |           | II. 218  | setaceus            | I.        | 103     |
| tridactylites       |           | II. 225  | supinus             | IV.       | 34      |
| <b>Scabiosa</b>     | I. 306.   | 317      | sylvaticus          | I. 109.   | IV. 35  |
| arvensis            | I. 321.   | IV. 111  | Tabernaemontani     | I.        | 101     |
| canescens           |           | IV. 112  | triqueter           | I.        | 105     |
| Columbaria          | I.        | 323      | uniglumis           | IV.       | 33      |
|                     |           | IV. 111  | <b>Scleranthus</b>  | II. 194.  | 227     |
| ochroleuca          |           | I. 325   | annuus              | II.       | 227     |
| Succisa             | I. 317.   | IV. 111  | perennis            | II.       | 228     |
| sylvatica           |           | I. 320   | <b>Scorzonera</b>   | III. 262. | 271     |
| <b>Scandix</b>      | I. 403.   | 693      | hispanica           | III.      | 273     |
| Cerefolium          |           | I. 696   | humilis             | III. 272. | IV. 580 |
| odorata             |           | I. 693   | laciniata           | III. 274. | IV. 582 |
| Pecten veneris      |           | I. 695   | purpurea            |           | IV. 580 |
| <b>Scherardia</b>   | I. 307.   | 325      | <b>Scrophularia</b> | II. 570.  | 698     |
| arvensis            |           | I. 326   | aquatica            | II.       | 699     |
| <b>Scheuchzeria</b> | II. 5.    | 115      | canina              | II.       | 701     |
| palustris           | II. 115.  | IV. 255  | nodosa              | II.       | 698     |
|                     |           |          | vernalis            | II.       | 700     |

|                    | Tom. | Pag. |                         | Tom. | Pag. |
|--------------------|------|------|-------------------------|------|------|
| <b>Scutellaria</b> | II.  | 568. | <b>Senecio viscosus</b> | III. | 434  |
| galericulata       | II.  | 658  | vulgaris                | III. | 433  |
| hastifolia         | IV.  | 446  | <b>Serapias</b>         | III. | 527  |
| minor              | II.  | 660. | ensifolia               | III. | 573  |
| <b>Secale</b>      | I.   | 63.  | lancifolia              | III. | 572  |
| cereale            | I.   | 277  | latifolis               | III. | 569  |
| <b>Sedum</b>       | II.  | 195. | longifolia              | III. | 571  |
| acre               | II.  | 278  | rubra                   | III. | 574  |
| album              | II.  | 277  | <b>Serratula</b>        | III. | 263. |
| Anacamseros        | II.  | 274  | arvensis                | III. | 357  |
| dasyphyllum        | II.  | 275  | tinctoria               | III. | 356  |
|                    | IV.  | 318  | <b>Seseli</b>           | I.   | 404. |
| Guettardi          | II.  | 280  | annuum                  | I.   | 712. |
| reflexum           | II.  | 276. | glaucum                 | IV.  | 210  |
| rupestre           | IV.  | 318  | Hippomarathrum          | I.   | 711  |
| saxatile           | IV.  | 319  |                         | IV.  | 210  |
| sexangulare        | II.  | 279  | montanum                | I.   | 710  |
|                    | IV.  | 320  | pyrenaicum              | IV.  | 204  |
| villosum           | II.  | 281. | <b>Sesleria</b>         | I.   | 63.  |
| <b>Selinum</b>     | I.   | 403. | coerulea                | I.   | 206. |
| carvifolia         | I.   | 637  | <b>Sibbaldia</b>        | IV.  | 135. |
| Chabraei           | I.   | 639  | procumbens              | IV.  | 217  |
| Lachenalii         | I.   | 640  | <b>Sideritis</b>        | II.  | 567. |
|                    | IV.  | 204  | Scordioides             | II.  | 591  |
| palustre           | I.   | 634  | <b>Silene</b>           | II.  | 194. |
| sylvestre          | I.   | 636  | acaulis                 | IV.  | 308  |
| <b>Sempervivum</b> | II.  | 308  | Armeria                 | IV.  | 305  |
| globiferum         | II.  | 346  | conica                  | II.  | 252  |
| hirtum             | IV.  | 329  | Linicola                | IV.  | 304  |
| montanum           | IV.  | 329  | noctiflora              | II.  | 254  |
| tectorum           | II.  | 344  | nutans                  | II.  | 251  |
| <b>Senecio</b>     | III. | 265. | quadrifida              | IV.  | 306  |
| aquaticus          | III. | 439  | rupestris               | II.  | 255  |
| erucaefolius       | III. | 436  | saxifraga               | IV.  | 307  |
| Fuchsii            | III. | 444  | <b>Sinapis</b>          | III. | 4.   |
| Jacobaea           | III. | 438  | alba                    | III. | 100  |
| nemorensis         | III. | 441  | arvensis                | III. | 99   |
|                    | IV.  | 613  | incana                  | III. | 102  |
| paludosus          | III. | 440  | nigra                   | III. | 100. |
| sarracenicus       | III. | 443  | <b>Sisymbrium</b>       | III. | 4.   |
| sylvaticus         | III. | 435  | ampibium                | III. | 62.  |
| tenuifolius        | III. | 437  | arenosum                | III. | 68.  |
|                    |      |      |                         | IV.  | 494  |



|                   | Tom.     | Pag.     |                       | Tom. | Pag.     |
|-------------------|----------|----------|-----------------------|------|----------|
| <b>Sisymbrium</b> |          |          | <b>Sonchus laevis</b> | III. | 285      |
| Columnae          | IV.      | 493      | palustris             | III. | 284      |
| Erucastrum        | III.     | 67       | Plumieri              | IV.  | 537      |
|                   | IV.      | 483      | <b>Sorbus</b>         | II.  | 347. 374 |
| Irio              | III. 72. | IV. 491  | aucuparia             | II.  | 374      |
| Loeselii          | III. 70. | IV. 494  | domestica             | II.  | 378      |
| Monense           |          | IV. 484  | hybrida               | II.  | 377      |
| murale            |          | IV. 487  | <b>Sparganium</b>     | III. | 579. 604 |
| Nasturtium        | III. 59. | IV. 482  | natans                | III. | 606      |
| palustre          | III. 61. | IV. 482  | ramosum               | III. | 605      |
| pannonicum        |          | IV. 490  | simplex               | III. | 604      |
| pyrenaicum        | III.     | 63       | <b>Spartium</b>       | III. | 141. 153 |
|                   | IV.      | 483      | junceum               | IV.  | 537      |
| Sophia            | III.     | 71       | scoparium             | III. | 153      |
| strictissimum     |          | IV. 495  | <b>Spergula</b>       | II.  | 195. 300 |
| sylvestre         | III. 60. | IV. 482  | arvensis              | II.  | 300      |
| tenuifolium       | III.     | 65       | nodosa                | II.  | 303      |
|                   | IV.      | 483      | pentandra             | II.  | 301      |
| vimineum          |          | IV. 488  | saginooides           | II.  | 304      |
| <b>Sium</b>       | I.       | 403. 667 | subulata              | II.  | 305      |
| angustifolium     | I.       | 669      | <b>Spinacia</b>       | III. | 716. 753 |
| Falcaria          | I.       | 673      | inermis               | III. | 754      |
| latifolium        | I.       | 667      | spinosa               | III. | 754      |
| nodiflorum        | I.       | 670      | <b>Spiraea</b>        | II.  | 348. 394 |
| repens            | I.       | 671      | Aruncus               | II.  | 396      |
| Sisarum           | I.       | 672      | chamaedrifolia        | IV.  | 355      |
| <b>Solanum</b>    | I.       | 399. 515 | crenata               | IV.  | 354      |
| Dulcamara         | I.       | 515      | Filipendula           | II.  | 398      |
| luteo-virescens   | IV.      | 177      | hypericifolia         | II.  | 395      |
| luteum            | I.       | 521      | Opulifolia            | IV.  | 355      |
| nigrum            | I. 519.  | IV. 175  | paniculata            | II.  | 394      |
| puniceum          |          | IV. 176  | salicifolia           | II.  | 393      |
| tuberosum         | I.       | 517      | sorbifolia            | IV.  | 356      |
| <b>Soldanella</b> | IV.      | 134. 156 | Ulmaria               | II.  | 400      |
| alpina            |          | IV. 156  | <b>Stachis</b>        | II.  | 568. 624 |
| <b>Solidago</b>   | III.     | 265. 449 | alpina                | II.  | 627      |
| Virgaurea         | III.     | 449      | annua                 | II.  | 632      |
|                   | IV.      | 618      | arvensis              | II.  | 633      |
| <b>Sonchus</b>    | III.     | 262. 283 | germanica             | II.  | 628      |
| alpinus           | III.     | 287      | palustris             | II.  | 625      |
| arvensis          | III.     | 284      | recta                 | II.  | 629      |
| asper             | III.     | 287      | sylvatica             | II.  | 624      |

|             | Tom.              | Pag.     |                | Tom.             | Pag. |
|-------------|-------------------|----------|----------------|------------------|------|
| Staphylea   | I. 405.           | 744      | Teucrium       |                  |      |
| pinnata     |                   | I. 744   | Chamaepitys    | II. 575          |      |
| Statice     | I. 406.           | 753      | montanum       | II. 582. IV. 433 |      |
| Armeria     | I. 753.           | IV. 215  | Scordium       | II. 579. IV. 432 |      |
| plantaginea |                   | IV. 215  | Scorodonia     | II. 577          |      |
| Stellaria   | II. 194.          | 257      | supinum        | II. 583          |      |
| arvensis    |                   | II. 259  | Thalictrum     | II. 466.         | 519  |
| Holostea    |                   | II. 258  | angustifolium  | II. 522          |      |
| nemorum     | II. 257.          | IV. 309  |                | IV. 421          |      |
| palustris   | II. 260.          | IV. 311  | aquilegifolium | II. 525          |      |
| uliginosa   | II. 261.          | IV. 311  |                | IV. 424          |      |
| Stellera    | II. 132.          | 161      | flavum         | II. 523. IV. 424 |      |
| Passerina   |                   | II. 162  | foetidum       | IV. 420          |      |
| Stipa       | I. 62.            | 246      | majus          | II. 520. IV. 421 |      |
| capillata   |                   | I. 248   | minus          | II. 520. IV. 421 |      |
| pennata     |                   | I. 246   | Morisoni       | IV. 422          |      |
| Subularia   | IV. 461.          | 463      | Thesium        | I. 400.          | 548  |
| aquatica    |                   | IV. 463  | alpinum        | I. 551           |      |
| Swertia     | I. 401.           | 583      | decumbens      | I. 549           |      |
| perennis    | I. 583.           | IV. 189  | montanum       | I. 552. IV. 183  |      |
| Symphytum   | I. 396.           | 425      | Thlaspi        | III. 3.          | 24   |
| Clusii      |                   | IV. 144  | alpestre       | III. 29. IV. 473 |      |
| officinale  |                   | I. 426   | arvense        | III. 24          |      |
| tuberosum   |                   | IV. 143  | Bursa pastoris | III. 30          |      |
| Syringa     | I. 10.            | 13       |                | IV. 43           |      |
| vulgaris    |                   | I. 13    | campestre      | III. 25          |      |
| Tagetes     | IV. 616           |          | montanum       | III. 27. IV. 472 |      |
| erecta      |                   | IV. 617  | perfoliatum    | III. 28. IV. 472 |      |
| patula      |                   | IV. 617  | saxatile       | IV. 471          |      |
| Tamarix     | I. 405.           | 745      | Thrinicia      | IV. 584          |      |
| germanica   |                   | I. 746   | hirta          | IV. 585          |      |
| Tamus       | III. 716.         | 757      | Thuja          | IV. 680          |      |
| communis    | III. 758. IV. 703 |          | occidentalis   | IV. 681          |      |
| Tanacetum   | III. 264.         | 397      | orientalis     | IV. 682          |      |
| Balsamita   |                   | IV. 603  | Thymus         | II. 568.         | 643  |
| vulgare     |                   | III. 397 | Acinos         | II. 647          |      |
| Taxus       | III. 717.         | 770      | alpinus        | IV. 444          |      |
| baccata     | III. 770. IV. 708 |          | citriodorus    | IV. 443          |      |
| Teucrium    | II. 557.          | 574      | Serpyllum      | II. 643. IV. 443 |      |
| Botrys      |                   | II. 576  | vulgaris       | II. 646          |      |
| Chamaedris  |                   | II. 580  | Tilia          | II. 465.         | 483  |
|             |                   |          | alba           | II. 487. IV. 402 |      |

|                        | Tom.      | Pag.    |                   | Tom.      | Pag.    |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|
| <b>Tilia americana</b> | ll.       | 485     | <b>Trifolium</b>  |           |         |
| europaea               | ll. 483.  | IV. 402 | fragiferum        | III. 233  |         |
| parvifolia             | ll. 484.  | IV. 402 |                   | IV. 567   |         |
| pubescens              | ll.       | 486     | hybridum          | III. 221. | IV. 566 |
| <b>Tillaea</b>         | l. 308.   | 394     | medium            | III. 225. | IV. 567 |
| aquatica               | l. 394.   | IV. 133 | montanum          | III. 234  |         |
| <b>Tordylium</b>       | IV. 135.  | 202     |                   | IV. 568   |         |
| maximum                | IV.       | 203     | ochroleucum       | III. 228  |         |
| <b>Torilis</b>         | l. 402.   | 615     |                   | IV. 567   |         |
| Anthriscus             | l.        | 615     | pratense          | III. 226. | IV. 567 |
| helvetica              | l. 617.   | IV. 201 | procumbens        | III. 241  |         |
| nodosa                 | IV.       | 201     |                   | IV. 568   |         |
| scandicina             | l.        | 618     | pseudoprocumbens  | III. 240  |         |
| <b>Tormentilla</b>     | ll. 348.  | 454     |                   | IV. 568   |         |
| erecta                 | ll. 454.  | IV. 393 | repens            | III. 222. | IV. 566 |
| reptans                | IV.       | 394     | rubens            | III. 243. | IV. 567 |
| <b>Tozzia</b>          | ll. 570.  | 582     | scabrum           | III. 231. | IV. 567 |
| alpina                 | ll.       | 583     | spadiceum         | III. 235  |         |
| <b>Tragopogon</b>      | III. 261. | 268     |                   | IV. 568   |         |
| majus                  | III.      | 269     | striatum          | III. 232. | IV. 567 |
| orientale              | IV.       | 579     | <b>Triglochin</b> | ll. 5.    | 119     |
| porrifolium            | III.      | 270     | palustre          | ll.       | 120     |
| pratense               | III.      | 268     | maritimum         | ll.       | 121     |
| <b>Trapa</b>           | l. 307.   | 370     | <b>Trigonella</b> | IV.       | 569     |
| natans                 | l.        | 370     | Foenumgraecum     | IV.       | 569     |
| <b>Trientalis</b>      | IV.       | 258     | <b>Triticum</b>   | l. 63.    | 285     |
| europaea               | IV.       | 258     | aestivum          | l. 286.   | IV. 98  |
| <b>Trifolium</b>       | III. 142. | 218     | caninum           | l.        | 298     |
| M. altissima           | III.      | 219     | dicoccum          | IV.       | 104     |
|                        | IV.       | 564     | durum             | IV.       | 101     |
| — coerulea             | IV.       | 565     | hybernum          | l. 296.   | IV. 99  |
| — dentata              | IV.       | 564     | juncum            | l. 293.   | IV. 106 |
| — officinalis          | III.      | 218     | Lachenalii        | l. 291.   | IV. 106 |
|                        | IV.       | 563     | monococcum        | l.        | 290     |
| — Petitpierreana       | IV.       | 564     | polonicum         | IV.       | 104     |
| agrarium               | III. 238. | IV. 568 | repens            | l.        | 294     |
| alpestre               | III. 224. | IV. 567 | Spelta            | l. 289.   | IV. 102 |
| alpinum                | IV.       | 566     | turgidum          | l. 288.   | IV. 101 |
| arvense                | III. 229. | IV. 567 | <b>Trollius</b>   | ll. 467.  | 559     |
| campestre              | III.      | 237     | europaeus         | ll.       | 559     |
|                        | IV.       | 568     | <b>Tropaeolum</b> | IV.       | 261     |
| filiforme              | IV.       | 568     | majus             | IV.       | 261     |

|              | Tom.     | Pag.     |               | Tom.    | Pag.     |
|--------------|----------|----------|---------------|---------|----------|
| Tulipa       | II.      | 4. 35    | Valantia      |         |          |
| sylvestris   | II. 36.  | IV. 226  | Cruciata      | III.    | 782      |
| Turritis     | III.     | 4. 87    | saccharata    | III.    | 181      |
| glabra       |          | III. 88  | Valeriana     | I. 60.  | 64       |
| hirsuta      | III. 89  | IV. 508  | dioica        | I.      | 64       |
| Tussilago    | III.     | 265. 425 | montana       | I.      | 71       |
| alba         |          | III. 430 | officinalis   | I. 65.  | IV. 20   |
| alpina       |          | III. 425 | Phu           | I.      | 68       |
| discolor     |          | III. 426 | tripteris     | I.      | 69       |
| Farfara      |          | III. 427 | Veratrum      | III.    | 772. 774 |
| hybrida      |          | III. 432 | album         | IV.     | 709      |
| nivea        |          | III. 428 | nigrum        | III.    | 774      |
| Petasites    |          | III. 430 | Verbascum     | I. 398. | 495      |
| Typha        | III.     | 579. 600 | Blattaria     | I. 502. | IV. 170  |
| elliptica    |          | III. 603 | cuspidatum    | IV.     | 169      |
| latifolia    |          | III. 601 | Lychnitis     | I. 500. | IV. 170  |
| media        |          | III. 602 | montanum      | IV.     | 170      |
| Ulex         | III.     | 141. 189 | nigrum        | I. 501. | IV. 170  |
| europaeus    |          | III. 189 | Phlomoides    | I.      | 497      |
| Ulmus        | I. 401.  | 578      | phoeniceum    | IV.     | 170      |
| campestris   |          | I. 578   | pulverulentum | I.      | 498      |
|              |          | IV. 188  |               | IV.     | 170      |
| effusa       | I. 581.  | IV. 188  | Thapsus       | I.      | 495      |
| suberosa     | I. 582.  | IV. 188  | Verbena       | I. 10.  | 51       |
| Urtica       | III.     | 580. 682 | officinalis   | I.      | 51       |
| dioica       |          | III. 683 | Veronica      | I. 10.  | 17       |
| urens        |          | III. 682 | acinifolia    | I.      | 43       |
| Utricularia  | I. 10.   | 49       | agrestis      | I.      | 37       |
| intermedia   | IV.      | 11       | alpina        | IV.     | 5        |
| minor        | I.       | 49       | Anagallis     | I.      | 26       |
| vulgaris     | I.       | 50       | aphylla       | IV.     | 7        |
| Uvularia     | IV. 219. | 224      | Beccabunga    | I.      | 25       |
| amplexifolia | IV.      | 224      | bellidifolia  | IV.     | 7        |
| Vaccinium    | II.      | 131. 146 | Chamaedris    | I.      | 33       |
| Myrtillus    | II.      | 146      | fruticulosa   | IV.     | 4        |
| Oxycoccus    | II.      | 152      | hederifolia   | I.      | 40       |
| uliginosum   | II.      | 148      | hybrida       | IV.     | 3        |
| Vitis idaea  | II.      | 149      | latifolia     | I.      | 34       |
| Valantia     | III.     | 772. 780 | longifolia    | I.      | 18       |
| Aparine      | III.     | 781      | montana       | I.      | 31       |
|              |          |          | officinalis   | I.      | 20       |
|              |          |          | praecox       | IV.     | 9        |



|                           | Tom.          | Pag.     |                        | Tom.          | Pag.     |
|---------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|----------|
| <i>Veronica prostrata</i> | I.            | 30       | <i>Viola calcarata</i> | III.          | 524      |
| <i>saxatilis</i>          | I.            | 21       | <i>canina</i>          | III. 515. IV. | 628      |
| <i>scutellata</i>         | I. 27. IV.    | 8        | <i>cornuta</i>         | III.          | 525      |
| <i>serpyllifolia</i>      | I.            | 23       | <i>grandiflora</i>     | III.          | 523      |
| <i>spicata</i>            | I. 19. IV.    | 3        | <i>hirta</i>           | III.          | 512      |
| <i>spuria</i>             | I.            | 17       | <i>mirabilis</i>       | III. 518. IV. | 635      |
| <i>Teucrium</i>           | I.            | 28       | <i>montana</i>         | III. 516. IV. | 633      |
| <i>Tournefortii</i>       | I. 39. IV.    | 9        | <i>odorata</i>         | III.          | 514      |
| <i>triphyllos</i>         | I.            | 41       | <i>palustris</i>       | III.          | 513      |
| <i>urticaefolia</i>       | I. 35. IV.    | 8        | <i>persicifolia</i>    | III.          | 517      |
| <i>verna</i>              | I.            | 42       |                        | IV.           | 635      |
| <i>Viburnum</i>           | I. 405.       | 735      | <i>stagnina</i>        | IV.           | 634      |
| <i>lantana</i>            | I.            | 735      | <i>tricolor</i>        | III.          | 522      |
| <i>Opulus</i>             | I.            | 736      | <i>Viscum</i>          | III.          | 715. 750 |
| <i>Vicia</i>              | III.          | 142. 181 | <i>album</i>           | III.          | 751      |
| <i>angustifolia</i>       | III.          | 191      | <i>Vitis</i>           | I. 400.       | 543      |
| <i>Cracca</i>             | III.          | 186      | <i>sylvestris</i>      | I.            | 543      |
| <i>dumetorum</i>          | III.          | 183      | <i>vinifera</i>        | I. 545. IV.   | 180      |
|                           | IV.           | 547      | <i>Vulpia</i>          | I.            | 1. 8     |
| <i>Faba</i>               | III.          | 190      | <i>Myurus</i>          | I.            | 8        |
| <i>Gerardi</i>            | III.          | 185      | <i>Willemeta</i>       | I. 401.       | 576      |
| <i>Lathyroides</i>        | III.          | 192      | <i>arenaria</i>        | I. 576. IV.   | 186      |
|                           | IV.           | 547      | <i>Xanthium</i>        | III.          | 580. 685 |
| <i>lutea</i>              | III. 193. IV. | 548      | <i>spinosum</i>        | III.          | 687      |
| <i>pisiformis</i>         | III.          | 182      | <i>strumarium</i>      | III.          | 686      |
|                           | IV.           | 547      | <i>Xeranthemum</i>     | IV.           | 609      |
| <i>sativa</i>             | III.          | 190      | <i>annuum</i>          | IV.           | 610      |
| <i>sepium</i>             | III.          | 194      | <i>Zannichellia</i>    | III.          | 578. 588 |
| <i>sylvatica</i>          | III. 184. IV. | 547      | <i>palustris</i>       | III.          | 588      |
| <i>villosa</i>            | III.          | 189      | <i>Zea</i>             | III.          | 608      |
| <i>Vinca</i>              | I. 398.       | 554      | <i>Mays</i>            | III.          | 608      |
| <i>major</i>              | IV.           | 183      | <i>Zinnia</i>          | IV.           | 624      |
| <i>minor</i>              | I. 555. IV.   | 183      | <i>multiflora</i>      | IV.           | 626      |
| <i>Viola</i>              | III.          | 267. 512 | <i>pauciflora</i>      | IV.           | 624      |
| <i>arvensis</i>           | III.          | 521      |                        |               |          |
| <i>biflora</i>            | III. 520. IV. | 635      |                        |               |          |

# INDEX G E N E R U M

ET

## SPECIERUM ALPHABETICUS

### NOMINA GERMANICA

#### COMPLECTENS.

|                   | Tom. | Pag. |                 | Tom. | Pag. |
|-------------------|------|------|-----------------|------|------|
| Abbiskraut        | I.   | 318  | Adonis          | II.  | 527. |
| Teufels           | I.   | 318  | feuerrothe      | II.  | 529  |
| Abnehmkraut       | II.  | 630  | Affodilllilie   |      |      |
| Acacienbaum       |      |      | braunrothe      | IV.  | 235  |
| Kugel             | IV.  | 553  | gelbe           | IV.  | 234  |
| unächter          | III. | 200  | Agley           | II.  | 500  |
| Ackerhirse        | I.   | 132  | Ahorn           |      |      |
| Ackerfuchsschwanz | I.   | 138  | Berg            | III. | 790  |
| Ackerkrumhals     | I.   | 431  | Feld            | III. | 791  |
| Ackermauseschwanz | I.   | 138  | grofser         | III. | 789  |
| Ackermeyerkraut   | I.   | 329  | kleiner         | III. | 791  |
| Ackerochsenzunge  | I.   | 431  | Montpellier von | III. | 792  |
| Ackerrettig       | III. | 104  | rauher          | IV.  | 718  |
| Ackersalat        | I.   | 73   | weifser         | III. | 789  |
| Ackerscharten     | III. | 357  | Akeley          | II.  | 500  |
| Ackerschmiele     | I.   | 142  | Alant           | III. | 456  |
| Ackersinau        | I.   | 3    | Berg            | III. | 464  |
| Ackersteinbrech   | I.   | 3    | rauhhaariger    | III. | 463  |
| Ackerstern        |      |      | Ruhr            | III. | 459  |
| kleiner           | II.  | 39   | Sumpf           | III. | 458  |
| Ackersternkraut   |      |      | Teutscher       | III. | 463  |
| blaues            | I.   | 329  | Weidenblättr.   | III. | 461  |
| Ackerstrausgras   | I.   | 142  | Alantwurz       | III. | 456  |

B b b

|                    | Tom.      | Pag.     |                  | Tom.     | Pag.    |
|--------------------|-----------|----------|------------------|----------|---------|
| Alleluja           | II.       | 283      | Antonskraut St.  | II.      | 135     |
| Allermannsharnisch | I.        | 77       | Apargie          |          |         |
|                    | II.       | 14       | Alpen            | III.     | 279     |
| Allerweltheil      | II.       | 315      | glatte           | III.     | 277     |
| Alpenkresse        | IV.       | 470      | graue            | III.     | 283     |
| Steinkresse        | IV.       | 470      | Herbst           | III.     | 281     |
| Alpenleinblatt     | I.        | 551      | krausse          | IV.      | 582     |
| Alpenröslein       |           |          | Löwenzahnbl.     | IV.      | 584     |
| gefranztes         | IV.       | 280      | pyrenaeische     | III.     | 280     |
| rostfarbiges       | IV.       | 282      | rauhe            | III.     | 278     |
| Alpkraut           | I. 519.   | III. 394 | Apfelbaum        | II. 388. | IV. 349 |
| Altbaum            | II.       | 351      | Apostemkraut     | I.       | 324     |
| Altkirsche         | II.       | 351      | Apricosenbaum    | II.      | 356     |
| Amaranth           |           |          |                  | IV.      | 338     |
| liegender          | III.      | 689      | Armleuchter      |          |         |
| Melde              | III.      | 688      | biegsamer        | III.     | 597     |
| wilder             | III. 688. | IV. 671  | Braunischer      | IV.      | 646     |
| zurückgebogener    | IV.       | 672      | filziger         | III.     | 595     |
| Amarellen          | II.       | 358      | gemeiner         | III.     | 594     |
| Amourettengras     | I.        | 191      | kuglichter       | IV.      | 645     |
| Andorn             |           |          | rauher           | IV.      | 644     |
| Berg - großer      | II.       | 628      | schöner          | IV.      | 645     |
| gemeiner           | II.       | 637      | stachlichter     | III.     | 596     |
| schwarzer          | II.       | 635      | Aron             | III.     | 585     |
| stinkender         | II.       | 635      | italiänischer    | III.     | 584     |
| Sumpf              | II.       | 626      | Wasser           | III.     | 587     |
| weißser            | II.       | 637      | Aronskraut       | III.     | 685     |
| wollichter         | II.       | 628      | Artischoken      | IV.      | 602     |
| Anemone            |           |          | Asche            | III.     | 794     |
| Alpen              | II.       | 511      | Aschenkraut      |          |         |
| Garten             | IV.       | 412      | herzblättriges   | III.     | 452     |
| — rheinländische   | II.       | 512      | lanzettblättrig. | III.     | 454     |
| gelbe Wald         | II.       | 517      | spatelblättrig.  | III.     | 455     |
| große - Wald       | II.       | 514      | Sumpf            | III.     | 451     |
| narcissenblüthige  | IV.       | 414      | Aster            |          |         |
| Angelik            |           |          | Alpen            | IV.      | 615     |
| Garten             | IV.       | 107      | chinesischer     | IV.      | 616     |
| Sumpf              | I.        | 666      | Weidenblättr.    | IV.      | 613     |
| Wald               | I.        | 666      | Astragalus       |          |         |
| Wiesen             | I.        | 666      | Alpen            | IV.      | 561     |
| wilde              | I.        | 666      | Caffee           | IV.      | 563     |
| Anis               | IV.       | 212      | haariger         | IV.      | 562     |
| Aniskerbel         | I.        | 694      |                  |          |         |

|                    | Tom.       | Pag. |                          | Tom. | Pag.     |
|--------------------|------------|------|--------------------------|------|----------|
| <b>Astragalus</b>  |            |      | <b>Baerenbeere</b>       | II.  | 206      |
| Kichern            | III.       | 215  | <b>Baerenklau</b>        |      |          |
| langfahniger       | IV.        | 560  | Alpen                    | I.   | 662      |
| Sand               | III.       | 217  | unächte                  | I.   | 660      |
| spanischer         | IV.        | 563  | <b>Baerenknoblauch</b>   | II.  | 27       |
| <b>Astrantie</b>   |            |      | <b>Baerentraube</b>      | II.  | 206      |
| große              | I.         | 607  | <b>Baerwurz</b>          | I.   | 660. 690 |
| kleine             | IV.        | 195  | <b>Barbatenkraut St.</b> | III. | 74       |
| <b>Attich</b>      | I.         | 739  | <b>Bartgras</b>          | III. | 776      |
| <b>Augentrost</b>  |            |      | <b>Bartsie</b>           |      |          |
| gelber             | II.        | 674  | Alpen                    | II.  | 665      |
| rother             | II.        | 672  | <b>Barttraube</b>        | IV.  | 480      |
| weißser            | II.        | 671  | <b>Basilienkraut</b>     | II.  | 658      |
| <b>Augenwurzel</b> | I.         | 66   | <b>Basilicum</b>         | II.  | 658      |
| <b>Aurikel</b>     |            |      | <b>Bastilme</b>          | I.   | 582      |
| Berg               | I.         | 445  | <b>Bauernsenf</b>        |      |          |
| ganzblättrige      | IV.        | 154  | bitterer                 | III. | 33       |
| <b>Aurin</b>       | I.         | 45   | <b>Beerwurz</b>          | I.   | 645      |
| <b>Azalea</b>      |            |      | <b>Becherblume</b>       | IV.  | 696      |
| niederliegende     | IV.        | 158  | <b>Behen</b>             |      |          |
| <b>Bachbohnen</b>  | I.         | 25   | gemeiner                 | II.  | 247      |
| <b>Bachbungen</b>  | I.         | 25   | glimmender               | II.  | 250      |
| schmahlblättr.     | I.         | 26   | weißser                  | II.  | 247      |
| <b>Bachmontie</b>  | I.         | 303  | <b>Beinheil</b>          | I.   | 426      |
| <b>Badekraut</b>   | I.         | 663  | Clusisches               | IV.  | 144      |
| <b>Baldrian</b>    |            |      | knolliges                | IV.  | 143      |
| Alpen              | I.         | 71   | <b>Beinholz</b>          | I.   | 12. 492  |
| Edel               | IV.        | 21   | <b>Belchenröslein</b>    | III. | 410      |
| feiner             | IV.        | 21   | <b>Benedicte</b>         |      |          |
| griechischer       | I.         | 465  | Berg                     | II.  | 461      |
| großer             | I. 66. IV. | 23   | Gundelrebenblät.         | II.  | 460      |
| — Garten           | I.         | 68   | Wasser                   | II.  | 459      |
| — Hollunderbl.     | IV.        | 25   | Wiesen                   | II.  | 459      |
| — officineller     | IV.        | 23   | <b>Benedictenwurz</b>    | II.  | 457      |
| — schmahlblät.     | IV.        | 23   | <b>Berberisken</b>       | II.  | 91       |
| — Sumpf            | IV.        | 23   | <b>Bergampher</b>        | II.  | 108      |
| — weißser          | I.         | 68   | <b>Bergbasilien</b>      | II.  | 647      |
| kleiner Alpen      | I.         | 70   | <b>Bergbenedicte</b>     | II.  | 461      |
| — Sumpf            | I.         | 64   | <b>Bergcalaminthe</b>    | II.  | 652      |
| <b>Balsamine</b>   | III.       | 526  | <b>Bergkriesen</b>       |      |          |
| <b>Balsamkraut</b> | IV.        | 604  | rothe                    | I.   | 494      |
|                    |            |      | <b>Bergsalat</b>         | III. | 294      |
|                    |            |      | <b>Bergsenf</b>          | III. | 35       |



|                      | Tom. Pag. | Binse            | Tom. Pag. |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Bertram</b>       |           |                  |           |
| Wiesen               | III. 486  | fadenartige      | II. 69    |
| wilder               | I. 635    | Flatter          | II. 67    |
| <b>Berufskraut</b>   | II. 630   | Forstersche      | IV. 244   |
| Alpen                | IV. 611   | Frosch           | II. 81    |
| Canadaisches         | III. 423  | Frühe - Feld     | II. 89    |
| einblumiges          | IV. 612   | gegliederte-Wald | II. 76    |
| scharfes             | III. 424  | — Wasser         | II. 75    |
| <b>Beschreykraut</b> | II. 630   | graue            | II. 68    |
| <b>Besenkraut</b>    |           | große See        | I. 100    |
| kleines              | III. 23   | — Wasser         | I. 100    |
| <b>Betonien</b>      | II. 623   | — Weiher         | I. 100    |
| <b>Beyfuß</b>        |           | — breitblättr.   | II. 84    |
| Alpen                | IV. 606   | — haarige        | II. 84    |
| Feld                 | III. 400  | — Wald           | II. 84    |
| gemeiner             | III. 404  | haarige Fröh.    | II. 83    |
| römischer            | III. 401  | Hallersche       | I. 96     |
| Stein                | IV. 605   | Heiden           | II. 72    |
| <b>Bibernelle</b>    | III. 696  | kleine           | IV. 35    |
| falsche              | I. 363    | — Wald           | I. 102    |
| <b>Bieberklee</b>    | I. 446    | — See            | I. 102    |
| <b>Bienensaug</b>    |           | knollige         | II. 80    |
| gefleckter           | II. 612   | Kopf             | II. 72    |
| glatter              | II. 612   | Kröten           | II. 81    |
| rother               | II. 615   | Meer             | I. 107    |
| weißser              | II. 614   | Meersalz         | II. 122   |
| <b>Bilsen</b>        | I. 507    | Nadel            | I. 98     |
| <b>Bilsenkraut</b>   |           | Quirlbluthige    | II. 77    |
| schwarzes            | I. 507    | Rasen            | I. 94     |
| <b>Bilsensaamen</b>  | I. 507    | rundköpfige      | II. 66    |
| <b>Bingelkraut</b>   | III. 765  | Salz             | II. 120   |
| ausdaurendes         | III. 764  | schmalblättr.    | II. 86    |
| einjähriges          | III. 765  | schwimmende      | I. 99     |
| Wald                 | III. 764  | sparrichte       | II. 71    |
| <b>Binse</b>         |           | Stech            | I. 104    |
| Aehren               | IV. 248   | Sumpf            | I. 93     |
| borstenartige        | I. 103    | Torf             | II. 77    |
| Busch                | II. 67    | vielhalmige      | I. 97     |
| dreyeckige           | I. 105    | Wald             | I. 109    |
| dreytheilige         | II. 70    | — große breitbl. | II. 84    |
| einbalgige           | IV. 33    | — — haarige      | II. 84    |
| einjährige           | II. 78    | — schmalblättr.  | II. 86    |
|                      |           | — weißblüh.      | II. 86    |

|                   | Tom.     | Pag.     |                | Tom. | Pag. |
|-------------------|----------|----------|----------------|------|------|
| Binse             |          |          | Bocksgeilen    |      |      |
| Weiher            | I.       | 93       | grofse         | III. | 549  |
| weifse Alpen      | II.      | 88       | grüne          | III. | 550  |
| wurzelnde         | IV.      | 36       | kriechende     | III. | 555  |
| Birke             |          |          | saftige        | III. | 553  |
| gemeine           | III.     | 675      | schwarze       | III. | 552  |
| weichhaarige      | III.     | 677      | weifse         | III. | 552  |
| weifse            | III.     | 675      | Bockshorn      | IV.  | 570  |
| Birnbaum          | II. 385. | IV. 343  | Bockshornkraut | IV.  | 570  |
| Bollweiler        | II.      | 386      | Bohne          |      |      |
| Bisam - Erdrauch  | II.      | 186      | Acker          | III. | 195  |
| Hahnenfufs        | II.      | 186      | gemeine        | III. | 197  |
| Kräutlein         | II.      | 186      | Feuer          | IV.  | 543  |
| Bischoffsmütze    | I.       | 530      | Sau            | III. | 195  |
| Bitterklee        | I.       | 446      | Scharlach      | IV.  | 543  |
| Bitterkraut       | III.     | 20       | Türkische      | IV.  | 543  |
| Habichtkrautartig | III.     | 276      | Zwerg          | III. | 167  |
| Bittersüfs        | I.       | 516      | Bohnenbaum     | IV.  | 551  |
| Bitterwurzel      | I.       | 585      | italiänischer  | IV.  | 552  |
| Blasenkirsche     | I.       | 514      | Bohnenkraut    | II.  | 585  |
| Blasennufs        | I.       | 744      | Bohnenstaude   |      |      |
| Blasenstrauch     |          |          | schwärzliche   | III. | 199  |
| gelber            | III.     | 202      | Boragen        | I.   | 430  |
| orientalischer    | IV.      | 555      | Boretsch       | I.   | 430  |
| rother            | IV.      | 555      | Borstengras    | I.   | 115  |
| Blauer Tarant     | I.       | 584      | Brackendistel  | I.   | 601  |
| Blumenbinse       | II.      | 191      | Braunheil      | II.  | 661  |
| Blutauge          | II. 463. | 529      | Braunschwertel | I.   | 77   |
| Blutgarbe         | II.      | 178      | Braunwurz      |      |      |
| Blutgras          | I.       | 130      | gelbblühende   | II.  | 700  |
| Bluthirse         | I.       | 130      | Hunds          | II.  | 701  |
| Blutkraut         | I. 363.  | 415      | knotige        | II.  | 698  |
|                   | II. 178. | 311      | Wasser         | II.  | 700  |
| Blutströpflein    | II.      | 527      | Bräunewurzel   | I.   | 332  |
| Blutwurz          | II.      | 455      | Brennkraut     | II.  | 533  |
| Bochsart          | I.       | 165      | aufrechtes     | IV.  | 419  |
| gelber            | III.     | 269      | Brennnessel    |      |      |
| —  grofser        | III.     | 270      | grofse         | III. | 683  |
| orientalischer    | IV.      | 579      | kleine         | III. | 683  |
| purpurrother      | III.     | 271      | Brennwurz      | II.  | 156  |
| Wald              | II.      | 397      | Brillenschote  |      |      |
| Wiesen            | II. 401. | III. 269 | glatte         | III. | 46   |
| Bocksbeer         | II. 433. | 437      |                |      |      |

|                       | Tom. Pag. |                        | Tom. Pag. |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>Brombeerstaude</b> |           | <b>Calcitrape</b>      | III. 505  |
| blaue                 | II. 437   | <b>Calinus</b>         |           |
| Drüsentragende        | IV. 376   | gemeiner               | II. 64    |
| Haselnufsblättr.      | IV. 374   | <b>Canariengras</b>    | IV. 40    |
| schwarze              | II. 436   | <b>Capuciner</b>       | IV. 662   |
| Silberweifse          | II. 435   | <b>Capucinerchen</b>   | IV. 662   |
| Trauben               | IV. 377   | <b>Caragantstrauch</b> | IV. 554   |
| <b>Bruchkraut</b>     |           | <b>Cardamine</b>       |           |
| glattes               | I. 560    | bittere                | III. 58   |
| haariges              | I. 561    | dreyblättrige          | IV. 481   |
| <b>Brunelle</b>       |           | flüchtigblühend.       | III. 53   |
| gemeine               | II. 661   | Maasliebenblättr.      | IV. 479   |
| grofsblumige          | II. 662   | rauhhaarige            | III. 55   |
| zerschlissene         | II. 663   | Reseddenblättr.        | IV. 480   |
| <b>Brunnkresse</b>    | III. 59   | Wiesen                 | III. 57   |
| <b>Bryonie</b>        |           | <b>Cardon</b>          | IV. 603   |
| glatte - Wald         | III. 758  | <b>Carniolen</b>       | I. 365    |
| <b>Bubenstree</b>     | I. 313    | <b>Cataputia</b>       | II. 324   |
| <b>Buchampfer</b>     | II. 283   | <b>Cellerie</b>        | I. 732    |
| <b>Buche</b>          | III. 703  | <b>Centunkel</b>       | I. 362    |
| Hagen                 | III. 704  | <b>Cerinthe</b>        | I. 428    |
| Hain                  | III. 704  | <b>Chamomille</b>      |           |
| Roth                  | III. 703  | ächte                  | III. 480  |
| Weifs                 | III. 704  | färbe                  | III. 484  |
| <b>Buchs</b>          | III. 681  | Hunds                  | III. 483  |
| <b>Buchweizen</b>     | II. 181   | stinkende              | III. 483  |
| <b>Buchwinde</b>      | II. 182   | unächte                | III. 482  |
| <b>Buhlkraut</b>      | I. 572    | <b>Chlora</b>          | II. 145   |
| <b>Bund</b>           |           | <b>Chondrille</b>      | III. 296  |
| gelber                | II. 32    | <b>Christophskraut</b> | II. 469   |
| pyrenäischer          | II. 32    | <b>Christwurz</b>      |           |
| wilder                | II. 34    | grüne                  | II. 562   |
| <b>Burzelkraut</b>    | II. 343   | schwarze               | II. 561   |
| <b>Büchselrohr</b>    | I. 261    | Winter                 | IV. 431   |
| <b>Butterblume</b>    |           | <b>Cichorien</b>       | III. 351  |
| grofse                | II. 566   | <b>Cistenröslein</b>   | II. 488   |
| <b>Cacalie</b>        |           | Alpen                  | II. 490   |
| Alpen                 | III. 391  | dünnes                 | IV. 405   |
| wollhaarige           | III. 393  | haartragendes          | IV. 403   |
| <b>Caffée</b>         |           | Weinbergs              | IV. 406   |
| französischer         | IV. 550   | <b>Citronenkraut</b>   | III. 399  |
|                       |           | <b>Citronenmünze</b>   | IV. 435   |

|                    | Tom.        | Pag. |                 | Tom.                   | Pag. |
|--------------------|-------------|------|-----------------|------------------------|------|
| Citronenquendel    | IV.         | 443  | Distel          |                        |      |
| Citronenthymian    | IV.         | 443  | Plumiersche     | IV.                    | 587  |
| Corallenwurz       | III.        | 557  | rauhe - Gänse   | III.                   | 287  |
| Coriander          | I.          | 692  | Sand            | III.                   | 384  |
| Cypergras          |             |      | Sau             | III.                   | 286  |
| gelbliches         | I.          | 90   | Sperr           | III.                   | 370  |
| grünes             | I.          | 92   | Sumpf           | III.                   | 369  |
| schwarzbraun       | I.          | 91   | überhängende    | III.                   | 359  |
| Darmbeerenbaum     | II.         | 370  | vieltachliche   | III.                   | 361  |
| Darrgras           |             |      | Walker          | I.                     | 313  |
| wolliges           | III.        | 778  | Wiesen          | III.                   | 382  |
| Deckrohr           | I.          | 261  | Wollen          | III.                   | 372  |
| Dickkraut          |             |      | Doldennelke     | I.                     | 305  |
| röthlichtes        | I.          | 766  | Doldensparre    | I.                     | 305  |
| Dickrüben          | I.          | 575  | Donnerkraut     | II.                    | 345  |
| Dill               | IV.         | 211  | netzblättriges  | II.                    | 275  |
| Dinkel             | I. 289. IV. | 102  | Dornapfel       | I.                     | 505  |
| Dintenbeerstrauch  | I.          | 12   | Dort            | I. 224. 270. 372. III. | 9    |
| Dintenkirschen     | II.         | 354  | Dosten          | II.                    | 642  |
| Diptam             | II.         | 297  | Dotter          |                        |      |
| Distel             |             |      | Bauhins         | III.                   | 8    |
| Acker - Gänse      | III.        | 285  | durchwachsener  | III.                   | 7    |
| Alpen - Gänse      | III.        | 288  | Felsen          | III.                   | 11   |
| Bergwiesen         | III.        | 363  | gemeiner - Lein | III.                   | 9    |
| Bisam              | III.        | 359  | rispenblüthiger | III.                   | 10   |
| Esels              | III.        | 383  | runzlicher      | III.                   | 5    |
| färbe              | III.        | 356  | weißblüthiger   | III.                   | 11   |
| Feld               | III.        | 357  | Dotterkraut     | III.                   | 9    |
| Frauen             | III.        | 383  | Dragun          | III.                   | 405  |
| gemeine - Karten   | I.          | 313  | Drehkraut       | I.                     | 616  |
| — Wald             | I.          | 313  | schweizersches  | I.                     | 618  |
| geschlitzblättrige | I.          | 315  | seitenblüthiges | IV.                    | 202  |
| glatte - Gänse     | III.        | 286  | Dryade          | IV.                    | 396  |
| grofse Sumpf       | III.        | 284  | Dungras         | I.                     | 110  |
| Klettenartige      | III.        | 364  | Düinkel         | I.                     | 282  |
| Kornblumenartige   | III.        | 367  | Durchbrech      | I.                     | 608  |
| krause             | III.        | 362  | Alpen           | I.                     | 609  |
| Krebs              | III.        | 383  | Durchwachs      | I.                     | 608  |
| Kugel              | III.        | 510  | Alpen           | I.                     | 609  |
| Marien             | III.        | 366  | Dürlebaum       | I.                     | 365  |
| niedere            | III.        | 379  | Dürlizen        | I.                     | 365  |
|                    |             |      | Dürrwurz        | III.                   | 422  |



|                   | Tom.      | Pag. |                       | Tom.        | Pag. |
|-------------------|-----------|------|-----------------------|-------------|------|
| Ebenholz          |           |      | Eiche                 |             |      |
| Alpen             | IV.       | 551  | klebeiche             | III.        | 697  |
| Eberesche         | II.       | 375  | Pyramiden             | III.        | 699  |
| Eberwurz          | III.      | 385  | Schlitzblättrige      | IV.         | 673  |
| Edelleberkraut    | II.       | 506  | Steineiche            | III.        | 697  |
| Egelkraut         | II.       | 533  | Stieleiche            | III.        | 698  |
| Ehmer             | IV.       | 105  | Wollblättrige         | IV.         | 673  |
| Ehrenpreis        |           |      | Einbeer               | II.         | 185  |
| Acker             | I.        | 37   | Einblatt              | I. 752. II. | 58   |
| Aehren            | I.        | 19   | Einkorn               | I.          | 290  |
| Alpen             | IV.       | 5    | Eisenhut              |             |      |
| Bastard           | IV.       | 3    | blauer                | II.         | 497  |
| Berg              | I.        | 32   | langhelmiger          | IV.         | 410  |
| blätterloser      | IV.       | 7    | Neubergischer         | IV.         | 408  |
| blauer - Stein    | I.        | 22   | gelber                | II.         | 406  |
| breitblättriger   | I.        | 34   | Eisenkraut            | I.          | 52   |
| dreyblättriger    | I.        | 41   | gelbes                | III.        | 73   |
| Epheublättriger   | I.        | 40   | Elatine               | II.         | 188  |
| Feld              | I.        | 38   | dreyfädige            | II.         | 189  |
| früher            | IV.       | 9    | Quirl                 | II.         | 180  |
| Frühlings         | I.        | 42   | sechsfädige           | IV.         | 272  |
| Gamander          | I.        | 28   | Eller                 | III.        | 677  |
| gemeiner          | I.        | 20   | Else                  | III.        | 677  |
| glatter - Feld    | I.        | 24   | Elsebeerbaum          | II.         | 370  |
| grofser           | I.        | 34   | Emmer                 | IV.         | 105  |
| hingestreckter    | I.        | 30   | Endivie               | III.        | 352  |
| langblättriger    | I.        | 18   | Engelsblümlein        | III.        | 410  |
| Maasliebenblättr. | IV.       | 7    | Engelwurz             | IV.         | 207  |
| Nesselblättriger  | I.        | 36   | Englisch Raygras      | I.          | 270  |
| orientalischer    | I.        | 39   | Englischer Steinbrech | I.          | 3    |
| quendelblättr.    | I.        | 24   | Entengrün             |             |      |
| schildförmiger    | I.        | 27   | grofses               | III.        | 598  |
| staudenartiger    | IV.       | 4    | Enzian                |             |      |
| Thymianblättr.    | I.        | 44   | baierischer           | IV.         | 192  |
| Tourneforts       | I.        | 39   | durchwachs. gelb.     | II.         | 145  |
| unächter          | I.        | 17   | Feld                  | IV.         | 194  |
| Wiesen            | I. 28. 33 |      | Frühlings             | I.          | 593  |
| Eibenbaum         | III.      | 771  | gefranzter            | I.          | 598  |
| Eibisch           | III.      | 131  | grofsblumiger         | I.          | 592  |
| haariger          | III.      | 132  | grofser gelber        | I.          | 585  |
| Stockrosen        | III.      | 134  | kleiner               | I.          | 569  |
|                   |           |      | Enzian                |             |      |

|                         | Tom. | Pag. |                       | Tom. | Pag. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| <b>Enzian</b>           |      |      | <b>Erdrauch</b>       |      |      |
| kleiner blauer          | I.   | 593  | kleinblüthiger        | III. | 147  |
| kreutz                  | I.   | 599  | knolliger             | III. | 145  |
| Lungen                  | I.   | 590  | mittlerer             | IV.  | 528  |
| punctirter              | IV.  | 190  | rankender             | IV.  | 529  |
| purpurrother            | I.   | 587  | Vaillantischer        | IV.  | 530  |
| schlauchartiger         | I.   | 594  | Erdtuffel             | I.   | 517  |
| Schwalbenwurzbl.        | I.   | 588  | Erdweich              | II.  | 234  |
| Sumpf                   | I.   | 584  | Erdweichsel           | II.  | 357  |
| weisser                 | I.   | 656  |                       |      |      |
| Wiesen, blauer          | I.   | 590  | <b>Erle</b>           |      |      |
| <b>Epheu</b>            | I.   | 542  | eyblättrige           | III. | 678  |
| Canadaisches            | IV.  | 180  | gemeine               | III. | 677  |
| <b>Eplern</b>           | III. | 791  | geringe               | III. | 678  |
| <b>Eppich</b>           | I.   | 542  | graue                 | III. | 680  |
| Wald                    | I.   | 637  | <b>Erven</b>          |      |      |
| <b>Erbseidorn</b>       | II.  | 91   | kleine                | IV.  | 548  |
| <b>Erbsele</b>          | II.  | 91   | <b>Esche</b>          | III. | 794  |
| <b>Erbsen</b>           |      |      | Blumentragende        | III. | 795  |
| gemeine                 | III. | 168  | Edelesche             | III. | 795  |
| <b>Erbsenstrauch</b>    | IV.  | 554  | <b>Escherwurz</b>     | II.  | 197  |
| <b>Erdäpfel</b> I. 517. | III. | 494  | <b>Eselskürbis</b>    | IV.  | 686  |
| <b>Erdbeere</b>         |      |      | <b>Eselskukummer</b>  | IV.  | 686  |
| Ananas                  | IV.  | 381  | <b>Eselsmilch</b>     | II.  | 335  |
| Garten                  | IV.  | 380  | <b>Esparsette</b>     | III. | 213  |
| gemeine                 | II.  | 440  | <b>Espe</b>           | III. | 763  |
| grolse                  | IV.  | 380  | schwarze              | III. | 761  |
| harte                   | IV.  | 379  | Zitterespe            | III. | 763  |
| Stein                   | IV.  | 379  | <b>Esper</b>          | III. | 213  |
| Wiesen                  | IV.  | 380  | <b>Eyerbretholz</b>   | I.   | 531  |
| <b>Erdbirn</b>          | I.   | 317  |                       |      |      |
| <b>Erdgalle</b>         | I.   | 522  | <b>Fadenkraut</b>     | III. | 415  |
| <b>Erdkastanien</b>     | I.   | 629  | <b>Falkkraut</b>      | III. | 466  |
| <b>Erdnufs</b>          | I.   | 629  | <b>Färbedistel</b>    | III. | 356  |
| <b>Erdnüsse</b>         | III. | 176  | <b>Färbedorn</b>      | I.   | 525  |
| <b>Erdpin</b>           | II.  | 575  | <b>Färberesede</b>    | II.  | 317  |
| <b>Erdrauch</b>         |      |      | <b>Färbereröthe</b>   | I.   | 355  |
| dichter                 | III. | 146  | <b>Färberscharten</b> | III. | 356  |
| gabelntragender         | III. | 148  | <b>Färberwaydt</b>    | III. | 13   |
| gelbblühender           | IV.  | 526  | <b>Faulbaum</b>       | I.   | 527  |
| gemeiner                | III. | 146  | Alpen                 | I.   | 528  |
| hohler                  | III. | 145  | niederiger            | I.   | 529  |

|                 | Tom. Pag.       |                  | Tom. Pag. |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| Federkraut      |                 | Fingerhuth       |           |
| ährenförmig.    | III. 692        | kl-inblumiger    | II. 707   |
| quirelförmig.   | III. 693        | mittlerer        | IV. 456   |
| Fedie           |                 | purpurrother     | II. 703   |
| gekielte        | IV. 26          | Fingerkraut      |           |
| ohrenrandige    | IV. 27          | aschgraues       | IV. 389   |
| wollharige      | IV. 26          | aufrechtes       | II. 446   |
| Feigbohne       |                 | Frühlings        | II. 449   |
| bunte           | IV. 539         | Fünffingerk.     | II. 452   |
| gelbe           | IV. 540         | graulichtes      | IV. 384   |
| weißse          | IV. 538         | Gold             | IV. 385   |
| Feigwarzenkraut | II. 536         | rothfingerkr.    | II. 463   |
| Feldmanstreu    | I. 601          | rothgelbes       | IV. 391   |
| Felsenbirne     | II. 391         | rothbraunes      | IV. 387   |
| Felsenkresse    | IV. 468         | silberweißes     | II. 447   |
| Felsensenf      | III. 35         | strauchartiges   | IV. 382   |
| Fenchel         | I. 719          | vieltieliges     | IV. 393   |
| Ferkelkraut     |                 | weißblumiges     | II. 451   |
| geflecktes      | III. 344        | Flachs           |           |
| glattes         | III. 345        | gemeiner         | I. 755    |
| wurzelndes      | III. 346        | österreichischer | I. 758    |
| Fette Henne     | II. 273         | Flachsgras       | I. 112    |
| — kriechend.    | II. 274         | Flachsseide      |           |
| Fettkraut       |                 | große            | I. 374    |
| Alpenf.         | IV. 10          | kleine           | I. 375    |
| gemeines        | I. 48           | Fladergras       | I. 141    |
| Feuerlilie      | II. 31          | Fleckenkraut     | IV. 558   |
| Feuerkraut      | II. 134         | Fleischblume     |           |
| Fichte          |                 | kamförmige       | II. 675   |
| gemeine         | III. 707        | Fleischkraut     | III. 20   |
| krummholz       | III. 708        | Flieder          | I. 740    |
| Weimouth        | IV. 679         | spanischer       | I. 13     |
| Zürbel          | IV. 678         | Flockenblume     |           |
| Fichtenspargel  | II. 200         | Benedicten       | III. 505  |
| Fieberklee      | I. 446          | bittere          | III. 504  |
| Fieberkraut     | I. 522. II. 659 | blaue Berg       | III. 498  |
| Filipendelwurz  | II. 399         | gelbe Sommer     | III. 507  |
| Fimmel          | III. 755        | gemeine          | III. 503  |
| Fingerhirse     | I. 131          | phrygische       | III. 496  |
| Eingerhuth      |                 | rispenförmige    | III. 500  |
| blaspurpurfarb. | IV. 455         | Scabiosen        | III. 502  |
| gelber          | II. 705         | schwarzkelchige  | III. 497  |
|                 |                 | Sternflockenbl.  | III. 505  |

|                                  | Tom. Pag. |                   | Tom. Pag. |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Flöhkraut II. 608. III. 422. 460 |           | Gamander          |           |
| Braunisches                      | IV. 268   | Trauben           | II. 5-6   |
| brennendes                       | II. 174   | wilder            | II. 5-8   |
| Erdflöhkr.                       | II. 169   | Gänseblümlein     | III. 472  |
| großes                           | II. 171   | Gänseblumen       |           |
| — oriental.                      | II. 177   | große             | III. 473  |
| kleines                          | II. 177   | Gänsedistel       |           |
| Wasserflöh                       | II. 169   | Alpen             | III. 288  |
| Flühbirn                         | II. 391   | Acker             | III. 285  |
| Fönugrec.                        | IV. 570   | glatte            | III. 286  |
| Fore                             | III. 707  | Plumierische      | IV. 587   |
| Französisch Raygras              | I. 250    | rauhe             | III. 287  |
| Frauenbettstroh                  | I. 342    | Sumpf             | III. 284  |
| Frauenkrieg                      | I. 433    | Gänsefuß          |           |
| Frauenkraut                      | II. 217   | eisengrauer       | I. 571    |
| Frauenmantel                     | I. 372    | feigenblättriger  | IV. 186   |
| Frauenmänteli                    | I. 372    | grüner            | I. 567    |
| Frauenmünze                      | IV. 604   | Mauer             | I. 566    |
| Frauenröschen                    | II. 287   | rother            | I. 565    |
| Frauenschuh                      | III. 575  | schmieriger       | I. 562    |
| Frauenspiegel                    | I. 480    | Stadt             | I. 564    |
| Fraxinelle                       | II. 197   | Stechapfelblättr. | I. 568    |
| Freysamkraut                     |           | stinkender        | I. 572    |
| Acker                            | III. 521  | unächter          | I. 568    |
| Garten                           | III. 522  | vielsamiger       | I. 573    |
| Froschbiß                        | III. 767  | Wasserholunderbl. | IV. 185   |
| Froschlöffel II. 127. III. 587   |           | weißser           | I. 566    |
| Fuchsschwanz                     |           | Gänsekraut        | III. 86   |
| Acker                            | I. 138    | Alpen             | III. 83   |
| knoten                           | I. 139    | klein             | III. 16   |
| kriechender                      | I. 139    | niederes          | IV. 507   |
| schlauchartiger                  | IV. 47    | rauhblättrig.     | IV. 506   |
| Wasser                           | I. 139    | thurmkrautartig.  | III. 85   |
| Wiesen                           | I. 137    | Gänserich         | II. 442   |
| Fuchstraube                      | II. 544   | Garbenkraut       | III. 487  |
|                                  |           | großblättr.       | IV. 623   |
| Galinsoga                        |           | schwarzkelchig.   | IV. 622   |
| kleinblumige                     | III. 490  | Gartenraute       | II. 199   |
| Gamander                         |           | Gartenscharlach   | IV. 18    |
| Berg                             | II. 582   | Gauchheil blauer  | I. 459    |
| — niederer                       | II. 584   | gelber            | I. 454    |
| Edel                             | II. 581   | Männlein          | I. 457    |



|                            | Tom. Pag. |                       | Tom. Pag. |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>Gauchheil</b>           |           | <b>Gerste</b>         |           |
| purpurrother               | I. 460    | Sommer                | I. 282    |
| rother                     | I. 457    | schwarze russische    | IV. 97    |
| Weiblein                   | I. 459    | taube                 | I. 283    |
| zarter                     | I. 460    | Waitzen               | I. 279    |
| <b>Gauchnelke</b>          | II. 289   | Winter                | I. 279    |
| <b>Geisbart</b>            |           | zweyzeilige           | I. 282    |
| Wald                       | II. 397   | <b>Gewürtzstrauch</b> | IV. 398   |
| <b>Geisblatt deutsches</b> | I. 490    | <b>Gichtrose</b>      | II. 492   |
| durchwachsenes             | I. 488    | <b>Gienst</b>         | III. 153  |
| immergrünes                | IV. 167   | <b>Gierch</b>         | I. 734    |
| italiänisches              | I. 488    | <b>Giftwende</b>      | I. 558    |
| <b>Geisfuß</b>             | I. 734    | <b>Giftwurz</b>       | I. 553    |
| <b>Geisklee</b>            | IV. 551   | <b>Gilbkraut</b>      | II. 317   |
| <b>Geisleck</b>            | I. 492    | <b>Gillblume</b>      | III. 484  |
| <b>Geisraute</b>           | IV. 558   | <b>Ginster</b>        |           |
| <b>Gelbharnkraut</b>       | II. 318   | deutscher             | III. 158  |
| <b>Gelbholz</b>            | IV. 214   | färbe                 | III. 156  |
| <b>Gelenkwurz</b>          | II. 55    | haariger              | III. 157  |
| vielblumige                | II. 57    | pfeilförmiger         | III. 155  |
| <b>Gemswurz</b>            |           | <b>Glanzgras</b>      |           |
| gemeine                    | III. 468  | Canarisches           | IV. 40    |
| Maasliebenartige           | III. 470  | feilenartiges         | I. 121    |
| Wegwartblättr.             | III. 469  | Lieschgrasartig       | I. 119    |
| <b>Gerhardskraut</b>       | I. 734    | Sand                  | IV. 42    |
| <b>Germer</b>              |           | schilfiges            | I. 122    |
| schwarzer                  | III. 775  | <b>Glaskraut</b>      | III. 784  |
| weißser                    | IV. 709   | jüdisches             | III. 785  |
| <b>Gerste</b>              |           | <b>Gleisse</b>        | I. 688    |
| blauliche                  | IV. 97    | <b>Gliedkraut</b>     | II. 630   |
| Bart                       | I. 282    | gezahntes             | II. 591   |
| Bastard                    | I. 283    | <b>Glockenblume</b>   |           |
| Futter                     | I. 282    | ausgebreitete         | I. 470    |
| gemeine                    | I. 279    | breitblättrige        | I. 474    |
| Hummel                     | I. 279    | Epheublättrige        | IV. 166   |
| — schwarze                 | IV. 97    | flachsblättrige       | I. 469    |
| kleine                     | I. 282    | gehäufte              | I. 478    |
| Mauer                      | I. 283    | großblühende          | IV. 164   |
| Mäuse                      | I. 283    | kleine Alpen          | I. 467    |
| nackte                     | I. 279    | Marienglöcklein       | IV. 164   |
| Rockenartige               | I. 285    | mittlere Hals         | I. 479    |
| sechszellige               | I. 281    | Nesselblättrige       | I. 476    |

|                           | Tom. Pag. |                       | Tom. Pag.       |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| <b>Glockenblume</b>       |           | <b>Grindwurz</b>      |                 |
| Pfirsichblättr.           | I. 473    | kleine                | I. 324          |
| pyramidenförmig.          | IV. 159   | Grosse Seebinse       | I. 100          |
| rapunzelartige            | I. 475    | Grüblingsbaum         | I. 517          |
| rauhhaarigbl.             | IV. 162   | Grundbirn             | I. 517          |
| rautenblättrige           | IV. 160   | Grundheil             | I. 457. 648     |
| rundblättrige             | I. 466    | Grundholz             | I. 527          |
| strausblüthige            | IV. 163   | Gukucksblume          | II. 289         |
| <b>Gnadenkraut</b>        | I. 45     | Gukuchsspeichel       | II. 289         |
| <b>Golden - Leinkraut</b> | III. 396  | Gundelreben           | II. 610         |
| <b>Goldhähnlein</b>       | II. 517   | Gundermann            | II. 610         |
| <b>Goldlack</b>           | III. 79   | <b>Günsel</b>         |                 |
| <b>Goldlilie</b>          | II. 31 32 | aufrechter            | II. 572         |
| <b>Goldmiltz</b>          | II. 214   | pyramidenf.           | II. 572         |
| Berg                      | II. 215   | sprossender           | II. 574         |
| <b>Goldnessel</b>         | II. 618   | Stein                 | II. 571         |
| <b>Goldröslein</b>        | II. 488   | Wiesen                | II. 574         |
| <b>Goldruthe</b>          | III. 449  | <b>Gurke</b>          | IV. 691         |
| <b>Goldschopf</b>         | III. 396  | <b>Guter Heinrich</b> | I. 562          |
| <b>Goldwundkraut</b>      | III. 449  | <b>Gypskraut</b>      |                 |
| <b>Gottesgnade</b>        | I. 45     | flachstrausiges       | IV. 299         |
| <b>Graswurz</b>           | I. 297    | kriechendes           | IV. 298         |
| <b>Gretchen im Busche</b> | II. 502   | Mauer                 | II. 230         |
| <b>Griechisch - Heu</b>   | IV. 570   | steinbrechart.        | II. 231         |
| <b>Grindkraut</b>         | I. 322    | <b>Haargras</b>       |                 |
| <b>Grindholz</b>          | I. 527    | europäisches          | I. 275          |
| <b>Grindwurz</b>          |           | Sand                  | IV. 96          |
| Alpen                     | II. 110   | Wald                  | I. 275          |
| Drachen                   | II. 96    | <b>Haarstrang</b>     | I. 650. II. 399 |
| gemeine                   | II. 102   | <b>Haberschlehen</b>  | II. 362         |
| gold.                     | II. 101   | <b>Haberwurz</b>      |                 |
| grosse                    | II. 100   | purpurfarbige         | IV. 580         |
| — Sumpf                   | II. 100   | <b>Habichskraut</b>   |                 |
| — Wasser                  | II. 106   | Abbisblättrig.        | III. 327        |
| kleine                    | II. 99    | abgebissenes          | III. 312        |
| krausblättr.              | II. 97    | Alpen                 | III. 306        |
| rothblättrige             | II. 96    | Blattariaförmig.      | III. 326        |
| schöne                    | II. 105   | Chondrilleblättr.     | III. 333        |
| spitzblättr.              | II. 102   | Cichorienartig.       | IV. 593         |
| stumpfbättr.              | II. 103   | Doldentragend.        | III. 332        |
| Sumpf                     | IV. 250   | gebogenes             | IV. 590         |
| Wald                      | IV. 253   |                       |                 |

|                      | Tom. | Pag.     |                       | Tom. | Pag.     |
|----------------------|------|----------|-----------------------|------|----------|
| <b>Habichtskraut</b> |      |          | <b>Haftdolde</b>      | l.   | 617      |
| goldgelbes           | III. | 305      | breitblättr.          | l.   | 625      |
| grasnelkenbl.        | III. | 314      | großblumige           | l.   | 620      |
| Hasenöhrenchenbl.    | III. | 317      | kleinblumige          | l.   | 624      |
| Krähenfußblättr.     | IV.  | 594      | Vogelnestartige       | l.   | 622      |
| Lachenalsches        | III. | 322      | Hagdorn               | II.  | 372      |
| Mauer                | III. | 321      | einweibiger           | II.  | 373      |
| Mertinsches          | IV.  | 591      | <b>Hahnenfuß</b>      |      |          |
| niederes             | III. | 319      | Acker                 | II.  | 551      |
| pomeranzenfarb.      | III. | 315      | Alpen                 | IV.  | 427      |
| Savojer              | III. | 331      | Berg                  | IV.  | 426      |
| schmalblättr.        | III. | 323      | Eisenhüttleinbl.      | II.  | 541      |
| scorzonerenblättr.   | III. | 316      | Gift                  | II.  | 539      |
| Stein                | III. | 318      | Goldgelber            | II.  | 538      |
| Stengelumfassend.    | III. | 328      | großer Berg           | II.  | 559      |
| Sumpf                | III. | 325      | großer gelber         | III. | 535      |
| vielblumiges         | III. | 311      | kleinblüthiger        | II.  | 552      |
| zottiges             | III. | 330      | kleiner Sumpf         | II.  | 533      |
| zweyspaltiges        | IV.  | 590      | — Wasser              | II.  | 553      |
| <b>Hafer</b>         |      |          | knolliger             | II.  | 545      |
| behaarter            | I.   | 256      | kriechender           | II.  | 546      |
| bunter               | IV.  | 83       | — Sumpf               | II.  | 534      |
| Chinesischer         | IV.  | 82       | Platanusblättr.       | II.  | 542      |
| dünnere              | IV.  | 86       | rauchhaariger         | II.  | 544      |
| Flughafer            | I.   | 255      | Rautenblättr.         | IV.  | 428      |
| Gauchhafer           | I.   | 255      | Rüben                 | II.  | 545      |
| gemeiner             | I.   | 253      | scharfer Wiesen       | II.  | 548      |
| gestreifter          | I.   | 251      | Thora                 | IV.  | 425      |
| Goldhafer            | I.   | 258      | verschiedenblättr.    | II.  | 555      |
| Hungarischer         | I.   | 252      | vielblumiger          | II.  | 547      |
| Mäuse                | I.   | 255      | Wasser                | II.  | 539, 556 |
| nackter              | I.   | 254      | weißer Wasser         | II.  | 558      |
| schwarzer            | I.   | 253      | — Wald                | II.  | 515      |
| Spinnen              | I.   | 254      | wollichter Wald       | II.  | 549      |
| Taub                 | I.   | 255      | <b>Hahnenhüttlein</b> | I.   | 531      |
| türkischer           | I.   | 252      | <b>Hahnenkamm</b>     |      |          |
| weißer               | I.   | 253      | Acker                 | II.  | 668      |
| Wiesen               | I.   | 250, 259 | gemeiner              | II.  | 667      |
| Wild                 | I.   | 255      | schmalblättr.         | II.  | 669      |
| Wind                 | I.   | 255      | Wiesen                | II.  | 667      |
| <b>Hafermark</b>     | III. | 269      | <b>Hahnenkopf</b>     |      |          |
|                      |      |          | Kronen                | IV.  | 556      |

|                    | Tom. | Pag. |                    | Tom. | Pag. |
|--------------------|------|------|--------------------|------|------|
| Halskraut          | I.   | 476. | Hauswurz           |      |      |
| Halskräutlein      | I.   | 332  | Berg               | IV.  | 329  |
| Halsrose           | III. | 134  | gemeine            | II.  | 345  |
| Händelkraut        | II.  | 223  | grofse             | II.  | 345  |
| Händleinkraut      |      |      | kleine             | II.  | 346  |
| breitblättriches   | III. | 544  | kugeltragende      | II.  | 346  |
| geflecktes         | III. | 545  | rauhhaarige        | IV.  | 329  |
| gelbes             | III. | 547  | Hebelie            |      |      |
| geruchvolles       | III. | 545  | allemannische      | II.  | 118  |
| Hollanderduftend.  | III. | 518  | Hügel              | II.  | 117  |
| Stechfliegenartig. | III. | 547  | Heckenbeere        | I.   | 541  |
| Hanf               | III. | 755  | Heckenbuchwinde    | II.  | 183  |
| Hanfkraut          |      |      | Heckenkirsche      | I.   | 492  |
| Wasserhanf         | III. | 388. | Heckenkörfel       | I.   | 616  |
| Hanftod            | II.  | 716  | Hecksame           |      |      |
| Hanfwürger         | II.  | 716  | europäisch.        | III. | 160  |
| Haarstrang         | I.   | 650. | Hederich           | III. | 104  |
| Hartheu            |      |      | Habichtskrautart.  | III. | 77   |
| englisches         | IV.  | 573  |                    | IV.  | 499  |
| sprossendes        | IV.  | 574  | Levcojenartiger    | III. | 76   |
| Hartriegel         |      |      | wohlriechender     | IV.  | 497  |
| gemeiner           | I.   | 12   | Heide              |      |      |
| rother             | I.   | 366  | gemeine            | II.  | 154  |
| Haselnufsbaum      | III. | 705  | Kraut              | II.  | 154  |
| Staude             | III. | 705  | Heidel             | II.  | 181  |
| Haselwurz          | II.  | 309  | Heidelbeere        | II.  | 147  |
| Hasenbrod          | I.   | 200. | blaue              | II.  | 147  |
| Hasenbrödlein      | II.  | 89   | gemeine            | II.  | 147  |
| Hasenöhrlein       |      |      | grofse Sumpf       | II.  | 148  |
| eckiges            | IV.  | 193  | Moosbeere          | II.  | 152  |
| feinstes           | I.   | 612  | rothe              | II.  | 150  |
| Pollichs           | I.   | 613  | Heidelwinde        | II.  | 182  |
| Ranunkelförm.      | IV.  | 199  | Heidenkorn         | II.  | 181  |
| Sichelförm.        | I.   | 611  | Heidnischwundkraut | II.  | 273  |
| Sternförmig.       | IV.  | 196  |                    | III. | 449  |
| Hauhechel          |      |      | Heil aller Schäden | I.   | 599. |
| Bocks              | III. | 164  |                    | 605  |      |
| Columnische        | IV.  | 542  | Heilwurz           | II.  | 455. |
| größte             | III. | 164  |                    | III. | 131  |
| kleine             | IV.  | 542  | Helmkraut          | II.  | 659  |
| stachellose        | III. | 163  | kleines            | II.  | 660  |
| stachlichte        | III. | 161  | spiesblättr.       | IV.  | 446  |
|                    |      |      | Henne, fette       | II.  | 273  |
|                    |      |      | — kriech.          | II.  | 274  |



|                   | Tom. | Pag.    |               | Tom. | Pag. |
|-------------------|------|---------|---------------|------|------|
| Henne, fette      |      |         | Hirtentasche  | III. | 31   |
| — scharfe         | II.  | 279     | Hohlbeere     | II.  | 433  |
| — weisse          | II.  | 277     | Holder        | I.   | 740  |
| Herbstblume       | II.  | 123     | Hollunder     |      |      |
| Herbstpflaume     | II.  | 362     | Acker         | I.   | 739  |
| Herbstlingstraube | II.  | 544     | Baum          | I.   | 740  |
| Herzgespann       | II.  | 639     | Berg          | I.   | 742  |
| Herzkraut         | II.  | 575     | Hirsch        | I.   | 742  |
| Hexenkraut        | I.   | 15. 507 | krautartig.   | I.   | 739  |
| Alpen             | I.   | 16      | spanischer    | I.   | 13   |
| mittleres         | IV.  | 2       | Trauben       | I.   | 742  |
| Hexenstrang       | II.  | 518     | Holzäpfelbaum | II.  | 388  |
| Hibiscus          |      |         | Holzbirnbaum  | II.  | 385  |
| Syrischer         | IV.  | 520     | Honigblume    | II.  | 656  |
| Himbeerstaude     | II.  | 433     | Honiggras     | III. | 778  |
| Stachellose       | II.  | 433     | geruchvolles  | III. | 780  |
| Stein             | II.  | 438     | weiches       | III. | 779  |
| wohlriechende     | IV.  | 378     | Hopfen        | III. | 757  |
| Himmelsleiter     | I.   | 465     | Hornbaum      | III. | 704  |
| Himmelsstengel    | I.   | 598     | Hornkraut     |      |      |
| Hinschkraut       | I.   | 516     | Acker         | II.  | 298  |
| Hirschdorn        | I.   | 525     | Alpen         | IV.  | 323  |
| Hirschheilwurz    | I.   | 643     | aufrechtes    | II.  | 296  |
| Hirschkohl        | I.   | 423     | gemeines      | II.  | 294  |
| Hirschwurz        | I.   | 646     | großblumig.   | II.  | 298  |
| Cretische         | I.   | 645     | klebrichtes   | II.  | 296  |
| Libanotische      | I.   | 643     | kleinblumig.  | IV.  | 322  |
| rauhblättr.       | I.   | 657     | steifes       | IV.  | 324  |
| weisse            | I.   | 656     | Wasser        | II.  | 299  |
| Hirse             |      |         | Hottonie      |      |      |
| Acker             | I.   | 132     | Sumpf         | I.   | 450  |
| Blut              | I.   | 130     | Hufblattig    | III. | 427  |
| Finger            | I.   | 131     | Alpen         | III. | 426  |
| — feinhaarig.     | IV.  | 45      | — zweyfärbig. | III. | 427  |
| Kolben Egypt.     | IV.  | 42      | Bastard       | III. | 432  |
| — italien.        | IV.  | 42      | großblättr.   | III. | 431  |
| — deutsche        | IV.  | 42      | weisser       | III. | 430  |
| — kleine          | IV.  | 42      | weissfilzig.  | III. | 429  |
| Wald              | I.   | 141     | Hufeisenhülse | III. | 211  |
| wilde             | I.   | 130     | Hühnerdarm    | I.   | 750  |
| Hirsegras, graues | I.   | 125     | blauer        | I.   | 459  |
| grünes            | I.   | 127     |               |      |      |
| Hahnenfußartig.   | I.   | 129     |               |      |      |

Hühner-

|                         | Tom. | Pag. |                            | Tom. | Pag. |
|-------------------------|------|------|----------------------------|------|------|
| <b>Hühnerdarm</b>       |      |      | <b>Ie länger je lieber</b> | I.   | 33   |
| gelber                  | I.   | 454  | <b>Igelkolbe</b>           | I.   | 505  |
| rother                  | I.   | 457  | ästige                     | III. | 606  |
| <b>Hühnertod</b>        | I.   | 507  | einfache aufrechte         | III. | 605  |
| <b>Hülst</b>            | I.   | 376  | schwimmende                | III. | 606  |
| <b>Hundsbeerstrauch</b> | I.   | 366  | <b>Ilme</b>                | I.   | 579  |
| <b>Hundsbaum</b>        | I.   | 527  | <b>Immer</b>               | IV.  | 105  |
| <b>Hundsgras</b>        | I.   | 297  | <b>Immergrün</b>           | I.   | 555  |
| rauhes                  | I.   | 299  | großes                     | IV.  | 184  |
| <b>Hundsläufte</b>      | III. | 251  | <b>Immerschön</b>          | III. | 407  |
| <b>Hundewaizengras</b>  | I.   | 299  | <b>Indig</b>               |      |      |
| <b>Hundszunge</b>       | I.   | 420  | Bastard                    | IV.  | 536  |
| Frühlings               | IV.  | 141  | deutscher                  | III. | 13   |
| Vergiftmeinnicht.       | IV.  | 142  | <b>Inngrün</b>             | I.   | 555  |
| Wald                    | I.   | 421  | <b>Iohannisbeere</b>       | I.   | 534  |
| <b>Hungerblümchen</b>   | III. | 16   | <b>Iohanniskraut</b>       |      |      |
| filziges                | IV.  | 465  | aufrechtes kleines         | III. | 259  |
| <b>Felsen</b>           | III. | 15   | Berg                       | III. | 257  |
| gelbbühend.             | III. | 15   | gemeines                   | III. | 255  |
| <b>Mauer</b>            | III. | 17   | kleines hingestr.          | III. | 256  |
| Sternartiges            | IV.  | 466  | Leersiches                 | III. | 254  |
| <b>Hyacinth</b>         |      |      | rundblättrig.              | IV.  | 576  |
| Frühlings               | IV.  | 231  | Sumpf                      | IV.  | 575  |
| kleine Heken            | II.  | 44   | viereckiges                | III. | 253  |
| Korn                    | II.  | 60   | zottiges                   | III. | 258  |
| steifblättr.            | IV.  | 227  | <b>Iohannistrauben</b>     | I.   | 534  |
| Trauben II. 62.         | IV.  | 227  | Alpen                      | I.   | 535  |
| Wald                    | II.  | 44   | Drüsentragende             | IV.  | 178  |
| <b>Hyssop</b>           | II.  | 587  | pennsylvanische            | IV.  | 178  |
|                         |      |      | rothe                      | I.   | 534  |
| <b>Jacobskraut</b>      | III. | 438  | schwarze                   | I.   | 537  |
| Wasser                  | III. | 439  | <b>Isenkraut</b>           | I.   | 52   |
| <b>Jasione</b>          | III. | 511  | <b>Isnardie</b>            |      |      |
| ausdaurende             | IV.  | 627  | Sumpf                      | I.   | 369  |
| Acker                   | III. | 511  | <b>Ittnera</b>             |      |      |
| Berg                    | III. | 511  | große                      | III. | 590  |
| <b>Jasmin wilder</b>    | II.  | 349  | kleine                     | III. | 592  |
| <b>Iberkraut</b>        |      |      | <b>Judenkirschen</b>       | I.   | 514  |
| bitteres                | III. | 32   | <b>lungfernkron</b>        | I.   | 555  |
| doldenartig.            | IV.  | 474  |                            |      |      |
| rundblättr.             | IV.  | 473  | <b>Kaisersalat</b>         | III. | 405  |
| Sand                    | III. | 33   | <b>Kaiserwurz</b>          | I.   | 708  |

|                   | Tom. | Pag.     |                      | Tom. | Pag. |
|-------------------|------|----------|----------------------|------|------|
| Kälberkropf       |      |          | Kleber               | I.   | 353  |
| Bergwiesen        | I.   | 704      | blauer               | IV.  | 147  |
| haariger          | I.   | 704      | Klebkraut            | I.   | 353  |
| knolliger         | I.   | 700      | Klebnelke            | II.  | 291  |
| Rüben             | I.   | 700      | Klee                 |      |      |
| Sumpf             | I.   | 704      | Ackerhöpfen          | III. | 239  |
| Wiesen            | I.   | 699      | Alpen                | IV.  | 566  |
| wilder            | I.   | 699      | aufrecht. roth. Berg | III. | 224  |
| Kälbersaamen      |      |          | Bastard              | III. | 221  |
| goldgelber        | I.   | 706      | Bieber               | I.   | 446  |
| Kammgras          |      |          | Bitter               | I.   | 446  |
| hartes            | I.   | 198      | blafs gelber         | III. | 229  |
| steifes           | I.   | 204      | einblumiger Hüls.    | III. | 243  |
| Kappes            | III. | 96       | — Wiesen             | III. | 243  |
| Kartendistel      | I.   | 517      | Erdbeeren            | III. | 233  |
| geschlitztblättr. | I.   | 315      | ewiger               | III. | 213  |
| haarige           | I.   | 316      | Fieber               | I.   | 446  |
| Kartoffeln        | I.   | 517      | gebogener rother     | III. | 226  |
| Kastanienbaum     | III. | 702      | gehörnter Schot.     | III. | 244  |
| Ross              | II.  | 129      | — Sumpf              | III. | 246  |
| — fleischfarb.    | IV.  | 260      | gelber Hopfen        | III. | 249  |
| Katzenpfötchen    | III. | 410      | — Schnecken          | III. | 249  |
| Katzenwurzel      | I.   | 66       | — Sichel             | III. | 248  |
| Kelchblume        |      |          | gelbbrauner Hopf.    | III. | 236  |
| Carolinische      | IV.  | 398      | gemeiner Futter      | III. | 227  |
| Kellerhals        | II.  | 156. 158 | — Wiesen             | III. | 227  |
| Kerbel            |      |          | gestreifter          | III. | 232  |
| Anis              | I.   | 694      | grofser gelb. Hopf.  | III. | 228  |
| Garten            | I.   | 697      | — rother             | III. | 223  |
| Nadel             | I.   | 695      | Hasen                | III. | 230  |
| spanischer        | I.   | 694      | hoher Stein          | III. | 220  |
| wälscher          | I.   | 691      | Honig                | III. | 222  |
| wohlriechend.     | I.   | 694      | kleiner Hopfen       | III. | 241  |
| Kernen            | I.   | 389      | kleinster Schneck.   | III. | 251  |
| Kichern           | IV.  | 550      | kriechender          | III. | 222  |
| Kienrost          | II.  | 202      | — Wiesen             | III. | 222  |
| Kinderpalme       | I.   | 555      | Lucerner             | III. | 247  |
| Kirschbaum        | II.  | 360      | mittlerer Hopfen     | III. | 240  |
| Kiwitsfett        | I.   | 48       | rauher               | III. | 231  |
| Klapprose         |      |          | Schild               | IV.  | 556  |
| kleine            | II.  | 475      | Schotten             | III. | 244  |
| Klebgas           | I.   | 124      | Sichel               | III. | 248  |

|                      | Tom.    | Pag. |                         | Tom.     | Pag. |
|----------------------|---------|------|-------------------------|----------|------|
| <b>Klee</b>          |         |      | <b>Knoblauch</b>        |          |      |
| <b>Stein</b>         | III.    | 218  | gemeiner                | II.      | 15   |
| — blauer             | IV.     | 565  | Lachen                  | II. 17.  | 579  |
| — gezahnter          | IV.     | 564  | rundlichter             | II.      | 13   |
| — Petitpierr.        | IV.     | 564  | Schlangen               | II.      | 14   |
| Süß spanischer       | IV.     | 556  | Wald                    | II.      | 27   |
| <b>Sumpf</b>         | I.      | 446  | Wasser                  | II.      | 579  |
| — gehörnter          | III.    | 246  | <b>Knoblauchskraut</b>  | III.     | 75   |
| Türkischer           | III.    | 213  | <b>Knopfgras</b>        |          |      |
| weißes aufr. Berg    | III.    | 235  | braunes                 | I.       | 86   |
| Wiesen               | III.    | 227  | schwärzliches           | I.       | 85   |
| <b>Kleister</b>      | III.    | 751  | Sumpf                   | IV.      | 32   |
| <b>Klette</b>        |         |      | weißes                  | I.       | 87   |
| dornige Spitz        | III.    | 687  | zusammengedrückt.       | I.       | 88   |
| große gemeine        | III.    | 354  | <b>Knorpelblume</b>     | IV.      | 182  |
| kleine               | III.    | 355  | <b>Knorpelkraut</b>     | I.       | 75   |
| Kropf                | III.    | 686  | <b>Knotenkraut</b>      |          |      |
| Spinnen              | III.    | 353  | aufrechtes              | II.      | 180  |
| Spitz                | III.    | 686  | <b>Korallenwurz</b>     | III.     | 50   |
| <b>Klettenkörfel</b> | I. 616. | 619  | <b>Königskerze</b>      | I.       | 496  |
| <b>Klosterbeere</b>  | I.      | 540  | <b>Körbel</b>           |          |      |
| <b>Knabenkraut</b>   |         |      | gefleckter              | I.       | 702  |
| affenartiges         | III.    | 557  | Wiesen                  | I.       | 699  |
| braunes              | III.    | 541  | wilder                  | I.       | 699  |
| hentes               | III.    | 538  | Taumel                  | I.       | 702  |
| graues               | III.    | 537  | <b>Kohl, Alpen</b>      | III.     | 92   |
| großes               | III.    | 540  | blau                    | III.     | 96   |
| kleines              | III.    | 536  | Blumen                  | III.     | 96   |
| Mährisches           | III.    | 541  | brauner                 | III.     | 96   |
| männliches           | III.    | 534  | Feld                    | III. 93. | 96   |
| pyramidalisch        | III.    | 530  | orientalischer          | III.     | 91   |
| Sumpf                | III.    | 542  | Rauken                  | III.     | 98   |
| Tabernämontans.      | III.    | 536  | rother                  | III.     | 96   |
| Wanzen               | III.    | 532  | Kohlsat                 | IV.      | 509  |
| weibliches           | III.    | 533  | Kolsat                  | IV.      | 509  |
| zweyblättr.          | III.    | 529  | Kolza                   | IV.      | 509  |
| <b>Knauel</b>        |         |      | <b>Kohlkraut</b>        | III.     | 96   |
| ausdaurender         | II.     | 229  | <b>Korkulme</b>         | I.       | 581  |
| jähriger             | II.     | 228  | <b>Kornblume, blaue</b> | III.     | 499  |
| <b>Knöterich</b>     | II.     | 229  | <b>Kornnelke</b>        | II.      | 286  |
| <b>Knoblauch</b>     | II.     | 15   | <b>Kornelbaum</b>       | I.       | 365  |
| Bären                | II.     | 27   | wilder                  | I.       | 366  |



|                    | Tom. | Pag. |               | Tom. | Pag. |
|--------------------|------|------|---------------|------|------|
| Kornrose           |      |      | Kresse        |      |      |
| rothe              | II.  | 477  | stink         | III. | 23   |
| Kornwuth           |      |      | Sumpf         | III. | 62   |
| Acker              | II.  | 622  | Wald          | III. | 61   |
| haarige            | II.  | 621  | zahme         | III. | 19   |
| schmalblättr.      | II.  | 619  | Kreutzbeerorn | I.   | 525  |
| Wald               | II.  | 622  | Kreutzblume   |      |      |
| weisse             | II.  | 621  | bittere       | III. | 151  |
| Kragenblume        |      |      | gemeine       | III. | 150  |
| überhängende       | III. | 420  | Kreutzdorn    | I.   | 525  |
| Krähenfuß          |      |      | Kreutzenzian  | I.   | 599  |
| englischer         | III. | 43   | Kreutzkraut   |      |      |
| Ruellischer        | III. | 45   | dünnblättr.   | III. | 437  |
| Krapp              | I.   | 355  | Fuchsisches   | III. | 444  |
| Kratzkraut         |      |      | gelbes        | III. | 782  |
| Bach               | III. | 376  | gemeines      | III. | 433  |
| englisches         | III. | 373  | Hain          | III. | 442  |
| großköpfig.        | III. | 372  | Heidnisch     | III. | 443  |
| klebriges          | IV.  | 599  | klebriges     | III. | 435  |
| knollentragend.    | III. | 378  | raukenblättr. | III. | 436  |
| Kohl               | III. | 382  | Sumpf         | III. | 440  |
| Lachenalisches     | III. | 380  | Wald          | III. | 436  |
| Lanzen             | III. | 370  | Wasser        | III. | 439  |
| Stengelloses       | III. | 379  | Kreutzwurz    | I.   | 599  |
| Sumpf              | III. | 369  | Kronwiken     |      |      |
| verschiedenblättr. | III. | 375  | bunte         | III. | 208  |
| violdorniges       | IV.  | 600  | Kropfklette   | III. | 686  |
| Krebsdistel        | III. | 383  | Kropfwurz     | II.  | 698  |
| Krebskraut         | I.   | 408  | Krummholz     | III. | 708  |
| Krebswurz          | II.  | 166  | Küchenschelle | II.  | 509  |
| Kresse             |      |      | Frühlings     | II.  | 508  |
| Alpen              | IV.  | 470  | große         | II.  | 509  |
| —  Stein           | IV.  | 470  | schwarze      | IV.  | 411  |
| Brunnen            | III. | 59   | Kugelblume    |      |      |
| Felsen             | IV.  | 469  | blaue         | I.   | 309  |
| flüchtigblühend.   | III. | 53   | gelbe         | II.  | 559  |
| Garten             | III. | 19   | herzblättrige | I.   | 311  |
| Indianische        | IV.  | 262  | nacktstielige | IV.  | 110  |
| kleine Stein       | IV.  | 469  | Kugeldistel   | III. | 510  |
| schmalblättrige    | III. | 21   | Kühdutten     | II.  | 123  |
| Schaum             | III. | 53   | Kühkraut      | II.  | 234  |
| Spring             | III. | 53   |               |      |      |

|                        | Tom. Pag.   |                        | Tom. Pag.   |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| <b>Kuhweizen</b>       |             | <b>Labkraut</b>        |             |
| Acker                  | II. 677     | Wald                   | I. 344      |
| blauer                 | II. 678     | weißes                 | I. 345      |
| gelber                 | II. 679     | <b>Lachenknoblauch</b> | II. 27. 579 |
| — Alpen                | II. 680     | <b>Laienapfelchen</b>  | II. 383     |
| kammförmiger           | II. 675     | <b>Lämmerkraut</b>     | III. 348    |
| purpurrother           | II. 677     | <b>Lämmersalat</b>     | I. 73       |
| Wald                   | II. 679     | <b>Landrohr</b>        | I. 264      |
| Wiesen                 | II. 679     | mittleres              | I. 266      |
| <b>Kümmel</b>          | I. 721      | <b>Laserkraut</b>      |             |
| Mohren                 | I. 645      | Laser                  | IV. 206     |
| schwarz                | II. 503     | großes                 | I. 656      |
| Wiesen                 | I. 721      | preussisches           | IV. 205     |
| wilder Schwarz         | II. 504     | <b>Lattig</b>          |             |
| <b>Kümmelsilge</b>     | I. 638      | Augustaner             | III. 292    |
| <b>Kunigundenkraut</b> | III. 394    | betäubender            | III. 291    |
| <b>Kürbis</b>          |             | blauer                 | III. 294    |
| Acker                  | IV. 689     | Garten                 | III. 290    |
| Eyer                   | IV. 690     | Weidenblättr.          | III. 293    |
| Feld                   | IV. 689     | wilder                 | III. 290    |
| Flaschen               | IV. 688     | <b>Lauch</b>           |             |
| Pomeranzen             | IV. 690     | Asch                   | II. 12      |
| Turban                 | IV. 690     | Bären                  | II. 27      |
| Warzen                 | IV. 690     | Berg                   | II. 19      |
| Weinbergs              | IV. 689     | breitblättr.           | II. 10      |
| <b>Kützenbaum</b>      | II. 390     | eckiger                | II. 25      |
| <b>Labestock</b>       | I. 663      | Feld                   | II. 16      |
| <b>Labkraut</b>        |             | Gemüß                  | II. 24      |
| Bocconisches           | I. 340      | großblättr.            | II. 12      |
| englisches             | IV. 116     | grüner                 | II. 24      |
| glockenförmig.         | I. 346      | Hunds                  | II. 22      |
| Harzisches             | I. 338      | kugelförmiger          | II. 13      |
| Hyssopblättr.          | IV. 113     | rundköpfig.            | II. 20      |
| nordisches             | I. 349      | Sand                   | II. 17      |
| Rötheartiges           | I. 333      | Schlangen              | II. 14. 16  |
| rothes                 | I. 348      | Schnitt                | II. 29      |
| rundblättrig.          | I. 351      | Sommer                 | II. 10      |
| Schlamm                | I. 335      | Wald                   | II. 19      |
| Sumpf                  | I. 334. 335 | Weinbergs              | II. 22      |
| unächtes               | I. 337      | Wiesen                 | II. 25      |
| wahres                 | I. 342      | Winter                 | II. 12      |

|                  | Tom. | Pag. |                 | Tom. | Pag.   |
|------------------|------|------|-----------------|------|--------|
| Läusekraut       | II.  | 564  | Leine           | III. | 790    |
| blättrvolles     | IV.  | 450  | Leinkraut       |      |        |
| Feuerfarben      | IV.  | 451  | Acker           | II.  | 692    |
| gelbes           | II.  | 667  | blaues          | II.  | 692    |
| — Acker          | II.  | 668  | gelbes          | II.  | 694    |
| Sumpf            | II.  | 685  | Ginsterblättr.  | IV.  | 453    |
| vierblättrig.    | IV.  | 451  | Gold            | III. | 396    |
| Wald             | II.  | 686  | großes          | II.  | 694    |
| Lavater          |      |      | Lenne           | III. | 790    |
| Baumartige       | IV.  | 522  | Lerche          | III. | 708    |
| Garten           | IV.  | 523  | Levcoje         |      |        |
| Lavendel         | II.  | 590  | Sommer          | IV.  | 504    |
| Lebensbaum       |      |      | Winter          | IV.  | 503    |
| abendländischer  | IV.  | 681  | — glatte        | IV.  | 503    |
| morgenländischer | IV.  | 682  | Liebstöckel     | I.   | 663    |
| Leberbalsam      | II.  | 710  | Liene           | II.  | 518    |
| Leberblume       |      |      | Lieschgras      |      |        |
| weiße            | I.   | 752  | Acker           | I.   | 135    |
| Leberblümlein    | II.  | 506  | Alpen           | IV.  | 46     |
| Leberklette      | II.  | 315  | knotiges        | I.   | 135    |
| Lederblume       | I.   | 752  | Wiesen          | I.   | 134    |
| Leienbirn        | II.  | 391  | Lieschkolben    |      |        |
| Lein             |      |      | große           | III. | 601    |
| dünnblättr.      | I.   | 757  | Lilie           |      |        |
| gemeiner         | I.   | 755  | blaue Berg      | I.   | 79     |
| kleinster        | I.   | 760  | Feuer           | II.  | 31     |
| österreichischer | I.   | 758  | gelbe Wasser    | I.   | 80     |
| Purgier          | I.   | 759  | Gold            | II.  | 31. 32 |
| Leinblatt        |      |      | Gras            | II.  | 46     |
| Alpen            | I.   | 551  | Martagons       | II.  | 34     |
| Berg             | I.   | 553  | weiße           | IV.  | 223    |
| gelblichtblättr. | I.   | 549  | Lilienzaunblume |      |        |
| niederliegend.   | I.   | 549  | ästige          | II.  | 46     |
| rispenartiges    | I.   | 553  | große           | II.  | 48     |
| Wiesen           | I.   | 549  | Lilienartige    | IV.  | 233    |
| Leindotter       |      |      | späthe          | IV.  | 232    |
| Bauhins          | III. | 8    | Limoselle       | II.  | 712    |
| durchwachsener   | III. | 7    | Linde           |      |        |
| Felsen           | III. | 11   | americanische   | II.  | 486    |
| gemeiner         | III. | 9    | Brand           | II.  | 485    |
| rispenblüthig.   | III. | 10   | Carolinische    | II.  | 486    |
| runzlicher       | III. | 5    | feinhaarige     | II.  | 486    |

|                          | Tom. | Pag. |                       | Tom. | Pag. |
|--------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| <b>Linde</b>             |      |      | <b>Lungenkraut</b>    | I.   | 423  |
| früh                     | II.  | 484  | geflecktes            | I.   | 423  |
| großblättr.              | II.  | 484  | schmalblättr.         | I.   | 424  |
| Holländische             | II.  | 484  | ungeflecktes          | I.   | 423  |
| kleinblättr.             | II.  | 485  | <b>Lupinen</b>        |      |      |
| Silber                   | II.  | 487  | bunte                 | IV.  | 539  |
| Sommer                   | II.  | 484  | gelbe                 | IV.  | 540  |
| Stein                    | II.  | 485  | weißse                | IV.  | 538  |
| Virginische              | II.  | 486  | <b>Lysimachie</b>     |      |      |
| Wasser                   | II.  | 484  | gemeine               | I.   | 452  |
| Winter                   | II.  | 485  | straufsartige         | I.   | 453  |
| <b>Lindernie</b>         | II.  | 709  | Wald                  | I.   | 454  |
| <b>Linnäa</b>            | IV.  | 432  | <b>Magenwurz</b>      | II.  | 64   |
| <b>Linse</b>             | III. | 198  | <b>Magsamen</b>       |      |      |
| <b>Löffelkraut</b>       | III. | 40   | schwarzer             | II.  | 478  |
| stielumfassend.          | IV.  | 478  | weißser               | II.  | 479  |
| <b>Lönne</b>             | III. | 790  | <b>Magistranz</b>     | I.   | 708  |
| <b>Lolch</b>             |      |      | <b>Mahalebkirsche</b> | II.  | 354  |
| Acker                    | IV.  | 95   | <b>Makümmich</b>      | I.   | 721  |
| Hallerischer             | I.   | 271  | <b>Malve</b>          |      |      |
| s höher                  | IV.  | 95   | krausblättrige        | III. | 137  |
| Sommer                   | I.   | 272  | mauritanische         | III. | 137  |
| kleiner                  | IV.  | 95   | Wald                  | III. | 136  |
| Winter                   | I.   | 270  | <b>Mandelbaum</b>     | II.  | 367  |
| <b>Lorbeer - Daphne</b>  | II.  | 158  | <b>Mangold</b>        | I.   | 575  |
| <b>Lorenzenkraut St.</b> | I.   | 558  | grüner                | I.   | 575  |
| <b>Loiwurz</b>           |      |      | weißser               | I.   | 575  |
| natterkopffartige        | IV.  | 146  | <b>Mangoldrübe</b>    | I.   | 575  |
| <b>Löwenfuß</b>          | I.   | 372  | blafsgrüne            | I.   | 575  |
| <b>Löwenmaul</b>         |      |      | gelbe                 | I.   | 575  |
| Alpen                    | IV.  | 453  | rothe                 | I.   | 575  |
| bastard                  | II.  | 691  | <b>Mannagras</b>      | I.   | 222  |
| Ginsterblättr.           | IV.  | 453  | <b>Mannsharnisch</b>  |      |      |
| kleines                  | II.  | 692  | großer                | I.   | 435  |
| großes                   | II.  | 696  | Hallerischer          | IV.  | 152  |
| niederliegend.           | II.  | 689  | Lachenalischer        | I.   | 437  |
| <b>Löwenzahn</b>         | III. | 302  | milchweißser          | I.   | 436  |
| Salz                     | III. | 303  | mitternächtlich.      | IV.  | 149  |
| <b>Lucerne</b>           | III. | 247  | rauhhaariger          | IV.  | 150  |
| <b>Lucienholz St.</b>    | II.  | 354  | verlängerter          | IV.  | 148  |
| <b>Lulch</b>             | I.   | 272  | <b>Mannstreu</b>      | I.   | 601  |
| <b>Lungenblume</b>       | I.   | 590  |                       |      |      |



|                     | Tom. Pag. |                 | Tom. Pag. |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Marienglöcklein     | IV. 164   | Mayenbusch      | II. 351   |
| Marienschuh         | III. 575  | Mays            | III. 608  |
| Märzenglöcklein     | II. 7     | Meerbinse       | I. 107    |
| Masholder           |           | Meerlinse       |           |
| Feld                | III. 791  | convexe         | III. 599  |
| monpellier          | III. 792  | kleine          | III. 599  |
| platanblättr.       | III. 790  | vielwurzliche   | III. 600  |
| rauhsaamiger        | IV. 718   | Meerrettig      | III. 42   |
| Maskel              | III. 755  | Megerkraut      | I. 342    |
| Maslieben           |           | kleines         | I. 332    |
| kleine              | III. 472  | Mehlbaum        | I. 735    |
| grofse              | III. 473  | Mehlbeerenbaum  | II. 368   |
| schwarzkelchige     | IV. 619   | bastard         | II. 377   |
| Mastkraut           |           | Mehlbirne       | II. 386   |
| aufrechtes          | I. 393    | Mehlstrauch     | I. 735    |
| blumenblättrlos.    | I. 392    | Meier           | II. 258   |
| niederliegendes     | I. 391    | Meisterwurz     | I. 708    |
| Mauerewig           | I. 542    | schwarze        | I. 607    |
| Mauer-Lorbeerkraut. | I. 542    | Melde           |           |
| Mauerpfeffer        | II. 279   | Amaranthm.      | III. 688  |
| Maulbeerbaum        |           | aufrechte       | IV. 717   |
| schwarzer           | IV. 669   | ausgebreitete   | III. 788  |
| weifser             | III. 685  |                 | IV. 715   |
| Mäuseholz           | I. 516    | Feld            | IV. 714   |
| Mausohr             |           | Fisch           | I. 573    |
| Alpen               | IV. 139   | Garten          | III. 786  |
| Feld                | I. 411    | glänzende       | IV. 713   |
| klettensaamiges     | I. 412    | Hunds           | I. 572    |
| niederes            | IV. 139   | Mist            | I. 565    |
| Sumpf               | I. 410    | Rosen           | III. 786  |
| Wald                | IV. 137   | schmalblättrige | IV. 717   |
| Mausöhrlein         |           | Schweins        | I. 568    |
| gemeines            | III. 308  | spondonblättr.  | III. 787  |
| grofses             | III. 310  | stinkende       | I. 572    |
| weifß und rothes    | III. 410  | zugespitzte     | IV. 713   |
| zweifelhaftes       | III. 309  | Meliloten       |           |
| Mausschwanz         | I. 768    | blaue           | IV. 565   |
| Mäusegras           | I. 768    | gelbe           | III. 218  |
| Mauzenkraut         | I. 572    | weifse          | III. 218  |
| Mayblume            | II. 51    | Melilotengras   | I. 59     |
| Blümchen            | II. 51    | Melisse         |           |
| Mappische           | II. 53    | Acker           | II. 654   |
| quirelförmige       | II. 54    | Melisse         |           |

|                  | Tom. | Pag. |                  | Tom.        | Pag. |
|------------------|------|------|------------------|-------------|------|
| <b>Melisse</b>   |      |      | <b>Montie</b>    |             |      |
| Berg             | II.  | 652  | grofse           | I.          | 303  |
| Citronen         | II.  | 649  | kleine           | I.          | 302  |
| Garten           | II.  | 649  | Moosbeere        | II.         | 152  |
| grofsblumige     | II.  | 651  | Mottenkraut      | I. 502. II. | 202  |
| Poley            | II.  | 654  | violettes        | IV.         | 171  |
| Melissenblatt    | II.  | 656  | Muckenkraut      | II.         | 174  |
| Merzenblume      | II.  | 7    | <b>Münze</b>     |             |      |
| Merzenglöcklein  | II.  | 7    | Acker            | II.         | 606  |
| Mespele          | II.  | 381  | Badische         | II.         | 604  |
| Metram           | III. | 479  | Basilien         | II.         | 602  |
| Meu              | I.   | 690  | Bergamott        | IV.         | 435  |
| <b>Milchen</b>   |      |      | Citronen         | IV.         | 435  |
| gemeiner         | III. | 349  | Edel             | II.         | 602  |
| Milchkraut       | I.   | 548  | Feld             | II.         | 606  |
| Milzkraut        | II.  | 214  | grüne            | II.         | 595  |
| Berg             | II.  | 215  | Hallersche       | II.         | 594  |
| Mispel           | II.  | 381  | haarige          | II.         | 600  |
| Alpen            | IV.  | 342  | Katzen           | II.         | 588  |
| filzige          | IV.  | 720  | krause           | II.         | 598  |
| Quitten          | II.  | 383  | Pfeffer          | IV.         | 437  |
| Stein            | II.  | 383  | Pferd            | II.         | 593  |
| Zwerg            | II.  | 383  | rundblättr.      | II.         | 596  |
| Mistel           | III. | 751  | Spitz            | II.         | 595  |
| Mistmelde        | I.   | 565  | Wasser           | II.         | 599  |
| Modelgeer        | I.   | 599  | wilde            | II.         | 593  |
| <b>Mohn</b>      |      |      | zahme            | II.         | 601  |
| gelber gehörnt.  | II.  | 473  | Münzbalsam       | IV.         | 604  |
| kleiner Feld     | II.  | 476  | Muttern          | I.          | 683  |
| rother gehörnter | IV.  | 400  | Mutterkraut      | III.        | 479  |
| rother Feld      | II.  | 477  |                  |             |      |
| Sand             | II.  | 475  | Nabelkraut       | II.         | 217  |
| schwarzer        | II.  | 478  | Nabelsaamenkraut | I.          | 353  |
| weißser          | II.  | 479  | Nachtkerze       |             |      |
| Möhre            | I.   | 627  | kleinblühende    | IV.         | 263  |
| Möhringie        |      |      | zweyjährige      | II.         | 134  |
| moosige          | II.  | 164  | Nachtschatten    | I.          | 519  |
| Mondkraut        | III. | 48   | Garten           | I.          | 519  |
| wohlriechendes   | III. | 49   | Feld             | I.          | 519  |
| Mondviole        |      |      | gelber           | I.          | 521  |
| wohlriechende    | III. | 48   | gelbgrünbeerig.  | IV.         | 175  |
| zweyjährige      | III. | 49   | gemeiner         | I.          | 519  |

|                         | Tom.        | Pag. |                          | Tom.        | Pag.     |
|-------------------------|-------------|------|--------------------------|-------------|----------|
| <b>Nachtschatten</b>    |             |      | <b>Nessel</b>            |             |          |
| rothbeeriger            | IV.         | 177  | Brennessel große         | III.        | 683      |
| schwarzer               | I.          | 519  | — kleine                 | III.        | 683      |
| <b>Nachtwiederstofs</b> | II.         | 254  | Stinknessel              | II.         | 624      |
| <b>Nackende Hure</b>    | II.         | 123  | Waldnessel               | II.         | 624      |
| <b>Nackende Jungfer</b> | II.         | 123  | <b>Nesselhanf</b>        |             |          |
| <b>Nadelbinse</b>       | I.          | 98   | großblumiger             | II.         | 623      |
| <b>Nägelcingras</b>     | I. 753. II. | 298  | kleinblumiger            | II.         | 622      |
| <b>Nagelkraut</b>       | IV.         | 108  | <b>Nieswurz</b>          |             |          |
| <b>Narzisse</b>         |             |      | falsche                  | II.         | 530      |
| gelbe                   | II.         | 9    | grünblühende             | II.         | 562      |
| weiße                   | II.         | 8    | schwarze                 | II.         | 561      |
| <b>Nard - wilder</b>    | II.         | 309  | stinkende                | II.         | 564      |
| <b>Nardensaame</b>      | II.         | 503  | weiße                    | IV.         | 709      |
| <b>Narrenkappe</b>      | II.         | 500  | — schwarzbl.             | III.        | 775      |
| <b>Natterkopf</b>       | I.          | 433  | <b>Nigelle</b>           |             |          |
| <b>Natterwurz</b>       | II.         | 106  | Acker                    | II.         | 504      |
| Alpen, kleine           | II.         | 168  | Damascenische            | II.         | 502      |
| <b>Nelke</b>            |             |      | gemeine                  | II.         | 503      |
| Bart                    | II.         | 235  | <b>Ochsenbrech</b>       | III.        | 161      |
| — wilde                 | II.         | 238  | <b>Ochsenzunge</b>       |             |          |
| Carthäuser              | II.         | 236  | gemeine                  | I.          | 417      |
| deltaförmige            | II.         | 242  | italänische              | IV.         | 140      |
| Dolden                  | I.          | 305  | schmalblättrige          | I.          | 418      |
| Donner                  | II.         | 238  | wilde blaue              | I.          | 433      |
| Feder                   | II.         | 245  | <b>Odermennig</b>        | II.         | 315      |
| Feld                    | II.         | 256  | wohlriechend.            | IV.         | 326      |
| — weiße                 | II.         | 293  | <b>Oemer</b>             | IV.         | 105      |
| Felsen                  | IV.         | 303  | <b>Ohnblatt</b>          | II.         | 200. 682 |
| Garten                  | IV.         | 302  | <b>Ohrlöffeleinkraut</b> | II.         | 248      |
| große rothe Wald        | II.         | 241  | <b>Olmeren</b>           | I.          | 537      |
| Heiden                  | II.         | 242  | <b>Olnitzwurz</b>        | I. 635. II. | 637      |
| kleine Kopf             | II.         | 240  | <b>Oltwurz</b>           | III.        | 456      |
| — Sand                  | II.         | 239  | <b>Ophrys</b>            |             |          |
| Kopf                    | II.         | 239  | Bienentrag.              | II.         | 567      |
| Sand                    | I.          | 753  | einhodige                | III.        | 563      |
| Stein                   | II.         | 236  | Fliegentr.               | III.        | 565      |
| wohlriechende           | II.         | 244  | Lösels                   | III.        | 561      |
| zottige                 | II.         | 244  | Menschenähnl.            | III.        | 564      |
| <b>Nelkenwurz</b>       | II.         | 427  | Spinnen                  | III.        | 567      |
| <b>Nespeibaum</b>       | II.         | 381  | Spinnetrug.              | III.        | 569      |

|                   | Tom. Pag. |                          | Tom. Pag. |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>Ophrys</b>     |           | <b>Peltschen</b>         |           |
| spiralförmig.     | III. 558  | Beilkrautartige          | III. 207  |
| Sumpf             | III. 562  | bunte                    | III. 208  |
| wohlriechende     | III. 563  | gekrönte                 | III. 205  |
| zweyblättr.       | III. 559  | kleinste                 | III. 206  |
| — kleine          | III. 566  | Scorpions                | III. 203  |
| <b>Orant</b>      | II. 642   | <b>Peplis</b>            | II. 93    |
| Feld              | II. 697   | <b>Peruquenbaum</b>      | IV. 214   |
| großser           | II. 696   | <b>Peruquensumach</b>    | IV. 214   |
| kleiner           | II. 692   | <b>Perlgras</b>          |           |
| Purpur            | II. 696   | blaues                   | I. 175    |
| <b>Orchis</b>     |           | einblumiges              | I. 173    |
| violette          | IV. 637   | glattes                  | I. 172    |
| <b>Osterlucey</b> | III. 577  | harriges                 | I. 170    |
| großblättrige     | IV. 639   | überhängendes            | I. 172    |
| <b>Ostriz</b>     | I. 708    | <b>Perlhirse</b>         | I. 413    |
| <b>Päonie</b>     | II. 492   | <b>Pestilenzkraut</b>    | IV. 558   |
| <b>Pappel</b>     |           | <b>Pestilenzwurz</b>     | III. 431  |
| Gänse             | III. 135  | Bastard                  | III. 432  |
| Käse              | III. 135  | <b>Peterlin</b>          | I. 730    |
| Moschus           | III. 139  | <b>Petersilie</b>        | I. 730    |
| Pferde            | III. 136  | Berg große               | I. 646    |
| Rosen             | III. 135  | Garten                   | I. 730    |
| Rose              | III. 134  | Hunds                    | I. 688    |
| <b>Pappelbaum</b> |           | Katzen                   | I. 688    |
| Balsam            | IV. 704   | kleine Berg              | I. 648    |
| — canadaisch.     | IV. 705   | <b>Peterskorn St.</b>    | I. 290    |
| griechischer      | IV. 703   | <b>Peterskraut St.</b>   | I. 599    |
| italianischer     | III. 762  | <b>Pfaffenhütchen</b>    | I. 531    |
| lombardischer     | III. 762  | <b>Pfaffenmütze</b>      | I. 531    |
| pyramiden.        | III. 762  | <b>Pfaffenöhrllein</b>   | III. 302  |
| schwarze          | III. 761  | <b>Pfefferkraut</b>      | III. 20   |
| Silber            | III. 760  | <b>Pfeffermünze</b>      | IV. 437   |
| weißgraue         | III. 761  | <b>Pfefferwurz</b>       | I. 723    |
| Zitter            | III. 763  | <b>Pfeiffenrohr</b>      | I. 261    |
| <b>Pariskraut</b> | II. 184   | <b>Pfeiffenkraut</b>     | I. 699    |
| <b>Pasternak</b>  | I. 717    | <b>Pfeiffenstrauch</b>   | II. 349   |
| <b>Pastinak</b>   | I. 717    | <b>Pfeilkraut</b>        | III. 694  |
| <b>Patatten</b>   | I. 517    | <b>Pfenningkraut</b>     | I. 455    |
| <b>Pechnelke</b>  | II. 291   | <b>Pferdesaamenkraut</b> | I. 681    |
|                   |           | Alpen                    | I. 683    |
|                   |           | <b>Pferdkastanien</b>    | II. 129   |



|                   | Tom. | Pag. |                     | Tom. | Pag. |
|-------------------|------|------|---------------------|------|------|
| Pferdeschwanz     | I.   | 2    | Platterbse          |      |      |
| Pfersingkraut     | II.  | 172  | Sumpf               | III. | 180  |
| Pfingstrose       | II.  | 492  | weisse              | IV.  | 545  |
| Pfirsigbaum       | II.  | 365  | wohlriechende       | IV.  | 546  |
| Pflaumenbaum      | II.  | 361  | Poley               |      |      |
| blaue Herbst      | II.  | 362  | Herzpoley           | II.  | 608  |
| Kirschenpfl.      | IV.  | 338  | wilder              | II.  | 645  |
| Türckenpfl.       | IV.  | 338  | Portulac            | II.  | 343  |
| Pfriemen          | III. | 153  | Post                | II.  | 202  |
| binsenartige      | IV.  | 537  | falscher            | II.  | 204  |
| Pfriemengras      | I.   | 115  | Potaken             | I.   | 517  |
| Pimperlimppimp    | I.   | 700  | Potentille          |      |      |
| Pimpernußbaum     | I.   | 744  | aufrechte Felsen    | II.  | 443  |
| Pimpinelle        |      |      | Erdbeerblättr.      | II.  | 453  |
| Anis              | IV.  | 212  | niederliegende      | II.  | 444  |
| grofse            | I.   | 725  | Strauchartige       | IV.  | 382  |
| Stein             | I.   | 723  | Prenanthe           |      |      |
| zerschliztblättr. | I.   | 726  | klebrige            | III. | 301  |
| zweyhäusige       | I.   | 728  | Mauer               | III. | 300  |
| Pippau            |      |      | Purpur              | III. | 299  |
| horstentragend.   | III. | 337  | schmalblättr.       | III. | 298  |
| Dioscorids        | III. | 338  | Pulverholz          | I.   | 527  |
| gemeiner          | III. | 339  | Pungen              | I.   | 486  |
| grüner            | III. | 341  | Purgierend. Wegdorn | I.   | 527  |
| klebriger         | IV.  | 595  | Purgierlein         | I.   | 759  |
| Lachenalischer    | III. | 336  | Purgierkörnerkraut  | II.  | 324  |
| schöner           | IV.  | 595  | Purgierkraut        | I.   | 45   |
| stinkender        | III. | 334  | Quandelbeerstrauch  | II.  | 391  |
| zweijähriger      | III. | 342  | Quecke              | I.   | 297  |
| Pistazien wilde   | I.   | 744  | Queckweizen         | I.   | 297  |
| Platane           |      |      | Quendel             | II.  | 645  |
| abendländische    | IV.  | 677  | Citronen            | IV.  | 443  |
| morgenländische   | IV.  | 676  | Quittenapfelbaum    | II.  | 390  |
| Platterbse        |      |      | Birnbäum            | II.  | 390  |
| Acker gelbe       | III. | 173  | Quittenbaum         | II.  | 390  |
| breitblättrige    | III. | 179  | Quittenmispel       | II.  | 383  |
| gelbe - Wiesen    | III. | 177  |                     |      |      |
| grofse Wald       | III. | 179  | Raden               |      |      |
| haarige           | III. | 175  | Körn                | II.  | 286  |
| knollige          | III. | 176  | Kranz               | II.  | 287  |
| Nissolische       | III. | 174  | Rainkohl            | III. | 349  |
| rothe             | IV.  | 544  |                     |      |      |

|                     | Tom.        | Pag. |                   | Tom. | Pag. |
|---------------------|-------------|------|-------------------|------|------|
| Ranunkel            |             |      | Rebe              |      |      |
| Garten              | II.         | 429  | Wein              | I.   | 546  |
| Rapunzel            |             |      | wilde             | I.   | 544  |
| Aehren              | I.          | 484  | Rebendolde        |      |      |
| französische        | II.         | 134  | Lachonals         | I.   | 678  |
| kleine              | I.          | 472  | Pollichs          | I.   | 679  |
| kugelförmige        | I.          | 483  | rohrige           | I.   | 675  |
| wilde               | I.          | 484  | Tabernämont.      | I.   | 677  |
| Rapunzelrübe        | I.          | 472  | Rebs              | III. | 94   |
| Rapunzel - Zellerie | II.         | 134  | Resede            |      |      |
| Rauchapfel          | I.          | 505  | Garten            | II.  | 319  |
| Rauke               |             |      | Färbe             | II.  | 317  |
| Acker               | III.        | 67   | wohlriechende     | II.  | 349  |
| Columnische         | IV.         | 494  | Rettig            | III. | 105  |
| dünnblättrige       | III.        | 66   | Acker             | III. | 104  |
| Garten              | IV.         | 514  | Rhabarber         |      |      |
| langblättrige       | IV.         | 491  | Bastard           | IV.  | 276  |
| Land und Wasser     | III.        | 63   | Mönchs            | II.  | 110  |
| Löselische          | III.        | 70   | stumpfbättr.      | IV.  | 274  |
| Mauer               | IV.         | 487  | unächte           | II.  | 524  |
| Monarauke           | IV.         | 484  | Rhapontic         | IV.  | 274  |
| pyrenäische         | III.        | 64   | Rhapuncia         | IV.  | 274  |
| Sand                | III.        | 69   | Rheide            | II.  | 154  |
| steifstenglige      | IV.         | 495  | Rheinblume, gelbe | III. | 407  |
| stinkende           | III.        | 66   | Rheinfarn         |      |      |
| Sumpf               | III.        | 62   | weißser           | III. | 486  |
| Ungarische          | IV.         | 490  | Rheinfarren       | III. | 398  |
| Weinbergs           | IV.         | 488  | Rheinweide        | I.   | 12   |
| wilde               | III.        | 61   | Rindsauge         | III. | 492  |
| Rauckenkohl         | III.        | 98   | Ringelblume       | III. | 508  |
| Rauhlinde           | I.          | 582  | Rispengras        |      |      |
| Rauschbeer          | II.         | 148  | Alpen             | I.   | 178  |
| schwarze            | III.        | 750  | dreyblättriges    | I.   | 180  |
| Raute               |             |      | einjähriges       | I.   | 189  |
| Garten              | II.         | 199  | feines Wald       | I.   | 193  |
| Wein                | II.         | 199  | gemeines          | I.   | 180  |
| Raygras             |             |      | graues            | IV.  | 60   |
| englisches          | I.          | 270  | grofsähriges      | IV.  | 59   |
| französisches       | I.          | 250  | haariges          | IV.  | 58   |
| Rebe                |             |      | hartes            | I.   | 198  |
| Wald                | I. 544. II. | 518  | Hügel             | IV.  | 54   |
|                     |             |      | Kammartig.        | I.   | 196  |

|                     | Tom. | Pag. |                  | Tom. | Pag. |
|---------------------|------|------|------------------|------|------|
| <b>Rispengras</b>   |      |      | <b>Rose</b>      |      |      |
| knollent.           | I.   | 194  | Alpen            | II.  | 420  |
| kurzblättr.         | IV.  | 51   | Apfel            | II.  | 410  |
| liebliches          | I.   | 191  | Axmannsche       | IV.  | 367  |
| Salz                | I.   | 187  | Balsam           | II.  | 403  |
| schlaffes           | I.   | 179  | Band             | II.  | 418  |
| Schlesisches        | IV.  | 56   | Berg             | IV.  | 365  |
| schmalblättrig.     | I.   | 182  | Bisam            | II.  | 431  |
| Wald                | I.   | 186  | Burgunder        | II.  | 432  |
| Wasser              | I.   | 177  | Carolinische     | IV.  | 360  |
| Wiesen              | I.   | 185  | Damascener       | II.  | 407  |
| zusammengedr.       | I.   | 190  | Dornlose         | IV.  | 358  |
| zweyzeiliges        | IV.  | 62   | Eschenblättr.    | II.  | 413  |
| <b>Rittersporn</b>  |      |      | Essig            | II.  | 407  |
| Feld                | II.  | 494  | Eeld             | II.  | 418  |
| grofse              | II.  | 495  | filzige          | IV.  | 369  |
| <b>Robinie</b>      | III. | 200  | Frankfurter      | II.  | 405  |
| klebrige            | IV.  | 553  | gelbe gefüllte   | II.  | 404  |
| Kugel               | IV.  | 553  | Hagenbutten      | II.  | 422  |
| sibirische          | IV.  | 554  | Hals             | III. | 134  |
| <b>Rockenbollen</b> | II.  | 16   | Hecken           | II.  | 422  |
| <b>Roggen</b>       | I.   | 277  | — strauß         | II.  | 424  |
| <b>Rohrgras</b>     |      |      | Hügel            | IV.  | 362  |
| ausgebreitetes      | I.   | 266  | hundertblättr.   | II.  | 429  |
| Büschel             | I.   | 261  | Hunds            | II.  | 424  |
| Deck                | I.   | 261  | — Strauß         | II.  | 424  |
| gemeines            | I.   | 261  | kleinblumige     | IV.  | 359  |
| Hallersches         | IV.  | 91   | kriech           | II.  | 418  |
| Land                | I.   | 254  | May              | II.  | 412  |
| mittleres           | I.   | 266  | Mohnessig        | II.  | 407  |
| Pfeiffen            | I.   | 261  | Monath           | II.  | 430  |
| Plinisches          | IV.  | 88   | niedrige         | IV.  | 364  |
| Schilf              | I.   | 261  | österreichische  | II.  | 421  |
| Teich               | I.   | 261  | Pappel           | III. | 134  |
| Ufer                | IV.  | 90   | Pfingst          | II.  | 413  |
| Wiesen I. 267.      | IV.  | 92   | Pimpinellblättr. | II.  | 416  |
| <b>Rohrkolben</b>   |      |      | Provinz          | II.  | 429  |
| breitblättr.        | III. | 601  | Rost             | II.  | 408  |
| elliptische         | III. | 603  | rothblättrige    | IV.  | 362  |
| grofse              | III. | 601  | Schirm           | II.  | 425  |
| mittlere            | III. | 603  | Schlangen        | II.  | 418  |
|                     |      |      | schwarze         | II.  | 407  |

|                      | Tom. | Pag.     |                 | Tom. | Pag.   |
|----------------------|------|----------|-----------------|------|--------|
| <b>Rose</b>          |      |          | <b>Ruhrwurz</b> | II.  | 458    |
| Schwefelgelbe        | II.  | 404      | Runkelrüben     | I.   | 575    |
| Stachel              | II.  | 414      | Rusche          | I.   | 579    |
| Türkische            | II.  | 403      | Rüster          |      |        |
| Wald                 | II.  | 418      | frühe           | I.   | 579    |
| weichhaarige         | II.  | 409      | gemeine         | I.   | 579    |
| weiße einfache       | II.  | 427      | graue           | I.   | 579    |
| — gefüllte           | II.  | 427      | Haynbuchen      | I.   | 579    |
| wohlriech. Dolden.   | II.  | 425      | kleine          | I.   | 579    |
| Zimmt                | II.  | 412      | — rothe         | I.   | 579    |
| <b>Rosmarin</b>      | IV.  | 14       | Kork            | I.   | 581    |
| Sumpf                | II.  | 202      | langstielige    | I.   | 582    |
| wilder               | II.  | 202      | rothe           | I.   | 581    |
| <b>Rosmarinheide</b> | II.  | 204      | schwarze        | I.   | 582    |
| Rosfenchel           | I.   | 652. 681 | weiße           | I.   | 579    |
| Rosshuf              | III. | 427      | <b>Sadebaum</b> | III. | 769    |
| Rosshüflein          | III. | 427      | Safflor         | IV.  | 597    |
| Roskastanien         | II.  | 123      | Safran          | IV.  | 28     |
| fleischfarbige       | IV.  | 260      | Salat           |      |        |
| Roswurz              | III. | 385      | Acker           | I.   | 73     |
| Rothfingerkraut      | II.  | 463      | Berg            | III. | 294    |
| Rübe, gelbe          | I.   | 627      | Garten          | III. | 290    |
| gemeine              | III. | 95       | Kaiser          | III. | 405    |
| Rubenkörbel          | I.   | 700      | Kopf            | III. | 290    |
| Rubrechtskraut       | III. | 120      | Lämmer          | I.   | 73     |
| Rübsaat              | III. | 94       | — späther       | I.   | 74     |
| Rübsen               | III. | 94       | Töchterlein     | I.   | 73     |
| <b>Ruchgras</b>      |      |          | weidenblättr.   | III. | 293    |
| gelbes               | I.   | 59       | <b>Salbey</b>   |      |        |
| wohlriechend.        | I.   | 59       | Garten          | IV.  | 15     |
| <b>Ruhralant</b>     | III. | 459      | gelbe           | I.   | 57     |
| <b>Ruhrkraut</b>     | III. | 459      | klebrige        | I.   | 57     |
| Alpen kleines        | IV.  | 608      | Muskateller     | IV.  | 18     |
| — schönes            | IV.  | 609      | Mutter          | IV.  | 18     |
| Berg                 | III. | 419      | Quiriförmige    | IV.  | 17     |
| deutsches            | III. | 415      | Salep           | III. | 534    |
| Feld                 | III. | 418      | Salomonssiegel  | II.  | 55. 57 |
| französisches        | III. | 416      | Salzbinse       | II.  | 120    |
| gelbes Sand          | III. | 407      | Meer            | II.  | 122    |
| gelbweißes           | III. | 408      | <b>Salzgras</b> |      |        |
| morastiges           | III. | 414      | Meer            | II.  | 122    |
| Perlen               | III. | 411      | Sumpf           | II.  | 120    |
| Wald                 | III. | 413      |                 |      |        |



|                    | Tom. | Pag. |                     | Tom. | Pag.     |
|--------------------|------|------|---------------------|------|----------|
| Salzkraut          | I.   | 548  | Sauerampfer         |      |          |
| glattes            | IV.  | 187  | Acker               | II.  | 114      |
| Samkraut           |      |      | Garten              | II.  | 107      |
| borstenartiges     | I.   | 387  | gemeiner            | II.  | 111      |
| dichtes            | I.   | 381  | kleiner             | II.  | 114      |
| durchstochen,      | I.   | 380  | römischer           | II.  | 107      |
| grasartiges        | I.   | 387  | rundblättrig.       | II.  | 108      |
| kleinstes          | I.   | 390  | Schild              | II.  | 107      |
| krauses            | I.   | 384  | spanischer          | II.  | 112      |
| leuchtendes        | I.   | 382  | Wiesen              | II.  | 111      |
| Meer               | I.   | 389  | Sauerdorn           | II.  | 91       |
| röthliches         | IV.  | 126  | Sauerklee           | II.  | 283      |
| süßartiges         | I.   | 385  | aufrechter          | IV.  | 331      |
| schwimmend.        | I.   | 379  | hingestreckt.       | II.  | 285      |
| Spatelförmig.      | IV.  | 125  | Saufenchel          | I.   | 650      |
| verschiedenblättr. | I.   | 383  | Sautod              | I.   | 519. 568 |
| Wegerichblättr.    | IV.  | 127  | Sauwurz             | II.  | 698      |
| zusammengedrückt.  | I.   | 386  | Scabiose            |      |          |
| — Spitzblät.       | IV.  | 131  | Acker               | I.   | 322      |
| Samoskraut         | I.   | 486  | breitblättr.        | I.   | 320      |
| Sanddorn           | III. | 753  | kleine blaue        | II.  | 324      |
| Sandkraut          |      |      | Sumpf               | II.  | 318      |
| büschelförmig.     | II.  | 270  | Wald                | II.  | 320      |
| drey nerviges      | II.  | 264  | weißgraue           | IV.  | 112      |
| dünnblättrig.      | II.  | 269  | Wiesen              | II.  | 322      |
| Felsen             | II.  | 267  | Schabenkraut        | I.   | 502      |
| Frühlings          | IV.  | 316  | violettes           | IV.  | 171      |
| gefranztes         | IV.  | 312  | Schabziegerklee     | IV.  | 565      |
| Gerardisches       | IV.  | 314  | Schaafgarben        | III. | 487      |
| Lerchenblättr.     | IV.  | 313  | edle                | III. | 488      |
| klebriges          | IV.  | 317  | Schaafgras          | I.   | 208      |
| Rasen              | II.  | 267  | Schaafkörfel        | I.   | 616      |
| rothblühend.       | II.  | 266  | Schaafschwengel     | I.   | 208      |
| quendelblättr.     | II.  | 265  | Scharfkraut         | IV.  | 147      |
| vieltenglich.      | IV.  | 313  | Scharlach Bocksbeer | II.  | 438      |
| Sandmohn           | II.  | 475  | Scharten            |      |          |
| Sandsenf           | III. | 37   | Acker               | III. | 357      |
| Sanikel            | I.   | 605  | Färber              | III. | 356      |
| Alpen              | II.  | 221  | Scheibenkraut       |      |          |
| Sarsaparille       |      |      | knoblauchart.       | IV.  | 477      |
| deutsche           | III. | 613  | Scherardie          |      |          |
| Saturey            | II.  | 585  | Acker               | I.   | 326      |
| Sauerach           | II.  | 91   | Scheuchzerie        |      |          |
|                    |      |      | Sumpf               | II.  | 116      |
|                    |      |      | Schier.             |      |          |

|                       | Tom. | Pag. |                   | Tom. | Pag.      |
|-----------------------|------|------|-------------------|------|-----------|
| Schierling            | I.   | 631  | Schmiele          |      |           |
| Erd                   | I.   | 631  | Rasenartige       | I.   | 161       |
| gefleckter            | I.   | 631  | Wasser            | I.   | 160       |
| großser Wasser        | I.   | 685  | Schmielengras     |      |           |
| Schiefsbeere          | I.   | 526  | gebogenes         | I.   | 163       |
| Schiefsbeerholz       | I.   | 366  | Schminkbeere      | I.   | 7         |
| Schildklee            | IV.  | 556  | Schminkmelde      | I.   | 7         |
| Schilf                | I.   | 261  | Schminkwurz       | II.  | 55        |
| Schilfrohr            |      |      | Schminkwurz       | I.   | 415       |
| ausgebreitetes        | I.   | 262  | Schnabelkraut     | I.   | 695       |
| gemeines              | I.   | 261  | Schneeballenbaum  | I.   | 737       |
| Hallersches           | IV.  | 91   | Schneckenklee     |      |           |
| Plinisches            | IV.  | 88   | gezahnter         | IV.  | 571       |
| Schlagkraut           | II.  | 575  | kleinster         | III. | 251       |
| Schlafkraut.          | I.   | 507  | Schneeglöcklein   | II.  | 7         |
| Schlafweizen          | I.   | 272  | kleines           | IV.  | 221       |
| Schlangenkraut        | II.  | 166  | Schölkraut        | II.  | 471       |
| Schlangenwurz         | III. | 587  | Eisengraues       | II.  | 473       |
| Schlehdorn            | II.  | 363  | kleines           | II.  | 536       |
| Schlingbaum           | I.   | 735  | rothblühend.      | IV.  | 400       |
| Schlüsselblume        |      |      | zerschlitztes     | II.  | 472       |
| einblumige            | I.   | 442  | Schölwurz         | II.  | 471       |
| feinhaarige           | IV.  | 154  | Schuppenkraut     | II.  | 682       |
| große wilde           | I.   | 441  | Schuppenwurz      | II.  | 682       |
| mehlblättrige         | I.   | 443  | Schusterholz      | I.   | 531       |
| rothe Wiesen          | I.   | 443  | Schwalbenkraut    | II.  | 471       |
| Wald                  | I.   | 441  | Schwalbenwurz     | I.   | 558       |
| Wiesen                | I.   | 440  | Schwarzdorn       | II.  | 363       |
| wohlriechende         | I.   | 440  | Schwarzkümmel     | II.  | 504       |
| Schlutten             | I.   | 514  | Schwarz - Sanikel | I.   | 607       |
| Schluttenart. Tollkr. | IV.  | 174  | Schwarzweizen     | II.  | 677       |
| Schmalzblume          | II.  | 566  | Schwarzwinde      | II.  | 182       |
| Schmergel             | I.   | 562  | Schwarzwurz       | III. | 273       |
| Schmerkraut           | I.   | 48   | Schwefelwurz      | I.   | 650       |
| Schmerwurz            | II.  | 273  | Schwelkenbaum.    | I.   | 737       |
| Schmiele, Acker       | I.   | 142  | Schweyckerte      |      |           |
| Berg                  | I.   | 164  | Seeblumenartige   | I.   | 448       |
| blaue                 | I.   | 175  | Schweinmelde      | I.   | 519       |
| frühe Sand            | I.   | 166  | Schweintod        | I.   | 519. 568. |
| graue                 | I.   | 165  | Schwertel         |      |           |
| kleine                | I.   | 166  | gelber - Wasser   | I.   | 80        |
| Nägelein              | I.   | 168  | Grasblättrig.     | IV.  | 31        |

|                       | Tom. | Pag.     |                       | Tom. | Pag. |
|-----------------------|------|----------|-----------------------|------|------|
| <b>Schwertlilie</b>   |      |          | <b>Seeblume</b>       |      |      |
| Bastardartige         | IV.  | 31       | gelbe kleine          | IV.  | 402  |
| blaue Wiesen          | I.   | 83       | weiße große           | II.  | 482  |
| gelbe                 | I.   | 80       | <b>Seeknotenkraut</b> | I.   | 748  |
| gelbbunte             | IV.  | 30       | <b>Seenuß</b>         | I.   | 370  |
| Grasblättrige         | IV.  | 31       | <b>Seesträndling</b>  | IV.  | 668  |
| niedere               | IV.  | 29       | <b>Segge</b>          |      |      |
| sibirische            | I.   | 83       | Blasen                | III. | 671  |
| <b>Schwindelhaver</b> | I.   | 272      | blasse                | III. | 664  |
| <b>Schwingel</b>      |      |          | Berg                  | III. | 641  |
| grauer Schaf.         | I.   | 210      | borstige              | III. | 673  |
| harter                | I.   | 215      | Brand                 | IV.  | 664  |
| hoher                 | I.   | 218      | braungelbe            | III. | 658  |
| Lolchartiger          | IV.  | 66       | Buxbaumische          | IV.  | 661  |
| niederliegend.        | I.   | 217      | Cyper                 | III. | 657  |
| Rohr                  | I.   | 220      | Cypergrasartige       | III. | 622  |
| rother                | I.   | 211      | Davallische           | IV.  | 649  |
| Schaf                 | I.   | 208      | entfernte             | III. | 631  |
| schwimmend.           | I.   | 222      | entlegenährige        | III. | 659  |
| Trespartiger          | I.   | 216      | fadenförmige          | III. | 649  |
| verschiedenblättr.    | I.   | 213      | fadenwurzliche        | IV.  | 652  |
| Wiesen                | I.   | 212      | filzige               | III. | 639  |
| <b>Scorpionskraut</b> | I.   | 408      | Fingerförmige         | III. | 647  |
| <b>Scorzonere</b>     |      |          | Flaschen              | III. | 672  |
| niedere               | III. | 272      | Floh                  | III. | 611  |
| purpurfarb.           | IV.  | 581      | frühe                 | III. | 638  |
| spanische             | III. | 273      | Fuchs                 | III. | 616  |
| zerschlitzte          | III. | 274      | gefranzte             | III. | 643  |
| <b>Sedum</b>          |      |          | gelbe                 | III. | 636  |
| Felsen                | IV.  | 318      | getrennte             | III. | 610  |
| Guettardisches        | II.  | 280      | graulichte            | III. | 628  |
| haariges              | II.  | 282      | grundweibliche        | IV.  | 655  |
| Netzblättr.           | II.  | 275      | hagere                | III. | 635  |
| scharfes              | II.  | 279      | hängende              | III. | 655  |
| sechseckiges          | II.  | 280      | haarige               | III. | 651  |
| Stein                 | IV.  | 319      | haarstielige          | IV.  | 665  |
| weißes                | II.  | 277      | Hasen                 | III. | 623  |
| zurückgebogen.        | II.  | 276      | Heiden                | III. | 643  |
| <b>Seebins</b>        | I.   | 100. 102 | heimlichbl.           | III. | 648  |
| <b>Seeblume</b>       |      |          | Hirsen                | III. | 663  |
| gelbe große           | II.  | 481      | kurzährige            | IV.  | 666  |
|                       |      |          | mittlere              | III. | 614  |

|                    | Tom. | Pag. |                 | Tom. | Pag. |
|--------------------|------|------|-----------------|------|------|
| <b>Segge</b>       |      |      | <b>Senf</b>     |      |      |
| niedere            | IV.  | 656  | schwarzer       | III. | 101  |
| Pilen              | III. | 644  | weißser         | III. | 100  |
| Rasen              | III. | 633  | Senne, falsche  | III. | 202  |
| Rispenförmige      | III. | 621  | Serapias        |      |      |
| rostfarbige        | III. | 651  | breitblättr.    | III. | 570  |
| rundhalmige        | III. | 619  | Degenblättr.    | III. | 573  |
| Sand               | III. | 613  | langblättr.     | III. | 571  |
| Schatten           | IV.  | 659  | rothe           | III. | 574  |
| schlaffe           | III. | 662  | weißgelbe       | III. | 572  |
| Schlamm            | III. | 660  | Sesel           |      |      |
| schlankährlige     | III. | 653  | Berg            | I.   | 710  |
| Schreibersche      | III. | 625  | einjähriger     | I.   | 713  |
| schwarze           | IV.  | 654  | gräulichter     | I.   | 711  |
| seltsamme          | IV.  | 651  | Pferde          | I.   | 715  |
| stechende          | III. | 618  | pyrenäischer    | IV.  | 204  |
| steife             | IV.  | 658  | Seslerie        |      |      |
| Sternförmig.       | III. | 629  | blaue           | I.   | 206  |
| Sumpf              | III. | 668  | Sevenbaum       | III. | 769  |
| Ufer               | III. | 669  | Sevibaum        | III. | 769  |
| unterbrochenähr.   | III. | 617  | Sibbaldia       | IV.  | 218  |
| verlängerte        | III. | 632  | Sibyllenwurz    | I.   | 599  |
| Vogelfuß           | III. | 645  | Sichelkraut     | I.   | 674  |
| Wald               | III. | 654  | Siebenzeit      | IV.  | 565  |
| weißse             | III. | 666  | Sigmarskraut    | III. | 138  |
| wenigblumige       | III. | 612  | Siegwurz        | II.  | 14   |
| Zittergrasartige   | III. | 626  | gemeine         | I.   | 77   |
| <b>Seidelbast</b>  | II.  | 156  | Silau           | I.   | 652  |
| immergrüner        | II.  | 158  | Silberblatt     | II.  | 442  |
| <b>Seidenkraut</b> |      |      | Silberbocksbart | I.   | 163  |
| großes             | I.   | 374  | Silbergras      | I.   | 168  |
| kleines            | I.   | 375  | Silge           |      |      |
| <b>Seifenkraut</b> | II.  | 233  | Chabräische     | I.   | 639  |
| niederliegend.     | IV.  | 300  | Kümmel          | I.   | 638  |
| <b>Senf, Acker</b> | III. | 99   | Lachenalische   | I.   | 640  |
| Berg               | III. | 35   |                 | IV.  | 204  |
| Englischer         | III. | 100  | Sumpf           | I.   | 635  |
| Felsen             | III. | 35   | Wald            | I.   | 637  |
| gelber             | III. | 101  | Silene, Alpen   | IV.  | 309  |
| — Sand             | III. | 37   | Garten          | IV.  | 306  |
| graublättrig.      | III. | 102  | kegelförmige    | II.  | 253  |
| rother             | III. | 101  | Lein            | IV.  | 304  |



|                           | Tom. Pag. |                     | Tom. Pag.            |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| <b>Silene</b>             |           | <b>Sparre</b>       |                      |
| Nacht                     | II. 254   | Dolden              | I. 305               |
| steinbrechende            | IV. 308   | Später Lämmersalat  | I. 74                |
| stiellose                 | IV. 309   | Spatzenkraut        | II. 162              |
| überhängende              | II. 252   | Specklilie          |                      |
| vierzählige               | IV. 307   | italiänische        | I. 488               |
| weisse kleine             | II. 255   | Wald                | I. 490               |
| <b>Sinai</b>              |           | Spelz               | I. 289. IV. 102. 103 |
| Alpen                     | IV. 122   | Sperenstich         | I. 599               |
| gemeiner                  | I. 372    | <b>Sperg</b>        |                      |
| Sinngrün                  | I. 555    | Acker               | II. 300              |
| Sockenblume               | IV. 121   | feinhaariger        | II. 305              |
| Sodkraut                  | III. 387  | langstieliger       | II. 304              |
| Soldanelle                | IV. 156   | kleiner             | II. 302              |
| Sommerkorn                | I. 277    | knotiger            | II. 303              |
| Sommerlock                | II. 169   | Spergel             | II. 300              |
| Sommerroggen              | I. 277    | Sperlingskraut      | II. 162              |
| Sommerweizen              | I. 286    | Sperrkraut          | I. 465               |
| Sommerwarz                |           | Spielbaum           | I. 527               |
| blaue                     | II. 715   | Spierlingsbaum      | II. 378              |
| erhabene                  | IV. 459   | <b>Spierstaude</b>  |                      |
| große                     | II. 713   | Ebereschenblättr.   | IV. 355              |
| kleine                    | IV. 460   | gekerbte            | IV. 354              |
| Nelkenduftende            | IV. 459   | Johanniskrautblät.  | II. 396              |
| <b>Sonnenblume</b>        |           | rispenartige        | II. 395              |
| Erdäpfeltragend.          | III. 494  | schnceballenblättr. | IV. 355              |
| große                     | III. 494  | sibirische          | IV. 355              |
| knollige                  | III. 494  | <b>Spinat</b>       |                      |
| <b>Sonnenthau</b>         |           | Dornloser           | III. 755             |
| englischer                | IV. 216   | Englischer          | II. 95               |
| langblättriger            | I. 764    | Holländischer       | III. 755             |
| rundblättriger            | I. 762    | Sommer              | III. 754             |
| <b>Sonnenwende</b>        |           | wilder              | I. 562               |
| europäische               | I. 408    | Winter              | III. 754             |
| <b>Sonnenwirbelein</b>    |           | Spindelbaum         | I. 531               |
|                           | I. 73     | breitblättrig.      | I. 533               |
| <b>Sophienkraut</b>       | III. 71   | <b>Spinnenkraut</b> |                      |
| <b>Spanischer Flieder</b> |           | ästiges             | II. 46               |
| Hollunder                 | I. 13     | astloses            | II. 48               |
| <b>Spargel</b>            | II. 50    | Spitzgras           | I. 297               |
| Fichten                   | II. 200   | Springkörnerkraut   | II. 324              |
| <b>Spargen</b>            | II. 50    | Springkraut         | II. 324              |
|                           |           | gelbes              | III. 526             |

|                    | Tom. Pag. |                     | Tom. Pag.     |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Spreublume         | IV. 610   | Steinkirschen       | II. 354       |
| Stabwurz           | III. 399  | Steinklee           |               |
| Stachelbeerstaude  |           | blauer              | IV. 565       |
| glatte             | I. 540    | gelber              | III. 218      |
| haarige            | I. 539    | hoher               | III. 220      |
| niederliegende     | I. 539    | Petitpierisch.      | IV. 564       |
| Stachelnufs        | I. 370    | weisser             | III. 218. 220 |
| Stachys            |           | Steinkraut          |               |
| Alpen              | II. 627   | gemeines            | III. 38       |
| einjährige         | II. 632   | weissblühend.       | III. 39       |
| Feld               | II. 633   | Steinmispel         | II. 383       |
| Sumpf              | II. 626   | Steinröschen        | II. 160       |
| teutsche           | II. 628   | Steinsaamenkraut    | I. 413        |
| Stahlkraut         | I. 52     | Acker               | I. 415        |
| Staudenkirsche     | II. 357   | purpur - blau       | I. 416        |
| Stechapfel         | I. 505    | Stendelkraut        |               |
| Stechpalme         | I. 376    | kugelartiges        | III. 531      |
| Steinäpfelchen     | II. 383   | Stendelwurz         |               |
| Steinbeere         | II. 150   | weisse wohlriech.   | III. 529      |
| Steinbrech         |           | Stephanskraut St.   | I. 15         |
| Bisam              | IV. 297   | Sternblume          | II. 8         |
| dreyfingeriger     | II. 223   | Alpen               | IV. 615       |
| entgegengesetztbl. | IV. 292   | Sternkraut          | II. 258       |
| gedrängter         | II. 226   | blaues              | III. 447      |
| gelbblühend.       | II. 219   | einjähriges         | III. 448      |
| glatter            | I. 560    | färbendes           | I. 330        |
| graublaulicher     | IV. 289   | kleines             | I. 326        |
| haariger           | I. 561    | Weiden              | IV. 613       |
| körnigter          | II. 222   | Sternleberkraut     | I. 328        |
| Moosartiger        | IV. 290   | Sternmeier          |               |
| Nabelkrautartig.   | IV. 286   | Acker               | II. 260       |
| Rasenartiger       | IV. 296   | Quellen             | II. 262       |
| rother             | II. 399   | Sumpf               | II. 260       |
| rundblättrig.      | II. 221   | Wasser              | II. 260       |
| scharfer           | IV. 294   | Stiefmütterchen     | III. 522      |
| Sponheimischer     | II. 224   | Stinkende Hoffart   | IV. 618       |
| sternartiger       | II. 218   | Stinkbaum           | II. 351       |
| veränderter        | IV. 288   | Stinknessel         | II. 624       |
| weisser            | II. 222   | Stolzer Heinrich I. | 433. 562      |
| zweyblüthiger      | IV. 293   | Storchschnabel      |               |
| Steinhimbeere      | II. 438   | blutrother          | III. 130      |
| Steinhirse         | I. 413    | Bocks               | III. 120      |

|                         | Tom. | Pag. |                        | Tom. | Pag. |
|-------------------------|------|------|------------------------|------|------|
| <b>Storchschnabel</b>   |      |      | <b>Sumpfilge</b>       | I.   | 635  |
| brauner                 | III. | 112  | <b>Sumpfklee</b>       | I.   | 446  |
| glänzender              | III. | 121  | <b>Sumpfkrautchen</b>  | II.  | 712  |
| großwurzlich.           | IV.  | 518  | <b>Sumpfkresse</b>     | III. | 62   |
| Malvenblättr.           | III. | 127  | <b>Sumpfnabelkraut</b> | I.   | 603  |
| Pimpinellblättr.        | III. | 110  | <b>Sumpfsenf</b>       | III. | 62   |
| pyrenäischer            | III. | 118  | <b>Sumpfständling</b>  | IV.  | 668  |
| rundblättrig.           | III. | 128  | <b>Süßholz, wildes</b> | III. | 214  |
| Schierlingsblättr.      | III. | 108  | <b>Süßklee</b>         | IV.  | 556  |
| <b>Sumpf</b>            | III. | 115  | <b>Swertie</b>         | I.   | 584  |
| <b>Tauben</b>           | III. | 125  | <b>Syringen</b>        | I.   | 13   |
| <b>Wald</b>             | III. | 113  | <b>Tabak</b>           |      |      |
| weicher                 | III. | 123  | Bauern                 | IV.  | 173  |
| <b>Wiesen</b>           | III. | 117  | chinesischer           | IV.  | 172  |
| zerschlissener          | III. | 124  | gemeiner               | I.   | 509  |
| <b>Straußgras</b>       |      |      | großblättr.            | IV.  | 172  |
| Acker                   | I.   | 142  | staudiger              | IV.  | 172  |
| Alpen                   | I.   | 151  | <b>Tamarisken</b>      | I.   | 746  |
| ästiges                 | I.   | 145  | <b>Tanne</b>           |      |      |
| auslaufendes            | I.   | 153  | Balsam                 | IV.  | 680  |
| gefiedertes             | I.   | 247  | Edel                   | III. | 710  |
| haarähnlich.            | I.   | 248  | roth                   | III. | 711  |
| haarförmig              | I.   | 154  | schwarz                | III. | 711  |
| Hunds                   | I.   | 147  | weiß                   | III. | 710  |
| kleinstes               | I.   | 158  | <b>Tannenwedel</b>     | I.   | 2    |
| niedriges               | I.   | 157  | <b>Tarant, blauer</b>  | I.   | 584  |
| Rohrartiges             | I.   | 144  | <b>Tartoffeln</b>      | I.   | 517  |
| Schwingelartig.         | I.   | 152  | <b>Täschelkraut</b>    |      |      |
| spitzblüthig.           | IV.  | 48   | Acker                  | III. | 25   |
| veränderliches          | IV.  | 49   | Berg                   | III. | 27   |
| Weinbergs               | I.   | 148  | durchwachsen.          | III. | 29   |
| weißes                  | I.   | 156  | Feld                   | III. | 26   |
| zweifelhaft.            | I.   | 149  | Hirten                 | III. | 31   |
| <b>Strickgras</b>       | I.   | 85   | kleines                | III. | 30   |
| <b>Stückwurz</b>        | I.   | 516  | Stein.                 | IV.  | 471  |
| <b>Sulla</b>            | IV.  | 556  | <b>Taubenkropf</b>     | III. | 146  |
| <b>Sumpfindorn</b>      | I.   | 53   | <b>Taubnessel</b>      |      |      |
| <b>Sumpfbeere</b>       | II.  | 152  | gefleckte.             | II.  | 612  |
| <b>Sumpfbirse</b>       | I.   | 93   | gelbe                  | II.  | 618  |
| <b>Sumpfdotterblume</b> | II.  | 566  | glatte                 | II.  | 612  |
| <b>Sumpfenian</b>       | I.   | 584  | Gold                   | II.  | 618  |
| <b>Sumpfgras</b>        | IV.  | 32   |                        |      |      |

|                           | Tom.   | Pag.    |                         | Tom.         | Pag. |
|---------------------------|--------|---------|-------------------------|--------------|------|
| <b>Taubnessel</b>         |        |         | <b>Töberich</b>         | I.           | 272  |
| kleine rothe              | II.    | 615     | <b>Tobkraut</b>         | I.           | 272  |
| Sumpf                     | II.    | 626     | <b>Töchterleinsalat</b> | I.           | 73   |
| umfassende                | II.    | 616     | <b>Todtenblume</b>      | I.           | 555  |
| weisse                    | II.    | 614     | gemeine                 | IV.          | 617  |
| <b>Täumel</b>             | I.     | 272     | großblumige             | IV.          | 618  |
| <b>Tausendguldenkraut</b> | I.     | 522     | <b>Todtenkopf</b>       | II.          | 697  |
| kleines                   | I.     | 524     | <b>Todtenkrantz</b>     | I.           | 555  |
| <b>Tausendknotenkraut</b> | II.    | 178     | <b>Todtenmyrthe</b>     | I.           | 555  |
| <b>Tausendkorn</b>        | I.     | 560     | <b>Tollbeere</b>        | I.           | 511  |
| <b>Taxbaum</b>            | III.   | 771     | <b>Tollkörfel</b>       | I.           | 631  |
| <b>Teichrohr</b>          | I.     | 261     | <b>Tollkorn</b>         | I.           | 272  |
| <b>Teufelsabbis</b>       | I.     | 318     | <b>Tollkraut</b>        | I. 505. 507. | 511  |
| <b>Teufelsauge</b>        | I. 507 | II. 529 | Schlutterartig.         | IV.          | 174  |
| <b>Teufelsbeere</b>       | I.     | 511     | <b>Tormentill</b>       |              |      |
| <b>Teufelsmilch</b>       | II.    | 335     | aufrechte               | II.          | 454  |
| <b>Teufelspuppen</b>      | I.     | 514     | liegende                | IV.          | 394  |
| <b>Thee</b>               |        |         | <b>Tozzie</b>           |              |      |
| Jesuitier                 | I.     | 569     | Alpen                   | II.          | 683  |
| spanischer                | I.     | 569     | <b>Trolltraube</b>      | II.          | 544  |
| ungarischer               | I.     | 569     | <b>Traubenkirsche</b>   |              |      |
| wetsindischer             | I.     | 569     | Nordamerikanische       | II.          | 353  |
| wilder                    | I.     | 413     | rothe                   | IV.          | 332  |
| <b>Theriackkraut</b>      | I.     | 68      | schwarze                | II.          | 351  |
| <b>Theernelke</b>         | II.    | 291     | spathblühende           | II.          | 353  |
| <b>Thrinicia</b>          |        |         | <b>Treffzen</b>         | I.           | 272  |
| ausdaurende               | IV.    | 586     | <b>Trespe</b>           |              |      |
| <b>Thurm Kohl</b>         | III.   | 88      | Acker                   | I.           | 239  |
| <b>Thurm kraut</b>        |        |         | aufrechter              | I.           | 237  |
| glatter                   | III.   | 88      | Badischer               | IV.          | 75   |
| rauchhariger              | III.   | 89      | Berg                    | I.           | 242  |
| <b>Thurnsenf</b>          | III.   | 86      | dicker                  | IV.          | 72   |
| <b>Thymian</b>            |        |         | feinhaariger            | I.           | 230  |
| Alpen                     | IV.    | 444     | gefiederter             | I.           | 243  |
| Berg                      | II.    | 647     | Gersten                 | IV.          | 69   |
| Citronen                  | IV.    | 443     | großser                 | I.           | 241  |
| Garten                    | II.    | 647     | Kochischer              | IV.          | 76   |
| gemeiner                  | II.    | 647     | magerer                 | I.           | 245  |
| wilder                    | II.    | 645     | Mauer                   | I.           | 236  |
| <b>Tilläa</b>             |        |         | Queck                   | I.           | 230  |
| Wasser                    | I.     | 395     | rauhhaariger            | I.           | 232  |
| <b>Timotheusgras</b>      | I.     | 134     | Roggen                  | I.           | 224  |



|                      | Tom. | Pag.     |                  | Tom.     | Pag.    |
|----------------------|------|----------|------------------|----------|---------|
| Trespe               |      |          | Veilchen         |          |         |
| Sand                 | I.   | 236      | Pfersingblättr.  | III.     | 518     |
| Scheuchzerscher      | IV.  | 79       | Pfüten           | IV.      | 634     |
| sparrichter          | I.   | 228      | rauchhaariges    | III.     | 513     |
| tauber               | I.   | 234      | Sumpf            | III.     | 513     |
| traubenblüthiger     | IV.  | 74       | wohlriechendes   | III.     | 515     |
| verwechselter        | IV.  | 72       | wunderbares      | III.     | 519     |
| vielblüthiger        | I.   | 226      | Veilwurz         | I.       | 79      |
| weicher              | I.   | 227      | Venuskamm        | I.       | 695     |
| Wiesen               | I.   | 237      | Venusspiegel     | I.       | 480     |
| Trollblume           | II.  | 559      | Bastard          | I.       | 481     |
| Tulpe                |      |          | Vergiftmeinnicht | I.       | 410     |
| wilde                | II.  | 36       | Vernunftkraut    | I.       | 457     |
| Tulpenbaum           | II.  | 504      | Vexierkürbse     | IV.      | 686     |
| Twalch               | I.   | 224. 272 | Vexiernelke      | II.      | 287     |
| Uferlingenkraut      | I.   | 748      | Vielgut          | I.       | 648     |
| Uferrohr             | IV.  | 90       | Viole            |          |         |
| Uferschilf           | IV.  | 90       | Acker            | III.     | 521     |
| Ulme                 | I.   | 579      | gelbe            | III.     | 79      |
| kleinblättrige       | I.   | 581      | Nacht            | III. 81. | 82      |
| Kork                 | I.   | 581      | niederliegend.   | IV.      | 501     |
| rothe                | I.   | 581      | Pfingst          | III.     | 81      |
| Zwerg                | I.   | 579      | Wasser           | I.       | 450     |
| Unform               | IV.  | 536      | Viset            | IV.      | 214     |
| Unserer Frauen Bett- |      |          | Holz             | IV.      | 214     |
| stroh                | I.   | 342      | Vogelbeerbaum    | II.      | 375     |
|                      |      |          | Bastard          | II.      | 377     |
| Vaillantia           |      |          | Vogelfuß         | III.     | 209     |
| klebkrautartige      | III. | 781      | Vogelkraut       |          |         |
| Kreutzblättr.        | III. | 782      | gemeines         | I.       | 750     |
| überzuckerte         | III. | 782      | gelbes           | III.     | 433     |
| Valerianskraut       | I.   | 486      | Vogelmilch       |          |         |
| Veilchen             |      |          | doldenartige     | II.      | 40      |
| Acker                | III. | 521      | gelbe            | II. 37.  | IV. 227 |
| blaue Berg           | III. | 517      | — feinhaarige    | IV.      | 229     |
| Dreyfaltigkeits      | III. | 522      | — Wald           | IV.      | 228     |
| dreyfarbiges         | III. | 522      | — kleine         | II.      | 39      |
| gelb. großblumig.    | III. | 523      | pyrenäische      | II.      | 41      |
| — zweyblüthig.       | III. | 520      | überhängende     | II.      | 42      |
| Hunds                | III. | 516      | Vogelnest        | I. 627.  | III 556 |
| langgesporntes       | III. | 524      | Vogeltraube      | I.       | 544     |
| Märzen               | III. | 515      | Vogelwegtritt    | II.      | 178     |
|                      |      |          | Vulpie           |          |         |

|                   | Tom.    | Pag.     |                    | Tom.   | Pag.     |
|-------------------|---------|----------|--------------------|--------|----------|
| Vulpie            |         |          | Wasseraron         | III.   | 587      |
| Mausschwanzartige | I.      | 9        | Wasserbenedikte    | II.    | 459      |
| Wachholder        |         |          | Wasserbinse        | I.     | 100      |
| gemeiner          | III.    | 768      | Wasserblume        |        |          |
| stinkender        | III.    | 769      | gelbe              | II.    | 481      |
| Virginischer      | IV.     | 707      | kleine             | IV.    | 402      |
| Wachtelweizen     | II.     | 677      | weifse             | II.    | 482      |
| Kammförmiger      | II.     | 675      | Wasserdoste        | III.   | 394      |
| Waldbinse         | I.      | 102. 109 | Wassereppig        | I.     | 732      |
| Waldbocksbart     | II.     | 397      | Wasserfenchel      | I. 49. | 681      |
| Waldeppich        | I.      | 637      | Wasserfuchsschwanz | I.     | 139      |
| Walderbse         |         |          | Wassergauchheil    | I.     | 26       |
| Frühlings         | III.    | 169      | Wassenhanfkraut    | III.   | 388. 394 |
| knollige          | III.    | 171      | Wasserhirse        | I.     | 160      |
| schwarze          | III.    | 171      | Wasserhollunder    | I.     | 737      |
| Waldgeisbart      | II.     | 397      | Wasserhorn         |        |          |
| Waldhirse         | I.      | 141      | spitzfrüchtig      | III.   | 691      |
| Waldkirschbaum    | II.     | 360      | stumpffrüchtig.    | III.   | 691      |
| Waldkletten       | I.      | 15       | Wasserknoblauch    | II.    | 579      |
| Waldmeister       | I.      | 328      | Wasserkresse       | III.   | 59       |
| Gold              | III.    | 782      | Wasserlilie        | I.     | 80       |
| Waldnachtschatten | I.      | 511      | Wasserlinse        | III.   | 600      |
| Waldnelke         | II.     | 292      | Wasserlisch        |        |          |
| Waldnessel        | II.     | 624      | Doldenblumiger     | II.    | 191      |
| Waldrebe          | II.     | 544      | Wassermerk         |        |          |
| brennende         | IV.     | 418      | breitblättr.       | I.     | 668      |
| italiänische      | IV.     | 416      | kleinster          | I.     | 671      |
| spanische         | IV.     | 416      | knotiger           | I.     | 671      |
| wohlriechende     | IV.     | 418      | schmalblättr.      | I.     | 669      |
| Waldrübleinkraut  | I.      | 484      | Wassernabel        | I.     | 603      |
| Waldstern         | II.     | 257      | Wassernufs         | I.     | 370      |
| Waldwurz          | II.     | 200      | Wassernymphe       | II.    | 481      |
| Walkerdistel      | I. 313. | 314      | Wasserpfeffer      | II.    | 174      |
| Wallnufsbaum      |         |          | kleinster          | II.    | 188      |
| gemeiner          | III.    | 701      | Wasserpfrieme      | IV.    | 464      |
| schwarzer         | IV.     | 674      | Wasserportulac     | I.     | 303      |
| Wallwurz          | I.      | 426      | Wasserranken       | I.     | 516      |
| Wandkraut         | III.    | 784      | Wasserschierling   | I.     | 685      |
| Warzenkraut       | I.      | 408      | Wasserschlauch     |        |          |
| Waschkraut        | II.     | 233      | gemeiner           | I.     | 49       |
| Wasserandorn      | I.      | 53       | kleiner            | I.     | 59       |
|                   |         |          | mittlerer          | IV.    | 11       |

|                 | Tom.      | Pag. |                    | Tom. | Pag. |
|-----------------|-----------|------|--------------------|------|------|
| Wasserschmiele  | 1.        | 160  | Weide              |      |      |
| Wasserschwertel | 1.        | 80   | Glas               | III. | 723  |
| Wasserstern     |           |      | Häng               | III. | 725  |
| früher          | 1.        | 5    | kleine schmalblät. | III. | 737  |
| Herbst          | 1.        | 7    | — werft            | III. | 740  |
| mittlerer       | 1.        | 6    | Korb               | III. | 745  |
| Wasserviole     | 1. 450.   | II.  | Krebs              | III. | 728  |
| Wau             | II.       | 317  | kriechende         | III. | 734  |
| gelber          | II.       | 318  | Lavendelblättr.    | IV.  | 700  |
| Waydt           | III.      | 13   | Lorbeer            | III. | 720  |
| Wegdorn         | 1.        | 525  | Mandel             | III. | 722  |
| Wegerich        |           |      | Matten             | III. | 737  |
| Alpen           | IV.       | 119  | Netzblättrige      | IV.  | 698  |
| breiter         | 1.        | 357  | purpur             | III. | 726  |
| Meerstrands     | IV.       | 118  | Rhein              | III. | 728  |
| mittel          | 1.        | 359  | rosmarinblättr     | III. | 738  |
| Ranunkelartig.  | II.       | 128  | rothe              | III. | 729  |
| Sand            | IV.       | 120  | — Korb             | III. | 726  |
| schwimmender    | II.       | 127  | Sahl               | III. | 742  |
| spitzer         | 1.        | 360  | Salbey             | III. | 740  |
| Wasser          | II.       | 126  | schmalblättr.      | III. | 737  |
| — grasblättr.   | IV.       | 256  | schwärzliche       | IV.  | 695  |
| Wegsenf         | III.      | 73   | Silber             | III. | 732  |
| Wegstroh        | 1.        | 342  | Spatelblättr.      | IV.  | 701  |
| Wegwart         | III.      | 351  | Tränen             | III. | 725  |
| gelber          | III.      | 276  | Trauer             | III. | 725  |
| Weichseln       | II.       | 358  | Wasser             | III. | 741  |
| Weide           |           |      | weichblättr.       | III. | 747  |
| ausgerandete    | IV.       | 697  | wellenförmige      | IV.  | 694  |
| Babylonische    | III.      | 725  | Werft              | III. | 744  |
| Bach            | III.      | 728  | weisse             | III. | 748  |
| Band            | III. 721. | 745  | Zwerg              | III. | 730  |
| Baumwollen      | III.      | 720  | Weidenkraut        | II.  | 311  |
| Brand           | III.      | 724  | Weiderich, Alpen   | IV.  | 266  |
| braune          | III.      | 736  | Berg               | II.  | 141  |
| Bruch           | III.      | 723  | gelber             | I.   | 452  |
| dreymännige     | III.      | 719  | großblumiger       | II.  | 138  |
| frühe           | III.      | 724  | Hügel              | IV.  | 265  |
| fünfmännige     | III.      | 720  | kleinblumiger      | II.  | 140  |
| gelbe Gold      | III.      | 721  | rosmarinblättr.    | II.  | 137  |
| gemeine         | III.      | 744  | rosenrother        | IV.  | 264  |
| geöhrte         | III.      | 740  | rother             | II.  | 311  |

|                     | Tom. Pag.       |                           | Tom. Pag. |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| <b>Weiderich</b>    |                 | <b>Wicke</b>              |           |
| schmalblättr.       | II. 135         | Gerardische               | III. 186  |
| Sumpf               | II. 143         | Hecken                    | III. 194  |
| viereckiger         | II. 142         | kleine frühe              | III. 192  |
| weichhaariger       | II. 140         | — rauhe                   | III. 198  |
| Ysopenblättr.       | II. 313         | kleinste                  | III. 192  |
| <b>Weierbinse</b>   | I. 93. 100      | platterbsenartig.         | III. 192  |
| <b>Weinrebe</b>     | I. 546          | schmalblättrig.           | III. 191  |
| <b>Weinraute</b>    | II. 199         | Strauch                   | III. 183  |
| <b>Weintraube</b>   | I. 546          | viersaamige               | III. 197  |
| <b>Weissdorn</b>    | II. 372         | Vogel                     | III. 187  |
| amerikanischer      | IV. 340         | Wald                      | III. 184  |
| einweibiger         | II. 373         | <b>Wiederstofs</b>        | II. 247   |
| <b>Weissglocken</b> | I. 463          | Nacht                     | II. 254   |
| <b>Weisslaub</b>    | II. 368         | <b>Wiesenbenedikte</b>    | II. 459   |
| <b>Weisskraut</b>   | III. 96         | <b>Wiesenbocksbart</b>    | II. 401   |
| <b>Weisswurz</b>    | II. 55          |                           | III. 269  |
| breitblättrige      | II. 57          | <b>Wiesenflachs</b>       | I. 112    |
| gemeine             | II. 57          | <b>Wiesenfuchsschwanz</b> | I. 157    |
| schmalblättr.       | II. 54          | <b>Wiesenknopf</b>        | I. 363    |
| <b>Weizen</b>       |                 | <b>Wiesenkönigin</b>      | II. 401   |
| Bart                | IV. 98. 102     | <b>Wiesenrodel</b>        | II. 667   |
| Bengel              | IV. 100         | <b>Wiesenrohr</b>         | I. 267    |
| Englischer          | I. 289. IV. 101 | <b>Wiesenraute</b>        |           |
| Kolben              | IV. 99. 100     | Akeleiblättr.             | II. 526   |
| Sommer              | I. 286. IV. 98  | gelbe                     | II. 524   |
| Winter              | I. 287. IV. 100 | grofse                    | II. 520   |
| Wunder              | IV. 101         | kleine                    | II. 521   |
| <b>Weizengras</b>   |                 | Morisonische              | IV. 422   |
| Hunde               | I. 299          | schmalblättr.             | II. 522   |
| Lachenalisches      | I. 291          | stinkende                 | IV. 420   |
| Rohr                | I. 293          | <b>Wiesenwolle</b>        | I. 112    |
| <b>Welschkorn</b>   | III. 608        | <b>Wilde Rebe</b>         | II. 544   |
| <b>Wendelbeer</b>   | I. 537          | <b>Wilddost</b>           | II. 640   |
| <b>Wermuth</b>      | III. 402        | <b>Wilder Hirse</b>       | I. 130    |
| Feld                | III. 400        | <b>Willemetie</b>         |           |
| <b>Wicke</b>        |                 | Sand                      | I. 576    |
| Acker               | III. 190        | <b>Winde</b>              |           |
| einjährige          | III. 189        | Acker                     | I. 461    |
| Erbsenartige        | III. 182        | Baum                      | I. 463    |
| Futter              | III. 190        | Feld                      | I. 461    |
| gelbe               | III. 193        | grofse                    | I. 463    |



|                      | Tom. | Pag.     |                     | Tom.               | Pag.     |
|----------------------|------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| <i>Winde</i>         |      |          | <i>Wolfsmilch</i>   |                    |          |
| kleine               | I.   | 461      | rundblättr.         | II.                | 320      |
| Korn                 | I.   | 461      | Sonnenwendend.      | II.                | 328      |
| weisse               | I.   | 463      | susslichte          | II.                | 325      |
| Zaun                 | I.   | 463      | Sumpf               | II.                | 341      |
| <i>Windgras</i>      | I.   | 142      | warzige             | II.                | 329      |
| kleines Acker        | I.   | 143      | weichharrige        | II.                | 330      |
| unterbrochenes       | I.   | 143      | zugespitzte         | II.                | 321      |
| <i>Wintergrün</i>    | I.   | 542. 555 | <i>Wolfstrappe</i>  | II.                | 639      |
| einblumiges          | II.  | 213      | Andornartig.        | IV.                | 442      |
| einseitiges          | II.  | 211      | <i>Wolfswurz</i>    | II.                | 469. 496 |
| großes               | IV.  | 183      | <i>Wollblume</i>    | I.                 | 496      |
| grüngelbes           | IV.  | 284      | <i>Wollgras</i>     | I.                 | 110      |
| kleines              | II.  | 210      | Alpen               | IV.                | 38       |
| mittleres            | IV.  | 283      | dünnes              | IV.                | 39       |
| Rosenfarbig.         | IV.  | 284      | großköpfig.         | IV.                | 37       |
| rundblättrig.        | II.  | 209      | schmalblättr.       | I.                 | 113      |
| Schirmförmig.        | II.  | 212      | Wiesen              | I.                 | 112      |
| <i>Winterkorn</i>    | I.   | 277      | <i>Wollkraut</i>    | I.                 | 496      |
| <i>Winterlolch</i>   | I.   | 270      | Berg                | IV.                | 170      |
| <i>Winterroggen</i>  | I.   | 277      | großes              | I.                 | 498      |
| <i>Wirbeldoste</i>   | II.  | 640      | italiänisches       | I.                 | 498      |
| <i>Wirsing</i>       |      |          | kleinblühend. gelb. | I.                 | 499      |
| grüner               | III. | 96       | — weisses           | I.                 | 500      |
| rother               | III. | 96       | schwarzes           | I.                 | 501      |
| weißser              | III. | 96       | zugespitztes        | IV.                | 169      |
| <i>Wohlgemuth</i>    | II.  | 642      | <i>Wolverley</i>    | III.               | 466      |
| <i>Wolfsbeer</i>     | II.  | 185      | <i>Wucherblume</i>  |                    |          |
| <i>Wolfsbeeren</i>   | I.   | 511      | Alpen               | IV.                | 621      |
| <i>Wolfsbein</i>     | I.   | 53       | Doldentraubige      | III.               | 475      |
| <i>Wolfsfuß</i>      | I.   | 53       | gelbe               | III.               | 477      |
| <i>Wolfskirschen</i> | I.   | 511      | geruchlose          | III.               | 474      |
| <i>Wolfsmilch</i>    |      |          | Hallersche          | IV.                | 620      |
| breitblättrige       | II.  | 332      | schwarzkelchige     | IV.                | 619      |
| brennende            | II.  | 339      | <i>Wunderbaum</i>   |                    |          |
| Cypressen            | II.  | 335      | gemeiner            | IV.                | 683      |
| Gerardische          | II.  | 337      | <i>Wundertraube</i> | IV.                | 181      |
| gemeine              | II.  | 335      | <i>Wundklee</i>     | III.               | 165      |
| große                | II.  | 341      | <i>Wundkr.</i>      | II. 273. 524. III. | 165      |
| Kärntische           | II.  | 327      | Gold                | III.               | 449      |
| kleinste             | II.  | 323      | heidnisch.          | II. 273. III.      | 449      |
| mandelblättr.        | II.  | 333      | rundblättr.         | II.                | 274      |

|                      | Tom. | Pag. |                      | Tom. | Pag. |
|----------------------|------|------|----------------------|------|------|
| <i>Wurmkraut</i>     | II.  | 401  | <i>Zeyland</i>       | II.  | 156  |
|                      | III. | 71.  | <i>Ziegenraute</i>   | IV.  | 558  |
| <i>Wurzelsauger</i>  | II.  | 200  | <i>Zigeunerkraut</i> | I.   | 53.  |
| <i>Wuthbeere</i>     | I.   | 511  | <i>Zinnie</i>        |      |      |
| <i>Wüterich</i>      | I.   | 631. | vielblüthige         | IV.  | 626  |
| giftiger             | I.   | 685  | wenigblühende        | IV.  | 625  |
| <i>Ysop</i>          | II.  | 587  | <i>Zirnet</i>        | IV.  | 203  |
| <i>Zahntrost</i>     | II.  | 672  | <i>Zittergras</i>    |      |      |
| <i>Zahnwurz</i>      |      |      | kleines              | I.   | 201  |
| Bollentragende       | III. | 50   | <i>Wiesen</i>        | I.   | 200  |
| gefingerte           | III. | 52   | <i>Zitterwurz</i>    | II.  | 95   |
| siebenblättr.        | III. | 51   | <i>Zuckerwurz</i>    | I.   | 673  |
| <i>Zannichellia</i>  | III. | 589  | <i>Zürbelbaum</i>    | IV.  | 678  |
| <i>Zapfenkraut</i>   | II.  | 574  | <i>Zürbelfichte</i>  | IV.  | 678  |
| stengelumfassend.    | IV.  | 225  | <i>Zwergmispel</i>   | II.  | 383  |
| <i>Zäpfleinkraut</i> | I.   | 476  | <i>Zweyblatt</i>     | II.  | 58   |
| <i>Zaunreis</i>      | I.   | 353  | <i>Zweyzahn</i>      | III. | 390  |
| <i>Zaunrübe</i>      |      |      | <i>Zwetschenbaum</i> | II.  | 361  |
| rothbeerige          | III. | 713  | <i>Zwiebel</i>       |      |      |
| schwarzbeerige       | III. | 712  | gemeine              | II.  | 28   |
| <i>Zaunwurz</i>      | III. | 713  | <i>Rohrenlauch</i>   | II.  | 29   |
| <i>Zehrhwurz</i>     | II.  | 64   | <i>Winter</i>        | II.  | 29   |
| <i>Zeitlose</i>      | II.  | 123  | <i>Zymbelkraut</i>   | II.  | 688  |
| Berg                 | II.  | 124  |                      |      |      |

# INDEX PLANTARUM

## ALPHABETICUS NOMINA

### OFFICINALIA COMPLECTENS.

|                         | Tom. | Pag. |                        | Tom. | Pag. |
|-------------------------|------|------|------------------------|------|------|
| Abietis Coni            | III. | 711  | Alkekengi Baccae       | I.   | 515  |
| Ramusculi               | III. | 711  | Alliariae Herb.        | III. | 76   |
| Resina                  | III. | 711  | Allii Rad.             | II.  | 16   |
| Thus                    | III. | 711  | Alni Cort. Fol.        | III. | 678  |
| Abrotani Herba          | III. | 399  | Alsine Herb.           | I.   | 750  |
| Absinthii Herb.         | III. | 403  | Althaeae Rad. Herb.    |      |      |
| Pontici Herb.           | III. | 402  | Flor.                  | III. | 132  |
| Acaciae nostratis Cort. | II.  | 364  | Amygdalae amarae       | II.  | 367  |
| Flor. Fruct.            | II.  | 364  | dulces                 | II.  | 367  |
| Acetosae Rad. Herb.     | II.  | 112  | Anacampserotis Herb.   | II.  | 275  |
| Semina                  | II.  | 112  | Anagallidis Herb.      | I.   | 457  |
| romanae Herb.           | II.  | 108  | aquat. Herb.           | I.   | 27   |
| rotundifoliae Herb.     | II.  | 108  | Angelicae Rad. Sem.    | IV.  | 208  |
| Acetosellae Herb.       | II.  | 284  | sylvestris Rad.        | I.   | 667  |
| Sal                     | II.  | 284  | Anethi Herb. Flor.     |      |      |
| Acinos Herb.            | II.  | 648  | Sem.                   | IV.  | 211  |
| Aconiti Herb. II. 498.  | IV.  | 411  | Anisi Sem.             | IV.  | 212  |
| Rad.                    | II.  | 497  | Anserinae Herb. Rad.   | II.  | 442  |
| hyemalis Rad.           | IV.  | 431  | Antidysentericae Rad.  | III. | 51   |
| Acori adulterini Rad.   | I.   | 82   | Anthos Flor.           | IV.  | 14   |
| palustris Rad.          | I.   | 82   | Aparines Herb.         | I.   | 354  |
| Actes grana             | I.   | 741  | Apii Herb. Rad. Sem    | I.   | 733  |
| Acus muscata            | III. | 111  | Aquifolii Bacc. Fol.   | I.   | 377  |
| Adonidis Flor. Sem.     | II.  | 529  | Aquilegiae Herb. Flor. |      |      |
| Agaricus Larvcis        | III. | 709  | Sem.                   | II.  | 501  |
| Agrimoniae Herb.        | III. | 316  | Arboris Vitae Frondes. | IV.  | 682  |
| odoratae Fol.           | IV.  | 327  | Ari Rad.               | III. | 586  |
| Alceae Herb. Rad.       | III. | 138  | Aristolochiae cavae    |      |      |
| Alchemillae Herb. Rad.  | I.   | 373  | Rad.                   | III. | 145  |

|                                | Tom. Pag. |                               | Tom. Pag.     |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| <b>Aristolochiae</b>           |           | <b>Berulae Herba</b>          | I. 670        |
| fabaciae Rad.                  | III. 146  | <b>Betae candidae Rad.</b>    |               |
| vulgaris Rad. Herb.            | III. 577  | Fol.                          | I. 575        |
| <b>Armoraciae Rad.</b>         | III. 42   | rubrae Rad. Fol.              | I. 575        |
| <b>Arnicae Herb. Flor.</b>     |           | <b>Betonicae Herb. Rad.</b>   | II. 625       |
| Rad.                           | III. 467  | <b>Betulae Folia</b>          | III. 676      |
| suedensis Herb.                | III. 460  | liquor. s. Lympha             | III. 676      |
| <b>Artemisiae albæ Herb.</b>   | III. 404  | <b>Bistortae Rad.</b>         | II. 167       |
| rubrae Herb.                   | III. 404  | <b>Blattariae Folia</b>       | I. 503        |
| <b>Arundinis vulgar. Rad.</b>  | I. 262    | <b>Boni Henrici Herb.</b>     | I. 563        |
| <b>Asari Herb. Rad.</b>        | II. 310   | <b>Boraginis Herb. Flor.</b>  | I. 430        |
| <b>Asparagi Rad. Sem.</b>      | II. 50    | <b>Botryos chamaedrioides</b> |               |
| <b>Asperulae aureae Herb.</b>  | III. 783  | Herb.                         | II. 577       |
| <b>Asteris Attici Herb.</b>    | III. 447  | Mexicanæ Herb.                | I. 570        |
| <b>Astrantiae Rad.</b>         | I. 607    | <b>Brancae ursinae Rad.</b>   |               |
| <b>Atriplicis olidae Herb.</b> | I. 572    | Herb.                         | I. 661        |
| <b>Auriculae muris Herb.</b>   |           | <b>Brassica capitata alba</b> | III. 97       |
| Flor.                          | III. 308  | — rubra                       | III. 97       |
| ursi Flor. Herb. Rad.          | I. 445    | <b>Brignolensia Pruna</b>     | II. 361       |
| <b>Avena, s. Avenae Sem.</b>   | I. 253    | <b>Britannicae Herb. Rad.</b> | II. 106       |
| <b>Balsamitae Herb.</b>        | IV. 604   | <b>Bryoniae Rad. Turion</b>   |               |
| <b>Balsamum canadense</b>      | IV. 680   | III. 713.                     | 714           |
| <b>Barbae Caprae Fol.</b>      |           | Bacc. Sem.                    | III. 713. 714 |
| Flor. Rad.                     | II. 398   | nigrae Rad.                   | III. 759      |
| Hirci Rad.                     | III. 269  | <b>Buglossi Herb. Flor.</b>   |               |
| <b>Barbareae Fol.</b>          | III. 75   | Rad.                          | I. 418        |
| <b>Bardanae Fol. Rad.</b>      |           | sylvestr. Rad.                | I. 432        |
| Sem.                           | III. 354  | <b>Bugulae Herb.</b>          | II. 572       |
| <b>Basilici Herb.</b>          | II. 658   | <b>Bulbus Salep</b>           | III. 535      |
| <b>Beccabungae Herb.</b>       | I. 26     | <b>Bulbocastani Rad.</b>      | I. 630        |
| <b>Bedeguar Fungus</b>         | II. 423   | <b>Bulbocodii Rad.</b>        | II. 9         |
| <b>Been album</b>              | II. 248   | <b>Bupleuri Herb. Sem.</b>    | I. 611        |
| <b>Belladonnae Bacc.</b>       |           | <b>Bursae Pastoris Herb.</b>  | III. 32       |
| Herb. Rad.                     | I. 512    | <b>Buxi Folia</b>             | III. 681      |
| <b>Bellidis minor. Herb.</b>   |           | <b>Calami aromatici Rad.</b>  | II. 65        |
| Flor.                          | III. 472  | vulgaris Rad.                 | II. 65        |
| majoris Herb. Flor.            | III. 473  | <b>Calaminthae Herb.</b>      | II. 653       |
| <b>Berberum Cort. med.</b>     |           | IV. 445                       |               |
| Bacc. Sem.                     | II. 91    | grandiflor. Herb.             | II. 651       |
|                                |           | praestantior. Herb.           | II. 651       |
|                                |           | <b>Calcitrapae Rad. Herb.</b> |               |
|                                |           | Sem.                          | III. 506      |



|                         | Tom. Pag. |                          | Tom. Pag. |
|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Calendulae Flor.        | III. 509  | Cerasorum rubr. acid.    |           |
| Calthae palustr. Flor.  |           | Stipites                 | II. 338   |
| Herb.                   | II. 566   | nigror. dulc. Fruct.     | II. 360   |
| Camelinae Herba         | III. 10   | — — Gummi                | II. 360   |
| Camphoratae Congener.   | I. 76     | Cerefolii Herb. Sem.     | I. 698    |
| Cannabis Semina         | III. 756  | Cervariae nigrae Rad.    |           |
| sylvestris Herba        | II. 622   | Sem.                     | I. 647    |
| Caprifol. ital. Cort.   |           | Cervicariae majoris Fol. | I. 477    |
| Flor.                   | I. 488    | minoris Fol.             | I. 478    |
| — — Fol.                |           | Chamaedris spuriae       |           |
| Baccae                  | I. 488    | maris Herb.              | I. 29     |
| german. Cort. Flor.     | I. 490    | Chamaedris spuriae       |           |
| — Fol. Baccae           | I. 490    | — foeminae               | H. I. 34  |
| Cardamines Herb. Flor.  |           | Chamaedrios Herba        | II. 581   |
| III.                    | 57        | Chamaepithyos Herb.      | II. 576   |
| amarae Herb.            | III. 58   | Chamomillae Flor. Herb.  |           |
| Cardiacae Herb.         | II. 639   | III.                     | 480       |
| Cardui Benedict. Herb.  |           | Cheiri Flores            | III. 79   |
| III.                    | 505       | Chelidonii majoris       |           |
| Mariae Rad. Herb.       |           | Herb. Rad.               | II. 471   |
| Sem.                    | III. 366  | minoris Herb. Rad.       | II. 537   |
| tomentosi Herb.         | III. 384  | Chrysosplenii Herb.      | II. 215   |
| Carlinae Rad.           | III. 386  | Christophoriana Rad.     | II. 469   |
| Caricis arenariae Rad.  | III. 613  | Ciceris Sem. alba        | IV. 550   |
| hirtae Rad.             | III. 674  | — rubra                  | IV. 550   |
| Carthami Flor. Sem.     | IV. 597   | Cichorii Rad. Herb.      |           |
| Carvi Semina            | I. 721    | Flor. Sem.               | III. 351  |
| Caryophyllatae Rad.     | II. 458   | Ciclae Rad. Folia        | I. 575    |
| Caryophylli rubr. Flor. |           | Cicutae Herb.            | I. 633    |
| IV.                     | 302       | aquaticae Herb.          | I. 686    |
| Cataputiae major. Sem.  |           | Cicutariae Herb.         | I. 699    |
| IV.                     | 684       | odoratae Rad. Herb.      |           |
| minoris Sem.            | II. 325   | Sem.                     | I. 694    |
| Catariae Herba          | II. 589   | Circaeae Folia           | I. 16     |
| Caudae murinae Herb.    | I. 768    | Clematis sylvestr. Rad.  | II. 519   |
| Centaurii lutei Herb.   | II. 146   | Clinopodii Herb.         | II. 648   |
| minor. Herb. Summit.    |           | majoris Herb.            | II. 641   |
| I.                      | 523       | Coccognidii Semina       | II. 157   |
| Centumnodiae Herb.      | II. 179   | Cochleariae Herb.        | III. 41   |
| Cepae Rad.              | II. 28    | Colchici Rad. Sem.       | II. 124   |
| Cerasorum rubr. acid.   |           | Colophonium Pini         | III. 707  |
| Fruct.                  | II. 338   | Coluteae Folia           | III. 262  |
|                         |           | Colu-                    |           |

|                                  | Tom. | Pag. |                                 | Tom. | Pag. |
|----------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| <b>Coluteae</b>                  |      |      | <b>Ebuli Bacc. Flor.</b>        | I.   | 740  |
| <i>scorpioidis</i> Fol.          | III. | 204  | Fol. Rad.                       | I.   | 740  |
| <b>Conii</b> Herb.               | I.   | 633  | <b>Echii</b> Herb. Rad. Sem.    | I.   | 434  |
| <b>Consolidae</b> majoris        |      |      | <b>Elaterium</b> alb. nigrum    | IV.  | 686  |
| Rad. Herb. Flor.                 | I.   | 427  | <b>Elatines</b> Herb.           | II.  | 690  |
| mediae Herb.                     | II.  | 572  | folio subrotund.                |      |      |
|                                  | 573. | 574  | Herb.                           | II.  | 691  |
| <i>regalis</i> Herb. Flor.       | II.  | 494  | <b>Enulae campanæ</b> Rad.      | III. | 457  |
| <i>Saracenicae</i> Herb.         | III. | 444  | <b>Epithymi</b> Herb.           | I.   | 375  |
| <b>Convolvuli</b> maj. Herb.     | I.   | 463  | <b>Erucae</b> Semina            | IV.  | 515  |
| minoris Herb.                    | I.   | 462  | <b>Ervi</b> Semina              | IV.  | 549  |
| <b>Conyzae</b> major. Folia      | III. | 422  | <b>Eryngii vulgaris</b> Rad.    | I.   | 602  |
| mediae Herb.                     | III. | 460  | <b>Erysimi</b> Herb. Sem.       | III. | 73   |
| <b>Coriandri</b> Semina          | I.   | 692  | <b>Esulae</b> major Rad.        | II.  | 342  |
| <b>Cotulae</b> foetid. Herb.     |      |      | — Cortex                        |      |      |
| Flor.                            | III. | 483  | Radiciis                        | II.  | 342  |
| <b>Cotyledon.</b> aquat. Herb.   | I.   | 604  | minor. Herb.                    | II.  | 336  |
| <b>Crocus</b> orientalis         | IV.  | 19   | rotundifol. Herb.               | II.  | 321  |
| <b>Cruciatae</b> Herb.           | III. | 783  | <b>Eupatorii</b> Rad. Herb.     | III. | 395  |
| <b>Cucumis</b> asininus          | IV.  | 686  | <b>Euphorb.</b> cypressin.      | II.  | 336  |
| <b>Cucumeris</b> Semina          | IV.  | 692  | vulgaris                        | II.  | 336  |
| <b>Cucurbitae</b> Semina         | IV.  | 688  | <b>Euphrasiae</b> Herb.         | II.  | 672  |
| <b>Cuscutae</b> Herb.            | I.   | 375  | rubrae Herb.                    | II.  | 673  |
| <b>Cyani</b> Flores              | III. | 499  | <b>Euonymi</b> Fructus          | I.   | 532  |
| <b>Cydoniae</b> Fruct. Sem.      | II.  | 390  | <b>Fabae</b> Flor. Sem. Stipit. |      |      |
| <b>Cymbalariae</b> Folia.        | II.  | 689  |                                 | III. | 196  |
| <b>Cynanchicae</b> Rad.          | I.   | 332  | <b>Farfarae</b> Fl. Fol. Rad.   | III. | 428  |
| <b>Cynoglossi</b> Rad. Herb.     | I.   | 420  | <b>Filipendulae</b> Herb. Rad.  |      |      |
| <b>Cynosbati</b> Fruct.          | II.  | 423  |                                 | II.  | 400  |
| <b>Damascaena</b> Pruna          | II.  | 361  | <b>Flammulae</b> Herb.          | II.  | 533  |
| <b>Daturae</b> Herb. Sem.        | I.   | 505  | Jovis Herb.                     | IV.  | 420  |
| <b>Dauci</b> cretic. Sem.        | I.   | 646  | <b>Foeniculi</b> aquat. Sem.    | I.   | 682  |
| sylvestr. Sem.                   | I.   | 628  | vulg. Herb. Rad.                |      |      |
| <b>Dentariae</b> Rad.            | II.  | 682. | Sem.                            | I.   | 719  |
| <b>Dictamni</b> albi Rad.        | II.  | 197  | <b>Foenugraeci</b> Semina       | IV.  | 570  |
| <b>Digitalis</b> Flor. Fol. Rad. | II.  | 704  | <b>Fragariae</b> Bacc. Herb.    |      |      |
| <b>Dipsaci</b> Rad.              | I.   | 313  | Rad.                            | II.  | 440  |
| <b>Doronici</b> Rad.             | III. | 469  | <b>Frangulae</b> Bacc. Cort.    | I.   | 527  |
| <b>Dracunculi</b> Herb.          | III. | 405  | <b>Fraxinellae</b> Rad.         | II.  | 197  |
| <b>Dulcamarae</b> Fol. Stipit.   |      |      | <b>Fraxini</b> Cort. Fol. Sem.  | III. | 794  |
|                                  | I.   | 516  | <b>Fumariae</b> Herb.           | III. | 147  |

|                          | Tom. | Pag. |                         | Tom. | Pag. |
|--------------------------|------|------|-------------------------|------|------|
| Galegae Herb.            | IV.  | 559  | Hepaticae albae Herb.   |      |      |
| Galii albi Summit.       | I.   | 346  | Flor                    | I.   | 752  |
| lutei Summit.            | I.   | 343  | nobilis Herb. Flor.     | II.  | 507  |
| rotundifolii Herb.       | I.   | 353  | stellatae Herb.         | I.   | 328  |
| Gallithrichi Folia       | IV.  | 19   | Herba Costa             | III. | 344  |
| Gei urbani Rad.          | II.  | 458  | Herbae Britannicae Rad. |      |      |
| rivalis Rad.             | II.  | 459  | Fol.                    | II.  | 106  |
| Genistae Scopar. Sum-    |      |      | Herniariae Herba        | I.   | 560  |
| mit.                     | III. | 154  | Hippocastani Cort.      |      |      |
| — Scopar. Fol.           |      |      | Fruct.                  | II.  | 130  |
| Flor. Sem.               | III. | 154  | Hirundinariae Herb.     |      |      |
| Herb. Flor. Sem.         |      |      | Rad.                    | I.   | 559  |
|                          | III. | 157  | Hordeum s. Hord.        |      |      |
| Gentianae alb. Rad.      | I.   | 657  | Sem.                    | I.   | 280  |
| Asclepiadeae Rad.        | I.   | 589  | Hormini pratens. Herb.  | I.   | 56   |
| Cruciatae Rad. Herb.     |      |      | sativi Folia            | IV.  | 19   |
|                          | I.   | 600  | Hydrolapathi Fol. Rad.  | II.  | 106  |
| rubrae Rad.              | I.   | 586  | Hydropiperis Herba      | II.  | 175  |
| Gentianellae Herb.       | I.   | 597  | Hyoscyami Herb. Rad.    |      |      |
| alpin. magn. flore       |      |      | Sem.                    | I.   | 508  |
| Rad.                     | I.   | 592  | Hyperici Herb. Flor.    |      |      |
| Geranii Robertiani       |      |      | Sem.                    | III. | 255  |
| Herb.                    | III. | 121  | Hyssopi Herba           | II.  | 587  |
| Globulariae Folia        | I.   | 310  | Iacobaeae Herba         | III. | 439  |
| Glycirrhizae sylv. Herb. |      |      | Imperatoriae Herb.      |      |      |
| Sem.                     | III. | 215  | Rad.                    | I.   | 709  |
| Gnaphalii Flor.          | III. | 411  | Iridis nostratis Rad.   | I.   | 80   |
| Graminis Rad.            | I.   | 297  | Isatis Folia            | III. | 14   |
| Gratiolae Herb. Rad.     | I.   | 46   | Iuglandis Fol. Cort.    |      |      |
| Halicacabi Baccae        | I.   | 515  | exter.                  | III. | 701  |
| Hederae arbor. Bacc.     | I.   | 542  | Fruct. immaturi.        | III. | 701  |
| — Lignum.                |      |      | Iunci floridi Rad. Sem. | II.  | 192  |
| Fol Gumm.                | I.   | 542  | maximi Rad. Sem.        | I.   | 101  |
| terrestris Herb.         | II.  | 610  | Iuniperi Lignum.        | III. | 769  |
| Helenii Rad.             | III. | 457  | Summit. Bacc.           | III. | 769  |
| Helianthemi Fol.         | II.  | 489  | Lactucae Semina         | III. | 290  |
| Heliotropii Fol. Sem.    | I.   | 408  | virosae Herb.           | III. | 292  |
| Hellebori albi Rad.      | IV.  | 710  | Lamii albi Flor.        | II.  | 614  |
| foetidi Herb.            | II.  | 565  | sylvat. foetidi Herb.   | II.  | 625  |
| Hippocrat. Rad.          | II.  | 531  | Lamsanae Herb.          | III. | 350  |
| nig. Rad.                | II.  | 562  | Lapathi acuti Rad.      |      |      |
| viridis Rad.             | II.  | 563  | Sem.                    | II.  | 102  |



|                           | Tom.        | Pag. |                         | Tom. | Pag.     |
|---------------------------|-------------|------|-------------------------|------|----------|
| Lapathi crisp Rad. Fol.   | II.         | 97   | Malvae sylvestris Herb. |      |          |
| sanguinei Herb. R.        | II.         | 96   |                         | III. | 136      |
| Lappae minoris Herb.      |             |      | vulgaris Herb. Flor.    |      |          |
| Sem.                      | III.        | 687  | Sem.                    | III. | 135      |
| Laureolae Cortex          | II.         | 159  | Marrubii albi Herb.     | II.  | 638      |
| Lavandulae Herb. Flor.    | II.         | 590  | agrestis Folia          | II.  | 629      |
| Lentibulariae Folia       | I.          | 50   | aquatici Herba          | I.   | 54       |
| Lentilii Semina           | III.        | 198  | — acuti Herb.           | II.  | 626      |
| Lepidii latifol. Rad.     | III.        | 21   | nigri Herba             | II.  | 635      |
| — Fol.                    | III.        | 21   | Martagon Rad.           | II.  | 35       |
| Levistici Herb. Rad.      |             |      | Matricariae Herb.       |      |          |
| Sem.                      | I.          | 664  | Flor.                   | III. | 479      |
| Levcoji bulbosi Rad.      | II.         | 7    | Matrisylvae Herba.      | I.   | 328      |
| Ligustri Flor. Fol.       | I.          | 13   | Meliloti Herb. Flor.    |      |          |
| Lilae Semina              | I.          | 14   | Sem.                    | III. | 219      |
| Lilii s. Lilii albi Flor. | IV.         | 223  | Melissae citrinae Herb. |      |          |
| — — — Rad.                | IV.         | 223  |                         | II.  | 650      |
| — — — Anth.               | IV.         | 223  | Nepetae Herb.           | II.  | 654      |
| Lilii Convallii Flor.     |             |      | Plinii Herb.            | II.  | 656      |
| Bacc.                     | II.         | 52   | Tragi Herb.             | II.  | 656      |
| Lilioasphodeli Flor.      | IV.         | 235  | Mei athamantini Rad.    |      |          |
| Linariae Herba            | II.         | 695  | Sem.                    | I.   | 691      |
| Lini cathartici Herb.     | I.          | 760  | Menthae acutae Herb.    | II.  | 596      |
| sativi Semina             | I.          | 756  | aquaticae               | —    | II. 600  |
| Linnaeae Herba            | IV.         | 458  | Balsaminae              | —    | II. 601  |
| Lithospermi Sem.          | I.          | 414  | crispae                 | —    | II. 598  |
| Lolii Semina              | I.          | 273  | longifoliae             | —    | II. 594  |
| Lupini Semina             | IV.         | 539  | piperitae               | —    | IV. 438  |
| Lupuli Coni               | III.        | 757  | Pulegii                 | —    | II. 609  |
| Turiones                  | III.        | 757  | romanae                 | —    | II. 596  |
| Luteolae Folia            | II.         | 317  | rotundifoliae           | —    | II. 597  |
| Lysimachiae luteae        |             |      | sylvestris              | —    | II. 607  |
| Herb.                     | I.          | 452  | Menthastri Herba        | II.  | 594      |
| Rad.                      | I. 452. IV. | 155  | Mercurialis             | —    | III. 766 |
| Chamaenerion Rad.         |             |      | Mespili Fruct. Sem.     | II.  | 382      |
| Fol.                      | II.         | 136  | Meu Rad. Sem.           | I.   | 691      |
| purpureae Herb.           |             |      | Mezerei Cort. Rad.      | II.  | 157      |
| Rad. Flor.                | II.         | 312  | Milii Semina            | I.   | 133      |
| Malvae arbor. Flor.       | II.         | 134  | Solis Sem.              | I.   | 414      |
| majoris Herb.             | III.        | 136  | Millefolii Herb. Sum-   |      |          |
| minoris Herb. Flor.       |             |      | mit.                    | III. | 488      |
| Sem.                      | III.        | 135  | nobil. Herb. Sum.       | III. | 489      |



|                        | Tom.         | Pag. |                         | Tom. | Pag. |
|------------------------|--------------|------|-------------------------|------|------|
| Monardae Herba         | IV.          | 13   | Oxyacanthae Fruct.      | II.  | 372  |
| Mori Cort. Baccæ       | IV.          | 669  | Oxycoccos Bacc.         | II.  | 153  |
| Morsus Diaboli         | I.           | 319  | Oxylapathi Rad. Sem.    | II.  | 102  |
| Moschatae Herba        | III.         | 111  | Padi Cortex             | II.  | 352  |
| Moschatellinae Rad.    | II.          | 187  | Paeoniae Flor. Rad.     |      |      |
| Mutellinae Herba       | IV.          | 607  | Sem.                    | II.  | 492  |
| Myagri Herb. Sem.      | III.         | 10   | Palmae Christi Oleum    | IV.  | 684  |
| Myrrhidis maj. Herb.   |              |      | Papaveris albi capita   | II.  | 480  |
| Sem. Rad.              | I.           | 694  | — Herb.                 |      |      |
| Myrtilli Baccæ         | II.          | 147  | Opium. Sem.             | II.  | 480  |
| Napelli Herba          | II.          | 498  | corniculati Rad.        | II.  | 474  |
| Napi Sem.              | III.         | 94   | erratici Flor.          | II.  | 478  |
| Narcissi Rad. Flor.    | II.          | 8    | nigri Herb. capita.     |      |      |
| majoris Rad.           | II.          | 9    | Sem.                    | II.  | 479  |
| Pseudonarcissi Rad.    | II.          | 9    | — Opium                 | II.  | 479  |
| Nasturtii aquat. Herb. | III.         | 60   | Rhaeadis Flor.          | II.  | 478  |
| hortensis Herb. Sem.   |              |      | Paralyseos Herb. Flor.  |      |      |
|                        | III.         | 20   | Rad.                    | I.   | 440  |
| indici Flor. Fruct.    | IV.          | 262  | Paridis Herb. Bacc.     | II.  | 185  |
| majoris amari Herb.    | III.         | 58   | Parietariae Herb.       | III. | 784  |
| petraei Herb.          | II.          | 215  | Parnassiae Flor. Herb.  | I.   | 752  |
| pratensis — Flor.      | III.         | 57   | Pastinacae Rad. Sem.    | I.   | 717  |
| verrucosi —            | III.         | 44   | Patientiae Rad.         | II.  | 95   |
| Nepetae Herba          | II. 589. IV. | 446  | Pedicularis Herb.       | II.  | 687  |
| Nicotianae Folia Sem.  | I.           | 509  | Pedis Cati Flores       | III. | 411  |
| Nigellae Sem.          | II.          | 503  | Pentaphylli Herb. Rad.  | II.  | 452  |
| Nucis aquat. Fruct.    | I.           | 371  | Peponis Sem.            | IV.  | 689  |
| Nummulariae Herb.      | I.           | 456  | Perfoliatae Herb. Sem.  | I.   | 609  |
| Nymphaeae alb. Rad.    |              |      | Percepier Herba         | I.   | 4    |
| Flor.                  | II.          | 482  | Persicae Fruct. Nucl.   |      |      |
| luteae Rad. Fol.       | II.          | 481  | Flor. Fol.              | II.  | 366  |
| Onagrae Folia          | II.          | 134  | Persicariae acid. Herb. | II.  | 170  |
| Ononidis Herb.         | III.         | 162  | mitis Herba             | II.  | 173  |
| Rad. Herb.             | III.         | 163  | urentis —               | II.  | 175  |
| Onopordi Herb.         | III.         | 384  | Petasitidis Rad.        | III. | 431  |
| Oreoselini Herb. Rad.  |              |      | Petroselini Herb. Rad.  |      |      |
| Sem.                   | I.           | 649  | Sem.                    | I.   | 731  |
| Origani vulg. Herb.    | II.          | 643  | Peucedani Rad.          | I.   | 651  |
| Ornithogali Rad.       | II.          | 38   | Phalangii ramosi Herb.  |      |      |
| Orobanche Flor. Rad.   | II.          | 714  | Fl. Sem.                | II.  | 47   |
| Orobi Farina           | IV.          | 549  | non — — —               | II.  | 49   |

|                          | Tom. | Pag. |                        | Tom.     | Pag. |
|--------------------------|------|------|------------------------|----------|------|
| Phellandrii Semina       | I.   | 682  | Porri Semina           | II.      | 12   |
| Philadelphi Flores       | II.  | 350  | Portulacae Sem.        | II.      | 344  |
| Phu Radix                | I.   | 69   | Primulae Veris Herb.   |          |      |
| minoris Rad.             | I.   | 65   | Flor. Rad.             | I.       | 440  |
| Pilosellae Herb. Flor.   | III. | 308  | Pruna Damascaena       | II.      | 361  |
| Flores                   | III. | 411  | Gallica                | II.      | 361  |
| Pimpinellae albae Rad.   |      |      | Prunellae Herba        | II.      | 661  |
| Herb. Sem.               | I.   | 724  | Pseudo - Rhabarbar.    |          |      |
| italicae Rad.            | I.   | 364  | Rad.                   | II.      | 110  |
| — Herba                  | III. | 696  | Ptarmicae Rad. Herb.   |          |      |
| majoris Rad.             | I.   | 726  | Flor.                  | III.     | 486  |
| minoris Herb.            | III. | 696  | Pulegii Herba          | II.      | 609  |
| nigrae Rad. Herb.        |      |      | Pulmonariae macul.     |          |      |
| Sem.                     | I.   | 724  | Herb.                  | I.       | 424  |
| Pinguiculae Folia        | I.   | 48   | Pulsatillae Herba      | II.      | 510  |
| Pini Liber               | III. | 707  | nigricant. Herb.       | IV.      | 412  |
| Resina alba              | III. | 707  | Pyri sylvest. Fruct.   | II.      | 385  |
| — communis               |      |      | Pyrolae Herba          | II.      | 210  |
| Turiones                 | III. | 707  | Quercus Cortex Fol.    | III.     | 698  |
| Pix atra                 | III. | 707  | Glandes                | III.     | 699  |
| Burgundica               | III. | 711  | Ranunculi acris Folia  | II.      | 546  |
| liquida                  | III. | 707  | — albi Herba           | II.      | 516  |
| Plantaginis aquat. Herb. |      |      | bulbosi Bulbus         | II.      | 546  |
| Rad.                     | II.  | 126  | flammei maj. Rad.      |          |      |
| angustifol. Fol. Rad.    |      |      | Herb.                  | II.      | 536  |
| Sem.                     | I.   | 361  | palustris Folia        | II.      | 540  |
| latifol. Fol. Rad.       |      |      | pratensis Folia        | II.      | 546  |
| Sem.                     | I.   | 358  | Rapae s. Rapi Rad.     | III.     | 95   |
| mediae Fol. Rad.         |      |      | Raphani rusticani Rad. |          |      |
| Sem.                     | I.   | 360  | Radix                  | III.     | 42   |
| Pneumonanthe Rad.        |      |      | Resedae Rad.           | II.      | 318  |
| Flor.                    | I.   | 591  | Resina alba            | III.     | 707  |
| Podagrariae Herba        | I.   | 734  | communis               | III.     | 707  |
| Polii montan. Herb.      | II.  | 583  | Restae Bovis Herb.     | III.     | 162  |
| Polygalae amarae Herb.   |      |      | Rhabarbari Monachor.   |          |      |
| c. Rad.                  | III. | 151  | Rad.                   | II.      | 110  |
| vulgaris Herb. Rad.      |      |      | Moscovit. Rad.         | IV.      | 276  |
| III.                     | 150  |      | Rhapontici Rad.        | IV.      | 274  |
| Polygoni Herba           | II.  | 179  | Rhei Moscovit. Rad.    |          |      |
| Populi Oculi, Gemmae     |      |      | IV.                    | 276. 777 |      |
| III.                     | 761  |      |                        |          |      |

|                        | Tom.         | Pag. |                          | Tom.         | Pag.     |
|------------------------|--------------|------|--------------------------|--------------|----------|
| Rhei Rhapont. Rad.     | IV.          | 274  | Saponariae Herb. Rad.    | II.          | 233      |
| sibirici Rad.          | IV.          | 277. | Saturejae Herba          | II.          | 586      |
| Rhododendri ferrugin.  |              |      | Satyrii Radix            | III.         | 529      |
| Fol.                   | IV.          | 281  | Saxifragae alb. Sem.     | II.          | 222      |
| Ribium nigr. Bacc.     |              |      | rubrae Herb. Rad.        | II.          | 400      |
| Supit. Fol.            | I.           | 537  | Scabiosae Herb. Flor.    | I.           | 323      |
| rubr. Bacc.            | I.           | 535  | Scirpi major. Rad. Sem.  | I.           | 101      |
| Ricini Oleum           | IV.          | 684  | Sclareae Folia           | IV.          | 19       |
| Semina                 | IV.          | 684  | Scordii Herb.            | II. 580. IV. | 432      |
| Rorellae Herba         | I.           | 763  | Scorodoniae Herba        | II.          | 578      |
| Roris Solis Herb.      | I.           | 763  | Scorzonerae Rad.         | III.         | 274      |
| Rosae albae Flor.      | II.          | 428  | Scrophulariae Fol. Rad.  | II.          | 699      |
| Damascaenae Flor.      | II.          | 430  | Herba                    | II.          | 700      |
| rubrae Flor.           | II.          | 407  | Secale s. Secalis Sem.   | I.           | 277      |
| sylvestr. Flor.        | II.          | 428  | Sedi albi Herb.          | II.          | 278      |
| Rosmarini Flor. Herb.  | IV.          | 14   | acris —                  | II.          | 279      |
| sylvestr. Herb.        | II.          | 203  | minoris —                | II.          | 278. 279 |
| Rubi Bati Fol.         | II.          | 437  | tridactylitis Herb.      | II.          | 224      |
| Idaei Baccae           | II.          | 434  | Sempervivi Herba         | II.          | 345      |
| Morae —                | II.          | 436  | Senecionis Herba         | II.          | 434      |
| vulgaris —             | II.          | 436  | Serpvlli Herba           | II.          | 646      |
| Rubiae tinctor. Rad.   | I.           | 356  | Sideritis —              | II.          | 631      |
| Rutae Herba Sem.       | II.          | 199  | Sigilli Salomonis Rad.   | II.          | 56       |
| Sabinae Herba          | III.         | 770  | Sii Herba                | I.           | 670      |
| Salep Rad.             | II. 534. 535 |      | Sileris montan. Sem.     | IV.          | 207      |
| Salicariae Herb. Flor. |              |      | Sinapios alb. —          | III.         | 100      |
| Rad.                   | II.          | 312  | nigrae —                 | III.         | 101      |
| Salicis alb. Cort.     | III.         | 748  | Solani Herba             | I.           | 520      |
| fragilis —             | III.         | 724  | furiosi Herb. Bacc.      | I.           | 512      |
| Laureae —              | III.         | 720  | — Rad.                   | I.           | 512      |
| vitellinae —           | III.         | 721  | tuberosi Herb. Tub.      | I.           | 518      |
| Salviae Folia          | IV.          | 16   | Sonchi Herba             | III.         | 286      |
| pratens. Herb.         | I.           | 56   | Sophiae Sem. Herb.       | III.         | 71       |
| sylvestris —           | II.          | 578  | Sorbi alpin. Bacc.       | II.          | 369      |
| Sambuci aquat. Cort.   |              |      | aucupariae Bacc.         | II.          | 376      |
| Flor. Bacc.            | I.           | 738  | domesticae —             | II.          | 379      |
| Cort. int. Fl. Fol.    |              |      | torminalis —             | II.          | 371      |
| Bacc.                  | I.           | 741  | Spartii Summit. Fol. Fl. |              |          |
| Fungus. Sem.           | I.           | 741  | Sem.                     | III.         | 154      |
| Samoli Folia           | I.           | 487  | Spinae albae Fruct.      | II.          | 372      |
| Saniculae Herba        | I.           | 606  | Cervinae Bacc. Cort.     | I.           | 526      |
|                        |              |      | Squamariae Rad.          | II.          | 682      |



|                          | Tom. | Pag. |                         | Tom.       | Pag. |
|--------------------------|------|------|-------------------------|------------|------|
| Stachydis Folia          | II.  | 629  | Ulmī Cort. medius.      | I.         | 580  |
| Statice Folia            | I.   | 754  | Unifolii Herb. Rad.     | II.        | 59   |
| Stoechadis citrin. Flor. |      |      | Urticae majoris Herb.   |            |      |
|                          | III. | 408  | Rad. Sem.               | III.       | 684  |
| Stramonii Herb. Sem.     | I.   | 505  | minoris Herba           | III.       | 683  |
| Succisae Rad.            | I.   | 319  | Uvae Ursi Folia         | II.        | 208  |
| Symphyti Rad. H. Fl.     | I.   | 427  |                         |            |      |
| Syringae Sem.            | I.   | 14   | Valerianae graecae      |            |      |
|                          |      |      | Fol.                    | I.         | 465  |
| Tamarisci Cort.          | I.   | 747  | majoris Rad.            | I.         | 69   |
| Tamni Rad.               | III. | 759  | minoris Rad.            | I.         | 65   |
| Tanacetī Herb. Fl.       |      |      | nobilis —               | IV.        | 21   |
| Sem.                     | III. | 398  | palustris —             | I.         | 65   |
| Taraxaci Herb. Rad.      |      |      | sylvestris —            | I. 67. IV. | 28   |
|                          | III. | 303  | Valerianellae Herb.     | I.         | 73   |
| Telephii Herb.           | II.  | 274  | Verbasci Rad. Fol. Fl.  | I.         | 496  |
| Terebinthina argentor.   |      |      | nigri — — —             | I.         | 502  |
|                          | III. | 710  | Verbēnae Herba          | I.         | 52   |
| communis                 | III. | 707. | Veronicae —             | I.         | 21   |
| Veneta                   | III. | 709  | saxatilis —             | I.         | 23   |
| Tertianariae Herb.       | II.  | 659  | Viburni Baccae Fol.     | I.         | 736  |
| Thalictri Rad. Herb.     |      |      | Victorialis longae Rad. | II.        | 15   |
| Sem.                     | II.  | 525  | rotundae Rad.           | I.         | 78   |
| Thlaspeos Sem.           | III. | 25   | Vincae Pervincae Herb.  | I.         | 556  |
| Thymi vulg. Herb.        | II.  | 647  | Vincetoxici Herb. Rad.  | I.         | 559  |
| Thysselini Rad. Herb.    | I.   | 636  | Violae caninae Rad.     | III.       | 516  |
| Tiliae Cort. Flor.       | II.  | 484  | Lunariae Sem.           | III.       | 49   |
| Tormentillae Rad. Herb.  |      |      | Martiae Fl. Herb.       |            |      |
|                          | II.  | 456  | Rad. Sem.               | III.       | 515  |
| Trifolii albi Flor.      | III. | 223  | odoratae Fl. Herb.      |            |      |
| aquatici Herb.           | I.   | 447  | Rad. Sem.               | III.       | 515  |
| fibrini —                | I.   | 447  | tricoloris Herb.        | III.       | 522  |
| pratensis Fl. Sem.       | III. | 227  | Viperini Rad. H. Sem.   | I.         | 434  |
| Tragopogi Rad.           | III. | 269  | Virgae aureae Herb.     | III.       | 450  |
| Triticum s. Tritici Sem. | I.   | 287  | Visci Lignum. Bacc.     | III.       | 751  |
| Trollii Flores           | II.  | 560  | Vitis Idaeae Bacc. Fol. | II.        | 151  |
| Tunicae —                | IV.  | 302  | Vulvariae Herba         | I.         | 572  |
| Tussilaginis Flor. Fol.  |      |      | Xylostei Baccae         | I.         | 493  |
| Rad.                     | III. | 428  |                         |            |      |
| Ulmariae Herb. Flor.     |      |      |                         |            |      |
| Rad.                     | II.  | 401  |                         |            |      |



# CORRIGENDA.

---

## *In Tomo I.*

Pag. 403 loco CXXVII. legatur CXXXVII. Inter pag. 435 et 437 loco pag. 536 legatur 436. Inter pag. 557 et 559 loco pag. 358 legatur 558. Inter pag. 583 et 585 loco pag. 384 legatur 584.

## *In Tomo II.*

Pag. 195 loco CCVIII legatur CCXVIII. et loco CCXII. legatur CCXXII. Inter pag. 233 et 235 loco 334 legatur 234. Inter pag. 609 et 612 loco pag. 606 et 607 legatur 610 611.

## *In Tomo III.*

Inter pag. 515 et 517 loco pag. 614 legatur 516. Inter pag. 532 et 534 loco pag. 335 legatur 533.

## *In Tomo IV.*

In Indice pag. 755. Barttraube loco pag. 480 legatur pag. 181.

---





*Bromus hordeaceus. pag. 69.*



*Bromus grossus.* pag. 71.









*Bromus groosus*  $\beta$  p. 71.



*Bromus commutatus*. p. 72.









*Bromus Badensis* . p. 75.



*Bromus Kochii* p. 76.









*Bromus Scheuchzeri* p. 179.



*Androsace Halleri*. p. 151.









*Viola stagnina.* pag. 634.

*Tom. IV.*

*Tab. IX.*



*Saxifraga sponhemica. pag. 294.*









New York Botanical Garden Library

QK314 .G55 t.4

Gmelin, Karl Christ/Flora Badensis, Alsa<sup>gen</sup>



3 5185 00121 1083



